

## موانع درک شده مادران در زمینه رفتار مسوак زدن کودکان ۳-۶ سال

پروانه صحرایی<sup>۱</sup>، دکتر نسترن کشاورز محمدی<sup>۲</sup>، دکتر هادی قاسمی<sup>۳</sup>

- کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

- دانشیار، دکتريار تقاضا اسلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

- استادیار، گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

**زمینه و هدف:** مسوак زدن حداقل دو بار در شباهنگی مهم‌ترین عامل مرتبط در کاهش خطر ابتلا به پوسیدگی زودرس دندان‌ها در دوران کودکی است، با وجود اهمیت آن، رعایت این رفتار با موانعی همراه است. موانع درک شده مهم‌ترین بعد در بیان یا پیش‌بینی رفتارهای محافظت‌کننده سلامتی هستند. تعین موانع بهداشت دهان و دندان، محققین را در طراحی مداخلات موثرتر و بهتر برای ارتقاء این رفتار بهداشتی یاری می‌کند. این مطالعه باهدف شناسایی موانع درک شده مادران در زمینه رفتار مسوак زدن کودکان ۳-۶ سال طراحی شده است  
**روش اجرا:** مطالعه حاضر در سال ۹۳ با روش کیفی در شهر کامیاران انجام شد. نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع صورت گرفت. ۴۰ مادر دارای کودک ۳-۶ ساله با شرکت در مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته تجارب خود را بیان نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل درون مایه‌ای انجام شد.

**یافته‌ها:** موانع درک شده مادران در دو دسته کلی شامل «موانع درک شده مربوط به مادر و اعضای خانواده» و «موانع درک شده مربوط به کودک» طبق‌بندی شدند. از مهم‌ترین موانع درک شده می‌توان به موانع نگرشی اشاره نمود.  
**نتیجه گیری:** شناخت موانع و برنامه‌ریزی جهت رفع آن از مهم‌ترین اقدامات پیش‌نیاز تغییر رفتار و موفقیت در آموزش بهداشت است. یافته‌های این مطالعه بر اهمیت نقش نگرش مادر و سایر اعضای خانواده بر سلامت دهان و دندان کودکان تأکید می‌کند و لذا می‌تواند به طراحی بهتر برنامه‌های ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان ۳-۶ ساله کمک کند.

**واژگان کلیدی:** موانع درک شده، مسوак، کودکان

وصول مقاله: ۱۳۹۲/۱۱/۲ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

نویسنده مسئول: دکتر نسترن کشاورز محمدی e.mail:n\_keshavars@yahoo.com

مقدمه:

این رو سلامت دهان و دندان اهمیت ویژه‌ای در حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه دارد (۱). سلامت دهان فراتر از داشتن دندان‌های سالم و جزء جدایی‌ناپذیر سلامت عمومی به شمار می‌آید به طوری که می‌توان گفت دهان آینه‌ای است از سلامت یا بیماری (۲). سلامت دهان و دندان از

در جوامع امروزی با توجه به افزایش ارتباطات و حضور افراد جامعه در موقعیت‌های اجتماعی گوناگون، لزوم رعایت بهداشت دهان و زیبایی دندان‌ها بیش از گذشته حس می‌شود. علاوه بر این، با توجه به این که سلامت عمومی بدن با سلامت دهان و دندان رابطه مستقیم دارد، از

تمرکز و یادگیری او نیز تاثیرگذار باشد. کودکی که از همان اوایل رویش دندان‌ها دچار پوسیدگی دندان می‌شود بیشتر احتمال دارد که در طول دوران کودکی خود از عواقب آن رنج ببرد. داشتن دندان‌های سالم بخش مهمی از سلامت عمومی کودک محسوب می‌شود (۶,۵)، لذا اهمیت سلامت دندان‌های شیری و آسیب‌پذیری بیشتر آن‌ها توجه بیشتر به سلامت دندان‌های شیری را به عنوان یک امر جدی برای سلامت دهان و دندان می‌طلبد.

با توجه به تاثیر آشکار سلامتی دهان بر سلامتی جسمی- روانی افراد و نیز قابل کنترل بودن این بیماری‌های دهان و دندان، رفتارهای متعددی در جهت پیشگیری از آن‌ها صورت گرفته است که کاربرد وسیع فلوراید به اشکال مختلف، مسوک زدن به طور صحیح و منظم، استفاده از نخ دندان، تغییر عادات بهداشتی و کاهش مصرف مواد قندی از جمله این اقدامات می‌باشد (۷) که مسوک زدن متداول‌ترین روش مراقبت از دندان‌ها در بین افراد می‌باشد.

دوبار مسوک زدن در روز جزیی از توصیه‌های خودمراقبتی است که باید برای کودکان با رویش دندان‌ها هر چه سریع‌تر شروع شود (۹,۸). نتایج مطالعه‌ای در اسکاتلندر شان داد که کودکانی که یک بار یا کمتر در روز مسوک می‌زنند ۶۴ درصد بیشتر از کسانی که حداقل دوبار در روز مسوک می‌زنند پوسیدگی دندان دارند (۱۰).

در مطالعات انجام شده در چند کشور اتحادیه اروپا و آمریکا گزارش شده است که این استاندارد رعایت می‌شود

عواملی هستند که معمولاً کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اختلال در صحبت کردن، خنده‌دن، غذا خوردن، درک مزه مواد غذایی و سایر اختلالات فیزیکی و روانی از پیامدهای بهداشت ضعیف‌دهان و دندان می‌باشد (۳). بیماری‌های دهان و دندان که از دامن‌گیرترین و شایع‌ترین بیماری‌های بشر به خصوص در بین کودکان جهان است یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به بهداشت عمومی است. تأثیر آن‌ها بر افراد و جوامع به عنوان نتیجه درد و رنج، اختلال در عملکرد و کاهش کیفیت زندگی قابل توجه می‌باشد. علاوه بر این درمان بیماری‌های دهان و دندان بسیار پرهزینه است و در بسیاری از کشورهای صنعتی چهارمین بیماری پرهزینه برای درمان می‌باشد (۴).

دندان‌های شیری علاوه بر کمک به کودکان در جویدن و برآورده ساختن نیازهای تغذیه‌ای و تکاملی دوره نوبایی و خردسالی در تلفظ کلمات و حفظ فضای کافی برای رشد دندانهای دائمی به صورت منظم نقش دارند. استعداد بالای آسیب‌پذیری دندانهای شیری به دلیل داشتن مینای نازک‌تر نسبت به دندانهای دائمی در برابر عوامل پوسیدگی زا و عدم رعایت موazین بهداشتی اهمیت دندانهای شیری را افزایش داده و حفظ سلامتی و بهداشت آن‌ها یک امر جدی برای سلامت کودک تلقی می‌شود. پوسیدگی دندانهای شیری در اوایل کودکی می‌تواند خواب، تغذیه، صحبت کردن کودک را با مشکل مواجه سازد همچنین می‌تواند بر

۲۱ درصد از مادران به توصیه دوبار مسوак زدن در روز عمل می‌کنند (۱۷). بهداشت دهان و دندان کودکان و نتایج آن تحت تأثیر آگاهی و اعتقادات و مهارت و رفتارهای بهداشت دهان و دندان والدینشان است و این متغیرها خود تحت تأثیر جنسیت، شغل و درآمد والدین است؛ مثلاً مطالعات نشان داده است که کودکان متولد شده از مادرانی که از اهمیت بهداشت دهان و دندان آگاه هستند دندانهای خود را به تعداد دفعات بیشتری مسوак می‌زنند و عادات مطلوب‌تری در مسواك زدن دارند (۱۸). برخی مطالعات نشان می‌دهد که همچنین جنسیت، رفاه خانواده، شغل پدر و مادر به وضوح با میزان مسواك زدن بیش از یک بار در روز رابطه مستقیم دارد (۱۹)؛ بنابراین بخشی از مشکلات پوسیدگی دندان کودکان می‌تواند با بهداشت ضعیف دهان و دندان مادران (۱۷) و آگاهی و نگرش نامناسب آن‌ها مرتبط باشد. البته آگاهی مادران الزاماً منجر به رفتار آنها نمی‌شود؛ مثلاً در یک مطالعه مروری مشخص شد که با وجود اینکه ۷۱ درصد از مادران از نیاز مسواك زدن روزانه در کودکان آگاه بودند ولی تنها ۴۰ درصد از کودکان این رفتار را انجام می‌دادند (۱۲). آگاهی باید منجر به ایجاد نگرش مناسب شود و امکانات و شرایط لازم برای راه رفتار نباشد؛ بنابراین راهکارهای بهداشت دهان و دندان نه تنها کودکان بلکه باید والدین را نیز شامل شود، این نکته باید بتواند مواعنی که مادران برای محافظت از

(۹،۸) این در حالی است که محبی و همکارانش در مطالعه ای که در شهر تهران انجام دادند گزارش کردند که تنها ۵ درصد از کودکان روزانه دوبار مسواك می‌زنند (۱۱). عادت مسواك زدن باید از کودکی توسط والدین به کودک یاد داده شود که روزی حداقل دوبار انجام گیرد (۱۲). مادران اولین معلم کودک هستند و نقش مهمی در حفظ سلامت او ایفا می‌کنند (۱۳) در واقع مادر بخشی از محیط کودک است که به طور مستقیم مسئول بهداشت دهان و دندان کودکان خود می‌باشد و نقش مهمی در ایجاد عادات‌های مهم رفتاری بهداشت دهان و دندان آن‌ها دارد. پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان جهت جلوگیری از ازدست دادن زودرس دندانهای شیری و در نتیجه کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های دهان و دندان در سالهای بعد زندگی کودک و ارتقاء سطح بهداشت دهان و دندان آن‌ها حیاتی است (۱۴). در کودکان ۱ تا ۳ سال مادران به عنوان مراقبت‌کنندگان اصلی جهت اقدامات بهداشت دهان و دندان محسوب می‌شوند. در دروه قبل از مدرسه (۲ تا ۶ سال) پیشرفت کودک در امور بهداشتی دهان و دندان آغاز می‌شود، اما هنوز مادران تأمین کننده اصلی بهداشت دهان و دندان هستند (۱۵) اما بسیاری اوقات در عمل این مسئولیت اعمال نمی‌شود؛ مثلاً در مطالعه‌ای در آمریکا در سال ۲۰۱۳ نشان داد که ۲۸ درصد از مادران بر مسواك زدن کودکان زیر ۵ سال خود هیچگونه نظارتی ندارند (۱۶). نتایج مطالعه دیگری در سال ۲۰۰۸ نشان داد که تنها

مصطفیه عمیق نیمه ساختار یافته انجام یافت. هدف از پژوهش کیفی توسعه شناخت پدیده‌های اجتماعی در بستر طبیعی بر اساس گردآوری اطلاعات و تجربیات مشارکت‌کنندگان می‌باشد که کمک می‌کند تا یک پدیده اجتماعی را در بستر طبیعی خودش بفهمد و تأکید آن گردآوری تجربیات و نظرات همه شرکت‌کنندگان در تحقیق است (۲۵). این مطالعه به بررسی عمیق موانع درک شده مادران برای انجام رفتار مسوак در کودکان پرداخت.

جامعه پژوهش، مادران دارای کودک ۳ تا ۶ سال تحت پوشش سه مرکز بهداشتی شهر کامیاران بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و با رعایت حداقل تنوع آغاز و سپس تا اشباع اطلاعات پیگیری شد به طوری که با ۴۰ مشارکت‌کننده به اشباع رسید. همچنین در پایان سه مصاحبه تکمیلی جهت تأیید رسیدن به اشباع اطلاعات انجام شد. بعد از هر مصاحبه تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام و سپس مصاحبه بعدی انجام می‌شد. از معیارهای ورود به مطالعه مادران دارای کودک ۳-۶ سال تحت پوشش مرکز، اهل کامیاران و ساکن این شهر از زمان تولد فرزند خود و مایل به انجام مصاحبه و داشتن توانایی در بیان تجربه‌های خود بود و از معیارهای خروج از مطالعه عدم تمایل و یا عدم توانایی برای ادامه مشارکت فرد به شرکت در پژوهش، داشتن کودک دچار اختلال روانی یا معلولیت بود. مشارکت‌کنندگان با حداقل تنوع از نظر سن مادر، سن کودک، جنسیت و رتبه تولد کودک، شغل و تحصیلات

سلامت دهان و دندان کودکان دارند را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها اقدام مقتضی را انجام دهد. مفهوم موانع درک شده، ادراکات فرد از ابعاد بالقوه منفی انجام یک رفتار مانند هزینه، خطر، در دسترس نبودن و زمان می‌باشد که به صورت یک مانع برای انجام رفتار عمل می‌کند (۲۱، ۲۰). مطالعات نشان داده‌اند که موانع درک شده عامل مهمی در بیان یا پیش‌بینی رفتارهای محافظت کننده سلامتی هستند (۲۲، ۲۳). شناخت موانع، آگاهی بالقوه ای برای تغییر رفتارهای سبک زندگی و کمک به آمادگی برای شروع و ادامه رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت به وجود می‌آورند (۲۴). با توجه به اینکه در مروری بر متون، به مطالعه ای که در ایران در خصوص شناسایی موانع درک شده مادران در خصوص مسوак زدن کودکان ۳ تا ۶ سال خود انجام شده باشد دست نیافت و همچنین با توجه به اهمیت رفتار مسوак زدن در سلامت دهان و دندان و ضرورت شناسایی نگرش و باورهای مادران در مورد این رفتار برای طراحی برنامه‌های آموزشی مناسب از مطالعه کیفی جهت شناسایی تجربیات و بیدگاه مادران شهر کامیاران در زمینه موانع دوبار مسوак زدن با نظارت و مراقبت مادران استفاده شد.

#### روش بررسی:

مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی است که در سال ۹۳ باهدف تبیین ادراک و تجربیات مادران از موانع رفتار مسوак زدن در کودکان ۳-۶ سال با روش

درون‌مایه‌ها)، باهدف تدوین درون‌مایه‌ها از کدهای ابتدایی انجام پذیرفت. کدها به برگه‌های کد انتقال یافت و طبقات از آن‌ها به دست آمد. طبقات با سازه یکسان گروه‌بندی و درهم ادغام شدند و به سطح بالاتر تا حد امکان و منطقی ارتقاء یافتند. طبقه با توجه به ویژگی‌های کلمات بکار رفته در آن نامگذاری شد بدین معنا که کدهای مشابه در یک طبقه تحت عنوان درون‌مایه فرعی طبقه‌بندی گردیدند. در مرحله چهارم (بازنگری درون‌مایه‌ها) با در نظر داشتن همسانی درونی و برونوی سعی بر آن گردید که داده‌های موجود در هر درون‌مایه علاوه بر پیوستگی درونی با داده‌های درون‌مایه‌های دیگر نیز تمایز داشته باشند. در مرحله پنجم (تعريف و شماره‌گذاری درون‌مایه‌های اصلی) با توجه به رویکرد استقرایی مطالعه باهدف تدوین طبقه نهایی صورت گرفت، جوهرهای هر یک از درون‌مایه‌ها شناسایی گردید و تحت عنوان درون‌مایه‌های اصلی نامگذاری گردیدند. در مرحله پایانی تلاش گردید با تجمعی معانی تمام درون‌مایه‌ها، بیان جامعی از موانع درک شده مادران از بهداشت دهان و دندان کودکان ۳-۶ سال ارایه گردد (۲۷،۲۶).

جهت تأیید روایی و دقت تحقیق، معتبر بودن، اطمینان پذیری و قابلیت تأیید داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تضمین معتبر بودن، یافته‌های این مطالعه به تعدادی از شرکت‌کنندگان ارائه شد و آن‌ها نظرات خود را در مورد هماهنگی یافته‌ها با تجربیاتشان به محققان ابراز نمودند،

والدین، بعد خانوار از سه مرکز بهداشتی درمانی شهری انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از راهنمای مصاحبه که به صورت سؤالات نیمه‌باز بود انجام گردید. در حین مصاحبه‌ها تمرکز اصلی بر توصیف مشارکت‌کنندگان از تجربیاتشان بود، همچنین از سؤالات کاوشی جهت شفاف تر شدن و برطرف کردن ابهامات و عمق بخشیدن به پاسخ‌ها استفاده شد. مدت مصاحبه‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بود. مصاحبه‌ها تا دستیابی به داده‌های عمیق ادامه یافت. با اجازه و اطلاع قبلی مصاحبه شوندگان تمامی مصاحبه‌ها روی دستگاه ضبط صدا ضبط شد، در طی مصاحبه از فرآیند مصاحبه و پیام‌های غیرکلامی مصاحبه شوندگان مانند لحن کلام، سکوت، تأکید و ... یادداشت‌برداری شد. بلافصله بعد از اتمام مصاحبه، متن مصاحبه‌ها پس از چند بار گوش دادن به همراه ارتباطات غیرکلامی تایپ شد.

از آنجا که در مطالعه حاضر، تاکید بر سازماندهی و توصیف عمیق داده‌ها و درک مفاهیم پیدا و ناپیدای تعابیر است لذا اطلاعات به روش Thematic (درون‌مایه‌ای) مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. محقق در مرحله اول (آشنایی با داده‌ها) به بازخوانی مکرر مصاحبه‌ها باهدف غوطه‌ور شدن در داده‌های مطالعه جهت دریافت ایده‌های کلی مصاحبه اقدام نمود. در مرحله دوم (تولید کدهای ابتدایی)، واحدهای معانی از متن مصاحبه‌ها استخراج و در قالب کدهای ابتدایی نامگذاری شدند. مرحله سوم (جستجوی

۴ سال، ۹ نفر دارای کودک ۵ سال و ۶ نفر نیز دارای کودک ۶ سال بودند. ۱۸ نفر از کودکان دختر و ۲۲ نفر هم پسر بودند. در این پژوهش، طبق ادعای مادران به ندرت یافت می‌شد که مادران بر مسواک زدن کودک نظارت کنند و اکثراً انجام آن را به خود کودک تحمیل می‌کردند. ماحصل تحلیل مصاحبه‌ها در مورد موافع درک شده رفتار مسواک کردن کودکان ۶-۳ ساله به صورت ۲۲ که، ۶ درون‌ماهیه فرعی، ۲ درون‌ماهیه اصلی شامل «موافع درک شده مربوط به مادر و یا اعضای خانواده» و «موافع درک شده مربوط به کودک» خلاصه گردید که تفصیل هر یک از این طبقات در زیر آورده شده است. خلاصه تحلیل یافته‌ها در جدول شماره یک همراه با کدها و فراوانی آن‌ها آمده است.

(الف) موافع درک شده مربوط به مادر و اعضای خانواده موافع درک شده مربوط به مادر به مراتب بیش از موافع درک شده مرتبط با کودک بود. مادران، به علی همچون نگرش نامناسب به لزوم مراقبت از دندان شیری، شرایط روحی روانی نامناسب خود و عدم داشتن رفتار، مهارت و آگاهی لازم برای مراقبت از دندان‌های شیری از توجه کافی و یا انجام مسواک کردن برای کودکان خود غفلت نموده بودند. از میان موافع مربوط به خود مادر بیشترین نوع موافع درک شده در میان زنان شرکت‌کننده مربوط به نگرش‌های نامناسب بود. در اینجا این دسته از موافع بیشتر توضیح داده می‌شود.

همچنین تعمق مشارکتی پیرامون مضمون‌های پدیدار شده توسط تیم تحقیق در مراحل مختلف مطالعه انجام گرفت. پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش، قابلیت تأیید این پژوهش را تضمین نمودند. علاقمندی پژوهشگران به پدیده تحت مطالعه، تماس درازمدت با داده‌ها و همچنین، تلاش برای کسب نظرات دیگران در این زمینه از دیگر عوامل تضمین‌کننده قابلیت تأیید بودند. علاوه بر این، پژوهش حاضر به صورت تیمی و با راهنمایی و نظارت صاحب‌نظران انجام گردیده است که هم اطمینان‌پذیری داده‌ها و هم قابلیت تأیید را امکان‌پذیر می‌نماید.

در رعایت ملاحظات اخلاقی، ضرورت ورود با رضایت آگاهانه به مطالعه، حق کناره‌گیری از تحقیق، لزوم ضبط مکالمات و انتشار کلی نتایج با مشارکت‌کننده‌ها در میان گذاشته شد. همچنین به مشارکت‌کنندگان اطمینان داده شد که در صورت تمایل، اطلاعات ضبط شده و متن مصاحبه‌های تایپ شده در اختیار آن‌ها قرار داده خواهد شد. یافته‌ها:

محدوده سنی مادران شرکت‌کننده در مصاحبه ۲۱-۴۴ سال بود. از نظر وضعیت تحصیلی ۵ نفر بی‌سواد، ۱۹ نفر دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و ۱۶ مادر دیگر نیز تحصیلات دیپلم و بالاتر از دیپلم را داشتند. همچنین ۲۹ نفر از مادران خانه‌دار و ۱۱ نفر دیگر کارمند بودند. ۱۱ نفر از مشارکت‌کنندگان دارای کودک ۳ سال، ۱۴ نفر دارای کودک

## نگرش

را در کودکان تحت تأثیر قرار دهد و باعث عدم وجود دو

بار رفتار مسوак کردن یا بیشتر در کودکان گردد؛ مثلاً

مشارکتکنندگان بیان نمودند که: «برای بچه‌های با این سن

۳۵ سال همون یک بار در شب کفايت می‌کنند» لیسانس،

ساله

- عدم باور به لزوم نظارت بر مسوак کردن کودک

در این مطالعه، بیش از نیمی از مشارکتکنندگان، لزوم

نظارت و مراقبت مسواك زدن دندان‌ها توسط کودک را در

این گروه سنی باور نداشتند و از نظر آن‌ها آموزش‌هایی

که در زمان شروع مسواك زدن به کودکان می‌دهند کفايت

می‌کند و نیازی به نظارت مستمر نیست، بیشتر

مشارکتکنندگان انجام مسئولیت این رفتار را بر عهده خود

کودک می‌گذاشتند: «همون روز اول که براش مسواك

خریدم بهش یاد دادم و دیگه نظارتی روی مسواك زدنش

ندارم، آخه دیگه فکر نکنم نیازی داشته باشه» دیپلم،

ساله

- نگرش نامناسب نسبت به ضرورت مسواك برای کودک

بیش از نیمی از مادران هم از گروه تحصیل‌کرده و هم کم

سواد و بی‌سواد به دلایل مختلفی معتقد بودند مسواك

ضرورت چندانی ندارد، از نظر آن‌ها کودک به خاطر عدم

مهارت کافی در این زمینه و استنگی به مادر تا زمانی که به

طور مستقل مهارت لازم را کسب نکند نیازی نیست که

مسواك زدن را به طور مرتب انجام دهد، از نظر برخی

دیگر از مادران این سن فقط زمان بازی و رشد کودک

در این رفتار درون‌ماهی نگرش بیشترین تعداد کدها را به

خود اختصاص داد. در این مطالعه، همان طور که جدول

شماره یک نشان می‌دهد عمدۀ مواعظ درک شده مادران

حتی مادرانی با تحصیلات دیپلم و بالای دیپلم از نوع

نگرشی بود که ۱۴۷ بار در قالب ۹ نگرش نامناسب مطرح

شد. در ذیل به انواع نگرش‌های نامناسب یافت شده در

مصاحبه‌ها با نقل قول مادران به همان صورتی که بیان

شده است اشاره می‌گردد.

- عدم اهمیت دندان‌های شیری

بی‌اهمیت بودن دندان‌های شیری مخصوصاً به دلیل موقعی

بودن آن، رایج‌ترین نگرش مشارکتکنندگان در این مطالعه

بود. اکثر مادران معتقد بودند که از نظر آن‌ها دندان‌های

شیری نیاز چندانی به مراقبت و سخت‌گیری جهت مسواك

زدن ندارند زیرا عمر این دندان‌ها تا ۶ یا ۷ سالگی بیشتر

نیست و مراقبت از دندان‌های دائمی مهمتر از دندان‌های

شیری است. به عنوان مثال یکی از مادران اظهار داشت:

«این دندونا که زیاد اهمیتی ندارن و موقتن و بالاخره

می‌افتن، به نظر من اگر هم در مراقبتش سهل انگاری کنیم

می‌توینیم برای دندونای اصلی جبران کنیم» دیپلم، ۲۸ ساله

- کافی بودن یک بار مسواك زدن

دیدگاه و تجارب بیشتر مادران نشان می‌دهد که آن‌ها به

یک بار مسواك زدن در طول شب‌انه روز اعتقاد داشتند و

همین باور و عقیده آن‌ها باعث شده بود که انجام این رفتار

- نداشتن انگیزه برای مسواك زدن دندان غیرسالم  
برخی از مشارکتکنندگان در این پژوهش هم افرادی با تحصیلات دانشگاهی و هم با تحصیلات ابتدایی، بیان نمودند که سیاهی و خرابی دندان‌های کودک به علت مصرف قطره آهن باعث بیانگیزگی آن‌ها در مراقبت از دندان‌های کودک شده است. در نتیجه، آن‌ها انگیزه‌ای جهت سختگیری در مسواك کودک و تمایلی به نظارت و مراقبت از آن‌ها نداشتند: «از وقتی دندوناش به خاطر قطره آهن خراب شده دیگه انگیزه‌ای ندارم که به دندوناش رسیدگی کنم لیسانس، ۳۴ ساله
- بی‌فایده دانستن مسواك کردن دندان غیرسالم  
بی‌فایده بودن مسواك کردن دندان غیرسالم از سایر نگرش‌های مانع توجه و نظارت بر انجام مسواك کردن کودکان بوده که از سوی برخی مشارکتکنندگان بیان گردید. از نظر تعداد معدودی مادران رسیدگی به دندانی که به دلایل مختلف از جمله مصرف قطره آهن و یا خوردن بی‌رویه مواد قندی پوسیده و خراب شده باشد کار بیهوده‌ای است و باید منتظر افتادن دندان پوسیده و رویش دندان‌های دائمی بود. از نظر این مادران مراقبت و مسواك از دندان قبل از خرابی و پوسیدگی دندان مفید است و مثلاً می‌تواند باعث سفیدی دندان شود، مواردی هم که بعد از خرابی و پوسیدگی شدید دندان‌ها بهداشت دهان و دندان را است و نباید بهداشت را به کودک تحمیل کرد و فقط در حدی باشد که با مسواك و خمیردندان آشنا گردد: «راستش تا حالا به اهمیت این موضوع فکر نکرده بودم که مسواك زدن برای بچه با این سن و سال کم ضرورتی داشته باشه، من همیشه فکر می‌کردم این سن و سال فقط کافیه بچه مسواك و بشناسه تا هر وقت که بزرگ شد یاد بگیره خودش استفاده کنه، به خاطر همین من فقط واسش خریدم ولی دیگه نه سختگیری می‌کنم نه نظارتی دارم» دیپلم، ۳۴ ساله
- اعتقاد به تنفر کودک از مسواك به علت مسواك کردن زیاد یا زود هنگام  
برخی مشارکتکنندگان در پژوهش بیان نمودند که شروع مسواك از سنین پایین و یا وادار کردن کودک به دو بار مسواك در شب‌نیروز باعث دل زدگی کودک از مسواك و عدم اشتیاق او جهت انجام این رفتار در بزرگسالی می‌شود، لذا تعدادی از مشارکتکنندگان هنوز مسواك را برای کودک خود شروع نکرده بودند و از نظر برخی دیگر از مادران فقط یک بار مسواك در شب‌نیروز در این گروه سنی کفایت می‌کند: «شب‌ارو که به زور می‌زاره و مقاومت می‌کنه اگه به خام روزام بهش اجبار کنم که مسواك بزنه دیگه واسه شب‌ها اشتیاقی برash نمی‌مونه و ممکنه از مسواك زدن متنفر بشه» دیپلم، ۲۸ ساله

جدول شماره (۱): جدول موانع درک شده مادران در زمینه رفتار مسواک زدن به صورت دو بار در شبانه‌روز با نظارت و مراقبت

مادر

فرآوانی	کد	درون‌مایه فرعی	درون‌مایه اصلی
۳۱	عدم اهمیت دندان‌های شیری		
۳۰	کافی بودن یک بار مسواک		
۲۸	عدم باور به لزوم نظارت بر مسواک زدن کودک		
۲۳	نگرش نامناسب نسبت به ضرورت مسواک برای کودک		
۱۰	اعتقاد به تنفس کودک از مسواک به علت مسواک زدن زیاد یا زودهنگام		
۸	نداشتن انگیزه برای مسواک کردن دندان غیرسالم	نگرش (با فرآوانی ۱۴۷)	
۷	بی‌فایده بودن مسواک کردن دندان غیرسالم		
۶	باور به عوارض مسواک کردن		
۳	اعتقاد به خوب بودن جنس دندان و عدم نیاز به مراقبت		
۳۷	عدم عادات رفتاری مناسب خانواده		موانع درک شده مریبوط به مادر و یا اعضای خانواده
۲۸	عدم همراهی کودک	رفتار و مهارت (با فرآوانی ۶۸)	
۳	عدم تشویق کودک		
۱۲	بی‌حوصلگی و تنبی		
۱۰	فراموشی	شرایط روحی روانی (با فرآوانی ۲۵)	
۳	مشکلات زندگی		
۱۴	عدم آگاهی	آگاهی (با فرآوانی ۱۴)	
۱۱	عدم تمایل و علاقه کودک به مسواک		
۱۰	بی‌حوصلگی و خواب آلودگی کودک	شرایط روحی روانی (با فرآوانی ۲۸)	موانع درک شده مریبوط به کودک
۷	عدم تمایل به مسواک زدن به صورت تنهایی		
۴	مسواک نزدن به علت عدم احساس اجبار و ترس		
۸	عدم مهارت کودک	مهارت و رفتار (با فرآوانی ۱۴)	
۶	کثیف و خیس کردن لباس		

دندو نامون خوبه فکر نکنم لازم باشه این قدر حساسیت  
نشون بدم به مسواك زدنش، همین که شکلات شیرینی  
کمتر بخوره کافیه، اون یکی بچم پنجم ابتداییه با وجود  
اینکه اصلا اهل مسواك زدن نیست ولی شکر خدا تا حالا

مشکلی نداشت» بی سواد، ۴۲ ساله

#### ❖ رفتار و مهارت

به غیر از نگرش از سایر از کدهای مربوط به موانع درک  
شده مرتبط با مادر رفتار و مهارت مادر و اعضای خانواده  
بود. این دسته از موانع شامل عدم عادات رفتاری مناسب  
خانواده، عدم همراهی و نیز عدم تشویق کودک بود که با  
نقل قول های مادران به آن پرداخته می شود:

#### • عدم عادات رفتاری مناسب خانواده

اکثریت قریب به اتفاق مادران بیان نمودند که چون ایشان  
و سایر اعضای خانواده به طور مرتب مسواك نمی زنند  
کودک نیز به طور مناسب مسواك نمی زند. در مواردی هم  
که رفتار مسواك به صورت روزانه در خانواده وجود  
داشت فقط جهت کاهش درد یا ساکت کردن درد دندان بعد  
از خرابی شدید دندانها بوده است. این مورد رایج ترین  
مانع گزارش شده مادران در این مطالعه بود: «ما هیچ کدام  
روزا مسواك نمی زنیم که بچم بخواه عادت کنه روزا بزن،  
یا از کسی یاد به گیره به خاطر همین بچم فکر میکنه  
مسواك فقط مختص شبهه نه روز» فوق دیپلم، ۳۴ ساله

برای کودک رعایت می کردند فقط جهت کاهش درد دندان و  
یا کسب عادت مسواك کردن بود: «پسرم شبا مسواك  
میزنه هر چند که قطره آهن تمام دندوانشو خراب کرده و  
دیگه فایده ای نداره، ولی خب میگم از حالا مسواك بزننه که  
بزرگ شد عادت کنه» ابتدایی، ۳۹ ساله

#### • باور به عوارض مسواك زدن

تعدادی از مشارکتکنندگان مانع از انجام رفتار مسواك در  
کودک خود می شدند زیرا از نظر آنها مسواك برای  
کودکان این گروه سنی حتی ممکن است ضرر هم داشته  
باشد: «بچم هر وقت مسواك میزنه لثه هاش قرمز میشه،  
باباش میگه به خاطر این مسواكه که لثه هاش این جوری  
میشه، به خاطر همین دیگه نمیذاره مسواك بزننه» دیپلم،  
۲۷ ساله

«تازه توی این بچهها با این سن خطر قورت دادن خمیر  
دندون هست که ممکنه مسموم بشن، به نظر من باید  
بزرگتر بشن بعد که یادگرفتن براشون تهیه کنیم»  
راهنمایی، ۴۳ ساله

#### • اعتقاد به خوب بودن جنس دندان و عدم نیاز دندان سالم به مراقبت

تعدادی از مشارکتکنندگان به دلیل عدم مشاهده مشکلات  
دندانی به خصوص درد دندان، به خوب بودن جنس دندان  
کودک خود معتقد بودند و از نظر آنها این گونه افراد نیاز  
زیادی به مسواك و مراقبت نداشتند: «ما خونوادگی جنس

شرایط روحی روانی مادران بود که به گفته ایشان در

مراقبت از دندان‌های کودکان موثر بود. بی‌حوالگی و  
تنبلی، فراموشی و مشکلات زندگی از جمله موانع بیان‌شده  
در این طبقه بودند که با ذکر مثال در اینجا توضیح داده  
می‌شوند:

• بی‌حوالگی و تنبلی

مشارکت‌کنندگان متعددی هم از گروه تحصیل‌کرده هم کم  
سواد، به نداشتن حوصله و تنبلی خود جهت نظارت و  
مراقبت مسواک کردن کودکان و یا یادآوری و تذکر به  
کودک جهت انجام این رفتار بهداشتی اشاره نمودند. این در  
حالی بود که حتی برخی لزوم نظارت بر مسواک کردن  
کودک خود را نیز می‌دانستند، این مادران با مشکل اهمال  
در بهداشت دهان و دندان کودک خود روبرو بودند و  
اهمیتی به مسواک زدن دندان کودک نمی‌دادند، برای مثال  
چهار نفر از شرکت‌کنندگان چنین گفتند: «راستشو بخاید  
خدوم تنبلی می‌کنم و گرنه میدونم لازمه روی مسواک  
زدنش نظارت کنم، آخه واقعاً حوصله می‌خواهد» فوق‌دیپلم،  
۳۴ ساله

• فراموشی

تعدادی از مشارکت‌کنندگان به مسئله فراموشی اشاره  
نمودند و از آن به عنوان مانعی در انجام رفتار مسواک  
کردن توسط کودک نام بردنند: «یادم می‌رده بهش بگم بره  
مسواک بزن، یه روز بگم دو سه روز یادم می‌رده، اگه  
مسئله مهمی بود مثل دادن دارو به کودک یا هر چیز مهم

• عدم همراهی کودک

بیش از نیمی از مادران بیان نمودند که عدم همراهی کودک  
جهت مسواک کردن و تحمل این وظیفه به خود کودک  
باعث عدم اشتیاق در کودک شده که به تدریج رفتار  
مسواک کردن را رها کند. البته برخی مادران گفتند که  
کودک خود را تنها به التماس و اصرار کودک جهت رفتار  
مسواک همراهی می‌کردند و به عبارتی مادر برخلاف میل  
و تمایل خود مجبور به انجام این کار بوده است: «بعضی  
وقت‌ها که خودم باهاش نرم مسواکشو بزنم او نم بی خیال  
مسواک زدن می‌شه» ابتدایی، ۲۸ ساله  
«شبا که خودم مسواک می‌زنم دخترم باهام می‌ارد  
مسواکشو می‌زنم ولی روزا بهونش اینه که چون کسی  
باهاش نمی‌رده مسواک بزنم او نم از خدا خواسته دیگه  
نمی‌زن» ابتدایی، ۳۹ ساله

• عدم تشویق کودک

برخی مشارکت‌کنندگان بیان کردند که یکی از علل عدم  
عادت رفتار مسواک کردن در کودک خود عدم تشویق  
آن‌ها است: «بچم تازه چند وقتی که مسواک می‌زنم، او نم به  
خاطر اینکه تشویقش می‌کنم، همیشه با خودم فکر می‌کنم  
اگه قبل از تشویقش کرده بودم که اینطوری نمی‌شد، متاسفانه  
دیر مسواکو شروع کردم وقتی که دندون دردش شروع  
شد» ابتدایی، ۲۹ ساله

• شرایط روحی روانی

سومین دسته موانع درک شده مرتبط با مادر، چگونگی

ب) موانع درک شده مربوط به کودک  
از دیگر موانع درک شده مادران در زمینه مسواک زدن کودکان مواردی بود که به خود کودک مربوط می‌شد که از درون‌مایه‌های فرعی این طبقه عدم شرایط روحی و روانی کودک و عدم مهارت لازم است که در اینجا به آن‌ها پرداخته می‌شود.

❖ شرایط روحی روانی کودک  
برخی مادران بیان نمودند که کودک آن‌ها به دلایلی چون عدم تمايل و علاقه به مسواک، بی‌حوالگی و تنبی، عدم تمايل به مسواک کردن به صورت تنهایی، مسواک نکردن به علت عدم احساس اجبار و ترس از مسواک امتناع می‌کنند.

• عدم تمايل و علاقه کودک به مسواک  
تجارب و دیدگاه برخی مشارکت‌کنندگان نشان داد که یکی از موانع مسواک کردن در کودکان به بی‌علاقگی و نداشتن هیچ‌گونه تمايلی جهت انجام این رفتار مربوط می‌شود. از نظر مادران تحمل مسواک به کودک در صورتی که علاقه و تمايلی به انجام این رفتار نداشتند باشد کار بیهوده‌ای است و نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت و مادر را خسته و بی‌انگیزه می‌نماید: «نه والا مسواک نمی‌زن، پارسال برash مسواک خریدم یکی دوبار که زد دیگه از چشممش افتاد و گذاشتند کنار، امسال هم به راش خریدم اتفاقی اگه بعضی وقتاً حوصله داشته باشه می‌زن، نمیدونم چیکار کنم، اصلاً

علاقه نشون نمی‌ده» ابتدایی، ۲۸ ساله

دیگه ای که فراموش نمی‌کردم ولی واقعیتش چون مسواک و دندوناش برام مهم نیست بیشتر وقتاً فراموش می‌کنم»  
ابتدایی، ۳۳ ساله

#### • مشکلات زندگی

وجود مشکلات یکی دیگر از مواردی است که تعداد معددی از مشارکت‌کنندگان به عنوان عاملی که مانع مراقبت و نظارت در مسواک کردن کودک می‌شود اشاره نمودند، از نظر مادران مسائل و مشکلات مهمتری در زندگی وجود دارد که فرصتی برای رسیدگی به بهداشت دهان و دندان کودکان باقی نمی‌گذارد: «مشکلات زندگیم به حدی زیاده که اسم خودمم یادم رفته چه برسه به اینکه مسواک زدن دخترمو یادآوری کنم و به فکر دندوناش باشم» ابتدایی، ۲۸ ساله

#### ❖ آگاهی

آگاهی یکی دیگر از درون‌مایه‌های فرعی مربوط به مادران است که به تعداد کمی عنوان مانع مراقبت بهداشت دهان و دندان کودکان به آن اشاره نمودند. طبق گفته‌های مادران برخی از آن‌ها اصلاً نمی‌دانستند که دو بار مسواک کردن در شب‌انه‌روز با نظارت و مراقبت مادر برای کودکان نیاز است، مثلاً مادران می‌گفتند که: «من اصلاً نمی‌دونستم که دوبار مسواک زدن برای بچه‌ها هم نیازه، فکر می‌کردم همون یه بار فعلاً که بزنم تا یاد به گیره کافیه» دیپلم، ۲۸ ساله

• بی‌حوصلگی و خوابآلودگی کودک

• مسوак نزدن به علت عدم احساس اجبار و ترس  
تعداد محدودی از مادران، تهدید کودک را به عنوان یکی از  
راههای وادار کردن او جهت مسواك کردن می‌دانستند که  
در صورت عملی نشدن تهدید، کودک رفتار مسواك کردن  
را رها می‌کند و همین مسئله مانع می‌شود که کودک  
سراغ مسواك نزود: «خمیر و مسواك برash خریدم ولی  
هیچ علاقه‌ای به مسواك زدن نداشت تا اینکه بهش می‌گفتم  
اگه نزنی می‌برمت پیش دندونپزشک، اوایل اکثر شبا  
مسواك می‌زد ولی حالانه، اصلاً مرتب نمی‌زن»  
راهنمایی، ۲۴ ساله

❖ عدم مهارت کودک برای مسواك زدن  
اظهارات بدخی مادران نشان داد که از نظر آن‌ها کودکان  
در این گروه سنی به اندازه کافی مهارت لازم را جهت  
انجام رفتار مسواك ندارند. لذا ایشان یا مانع انجام این  
رفتار در کودک می‌شوند و در مواردی هم علیرغم تمایل  
کودک این کار را برای کودک انجام می‌دادند.

• مهارت و رفتار

از نظر تعدادی از مشارکت‌کنندگان، کودکان این گروه سنی  
مهارت لازم برای مسواك را ندارند و یا باید مانع مسواك  
زدن آن‌ها شد و یا این کار را برای کودک انجام داد: «به  
نظر من بچه در این سن ممکن خمیردنون رو قورت بده یا

از نظر برخی دیگر از مادران یکی از مشکلات دیگر این  
است که کودک به دلیل اینکه در طول روز بیشتر در حال  
بازی و جنب و جوش است شب‌ها بی‌حوصله و خوابآلود  
می‌باشد و از مسواك کردن سر باز می‌زند. برخی عنوان  
کردند که با توسل به زور و التماس کودک را وادار به  
مسواك زدن می‌کنند و گروهی از کودکان هم بدون انجام  
مسواك به خواب می‌روند: «تازگیا برash خمیر و مسواك  
خریدم، گاهی وقت‌ها می‌زنم بعضی وقت‌ها اصلاً نمی‌زنم،  
شده قبل از غذا رفته مسواك زده ولی بعضی وقت‌ها سه  
چهار روز اصلاً نمی‌زنم، بعضی وقت‌ها مسواكشو خالی  
بدون خمیر توی دهنش می‌چرخونه، بیشتر باهاش بازی  
می‌کنه تا دندوناشو مسواك بزنه، بیشترش بیام بهونش اینه  
می‌گه خوابم می‌ماید و مجبورم خودم به زور ببرم» ابتدایی،  
۴۴ ساله

• عدم تمایل به مسواك زدن به صورت تنها

تعدادی از مشارکت‌کنندگان اظهار داشتند که کودک تمایلی  
به مسواك کردن به صورت تنها ندارد و در مواردی  
حتی رفتار مسواك کردن را رها می‌کند: «بعضی وقت‌ها  
پسرم می‌ماید می‌گه مامان توام با من بیا بریم مسواك بزنیم  
وقتی باهاش نمیرم او نم دیگه اشتیاقی برash نمی‌مونه و بی  
خيال مسواك زدن می‌شه» ابتدایی، ۲۸ ساله

یا اعضای خانواده بیشترین انواع و در مجموع تکرار را به خود اختصاص دادند. در این مطالعه به وضوح معلوم

گردید که نگرش‌های نادرست مادران مبنی بر عدم اهمیت دندان‌های شیری مهم‌ترین مانع انجام رفتار مناسب مادران جهت حفظ و ارتقای بهداشت دهان و دندان کودکان ۳-۶ ساله بود. نگرش نامناسب در مطالعات خارجی مثلاً در مطالعه‌ای در استرالیا نیز به عنوان یک مانع بهداشت دهان و دندان ذکر شده است (۲۸). لذا به نظر می‌رسد در مداخلات آموزشی باید اصلاح نگرش‌های نامناسب مادران که ریشه در عدم آگاهی مناسب آن‌ها نسبت به اهمیت بهداشت دهان و دندان است بسیار مورد توجه قرار گیرد.

به غیر از نگرش، عدم وجود رفتارهایی چون مسوак زدن در خانواده که منجر به عدم همراهی و تشویق کودک جهت مسوак زدن به هر دلیل می‌گردید از جمله شایع‌ترین موانع درک شده مادران مورد مطالعه بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد کودکان هم به دلیل عدم همراهی مادر هیچ‌گونه تقابلی به مسوак زدن به صورت تنهایی ندارند و به مرور این رفتار را رها می‌کنند. عدم نظارت مادران یا ناشی از عدم باور به لزوم نظارت بر مسوак زدن کودک، یا تنبی و بی‌حوصلگی و یا وجود مشکلات زندگی بوده است. تنبی به عنوان یکی از موانع مادران جهت نظارت بر مسوак کردن کودکان در مطالعه Riedy و Huebner

به لثه هاش آسیب برسونه لازمه مادران خودشون اینکارو  
براشون انجام بدن نباید سپردهش به بچه» دیپلم، ۲۴ ساله

#### • کثیف و خیس کردن لباس

برخی مادران به این موضوع اشاره داشتند که کودکان کم سن به خاطر عدم مهارت کافی حین مسوак کردن لباس‌های خود را خیس می‌کنند و همین عامل باعث می‌شود که مادران مانع از انجام این رفتار در کودکان شوند: «برخلاف بقیه بچه های این یکی خیلی دوست دارد هر شب مسواك بزنه ولی چون لباساشو خیس میکنه خودم میگم هر وقت می‌برم مش حموم مسواك بزنه تا وقتی که کم بزرگ‌تر بشه» بی‌سوار، ۴۲ ساله

#### بحث و نتیجه‌گیری

مصاحبه با مادران نشان داد که به ندرت کودکان دو بار مسواك زدن را در شبانه‌روز انجام می‌دادند، مواردی هم اگر بود صرفاً جهت کاهش بوی بد دهان و یا جلوگیری از درد دندان ناشی از پوسیدگی شدید دندان‌ها بوده است. تعداد بسیار اندکی هم از مادران بر نحوه مسواك زدن کودک نظارت داشتند. این‌ها همه نشان از بی‌توجهی مادر به این رفتار مهم در کودکان است. از نظر فراوانی تجربه موانع در میان مادران شرکت‌کننده در این مطالعه، موانع مربوط به مادر بیشترین تکرار در مصاحبه با مادران را داشتند. از این دسته موانع، موانع مربوط به نگرش مادر و

انواع مشکلاتی که مادران جهت انجام مسوак کردن در کودکان خود با آن رو برو هستند و در رفع آن ناتوان هستند مانند نحوه عادت دادن کودک و برخورد با عدم همکاری و تمایل کودک و یا آموزش مهارت مسوак کردن درست بدون خوردن خمیر دندان، آسیب به لثه و یا خیس کردن لباس را شناسایی کرد. عدم مهارت مواجهه با این مشکلات باعث ترک رفتار یا ممانعت از آن در کودکان می شود. مطالعات خارجی هم عدم مهارت لازم نزد مادران جهت عادت دادن کودک به دو بار مسوак زدن را (۲۹) بدون خیس کردن لباس را به عنوان مانع برای مسواك زدن کودکان ذکر کرده اند. لذا برنامه های آموزشی بهداشت دهان و دندان برای مادران باید به غیر از آگاهی و نگرش بلکه شامل کسب مهارت هایی برای موفق شدن جهت عادت دادن کودک به مسواك زدن و نیز روش صحیح انجام آن باشد. نکته مهم دیگر که باید در بهداشت دهان و دندان کودکان کم سن در نظر داشت تأثیرات نامطلوب مصرف قطره آهن بر کاهش انگیزه مادران جهت مراقبت از دندان کودکان است. آموزش روش های پیشگیری کننده از تغییر رنگ دندان با مصرف قطره آهن باید به شدت مورد توجه کارشناسان بهداشت کودک در مراکز بهداشتی قرار گیرد. مسئله مهم دیگر که در این مطالعه بارها مطرح شد توجه به تأثیر نگرش و رفتارهای اعضای خانواره به خصوص پدر

(۲۰۱۰) دیده شده است (۲۹). این در حالی است که مطالعات نشان داده است که ممکن است مسواك زدن در شرایطی مانند عدم کفایت و یا صحیح بودن از پوسیدگی دندان کودکان جلوگیری نکند که این مسئله میین لزوم تأکید بیشتر بر کیفیت و روش مناسب مسواك زدن در کنار توجه به تعداد بارهای مسواك زدن در طی آموزش ها است که مستلزم نظارت بیشتر و همراهی بیشتر والدین است (۳۰). لذا تأکید ارائه دهنده گان خدمات سلامت در رابطه با بهداشت دهان و دندان در طی آموزش ها به این مسئله که کودک برای یادگیری انجام درست رفتار مسواك زدن نیازمند حمایت و کمک والدین است می تواند در بهبود عملکرد والدین در این زمینه کمک کننده باشد. این امر خود مستلزم وجود انگیزه کافی در والدین جهت توجه مناسب به دندان کودکان خود است. تصمیم مادران به رعایت بهداشت دهان و دندان کودکانشان با عقاید و نگرش و نیز انگیزه های آنان ارتباط دارد که با اجرای برنامه آموزشی می توان این نگرش ها را به طور صحیح تغییر داد (۳۱). نگرش والدین نسبت به بهداشت دهان و دندان تأثیر زیادی بر رفتارهای بهداشت دهان و دندان کودکان دارد همچنین می تواند بر چگونگی استفاده از خدمات پیشگیرانه دندانپزشکی و خدمات در دسترس برای کودکان خود تأثیر بگذارد. در مورد موانع مربوط به کودک، این مطالعه

موفقیت مادران در انجام این رفتار بهداشتی باشد. اگر چه یافته‌های مطالعات کیفی قابلیت تعمیم نداشته، اما یافته‌های این مطالعه کمک می‌کند تنوع موانعی که مادران برای بهداشت دهان و دندان کودکان خود با آن مواجه هستند را با عمق بیشتری به تصویر بکشد. طبیعتاً در ادامه این مطالعه، مطالعات کمی می‌توانند فراوانی موانع شناسایی شده را بسنجدند تا مبنای جامع و مناسبی برای مداخلات ارتقاء دهنده سلامت دهان و دندان کودکان ۳-۶ ساله فراهم شود.

بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سلامت دندان کودکان ۳-۶ سال این شهر با موانع و چالش‌هایی مواجه است که ممکن است تداوم یابد و باعث اختلال در سلامت دندان در نهایت اختلال در زندگی روزمره آنان گردد. به علاوه در مطالعه حاضر عدم کفايت دفعات مسواک زدن و عدم وجود نگرش‌ها، مهارت‌ها، حمایت‌های لازم مادران جهت انجام درست رفتارهای بهداشت دهان و دندان کودکان خود محسوس بود. از آنجا که مادران تأثیرگذارترین عامل بر ایجاد عادت‌های بهداشتی در کودکان خود هستند، لذا لازم است مداخلات ارتقاء دهنده سلامت دهان و دندان کودکان بتواند موانع درک شده مادران جهت انجام مسئولیت خود را رفع نماید.

و تشویق آن‌ها در کسب یا عدم کسب رفتارهای بهداشت دهان و دندان بود. نقش و اهمیت مشاهده انجام رفتار مسواک در والدین در ترغیب کودک جهت مسواک زدن در مطالعات متعدد نیز نشان داده شده است (۲۹ و ۱۸). برخی مطالعات عدم وجود رفتار مسواک زدن در والدین یا عدم تشویق فرزندان جهت مسواک زدن را حتی به عنوان موانع انجام این رفتار در نوجوانان نیز ذکر نموده‌اند (۳۲).

تعدادی از مشارکت‌کنندگان در پژوهش بیان کردند که هیچ گونه آگاهی از تعداد دفعات لازم برای مسواک زدن نداشتند، نتایج مطالعه‌ای در واشنگتن نیز عدم آگاهی از لزوم دو بار مسواک زدن به عنوان مانع گزارش کردند (۲۹). عامل نداشتن وقت مادر یا والدین برای مراقبت از دندان کودکان و عدم همکاری کودک در سایر مطالعات انجام شده نیز از موانع تأثیرگذار در مسواک زدن دندان کودک توسط والدین بوده است (۳۰، ۳۳). این مسئله نشان‌دهنده حمایت خانواده از مادر جهت انجام نقش مراقبتی خود از سلامت دهان و دندان کودک و نیز مشارکت بیشتر پدر و یا سایر اعضای خانواده در این زمینه است. به نظر می‌رسد بررسی موانع عدم مسواک زدن برای کودک در طی مشاوره‌های فردی برای مادران با استفاده از راهکارهای مؤثر و سپس ارائه راه حل‌های مناسب راهکار مناسبی برای افزایش انگیزه، مهارت و

## References:

- 1-Naderifar M, Akbarsharifi T, Pairovi H, Haghani H. Mothers' Awareness, regarding Orodental Health of their Children at age of 1-6 Years old. *Iran Journal of Nursing*. 2006; 19(46):15-27. (In Persian).
- 2- Greens pan D. Oral health is global health. *J Dent Res* 2007; 86: 485.
- 3- Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century—the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *Community Dentistry and oral epidemiology*. 2003; 31(s1):3-24.
- 4- Suprabha BS, Rao A, Shenoy R, Khanal S. Utility of knowledge, attitude, and practice survey, and prevalence of dental caries among 11-to 13-year-old children in an urban community in India. *Global health action*. 2013; 6.
- 5-ADA. Tooth Eruption: The Permanent Teeth. American Dental Association; 2006. Available from:[www.ada.org/sections/scienceAndResearch/pdfs/patient\\_58.pdf](http://www.ada.org/sections/scienceAndResearch/pdfs/patient_58.pdf). Accessed March, 2012.
- 6-Canadian Pediatric Society. Healthy teeth for children; March 2013. Available from:[http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/healthy\\_teeth\\_for\\_children](http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/healthy_teeth_for_children). Accessed June, 2013.
- 7-Fallahinejad M, Mirshekar Z, Razavi Sh. (Knowledge and attitude toward oral and dental health among Zahedan's guidance school students). *J Dent Sch*. 2006; 24(4): 492-498. (Persian)
- 8-Van Der Weijden F, Slot DE. Oral hygiene in the prevention of periodontal diseases: the evidence. *Periodontology*. 2011; 55(1):104-23.
- 9- Gussy MG, Waters EG, Walsh O, Kilpatrick NM. Early childhood caries: current evidence for aetiology and prevention. *J Pediatric Child Health*. 2006; 42(1□2):37-43.
- 10-Pine C, McGoldrick P, Burnside G, Curnow M, Chesters R, Nicholson J, et al. An intervention programme to establish regular tooth brushing: understanding parents' beliefs and motivating children. *International Dental Journal*. 2000; 50(S6\_Part1):312-23.
- 11- Mohebbi SZ, Virtanen JI, Murtomaa H, Vahid - Golpayegani M, Vehkalahti MM. Mothers as facilitators of oral hygiene in early childhood. *International Journal of Pediatric Dentistry*. 2008; 18(1):48-55.
- 12-Castilho ARFd, Mialhe FL, Barbosa TdS, Puppin-Rontani RM. Influence of family environment on children's oral health: a systematic review. *Journal de Pediatric (Versao en Portugues)*. 2013; 89(2):116-23.
- 13- AGD. Family plays vital role in children's oral health: General Dentistry: Academy of General Dentistry; 2010. Available from: <http://www.news medical.net/news/20100518/Family-plays-vital-role-in-childrens-oral-health-General-Dentistry.aspx>. Accessed March 2013.
- 14-Kumar G, Singh DK, Jalaluddin M, Dileep C, Rout P, Mohanty R. Oral Health of Pre-School Aged Children in Dhanbad District, Jharkhand, India-A Peek into their Mother's Attitude. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*. 2013; 7(9):2060-2062.
- 15-Naderifar M, Peyrovi H, Galgay F. Mothers' Attitude Towards Orodental Health of Their 1-6 Years Old Children Referred To Medical Centers of Zahedan City, 2006. *Iran Journal of Nursing*. 2008; 20(52):75-86. (In Persian).
- 16-American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). (January 28, 2014). America's Pediatric Dentists Bite Into Problem of Rampant Tooth Decay In Little Teeth and Encourage Parents to Join the Monster-Free Mouths

- Movement. Available at: <http://www.multivu.com/mnr/64715-american-academy-of-pediatric-dentistry-aapd-fights-tooth-decay>. Accessed May 8, 2013.
- 17- Douglass J, Li Y, Tinanoff N. Association of mutans streptococci between caregivers and their children. *Pediatric dent.* 2008; 29(5):375-87.
- 18-Finlayson TL, Siefert K, Ismail AI, Sohn W. Maternal self-efficacy and 1–5-year-old children's brushing habits. *Community Dentistry and Oral Epidemiology.* 2007; 35(4):272-81.
- 19- Maes L, Vereecken C, Vanobbergen J, Honkala S. Tooth brushing and social characteristics of families in 32 countries. *International dental journal.* 2006; 56(3):159-67.
- 20- Galloway RD. Health promotion: causes, beliefs and measurements. *Clin Med Res* 2003; 1(3): 249-58.
- 21- Pender NJ, Murdaugh CL & Parsons MA. Health promotion in nursing practice. 6th ed. USA: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2010; 15-20.
- 22- Shamsi M, Heidarnia A, Niknami Sh. Assessment of Oral health care behavior in pregnancy in Arak: An Application of the Health Belief Model. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.* 2012; 22(89):104-115. (In Persian).
- 23- Badri Gargari R, Salek Hadadian N. The role of self-efficacy and health behavior factors HBM brushing and flossing in clients to private clinics in Tabriz. *Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty.* 2011; 9 (3):0. (In Persian).
- 24- Tol A, Shahmirzadi SE, Shojaeizadeh D, Eshraghian MR, Mohebbi B. Determination Of Perceived Barriers And Benefits Of Adopting Health-Promoting Behaviors In Cardiovascular Diseases Prevention: Application Of Preventative Behavior Model. *Payavard Salamat.* 2012; 6(3):204-14. (In Persian).
- 25- Nilchian F, Skini M, Jabbarifar SE, Soheilipour S. Identification of educational needs to promote oral health from the standpoint of patients referring to Shariati dental clinic in Isfahan: a qualitative research. *Journal of Isfahan Dental School.* 2012; 7(5):790-7. (In Persian).
- 26-Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in psychology* 2006; 3(2): 77-101.
- 27- Pickard AJ. Research methods in information. London, UK: Facet Publishing; 2007.
- 28- Bracksley S, Dickson-Swift V, Anderson K, Gussy M. An Exploration of Mothers' Perceptions About Dental Health. *Journal of Theory and Practice of Dental Public Health.* 2013; 1(1):9-14.
- 29- Huebner CE, Riedy CA. Behavioral determinants of brushing young children's teeth: implications for anticipatory guidance. *Pediatric dentistry.* 2010; 32(1):48-55.
- 30- Karimi Shahajarini A, Makvandi Z, Faradmal J, Bashirian S, Hazavehei S. Assessing the tooth decay status of 2-5 years children and the role of their mothers' caring behaviors. 3. 2014; 21 (4):41-50. (In Persian).
- 31- Hajimiri KH, Sharifirad GH, Hasanzade A. The Effect of Oral Health Education Based on Health Belief Model in Mothers Who Had 3-6 Year Old Children on Decreasing Dental Plaque Index in Zanjan. *Scientific Journal.* 2010; 18(72): 77-86. (In Persian)
- 32- Pakpour A, Hidarnia A, Hajizadeh E, Kumar S, Fridlund B. Why Iranian adolescents do not brush their teeth: a qualitative study. *Int J Dent Hygiene* 2012; 10: 86-90.
- 33- Zare MS, Noroozi A, Tahmasebi R. Factors Influencing Tooth Brushing Behaviour based on Health Belief Model among Bushehr Primary School 5th & 6th grade Students. *Hayat.* 2013; 19(2):67-78.