

## ارزیابی میزان آگاهی مادران کودکان ۷-۱۰ سال از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان

دکتر الهام زاجکانی<sup>۱</sup>، دکتر ندا غلامی<sup>۲</sup>، دکتر سمانه بدخش<sup>۳</sup>، دکتر سقراط فقیه زاده<sup>۴</sup>، دکتر سعیده اجلی<sup>۵</sup>

۱- گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران

۲- گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران

۳- گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

۴- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران

۵- دانشجوی دندانپزشکی

چکیده

**زمینه و هدف:** اجرای روش‌های پیشگیری از پوسیدگی برای کودکان دستنای از برنامه‌های ملی ایران است. لذا نیاز است آگاهی والدین نسبت به این روش‌ها ارزیابی و ارتقا یابد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی مادران کودکان ۷ تا ۱۰ ساله از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان در شهر زنجان در سال ۱۳۹۲-۹۳ است.

**روش اجرا:** در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی، نفر از کودکان ۷ تا ۱۰ ساله شهر زنجان جهت بررسی به صورت تصادفی، خوشه‌ای در دو منطقه شهری انتخاب شدند. اطلاعات کلی و آگاهی مادران از طریق پرسشنامه بررسی شد. سپس داده‌های حاصل با آزمون آماری کایدو تحلیل شد.

**یافته‌ها:** آگاهی مادران از دفعات مسوک زدن روزانه (۷۶/۲)، استفاده از دهان شویه فلوراید (۶۷/۳)، نخ دندان (۷۷/۹)، دریافت مواد قندی کمتر (۹۰/۰)، نقش فلوراید در آب (۶۶/۲) و فیشور سیلنت (۳۱/۳)، آدامس زایلپتول (۵۵/۲) درصد بود. رابطه معنی داری بین آگاهی مادران و میزان تحصیلات آنها و منطقه سکونت شهری مشاهده شد ( $p < 0.05$ )

**نتیجه گیری:** میزان آگاهی مادران از استفاده از فلوراید و فیشور سیلنت پایین بود. والدین باید به مراجعه مستقیم به دندانپزشکی تشویق شوند و دندانپزشکان به ارایه آموزش‌های لازم به مراجعین ترغیب گردند. مدارس نیز می‌توانند نقش مهمی در ارتقاء آگاهی والدین ایفا کنند.

**واژگان کلیدی:** مادران، آگاهی، پوسیدگی دندان، پیشگیری، کودکان

وصول مقاله: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷

نویسنده مسئول: دکتر ندا غلامی [dr.gholami.n@zums.ac.ir](mailto:dr.gholami.n@zums.ac.ir)

مقدمه:

بیماریهای دهانی جزء مشکلات شایع جامعه است. سلامتی

دهان در سلامتی کلی هر فرد نقش بسزایی دارد. بیماریهای

دهانی شامل انواع سرطانها، پوسیدگی دندانها، مشکلات

دارند (۵).

طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۷ کودکان ایرانی ۳ سالگی را با حدود ۲ دندان شیری پوسیده، پر شده یا افتاده و شش سالگی را با ۵ دندان شیری خراب سپری می‌کنند که این امر نشان دهنده عدم توجه والدین به این دندانها بوده است و لزوم برنامه‌های آموزشی، پیشگیری و درمانی را برای والدین کودکان ۳ تا ۶ ساله مشخص می‌نماید (۸). اولین گام برای پیشگیری از پوسیدگی، بالا بردن آگاهی، نگرش والدین نسبت به اقدامات و روش‌های پیشگیرانه می‌باشد. از آنجا که در ایران مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آگاهی‌مادران کودکان ۱۰-۷ ساله شهر زنجان در مورد روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان است.

مواد و روش‌ها:

این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی، تحلیلی برروی ۳۰۰ نفر از مادران دانش آموزان کلاس اول تا سوم ابتدایی انجام گرفت. در این مطالعه از روش نمونه گیری بصورت طبقه‌ای- خوش‌ای استفاده شد بدین صورت که از هر یک از دو ناحیه آموزش و پرورش شهر زنجان ۲ دبستان دخترانه (دولتی و غیر دولتی) و ۲ دبستان پسرانه (دولتی و غیر دولتی) انتخاب شدند. پرسش نامه مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از مطالعات مشابه (۱۲-۷) تهیه شد و پس از نظر اصلاحی متخصصین به عنوان پیش آزمون بین

میز الیزه دندان توسط اسید ناشی از تجزیه مواد قندی به واسطه فعالیت باکتریهای بیماریزای دهان حل می‌گردد و حفره پوسیدگی تشکیل می‌شود. فاکتورهای رایج در ایجاد پوسیدگی دندان شامل سطوح دندانی با ساختار نامناسب، میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا به مقدار کافی و عدم رعایت رژیم غذایی مناسب است (۴).

بسیاری از مشکلات بهداشت دهان از جمله پوسیدگی دندانها از سنین کودکی آغاز می‌گردد که با مراقبتهای نزد رس می‌توان از بروز آن پیشگیری کرد (۵). با وجود کاهش بروز پوسیدگی دندانی از ۷۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۲ درصد در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، هنوز پوسیدگی دندانی یکی از شایع ترین بیماریهای عفونی است (۶) که میزان آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بالاست (۷). مهترین دلیل کاهش پوسیدگی در کشورهای پیشرفته پیشگیری است که در قالب آموزش بهداشت دهان، استفاده از رژیم غذایی مناسب و خمیر دندان‌های حاوی فلوراید، افزودن فلوراید به آب آشامیدنی، فلوراید تراپی و نهادینه شدن برنامه‌های پیشگیری از پوسیدگی و فیشور سیلت از دوران کودکی انجام می‌گردد (۳). علاوه بر مشکلات ساختاری دندان عوامل دیگری شامل وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین، متولد شدن از مادران با سطح تحصیلات پایین، مصرف مواد قندی و نوشابه‌های شیرین طی روز و غلظت بالای استرپتوكوک موتانس در بزاق نیز در ایجاد پوسیدگی نقش

مادران دارای فرزند پسر و ۱۴۰ (۴۹/۸ درصد) مربوط به مادران دارای فرزند دختر بود، همچنین ۱۳۸ (۴۹/۱ درصد) مربوط به منطقه ۱، و ۱۴۳ (۵۰/۹ درصد) مربوط به منطقه دو بود. از نظر تحصیلات ۴۱ (۱۴/۶ درصد) مادران زیر ۶۶ دیپلم، ۱۰۸ (۳۸/۴) دیپلم، ۴۷ (۱۶/۷ درصد) فوق دیپلم، ۷ (۲۳/۵ درصد) لیسانس، ۱۲ (۴/۳ درصد) فوق لیسانس، ۷ (۲/۵ درصد) دکترا بود. وضعیت پاسخ دهنده سئوالات به تفکیک در جدول ۱ بیان شده است. در مورد پاسخ دهنده سئوالات مطرح شده بین مادران دارای فرزند پسر و دختر به جز در مورد نقش جویدن آدامس زایلیتول در کاهش پوسیدگی، اختلاف معنی داری وجود نداشت. ( $P<0.05$ ). در مقایسه منطقه ۱ و ۲ در پاسخ دهنده سئوالات در مورد دفعات مسواک زدن در روز، نقش رژیم غذایی مناسب و فلوراید در کاهش پوسیدگی، نقش فلوراید در آب آشامیدنی، هدف از سیلنت دندان‌ها، نقش آدامس زایلیتول در کاهش پوسیدگی، بهترین روش جهت پیشگیری از پوسیدگی، اختلاف معنی داری وجود داشت ( $P<0.05$ ). به گونه‌ای که افراد منطقه ۲ نسبت به ۱ پاسخ صحیح تری را داده بودند ولی در سایر سئوالات اختلاف معنی دار نبود. ( $P>0.05$ ). از نظر نقش سطح تحصیلات مادران در پاسخ دهنده صحیح به سوالات اختلاف معنی دار بود ( $P<0.05$ ).

بحث و نتیجه گیری:

پوسیدگی دندان سابقه طولانی در تاریخ داشته و از شایعترین بیماریهایی است که با توجه به پیشرفت‌های

۱۰ نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید و بر اساس پاسخ‌های آن‌ها اصلاحات نهایی پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه نهایی جهت سنجش پایایی دو مرتبه بین ۱۰ نفر دیگر از افراد جامعه آماری با فاصله یک هفته قرار گرفت و پس از تایید نهایی پایایی و روایی توسط متخصص آمار، به همراه رضایت نامه شرکت در مطالعه، از طریق دانش آموزان برای والدین آنها ارسال گردید. پرسشنامه حاوی اطلاعات کلی دموگرافیک شامل جنس پاسخ دهنده، تحصیلات مادران، نام مدرسه و منطقه سکونت بود. سؤال‌های اصلی تحقیق ۱۴ عدد بود که شامل پرسش‌هایی در مورد دفعات مسواک زدن کودکان در روز، استفاده از دهان شویه فلوراید و نخ دندان و سن شروع استفاده از آن، نقش مواد قندی و فلوراید، فیشور سیلنت، آدامس زایلیتول در کاهش پوسیدگی، ... بود. پس از اتمام جمع آوری پرسش نامه‌ها، داده‌های حاصل به برنامه آماری SPSS منتقل و آنالیز آماری صورت پذیرفت. بعد از مشخص شدن مقادیر فراوانی متغیرها، از تست chi-square جهت مقایسه متغیرها استفاده شد.  $P<0.05$  به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

دریافت ۲۸۱ پرسشنامه از میان ۳۰۰ نمونه که برای آنها پرسشنامه فرستاده شده بود، بیانگر مشارکت ۹۲/۶۶ درصد مادران در این برنامه می‌باشد. از میان ۲۸۱ پرسشنامه تکمیل شده ۱۴۱ (۵۰/۲ درصد) مربوط به

Suresh و همکاران طی مطالعه ای در سال ۲۰۱۰ به این

نتیجه رسیدند که مادران با سطح تحصیلات بالاتر و

مراجعت منظم به دندانپزشک اطلاعات بهتری نسبت به

روش‌های پیشگیری از پوسیدگی در کودکان خود دارند.

(۱۶)

کبیری و نیکمنش در بررسی سال ۷۵ روی دانشآموزان

۱۲ ساله شیراز رابطه معنی‌داری بین تحصیلات پدر و

تعداد دندانهای پوسیده بدست آورده اما رابطه معنی‌داری

در سطح ۱٪ بین میزان دندانهای پوسیده و تحصیلات

مادر بدست نیاوردند (۱۷).

Sadunaite و همکاران طی مطالعه ای در سال ۲۰۱۴ به

این نتیجه رسیدند که بین سطح تحصیلات و وضعیت

اقتصادی والدین و توجه آنها به بهداشت دهان و دندان

کودکان خود ارتباط معنا داری وجود دارد (۱۸).

مطالعه ای که توسط یاراحمدی و همکاران در یزد انجام

شد نشان داد که در بررسی آگاهی از روش‌های پیشگیری

از پوسیدگی دندان، عده والدین به محدود کردن مصرف

مواد قندی توسط کودک اشاره کرده بودند ولی عده کمی

از والدین از نقش فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی آگاهی

داشتند (۱۹) که تقریباً مشابه نتایج ما بود. در دندانپزشکی

کودکان تأکید بر این است که این اقدامات پیشگیرانه با

آموزش بهداشت دهان و دندان برای والدین آغاز شود و

همراه با رشد کودک، آموزش، معاینات منظم دوره ای و

اجرای روش‌های کلینیکی پیشگیری ادامه یابد (۹،۱۰).

چشمگیر علمی هنوز را حل جامعی جهت ریشه‌کن نمودن

آن بدست نیامده است.

پیشگیری مناسب‌تر از درمان است و با توجه به سرانه

هزینه‌های درمانی و مسائل جانبی آن نمی‌توان به درمان

به عنوان عاملی جهت ریشه‌کن نمودن این بیماری تکیه

نمود (۱۲). هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آگاهی

مادران کودکان ۷ تا ۱۰ ساله در مورد روش‌های پیشگیری

از پوسیدگی دندان در شهر زنجان بود. میزان مشارکت

مادران در این طرح مطلوب بود. در کل میزان آگاهی

مادران کودکان شهر زنجان در مورد روش‌های بهداشت

دهان و دندان (میزان مسوک زدن روزانه کودکان، لزوم

استفاده از دهان شویه فلوراید، نخ دندان) و عوامل موثر

در کاهش پوسیدگی (رزیم غذایی مناسب، نقش فلوراید

موجود در آب و خمیر دندان) حدود ۶۵ تا ۹۰ درصد بود

که در واقع خوب می‌باشد اما در مورد سایر عوامل

پیشگیری از پوسیدگی مانند نقش فیشور سیلنت دندانها و

استفاده از آدامس زایلیتول حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بود که

میزان آگاهی مادران در این موارد ضعیف بود.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین سطح تحصیلات و

میزان آگاهی والدین رابطه معنا داری وجود داشت. که با

دیگر تحقیقان همخوانی داشت (۱۲،۱۴،۱۵). بدین معنا که

والدین با سواد پایین تر بیشتر نیازمند کسب اطلاعات در

زمینه خدمات پیشگیرانه دندانپزشکی می‌باشند.

جدول ۱: وضعیت پاسخ دهی مادران به روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان

مورد	وضعیت	تعداد	درصد	Cumulative percent
دفعات مسواک زدن کودکان در روز	یک بار	۱۵	۵/۳	۵/۳
	دو بار	۵۲	۱۸/۵	۲۳/۸
	سه بار	۲۱۴	۷۶/۲	۱۰۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰	
لزوم استفاده از دهان شویه فلوراید بعد از مسواک زدن	بله	۱۸۹	۶۷/۳	۶۷/۳
	خیر	۶۰	۲۱/۴	۸۸/۶
	نمیدانم	۳۱	۱۵/۰	۱۰۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰	
سن شروع مصرف دهان شویه فلوراید	سه سالگی	۴۶	۱۶/۴	۱۶/۴
	شش سالگی	۲۰۴	۷۲/۶	۸۹/۰
	نمیدانم	۳۱	۱۱/۰	۱۰۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰	
لزوم استفاده از نخ دندان در کودکان	بله	۲۱۹	۷۷/۹	۷۷/۹
	خیر	۴۰	۱۴/۲	۹۲/۲
	نمیدانم	۲۲	۷/۸	۱۰۰/۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰/۰	
نقش رژیم غذایی در پیشگیری از پوسیدگی	بله	۲۵۳	۹۰/۰	۹۰/۰
	خیر	۱۷	۶/۰	۹۶/۱
	نمیدانم	۱۱	۳/۹	۱۰۰/۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰/۰	
نقش فلوراید خمیر دندان در پیشگیری از پوسیدگی	بله	۲۶۳	۹۳/۶	۹۳/۶
	خیر	۵	۱/۸	۹۵/۴
	نمیدانم	۱۳	۴/۶	۱۰۰/۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰/۰	
آیا پوسیدگی دندان یک بیماری است؟	بله	۱۷۱	۶۰/۹	۶۰/۹
	خیر	۶۹	۲۴/۶	۸۵/۴
	نمی دانم	۴۱	۱۴/۶	۱۰۰/۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰/۰	
هدف از اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی جامعه	پیشگیری از پوسیدگی دندان	۱۸۶	۶۶/۲	۶۶/۲
	تصفیه آب	۳۹	۱۳/۹	۸۰/۱
	نمیدانم	۵۶	۱۹/۹	۱۰۰/۰
	مجموع	۲۸۱	۱۰۰	

۳۷/۷	۳۷/۷	۱۰۶	بله	اطلاعات در مورد فیشور سیلت
۷۹/۴	۴۱/۶	۱۱۷	خیر	
۱۰۰/۰	۲۰/۶	۵۸	نمیدانم	
	۱۰۰/۰	۲۸۱	مجموع	
۲۰/۳	۲۰/۳	۵۷	ترمیم حفره	هدف از سلیت دندان‌ها
۵۱/۶	۳۱/۳	۸۸	جلوگیری از پوسیدگی	
۶۱/۲	۹/۶	۲۷	بهبود شکل دندان	
۱۰۰/۰	۳۸/۸	۱۰۹	نمی‌دانم	
	۱۰۰/۰	۲۸۱	مجموع	
۵۵/۲	۵۵/۲	۱۵۵	بله	
۷۶/۹	۲۱/۷	۶۱	خیر	آیا آدامس زیلیتول در کاهش پوسیدگی اثر دارد
۱۰۰/۰	۲۳/۱	۶۵	نمیدانم	
	۱۰۰/۰	۲۸۱	مجموع	
۴۵/۶	۴۵/۶	۱۲۸	دندانپزشک	
۴۸/۸	۳/۲	۹	روزنامه	نحوه دریافت اطلاعات مادران در مورد پوسیدگی
۶۱/۹	۱۳/۲	۳۷	کتاب‌های آموزشی	
۱۰۰/۰	۳۸/۱	۱۰۷	تلوزیون	
	۱۰۰/۰	۲۸۱	مجموع	
۷۳/۲	۷۳/۳	۲۰۶	هر ۶ ماه	
۹۴/۰	۲۰/۶	۵۸	سالانه	
۹۷/۲	۳/۲	۹	در صورت بروز مشکل دندانی	دفعات مراجעה کودک نزد دندانپزشک
۱۰۰/۰	۲/۸	۸	نمی‌دانم	
	۱۰۰/۰	۲۸۱	مجموع	
۴/۳	۴۱۳	۱۲	محدویت تقدیم با مواد چسبنده به دندان	
۱۵/۳	۱۱/۰	۳۱	استفاده از آب فلوراید دار	
۹۹/۶	۸۴/۳	۲۳۷	مسواک‌ک زدن و استفاده از نخ دندان	
۱۰۰/۰	۴	۱	جویدن آدامس بدون قند	بهترین روش جهت پیشگیری از پوسیدگی
	۱۰۰	۲۸۱	مجموع	

که نقاط ضعف و قوت آگاهی مادران در مورد اهمیت

پیشگیری از ایجاد پوسیدگی چگونه است. لذا با مشخص

شدن نقاط ضعف می‌توان آن‌ها را در اولویت برنامه‌های

آموزشی قرار داد و بهتر است در این برنامه‌ها و

راهکارهای پیشگیری از ایجاد پوسیدگی مثل استفاده از

فلوراید، تصحیح رژیم غذایی، راه‌های مکانیکی حذف پلاک

و درمان فیشور سیلنت آورده شود (۹,۱۰).

بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان چنین نتیجه

گرفت که میزان آگاهی مادران کودکان در شهر زنجان در

مورد روش‌های استفاده از فلوراید، فیشورسیلیت پایین

بوده است. بنابراین همکاری نزدیک بین دندانپزشکان،

دانشکده دندانپزشکی، مدارس و والدین مراقبت‌های دهانی

کودکان را ببود می‌بخشد.

تقدیر و تشکر:

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم

پزشکی زنجان می‌باشد. بدین وسیله از حمایت‌های مادی و

معنوی معاونت محترم پژوهشی، تقدیر و تشکر به عمل

می‌آید.

میزان آگاهی از نقش فیشورسیلنت در این مطالعه حدود

۲۲ درصد بود که این نسبت به مطالعاتی در ملبورن

استرالیا که ۵۳٪ بود و در حدود ۱۰ سال پیش مطالعه

انجام شده است کم می‌باشد (۲۰). اگرچه فیشور سیلنت

ترابی جزء یکی از خدمات گرانقیمت پیشگیرانه محسوب

می‌شود، اما بهترین راه پیشگیری از پوسیدگی مولر اول

دائمی بحساب می‌آید (۲۱,۲۲). اولین گام برای گسترش

انجام این نوع درمان دندانپزشکی بالا بردن آگاهی والدین

نسبت به این روش می‌باشد.

۴ درصد مادران از دندانپزشک به عنوان منبع کسب

آگاهی‌های خود درباره بهداشت دهان و دندان نام برده

بودند. تحقیقی در میشگان نشان داد که مطب‌های

دندانپزشکی در ۷۴ درصد موارد منبع اولیه کسب اطلاعات

بود (۲۳).

روش‌های بهداشتی و پیشگیری در کودکان باید به طور

موثری انجام گردد. مطالعات مختلف نشان داده اند که

روش آموزش چهره به چهره مؤثرترین روش آموزش

بهداشت در بین آموزه‌های مختلف بوده است (۲۴,۲۵).

باید ذکر نمود که برای دستیابی به میزان دقیق آگاهی افراد

در جامعه بهتر است تحقیقات بیشتر با حجم نمونه بیشتر و

در بازه زمانی طولانی‌تر انجام شود این مطالعه نشان داد

## References

1. Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet 2007; 369: 51-9 .
2. Skeie MS, Raadal M, Strand GV, Espelid I. The relationship between caries in the primary dentition at 5 years of age and permanent dentition at 10 years of age – a longitudinal study. Int J Paediatr Dent 2006; 16: 152-156.
3. Milsom KM, Tickle M. Preventing decay in children: dare we risk the 'risk assessment' model in practice? Br Dent J 2010;209: 159-60.
- 4.Crall JJ, Edelstein B, Tinanoff N. Relationship of microbiological, social, and environmental variables to caries status in young children. Pediatr Dent 1990; 12: 233-6.
5. Wendt LK, Svedin CG, Hallonsten AL, Larsson IB. Infants and toddlers with caries. Mental health, family interaction, and life events in infants and toddlers with caries. Swed Dent J 1995; 19: 17-27.
- 6.Fisher-Owens SA, Gansky SA, Platt LJ, Weintraub JA, Soobader MJ, Bramlett MD, et al. Influences on children's oral health: a conceptual model. Pediatrics 2007; 120: 510-20.
- 7.Eriksen HM, Bjertness E. Concepts of health and disease and caries prediction: a literature review. Scand J Dent Res 1991; 99: 476-83.
- 8.Pakshir HR. Oral health in Iran. Int Dent J.2004;54:367-72
- 9.SAKAI VT, Oliveira TM, Silva Tc, Moretti A, Palti d, Machado M.. Knowledge and attitude of parents or caretakers regarding transmissibility os caries disease. J. Appl. Oral Sci. [online]. 2008, vol.16, n.2, pp. 150-154. ISSN 1678-7765.
10. جعفری احمد، امیر سلطانی مصطفی، گاستان بنفشه، بهرامی نعمه. بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد والدین دانش آموزان کلاس سوم پسرانه شهر تهران درباره شیار پوش . مجله دندانپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۲۳، شماره ۴، زمستان آموزان کلاس سوم پسرانه شهر تهران درباره شیار پوش . مجله دندانپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۲۳، شماره ۴، زمستان
11. پور هاشمی سید جلال. بررسی میزان آگاهی و نگرش کار کنان بهداشت استان قم درباره روش‌های بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره ۱۷، شماره ۳، سال ۱۳۸۵. صفحه ۷۷-۸۲
- 12 .Thakib A. Al-Shalan. Saudi parents knowledge of and attitude toward the prevention of dental caries. Saudi Dental Journal, 2003 ; 15: 27-32 .
13. Shani Ann Mani, Jacob John, Wei Yen Ping and Noorliza Mastura Ismail (2012). Early Childhood Caries: Parent's Knowledge, Attitude and Practice Towards Its Prevention in Malaysia, Oral Health Care - Pediatric, Research, Epidemiology and Clinical Practices, Prof. Mandeep Virdi (Ed.), ISBN: 978-953-51-0133-8, InTech, DOI: 10.5772/33898. Available from: <http://www.intechopen.com/books/oral-health-care-pediatric-research-epidemiology-and-clinical-practices/early-childhood-caries-parent-s-knowledge-attitude-and-practice-towards-its-prevention-in-malaysia>