

تحقیقی

آگاهی و عملکرد مرتبط با سلامت دهان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

سیمین زهرا محبی^۱، کتایون سرگران^۱، سمانه رازقی^۱، شاداب خراسانی زاده^۱، هدی بهرامیان^{*}

^۱- مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: مادران باردار به سبب تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری از ریسک افزایش یافته ای برای بیماری های دهان و دندان برخوردار هستند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آگاهی و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کمتر برخوردار شهر تهران در رابطه با سلامت دهان و دندان انجام شد.

مواد و روشهای: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی مادران باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی در شهر تهران صورت گرفت. در میان افراد شرکت کننده پرسشنامه ای توزیع گردید که سوالات آن در سه دسته ای اطلاعات دموگرافیک، عملکرد مادران و دانش مادران طبقه بندی شده بود. پرسشنامه ها توسط خود افراد تکمیل گردید. در نهایت داده ها با آزمون های آماری توصیفی، همبستگی و رگرسیون توسط نرم افزار IBM SPSS (نسخه ۲۴) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: تعداد ۱۶۶ مادر باردار در مطالعه شرکت کردند میانگین نمره دانش مادران در رابطه با سلامت دهان در دوران بارداری، نمره ۳۰/۳۲ از ۹ بود. نتایج آنالیز های رگرسیونی نشان داد، بین دانش عمومی مادران باردار در زمینه سلامت دهان و میزان تحصیلات افراد ارتباط وجود داشت ($p=0.065$) و با قومیت، نژاد، سطح تحصیلات همسر، سطح درآمد، وضعیت محل سکونت ارتباط نداشت ($p>0.1$). در حالی که میزان دانش مادران باردار در مورد سلامت دهان و دندان در دوران بارداری با سطح تحصیلات ($p=0.07$)، وضعیت محل سکونت ($p=0.042$) و تعداد افراد خانوار مادران ($p=0.069$) ارتباط معنیداری برقرار بود. رفتارهای عمومی سلامت دهان مادران تنها با میزان تحصیلات افراد ارتباط داشت ($p<0.03$) و با سایر متغیرها ارتباط معنیداری نداشت ($p>0.1$). در حالی که بین رفتار های سلامت در دوران بارداری توسط مادران باردار با هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود نداشت ($p>0.1$).

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد جامعه ای مورد مطالعه از سطح آگاهی و دانش کافی در زمینه ای مراقبت از سلامت دهان و دندان برخوردار نبوده و لازم است در این زمینه به مادران باردار آموزش های متناسب در مورد مهارت های عملی مراقبت از سلامت دهان و دندان داده شود و این افراد از اهمیت حفظ سلامت دهان در این دوران و اثرات بالقوه نامطلوب بیماری های پریودنتمال آگاه گردند.

کلید واژه ها: سلامت دهان، مادران باردار، آگاهی، عملکرد

وصول مقاله: ۱۳۹۶/۶/۲۶ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

نویسنده مسئول: دکتر هدی بهرامیان ایمیل: hoda_bahramian@yahoo.com

مقدمه: بیماریهای دهان و دندان هورمونی و تغذیه ای شرایط مستعدی را برای ایجاد بیماری های لثه و پوسیدگی دندان در مادران باردار فراهم می کند. از طرفی مراقبت های بهداشتی که در حالت عادی به سهولت انجام می شود، در خانم های باردار ممکن است با مشکل مواجه شود. این گروه به جهت شرایط ویژه بارداری از جمله ویار و کم

اگرچه تمام گروههای سنی و جنسی جمعیت را تهدید می کند، برخی از گروه ها در جامعه به لحاظ شرایط خاص فیزیولوژیکی بیشتر از سایرین آسیب پذیر می باشند. به عنوان نمونه بارداری روندی طبیعی است، اما با تغییراتی در بدن از جمله دهان و دندان همراه است. تغییرات

زایمان و دندانپزشکان) است. (۴) عواملی چون عفونت به HIV، کمبود مراقبت های دندانی، مصرف سیگار، سطح پایین تحصیلات، وضعیت اشتغال در سطوح پایین و سن زیاد و نوع نژاد می توانند وضعیت بیماری پریودنتال و پوسیدگی را بد تر کنند. (۵) عفونت های پریودنتال می تواند به عنوان منبعی از مدياتورهای التهابی باشد که جفت و جنین را به وسیله ای زایمان زودرس احتمالی با تهدید روبرو کند. (۶) نتایج نامناسب بارداری که با بیماری های پریودنتال در ارتباط هستند شامل تولد زودرس، وزن کم هنگام تولد، سقط و پره-اکلامپسی هستند که پره اکلامپسی و تولد زودرس از دلایل اصلی ناخوشی و مرگ و میر حین زایمان مادران است. (۷) توصیه می شود که تمامی زنان در طول بارداری تحت سنجش جامع سلامت دهان و ارزیابی خطر قرار بگیرند. علی رغم بحثی که در مورد این که آیا درمانهای پریودنتال میتوانند از نتایج نامناسب بارداری جلوگیری کنند وجود دارد، این امر واضح است که درمانهای دندانپزشکی در طول بارداری امن بوده و به طور قابل توجهی سلامت دهان مادران را بهبود می بخشد و احتمال به وجود آمدن پوسیدگی های دندانی زودرس را در نوزادان کاهش می دهد. (۸) با این وجود اغلب مادران باردار از توصیه های دندانی پیروی نمی کنند و به دنبال درمانهای دندانپزشکی نمی روند. برای مثال کمتر از نصف (۴۷٪) زنان باردار در ایالات متحده یه یک دندانپزشک مراجعه می کنند حتی در زمانی که یک مشکل

حوالگی و شرایط خاص روحی به سمت عدم رعایت بهداشت سوق پیدا می کنند. (۹) بیماریهای پریودنتال به صورت ژنژیوت و پریودنتیت هستند و فراوانی آنها بین ۱۰۰-۳۶ درصد گزارش شده است. ژنژیوت شایع ترین بیماری دهان در طول بارداری بوده و شیوع آن بین ۶۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است. (۱۰) تغییرات فیزیولوژیکی در متابولیسم شامل تغییر در گونه های میکروبی دهان، پاسخ ایمنی بدن و متابولیسم سلولی است . در طول بارداری سطح پروژسترون تا ۱۰ برابر واستروژن تا ۳۰ برابر نسبت به زمان سیکل قاعده ای افزایش می یابد که به علت تولید مدام آنهاست. افزایش غلظت استروژن و پروژسترون می تواند منجر به پرخونی ، ادم ، خونریزی از بافت های پریودنتال و افزایش احتمال عفونت باکتریای شود. (۱۱) همچنین بیشتر زنان در طول زمان بارداری عادات غذایی خود را به سمت غذاهای پرکربوهیدرات و اسیدی تغییر می دهند که این امر کا هش PH بزاق را که با حالت تهوع و استفراغ مکرر رخ می دهد تشديد می کند و زنان بارداری که بهداشت دهان را به صورت منظم و دقیق رعایت نمی کنند اغلب از اروژن های مینای دندان و پوسیدگی های دندانی هم رنج می برنند. (۱۲) عوامل دیگری که دسترسی به مراقبت های دندانی را در طول بارداری محدود می کند شامل کمبود پوشش بیمه ای، دیدگاه زنان باردار در مورد درمانهای دندانپزشکی در زمان بارداری و نگرش ارائه دهنده کان خدمات درمانی (متخصصین

ذکر است حجم نمونه مورد نیاز برای فاز تحلیلی مطالعه کمتر از این میزان می باشد. یک پرسشنامه استاندارد شده (دکتر بهرامیان - دکتر محبی) با ۷ سوال در رابطه با مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان، ۱۵ سوال در رابطه با دانش مادران باردار در زمینه سلامت دهان و ۹ سوال در رابطه با عملکرد مادران باردار در زمینه سلامت دهان ابزار تحقیق بود. با مراجعه به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، لیست مراکز بهداشت وابسته گرفته و با روش تصادفی طبقه ای خوشه ای از مراکز بهداشت جنوب، اسلامشهر، شهر ری به عنوان طبقه ، تعداد ۱۰ مرکز که از نظر جغرافیایی در مناطق ۹ تا ۲۰ شهری واقع بودند، به عنوان خوشه انتخاب شدند. گروه مطالعه، مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران می باشند که تعداد ۱۵ مادر باردار از هر مرکز با روش نمونه گیری در دسترس بر حسب معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. (جمعاً ۱۵۰ نفر) در ابتدا رضایت نامه شفاهی از نمونه ها و اطلاعات اولیه و شماره تماس برای دسترسی دریافت شد. دانش و عملکرد خود اظهار نمونه ها در رابطه با سلامت دهان و مشخصات دموگرافیک توسط خود فرد تکمیل گردید. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار IBM SPSS نسخه ۲۴ آنالیز گردید که با استفاده از شاخص های میانگین و انحراف معیار توصیف شدند. عوامل مرتبط با سطح آگاهی و عملکرد با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل آماری شدند. پرسش نامه توزیع شده

وجود دارد . (۷) سلامت دهان حین زایمان نقش بسیار حیاتی ای را در سلامت عمومی و خوب بودن زن باردار و کودکان تازه متولد شده ایفا می کند . (۹) از این رو لزوم انجام نیاز سنجی و متعاقبا برنامه ریزی برای پیشگیری از پوسیدگی و بیماریهای دهان و دندان در گروه آسیب پذیر مادران باردار اهمیت بیشتری دارد. هدف ما از انجام این مطالعه ارزیابی آگاهی و عملکرد مادران باردار در رابطه با سلامت دهان و دندان در طول دوران بارداری است. پس از بررسی وضعیت موجود و آگاهی یافتن از خلاها در دانش و عملکرد این گروه، امکان طراحی مداخلات مناسب با رویکرد پیشگیرانه جهت ارتقا سلامت مادران باردار و کودکانشان فراهم خواهد شد.

روش بررسی:

این مطالعه از نوع مقطعی cross-(sectional) است و با هدف بررسی آگاهی و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی کمتر برخوردار شهر تهران در رابطه با سلامت دهان و دندان انجام شد. مطالعه از دیدگاه حجم نمونه دو هدف اصلی دارد. هدف اول که توصیفی است، برآورد آگاهی و عملکرد مادران باردار است که با توجه به مطالعه با استفاده از confidence interval for one mean گزینه نرم افزار PASS با درنظر گرفتن $\alpha=0,05$ فاصله اطمینان برابر $122,79 \pm 0,05$ واحد و انحراف معیار برابر نمونه محاسبه شد که با در نظر گرفتن inflation factor برابر ۱,۵ حجم نمونه ۱۸۵ نمونه می باشد. لازم به

یافته ها :

مطالعه حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از پرسش نامه صورت گرفت. مطالعه برروی تعداد ۱۶۶ مادر باردار مراجعه کننده به ۱۰ مرکز بهداشتی درمانی در شهر تهران صورت گرفت، که این مراکز به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای انتخاب شده بودند. پرسشنامه ها توسط خود افراد تکمیل شد و در نهایت نتایج تحت بررسی آماری قرار گرفت. میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه ۲۷,۹ با انحراف معیار ۵,۷۴ بود. از نظر میزان تحصیلات، ۷۲ نفر (۴۳,۴%) از مادران دارای مدرک تحصیلی دیپلم و ۱۴ نفر (۸,۴%) بی سواد بودند و تنها ۱۵ نفر (۹%) دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بودند. ۵۹ نفر (۳۵,۸%) از همسران مادران باردار دارای دیپلم و ۱۰ نفر (۶,۱%) بی سواد بودند. (جدول ۱)

حاوی ۷ سوال در رابطه با مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان بود که بیشترین امتیاز به وضعیت اجتماعی اقتصادی مناسب و به ترتیب کمترین امتیاز به وضعیت اجتماعی اقتصادی نامناسب تعلق گرفت. ۱۲ سوال در رابطه با دانش عمومی سلامت دهان و دندان، ۳ سوال در رابطه با دانش مرتبط با سلامت دهان و دندان در بارداری، ۷ سوال در رابطه با رفتارهای عمومی سلامت دهان و ۲ سوال در رابطه با رفتارهای مرتبط با سلامت دهان در بارداری بود. در کل در ۱۵ سوال در رابطه با دانش مادران باردار گزینه صحیح نمره ۱ و بقیه گزینه ها صفر در نظر گرفته شدند و در ۹ سوال در رابطه با عملکرد مادران باردار در زمینه سلامت دهان بیشترین امتیاز به بهترین رفتار و به ترتیب کمترین امتیاز به بدترین رفتار تعلق گرفت. لازم به ذکر است این مطالعه پس از کسب تاییدیه از کمیته اخلاق دانشگاه انجام گرفت. پرسش نامه ها بی نام و شرکت در مطالعه اختیاری بود.

جدول شماره ۱- تحصیلات مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مناطق کمتر برخوردار شهر تهران و همسرانشان

گزینه ها	تعداد	د رصد
بی سواد	۱۴	۸,۴
ابتدايی	۱۷	۱۰,۲
راهنمایی	۳۰	۱۸,۱
دبیرستان	۱۸	۱۰,۸
دیپلم	۷۲	۴۳,۴
دانشگاه	۱۵	۹,۰
بی سواد	۱۰	۶,۱
ابتدايی	۲۳	۱۳,۹
راهنمایی	۴۰	۲۴,۲
دبیرستان	۲۲	۱۳,۳
دیپلم	۵۹	۳۵,۸
دانشگاه	۱۱	۶,۷

تحصیلات مادران باردار
N=۱۶۶

تحصیلات همسران مادران باردار
N=۱۶۵

جدول شماره ۲ - وضعیت اقتصادی مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کمتر برخوردار شهر تهران

درصد	تعداد	گزینه ها	
۱۳,۹	۲۳	شخصی	وضعیت محل سکونت از نظر مالکیت $N=166$
۸۲,۵	۱۳۷	اجاره	
۲,۴	۴	رایگان	
۱,۲	۲	مسکن در برابر خدمت	
۵۶,۳	۹۰	کمتر از ۵۰ متر	مساحت محل سکونت $N=160$
۴۱,۳	۶۶	بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر	
۲,۵	۴	بالاتر از ۱۰۰ متر	
۲۸,۳	۴۷	کم	میزان درآمد خود اظهار $N=166$
۵۳,۶	۸۹	متوسط	
۱۸,۱	۳۰	خوب	

مسوак را ۲ دقیقه می دانستند و به سوال پاسخ صحیح دادند. کمتر از نیمی از افراد (۴۲,۲%) مهمترین زمان مسوак زدن را قبل از خواب می دانستند و پاسخ صحیح دادند. تنها ۷,۹ درصد آگاهی صحیح از این را داشتند که استفراغ های مکرر منجر به سایش دندان می شود. این سوال از کمترین پاسخ صحیح برخوردار بود. حداقل و حد اکثر نمره قابل کسب دانش عمومی سلامت دهان و دندان، به ترتیب صفر و ۹ بود. میانگین نمره ۳,۳۲ با انحراف معیار ۱,۸۱ بود. حداقل و حد اکثر نمره دانش مرتبط با سلامت دهان و دندان در بارداری، به ترتیب صفر و ۳ بود. میانگین نمره ۰,۴۷ با انحراف معیار ۰,۶۴ بود. (جدول ۲) نتایج نشان داد ۰,۱۱ نفر (۶%) از مادران هرگز مسوак نمی زدند و ۱۲۳ نفر (۷۴,۱%) حداقل یک بار در روز زندن.

می دانستند و ۴۰ نفر (۲۴,۱%) از مادران در رابطه با حداقل تعداد مسوак زدن در روز اطلاع کافی داشتند و ۴۰ نفر (۲۴,۱%) حداقل زمان لازم برای وضعیت محل سکونت اکثر افراد شرکت کننده ۱۳۷ نفر (۸۲,۵%) اجاره ای و ۲۳ نفر (۱۳,۹%) دارای مسکن شخصی بودند. ۸۹ نفر (۵۳,۶%) از افراد شرکت کننده میزان درآمد خود را متوسط و ۴۷ نفر (۲۸,۳%) میزان درآمد خود را کم می دانستند. (جدول ۲) درسوالات مربوط به دانش مادران در رابطه با سلامت دهان و دندان، ۳۹ نفر (۲۲,۵%) علت خون ریزی از لثه را بیماری لثه می دانستند در صورتی که ۵۹ نفر (۳۵,۵%) گزینه نمی دانم را انتخاب کردند. ۷۷ نفر (۴۶,۶%) علامت های پوسیدگی دندان را می دانستند و ۴۰ نفر (۲۴,۱%) گزینه نمی دانم را انتخاب کردند و در میان سوالات مربوط به دانش، بیشترین پاسخ صحیح به این سوال داده شده بود.

۶۱ نفر (۳۶,۷%) از مادران در رابطه با حداقل تعداد مسوак زدن در روز اطلاع کافی داشتند و ۴۰ نفر (۲۴,۱%) حداقل زمان لازم برای

جدول شماره ۳۵ - دانش عمومی سلامت دهان و دندان در مادران باردار

درصد	تعداد	گزینه ها	
۲۳,۵	۳۹	بیماری لثه	مهترین علت خون ریزی از لثه در هنگام مسوак زدن چیست؟ ۱۶۶N=
۸,۴	۱۴	پوسیدگی	
۶,۶	۱۱	جرم دندانی	
۲۵,۹	۴۳	مسواک زدن نادرست	
۳۵,۵	۵۹	نمی دانم	
۱۸,۷	۳۱	نقاط سفیدیاقيقه ای	کدام یک از موارد زیر علامت پوسیدگی دندان است؟ ۱۶۶N=
۶,۰	۱۰	حساسیت به سرما یا گرمای	
۴,۸	۸	درد هنگام جویدن	
۴۹,۴	۷۷	همه موارد	
۲۴,۱	۴۰	نمی دانم	
۸,۴	۱۴	۳ بار در هفته	مسواک زدن دندان ها حداقل چند بار باید انجام بگیرد؟ ۱۶۶N=
۱۳,۹	۲۳	۱ بار در روز	
۳۹,۷	۶۱	۲ بار در روز	
۳۹,۷	۶۱	بیش از ۲ بار در روز	
۴,۲	۷	نمی دانم	
۲۴,۱	۴۰	۲ دقیقه	حداقل زمان لازم برای مسوک زدن چند دقیقه است؟ ۱۶۶N=
۲۱,۱	۳۵	۳ دقیقه	
۱۰,۲	۱۷	۴ دقیقه	
۲۷,۷	۴۶	۵ دقیقه	
۱۹,۹	۲۸	نمی دانم	
۳,۶	۶	بعد از خواب	مهترین زمان برای تمیز کردن دندان ها چه موقع است؟ ۱۶۶N=
۴۲,۲	۷۰	قبل از خواب	
۱,۲	۲	بعد از صبحانه	
۴۹,۴	۸۲	بعد از وعده های اصلی	
۳,۶	۶	نمی دانم	
۱,۲	۲	مزه خوشایند	مهترین اثر فلوراید در خمیر دندان چیست؟ ۱۶۶N=
۵,۴	۹	اثر سفید کنندگی	
۴۲,۸	۷۱	پیش گیری از پوسیدگی	
۹,۶	۱۶	اثر ضد میکروبی	
۴۱,۰	۶۸	نمی دانم	
۱۰,۲	۱۷	۳ ماه یک بار	یک فرد عادی هر چند وقت یک بار باید برای معاینه دهان و دندان به دندانپزشک مراجعه نماید؟ ۱۶۶N=
۵۱,۸	۸۶	۶ ماه یک بار	
۱۸,۱	۳۰	۱ سال یک بار	
۰,۶	۱	۲ سال یک بار	
۱۹,۳	۳۲	نمی دانم	
۶۶,۹	۱۱۱	بله	علت اصلی ایجاد بیماری های لثه عدم رعایت بهداشت است. ۱۶۶N=
۶,۰	۱۰	خیر	
۲۷,۱	۴۵	نمی دانم	
۴۴,۶	۷۴	بله	شستن دندانها با آب زیاد، بعد از مسوک زدن با خمیر دندان حاوی فلوراید، در پیشگیری از پوسیدگی مؤثر است.
۹,۶	۱۶	خیر	
۴۵,۲	۷۵	نمی دانم	
۳۳,۷	۵۶	بله	در پیشگیری از پوسیدگی، استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید، از روش مسوک زدن مهمتر است.
۱۹,۳	۳۲	خیر	
۴۷,۰	۷۸	نمی دانم	
۶۹,۹	۱۱۶	بله	دفعات مصرف شکر، نقش مهمتری از میزان مصرف آن در ایجاد پوسیدگی دارد.
۳,۶	۶	خیر	
۲۶,۵	۴۴	نمی دانم	
۲۷,۷	۴۶	بله	صرف آدامسهای حاوی قند زایلیتول باعث کاهش سطح باکتری مسبب پوسیدگی می شود.
۷,۸	۱۳	خیر	
۶۴,۵	۱۰۷	نمی دانم	

دهان در بارداری به ترتیب ۴۲ و ۴۰ بود. میانگین نمره ۲،۶۴ با انحراف معیار ۰،۵۲ بود. (جدول ۵) به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای سلامت دهان عمومی و بارداری با متغیرهای دموگرافیک آزمون رگرسیون نشان داد که رفتارهای عمومی سلامت دهان مادران تنها با میزان تحصیلات افراد ارتباط معنی داری از لحاظ آماری داشته ($P=0.03$) و با سایر متغیرها ارتباط معنی داری ندارد. ($P<0.1$) در حالی که بین رفتارهای سلامت در دوران بارداری توسط مادران باردار با هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود نداشت. ($P<0.1$)

۷ نفر (۴٪) هرگز از خمیر دندان و ۵۴ نفر (۳۲٪) هرگز از نخ دندان استفاده نمی کردند. هم چنین ۳۲ نفر (۹٪) حداقل یک بار در روز از نخ دندان استفاده می کردند. ۱۵ نفر (۹٪) سه بار یا بیشتر در روز از تنقلات شیرین ۳۵ استفاده می کردند در حالی که ۲۱ نفر (۲۱٪) به ندرت از تنقلات استفاده می کردند. اکثر مادران (۱۵۴ نفر - ۹۲٪) تا به حال دخانیات مصرف نکرده بودند. حداقل و حد اکثر نمره قابل کسب رفتار عمومی سلامت دهان، به ترتیب ۲۴ و ۲۹ بود. میانگین نمره ۱۵/۲۹ با انحراف معیار ۲،۹۸ بود. حداقل و حد اکثر نمره رفتار مرتبط با سلامت



جدول شماره ۴- ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک والدین با عملکرد بهداشتی آنان

درصد	تعداد	گزینه ها	
۷،۹	۱۳	سایش دندان	استفراغ های مکرر در دوره بارداری منجر به کدام یک از حالات زیر می شود؟ $N=165$
۵،۵	۹	درد دندان	
۹،۱	۱۵	بیماری لثه	
۱۰،۹	۱۸	جرم دندان	
۶۶،۷	۱۱۰	نمی دانم	
۲،۴	۴	۱ بار	چند بار مراجعه به دندانپزشک در طی بارداری لازم می باشد؟ $N=165$
۵،۵	۹	۲ بار	
۹،۱	۱۵	۳ بار	
۷،۳	۱۲	۴ بار	
۷۵،۲	۱۲۴	نمی دانم	
۳۷،۳	۶۲	بله	بهترین زمان برای برای انجام اعمال دندانپزشکی خانم باردار در سه ماهه دوم بارداری است. $N=165$
۳،۶	۶	خیر	
۵۸،۴	۹۷	نمی دانم	

جدول شماره ۵- رفتار های عمومی سلامت دهان درمادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کمتر برخوردار شهر تهران

درصد	تعداد	گزینه ها	
۶,۰	۱۰	بی نظم یا هرگز	دفعات مسواک زدن N=۱۶۶
۶,۰	۱۰	۱ بار در هفته	
۱۳,۹	۲۳	۲-۳ بار در هفته	
۵۵,۴	۹۲	۱ بار در روز	
۱۸,۷	۳۱	بیش از ۱ بار در روز	
۳۶,۰	۵۹	همیشه یا تقریبا	
۴۳,۹	۷۲	ممومولا	
۱۵,۹	۲۶	به ندرت	
۴,۳	۷	هرگز	
۳۲,۵	۵۴	هرگز	
۴۱,۰	۶۸	گاهی اوقات	دفعات استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید N=۱۶۴
۷,۲	۱۲	۲-۳ بار در هفته	
۱۳,۹	۲۳	۱ بار در روز	
۵,۴	۹	بیش از ۱ بار در روز	
۹,۱	۱۵	۳ بار یا بیشتر	
۲۵	۴۱	۲ بار	
۱۸,۹	۳۱	۱ بار در روز	
۲۵,۶	۴۲	گاهی اوقات	
۲۱,۳	۳۵	به ندرت	
۹۲,۸	۱۵۴	هرگز	
۶,۰	۱۰	ترک شده	استعمال دخانیات N=۱۶۶
۱,۲	۲	۱ بار در ماه	
۳۰,۷	۵۱	طی ۶ ماه گذشته	
۱۷,۵	۲۹	۶ ماه تا ۱ سال	
۱۶,۳	۲۷	۱۲ ماه تا ۲۳ ماه	
۹,۰	۱۵	۲۴ ماه تا ۵ سال	
۵,۴	۹	۵ سال یا بیشتر	
۶,۰	۱۰	هرگز	
۱۵,۱	۲۵	فراموش شده	
۶۰,۸	۱۰۱	بله	مراجعه به دندانپزشکی طی ۱۲ ماه گذشته N=۱۶۶
۳۲,۹	۶۵	خیر	

جدول شماره ۶- رفتار های مرتبط با سلامت دهان در بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کمتر برخوردار شهر تهران

درصد	تعداد	گزینه ها	
۴۲,۲	۷۰	بله	مراجعه به دندانپزشکی حین بارداری فعلی N=۱۶۶
۵۷,۸	۹۶	خیر	
۹۲,۱	۱۵۲	بله	تشست و شو دهان پس از استقراغ صحبتگاهی N=۱۶۵
۷,۳	۱۲	خیر	

دهان و دندان برخوردار نیستند. بر اساس گزارش سیستم کنترل و ارزیابی خطرات بارداری (PRAMS) مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها (CDC)، تنها ۴۳%-۲۳% از مادران باردار در سراسر دنیا در دوران بارداری خود از خدمات دندانپزشکی بهره میبرند و این مقدار در ایالات متحده ۶۷% از مادران باردار را شامل می شود. بر اساس مطالعه ای که توسط شمسی و همکاران در سال ۲۰۱۳ بر روی گروهی از زنان باردار در ایران صورت گرفت میانگین شاخص DMFT زنان باردار شرکت کننده در مطالعه ۵,۴ بود. این مطالعات و مطالعات مشابه دیگر، نشان دهنده ای وجود نیاز به توجه ویژه به سلامت دهان و دندان این افراد می باشد. (۱۱، ۱۰) طی مطالعه ای که توسط حاجی کاظمی و همکاران در گروهی از مادران باردار در کشور ایران انجام شد، مشخص شد بین میزان آگاهی و نگرش افراد نسبت به مراقبت های دهان و دندان در دوران بارداری ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشته و از سوی دیگر بین نگرش افراد و سطح عملکرد افراد ارتباط معنی داری از لحاظ آماری برقرار است و این در حالی است که تنها بخش کمی از افراد شرکت کننده در این مطالعه (۵,۶%) از آگاهی مناسبی برخوردار برخودار بودند. (۱۲) مطالعات مداخله ای متعدد نیز اهمیت آگاهی افراد و اثر آن را بر رفتار افراد در زمینه های مختلف رفتار

همچنین به منظور بررسی رابطه بین دانش عمومی سلامت دهان و دانش مرتبط با سلامت دهان و دندان در بارداری با متغیرهای دموگرافیک آزمون رگرسیون نشان داد که بین دانش عمومی مادران باردار در زمینه سلامت دهان و میزان تحصیلات افراد ارتباط نسبتاً معنی داری از لحاظ آماری وجود داشت ($P=0.065$) و با قومیت، نژاد، سطح تحصیلات همسر، سطح درآمد، وضعیت محل سکونت ارتباط معنی داری نداشت. (P<0.01) در حالی که بین میزان دانش مادران باردار در مورد سلامت دهان و دندان در دوران بارداری با سطح تحصیلات ($P=0.07$)، وضعیت محل سکونت ($P=0.042$) و تعداد افراد خانوار مادران ($p=0.069$) ارتباط نسبتاً معنی داری برقرار بود.

بحث:

همانطور که پیشتر بحث شد، در دوران بارداری تغییرات فیزیولوژیک گسترده ای در بدن مادران به وجود آمده که به سبب این تغییرات مادران باردار دارای ریسک افزایش یافته ای برای بیماری های دهان و دندان هستند. همچنین مادران نقش مهمی در انتقال و آموزش مراقبت های بهداشتی در زمینه سلامت دهان به فرزندان داشته و بنابراین سهم بزرگی در بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان جامعه دارند. این درحالی است که مطالعات گذشته حاکی از آن است که مادران باردار در نقاط مختلف دنیا از وضعیت مساعد سلامت

نمی کردند. در مطالعه‌ی شمسی و همکاران نیز نتایج مشابه بود به صورتی که اکثریت افراد تنها یک بار یا کمتر در روز مسواک می‌زدند و ۴۱٪ از افراد هرگز از نخ دندان استفاده نمی کردند. در مطالعه‌ای که توسط بیات و همکاران نیز صورت گرفت نتایج مشابه بود؛ نزدیک به ۷۰ درصد از افراد تنها به یک بار مسواک زدن قبل از خواب بسته می کردند. (۱۴، ۱۵) عملکرد ضعیف مادران باردار را می توان به وجود آگاهی ناکافی و یا داشتن اطلاعات اشتباه در این زمینه و یا تغییرات جسمی و هورمونی که برای مادران در دوران بارداری رخ می دهد نسبت داد. با این وجود به نظر میرسد بروز تغییرات فیزیولوژیک سهم بیشتری در این مسئله داشته چراکه اکثریت مادران شرکت کننده در مطالعه حاضر (۷۳٪) در مورد تعداد دفعات مسواک زدن در روز گزینه‌ی حداقل ۲ بار در روز یا بیشتر را انتخاب کردند. به عبارتی دیگر تغییرات جسمی پیش آمده برای مادران در این دوران منجر به ایجاد خستگی و کسالت می شود که می تواند آنان را از پرداختن به حفظ سلامت دهان خود به صورت مناسب، باز بدارد. همچنین تنها درصد کمی از مادران به سوال در مورد مدت زمان مسواک زدن پاسخ صحیح دادند که نشان دهنده‌ی عدم وجود مهارت عملی کافی در این زمینه می باشد. از آنجایی که بی حوصلگی و عدم وجود آگاهی کافی

های بهداشتی از طریق آموزش به افراد نشان داده اند. در زمینه‌ی سلامت دهان و دندان مادران باردار در ایران نیز شمسی و همکاران مطالعه‌ای انجام دادند. در این مطالعه گروهی از مادران (گروه مورد) به مدت ۲ ماه برنامه‌های آموزشی در زمینه سلامت دهان دریافت کردند و نتایج نهایی اختلاف معنی داری بین گروه مورد و گروه شاهد (که برنامه‌های آموزشی دریافت نکرده بودند) نشان داد. (۱۳) بنابراین مطالعات و مطالعات مشابه در نقاط دیگر دنیا می توان نتیجه گرفت که میزان آگاهی مادران باردار در زمینه‌ی مراقبت از سلامت دهان و دندان ارتباط مستقیمی با میزان عملکرد افراد در این زمینه داشته و به برنامه‌های آموزشی درباره‌ی سلامت دهان در دوران بارداری برای مادران باردار باید توجه بیشتری نمود. هدف از انجام این مطالعه نیز، بررسی میزان آگاهی و عملکرد در زمینه‌ی سلامت دهان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی کمتر برخوردار در شهر تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد که مادران باردار در زمینه مراقبت از بهداشت دهان و دندان از آگاهی و دانش کافی برخوردار نیستند و در این زمینه عملکرد مناسبی ندارند به گونه‌ای که از میان افراد شرکت کننده در مطالعه ۸۰٪ از افراد یک بار یا کمتر در روز مسواک می زدند، و ۳۲٪ از افراد هرگز از نخ دندان استفاده

از افراد در دوران بارداری خود به دندانپزشک مراجعه کرده بودند و بین مراجعات افراد به دندانپزشک و دریافت قبلی آموزش بهداشت دهان و اطلاع داشتن از اثرات نامطلوب بالقوه بیماری های دهان بر بارداری، ارتباط مستقیم و از لحاظ آماری معنا دار، برقرار بود. Saddki و همکاران مهمترین موافع موجود برای مادران باردار برای مراجعه به دندانپزشک را تصور نداشتند بیماری های دهان و دندان، زمان انتظار زیاد در کلینیک های دندانپزشکی و عدم دریافت فوری خدمت توسط دندانپزشک دانسته اند. (۱۷) Hulla و همکاران نیز در مطالعه ای که بر روی گروهی از زنان مهاجر در لندن انجام دادند به آمار تقریبا مشابهی دست یافتند به گونه ای که ۳۲٪ از مادران در طول بارداری خود به دندانپزشک مراجعه کرده بودند و تنها ۳۴٪ به صورت منظم به دندانپزشک مراجعه داشتند. (۱۸) در ایران در مطالعه ای که توسط بیات و همکاران در شهر همدان صورت گرفت نتایج بدست آمده نشان داد حدود نیمی از افراد در طول بارداری خود هرگز به دندانپزشک مراجعه نکرده اند و علت آن را عواملی چون هزینه ای زیاد، استرس زا بودن درمانهای دندانپزشکی و احساس عدم نیاز مطرح کرده اند. (۱۹) Habashneh و همکاران نیز در مطالعه ای که انجام دادند عواملی چون مسائل شخصی (مثل وضعیت تاہل، سن و ...)

و نداشتن مهارت عملی مناسب در این دوران از موانع عدمه مادران برای رسیدن به سلامت دهان و دندان مطلوب می باشد، آموزش مهارت های عملی و اطلاع رسانی به مادران در مورد میزان اهمیت حفظ سلامت دهان و دندان در دوران بارداری و اثرات بالقوه آن بر نتایج بارداری باید مد نظر قرار گیرد. در مطالعه ای حاضر در مورد استفاده از نخ دندان نیز شرایط تقریبا مشابهی برقرار بود به صورتی که اکثریت افراد اطلاع درستی در مورد تعداد دفعات استفاده از نخ دندان در روز نداشتند و علت خونریزی از لثه را وجود بیماری های پریودنتال نمی دانستند. در مورد میزان مراجعات مادران باردار به دندانپزشک در طی دوران بارداری خود مطالعات زیادی در نقاط مختلف صورت گرفته است. مطالعه ای که توسط Kim و همکاران در کارولینای جنوبی در کشور آمریکا بر روی ۵۹۹ مادر باردار صورت گرفت نشان داد ۷۰ درصد از مادران در طول دوران بارداری خود به دندانپزشک مراجعه نکرده اند و دلیل آن را عدم آگاهی از اهمیت این موضوع دانستند. همچنین مشخص شد بین میزان استفاده افراد از مساوک و نخ دندان ارتباط معنی دار و مستقیمی با میزان مراجعات افراد به دندانپزشک داشته است. (۱۶) در مطالعه ای Saddki و همکاران که در کشور مالزی انجام شد نیز شرایط بسیار مشابه بود؛ تنها ۲۹ درصد

رادیوگرافی در بارداری می تواند برای جنین مضر باشد و سایر درمان های دندانپزشکی کاملاً بی خطر هستند. (۱۲) و یا در مطالعه‌ی ozen و همکاران که در کشور ترکیه صورت گرفت نیز نتایج حاکی از وجود باور های نادرست در بین اکثر مادران باردار بود. در این مطالعه ۴۳٪ از مادران باور داشتند که گفته‌ی : ((یک دندان به ازای هر نوزاد)) درست است و ۷۲٪ از آنها باوری مشابه آنچه که در مورد مصرف کلسیم دندان توسط جنین بیان شده، داشتند. (۲۰) یافته‌ی قابل توجه در مطالعات اخیر وجود ارتباط معکوس بین وجود این گونه باور های غلط و سطح تحصیلات و نوبت بارداری مادران بود که نقش مهم داشتن اطلاع و آگاهی در برطرف کردن این قبیل از باور های نادرست را نشان می دهد. در مطالعه‌ی حاضر نیز نتایج مشابه مطالعات مشابه انجام شده در سایر نقاط ایران بود. به صورتی که در بیش از نیمی از افراد (۵۱,۲٪) از آخرین مراجعه‌ی آنها به دندانپزشک اسال یا بیشتر می گذشت. و ۵۲,۸٪ از افراد در طول بارداری فعلی خود هیچ مراجعه‌ی ای به دندانپزشک نداشته اند. همچنین از میان افرادی که به دندانپزشک در طول بارداری اخیر خود مراجعه کرده بودند (۲۱ نفر) تنها ۱۹ نفر (۲۶,۸٪) به منظور چک آپ مراجعه داشته اند و اکثر مراجعات در اثر وجود درد صورت گرفته بود. نکته‌ی قابل توجه این

، عوامل مالی (مانند پوشش بیمه ای) و میزان آگاهی افراد را از جمله موافع اصلی مراجعه‌ی فرد به دندانپزشک دانسته اند. (۱۹) بنا بر این می توان نتیجه گرفت که مادران باردار در سراسر دنیا با موافع تقریباً مشابهی در مراجعه به دندانپزشک در دوران بارداری خود مواجه هستند. البته لازم به ذکر است که در ایران وجود باور های غلط و اعتقادات ریشه دار و ناصحیح در مورد مراقبت از بهداشت دهان و دندان و خطرات احتمالی مراجعه به دندانپزشک در دوران بارداری، نیز از جمله موافع مهم برای مادران باردار برای مراجعه به دندانپزشک می باشد. برای مثال در مطالعه‌ی ای که حاجی کاظمی و همکاران انجام دادند، ۷۷,۵٪ از مادران بر این باور بودند که جنین از کلسیم موجود در بدن مادر و دندانهای مادر استفاده کرده و بنابراین پوسیدگی دندانی در دهان مادر باردار به این علت اتفاق می افتد. و یا ۴۵٪ از مادران بر این باور بودند که در دوران بارداری از دریافت درمانهای دندانپزشکی باید اجتناب نمود چرا که بر سلامت جنین تاثیر نامطلوب می گذارد. و یا یافته‌ی بسیار قابل توجه در مطالعه‌ی Hbashneh و همکاران نشان داد که حتی ۸۸٪ از پزشکان به مادران توصیه کرده اند که درمانهای دندانپزشکی خود را به بعد از بارداری موكول کنند. در حالی که مطالعات متعددی نشان داده اند که تنها گرفتن عکس

می رود. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه اکثریت مادران بعد از استفراغ دهان خود را می شویند اما تنها ۷/۹ درصد از مادران از اثرات نامطلوب استفراغ بر دندانهای خود آگاهی داشتند. بر اساس آکادمی دندانپزشکی اطفال آمریکا ، به مادران باردار باید توصیه شود تا بعد از استفراغ دهان خود را با یک لیوان آب و جوش شیرین شسته و تا یک ساعت بعد از استفراغ از استفاده از مسواک اجتناب کنند. (۱۲) همانطور که قبل اشاره شد، یکی از علل شایع بروز پوسیدگی های دندانی در مادران مصرف زیادتر از حد معمول مواد قندی در روز است. بر اساس مطالعه‌ی Hull و همکاران، اکثریت مادران باردار پس از بارداری رژیم سرشار از مواد قندی را در پیش می گیرند. (۱۸) نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد مادران درمورد اثرات تعداد دفعات مصرف مواد قندی از آگاهی مناسبی برخوردارند و ۷۵ درصد از افراد ۱بار یا کمتر در روز از این مواد استفاده می کردند. البته لازم به ذکر است که بررسی دقیق تر تغییرات عادات غذایی در دوران بارداری نیازمند داشتن اطلاعات در مورد میزان مصرف مواد قندی قبل و در حین بارداری بوده که جز اهداف این پژوهش نبود. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیونی در مطالعه‌ی حاضر نتایج بسیار سودمندی در اختیار قرار داد. برآسان این آنالیزها که به منظور بررسی روابط احتمالی موجود

بود که در مطالعه‌ی Saddki و همکاران و مطالعه‌ی بیات و همکاران بسیاری از مادران عدم نیاز به دندانپزشک و داشتن سلامت دهان و دندان مناسب را از جمله عوامل عدم مراجعه به دندانپزشک مطرح کرده بودند در حالی که در مطالعه‌ی حاضر کمتر از نیمی از افراد علائم پوسیدگی دندانی و علل خونریزی از لثه را می دانستند. بنابر این می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مادران دانش لازم برای بررسی وضعیت دهان و دندان خود را نداشته و لازم است به مادران آموزش داده شود تا تنها در صورت وجود درد به دندانپزشک مراجعه نکنند و به منظور پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و حفظ سلامت دهان مراجعات منظم به دندانپزشک باید صورت بگیرد. همانطور که پیشتر بحث شد یکی از مشکلاتی که بسیاری از مادران باردار در دوران بارداری با آن مواجه می شوند افزایش اسیدیته محیط دهان است که ایجاد سایش های مینایی و پوسیدگی دندانی می کند. علت آن را می توان به مصرف بیشتر مواد کربوهیدراتی تخمیر پذیر و همچنین بروز حالت های تهوع ، ریفلاکس اسید معده به مری و استفراغ نسبت داد که در پی تغییرات هورمونی به وجود می آیند. بنابراین آموزش و دادن آگاهی به مادران باردار در مورد میزان مصرف قندی و نحوه‌ی برخورد مناسب بعد از بروز تهوع و استفراغ امر بسیار مهمی به شمار

معناداری از لحاظ آماری داشت که کاملا مشابه با نتایج حاصل از مطالعات دیگر در سایر نقاط بود. همچنین همانگونه که پیش بینی می شد، رفتار مادران باردار تا حد زیادی همخوان با میزان دانش افراد بود. به صورتی که بین میزان اعمال مراقبتی مادران باردار در زمینه‌ی بهداشت عمومی دهان و دندان با سطح تحصیلات افراد ارتباط معنی داری برقرار بود. و مطالعات متعددی ارتباط مستقیم و قوی موجود بین دانش افراد در تمامی زمینه‌های سلامت و رفتار افراد در همان زمینه‌ها را نشان داده اند. (۲۲، ۱۳، ۳) نکته‌ی قابل تأمل در این نتایج اینگونه بود که اگرچه اعمال مراقبتی مادران باردار در زمینه‌ی بهداشت عمومی دهان و دندان با سطح تحصیلات افراد ارتباط معنی داری داشت اما، اعمال مراقبتی مادران در مورد رعایت بهداشت دهان و دندان به صورت خاص در زمان بارداری ارتباطی با سطح تحصیلات نداشت. در واقع می‌توان این چنین نتیجه گیری کرد که مادران باردار به دلیل کسالت و یا بی‌حوصلگی و خستگی که در اثر بارداری دچار می‌شوند حتی با داشتن دانش و آگاهی در مورد رعایت بهداشت دهان کمتر به آن می‌پردازند. بنابراین در مادران باردار و یا زنانی که در سن بارداری هستند، نباید تنها به آموزش‌های عمومی بهداشت دهان و دندان اکتفا نمود بلکه این افراد

بین متغیر‌ها صورت می‌گیرد مشخص شد بین میزان دانش و آگاهی مادران باردار در زمینه‌ی سلامت عمومی دهان و دندان با سطح تحصیلات افراد ارتباط مستقیم و معنی داری از لحاظ آماری برقرار است. (۱۵، ۱۲) این یافته با نتایج حاصل از مطالعات مشابه که جهت بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشت دهان و دندان انجام شده است کاملا همسو می‌باشد. میتوان این چنین تحلیل کرد که افزایش سطح تحصیلات و کسب سعاد، فرصتی را در اختیار فرد قرار داده که طی آن اطلاعات و آگاهی در زمینه‌ی رفتار‌های صحیح بهداشتی دریافت کند. Bamanikar و همکاران در مطالعه‌ای که با موضوع بررسی نگرش و دانش و رفتار مادران باردار در مراقبت از سلامت دهان و دندان انجام دادند نیز به نتیجه‌ی کاملا مشابهی دست یافته‌ند به صورتی که افراد با سطح تحصیلی بالاتر نه تنها از دانش بیشتری در این زمینه برخوردار بوده بلکه نگرش و اعمال مراقبتی بهتری نیز از خود نشان می‌دادند. آنها علت احتمالی این همبستگی را داشتن ارتباطات بیشتر با افراد بیشتر در مادرانی که تحصیلات بیشتری دارند بیان کرده اند. (۲۱) همچنین آگاهی مادران در مورد رعایت بهداشت دهان و دندان به صورت خاص در زمان بارداری با سطح تحصیلات و وضعیت محل سکونت که نشان دهنده‌ی وضعیت اجتماعی و درآمد فرد می‌باشد ارتباط

سلامت دهان و دندان برخورد ار نبوده و لازم است در این زمینه به مادران باردار آموزش های متناسب در مورد مهارت های عملی مراقبت از سلامت دهان و دندان داده شود و این افراد از اهمیت حفظ سلامت دهان در این دوران و اثرات بالقوه نامطلوب بیماری های پریودنال آگاه گردند. همچنین لازم است تا در آموزشهای داده شده در دوران بارداری به مادران باردار بر لزوم مراجعات منظم به دندانپزشک تاکید گردد.

با توجه به مستعد تر بودن برای بیماری های دهان و دندان و شرایط ویژه ای که دارند نیازمند دریافت اطلاعات مربوط به سلامت دهان و دندان در زمان بارداری و اهمیت آن، تغییرات فیزیولوژیک پیش آمده در این دوران و اثرات بالقوه نامطلوب بیماری های پریودنال بر سلامت جنین هستند.

نتیجه گیری:

نتایج پژوهش حاضر نشان داد جامعه ای مورد مطالعه از سطح آگاهی و دانش کافی در زمینه ای مراقبت از

References

- Bahramian H, Mohebbi SZ, Khami MR, Asadi-Lari M, Shamshiri AR, Hessari H. Psychosocial determinants of dental service utilization among adults: Results from a population-based survey (Urban HEART-2) in Tehran, Iran. European journal of dentistry. 2015;9(4):542-550.
- Silk H, Douglass AB, Douglass JM, Silk L. Oral health during pregnancy. American Family Physician. 2008;77(8).
- Thomas NJ, Middleton PF, Crowther CA. Oral and dental health care practices in pregnant women in Australia: a postnatal survey. BMC pregnancy and childbirth. 2008;8(1):13.
- Gaffield ML, GILBERT BJC, MALVITZ DM, ROMAGUERA R. Oral health during pregnancy: an analysis of information collected by the pregnancy risk assessment monitoring system. The Journal of the American Dental Association. 2001;132(7):1009-16.
- Mamatha B RR, G Radha. ORAL HEALTH STATUS AND TREATMENT NEEDS FOR PREGNANT WOMEN: A REVIEW. International Journal of Dental and Health Sciences. 2015;02(03):619-27.
- Xiong X, Buekens P, Fraser W, Beck J, Offenbacher S. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2006;113(2):135-43.
- George A, Johnson M, Blinkhorn A, Ajwani S, Bhole S, Yeo A, et al. The oral health status, practices and knowledge of pregnant women in south-western Sydney. Australian dental journal. 2013;58(1):26-33.
- Byanaku Ak RD. ORAL HEALTH OF PREGNANT WOMEN; Knowledge, attitude and practice at antenatal care clinic in Morogoro Municipal, Tanzania. Professional Med Journal. 2016;20(3):365-73.
- Council O. Guideline on Perinatal Oral Health Care.

10. Shamsi M, Hidarnia A, Niknami S. Self-reported oral hygiene habits and self-care in the oral health in sample of Iranian women during pregnancy. *World Applied Sciences Journal*. 2013;22(5):647-56.
11. Kazemi HH, Zeinal Zadeh M, Farsam F, Khafri S, Matloubi N. Pregnant women's self-report of oral health condition and its relation with oral clinical status. *Iran J Obstet Gynecol Infertil* 2016; 18(186):9-16.
12. HajiKazemi E, Mohseni SH, Oskouie F, Haghani H. The association between knowledge, attitude and performance in pregnant women toward dental hygiene during pregnancy. *Iran Journal of Nursing*. 2005;18(43):31-8.
13. Shamsi M, Hidarnia A, Niknami S. A survey of oral health care behavior in pregnant women of Arak: Application of Health Belief Model. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*. 2012;22(89):103-115. (Persian)
14. Bayat F, Karimi-Shahanjirini A, Bashirian S, Faradmal J. Assessment of Dental Care and its Related Barriers in Pregnant Women of Hamadan City. *JECH*. 2016; 3 (1) :20-27
15. Shamsi M, Hidarnia A, Niknami S, Rafiee M, Karimi M: Oral health during pregnancy: A study from women with pregnancy. *Dent Res J (Isfahan)*. 2013;10:409-410.
16. Boggess KA, Urlaub DM, Massey KE, Moos M-K, Matheson MB, Lorenz C. Oral hygiene practices and dental service utilization among pregnant women. *The Journal of the American Dental Association*. 2010;141(5):553-61.
17. Saddki N, Yusoff A, Hwang YL. Factors associated with dental visit and barriers to utilisation of oral health care services in a sample of antenatal mothers in Hospital Universiti Sains Malaysia. *BMC Public Health*. 2010;10(1)75
18. Hullah E, Turok Y, Nauta M, Yoong W. Self-reported oral hygiene habits, dental attendance and attitudes to dentistry during pregnancy in a sample of immigrant women in North London. *Archives of gynecology and obstetrics*. 2008;277(5):405-9.
19. Al Habashneh R, Guthmiller JM, Levy S, Johnson GK, Squier C, Dawson DV, et al. Factors related to utilization of dental services during pregnancy. *Journal of clinical periodontology*. 2005;32(7):815-21.
20. Özen B, Özer L, Başak F, Altun C, Açıkel C. Turkish women's self-reported knowledge and behavior towards oral health during pregnancy. *Medical Principles and Practice*. 2012;21(4):318-22.
21. Bamanikar S, Kee LK. Knowledge, attitude and practice of oral and dental healthcare in pregnant women. *Oman medical journal*. 2013;28(4):288.
22. Hom JM, Lee JY, Divaris K, Baker AD, Vann WF. Oral health literacy and knowledge among patients who are pregnant for the first time. *The Journal of the American Dental Association*. 2012;143(9):972-80.