

Comparison of the number of permanent teeth in children from fertility with natural fertility at age 5 in Isfahan, 1396

[Original Article](#)

Abstract

Background: The tooth eruption is a continuous biological process through which the growing teeth enter the oral cavity through the jaws. Generally, teeth are usually between 5 to 13 years old. The time and arrangement of tooth eruption in different races varies. For this purpose, the aim of this study is to compare the number of permanent teeth in children in Isfahan.

Materials and methods: This descriptive -comparative study was conducted on 5-year-old children in preschools, 21 of which were children with Assisted fertility methods (male and female) and 21 children (male and female), From natural pregnancy. Data were analyzed using SPSS version 22. The number of permanent teeth was compared with the Mann-Whitney test. In the kidneys of the statistical tests, p value less than 5 hundredths is considered as a significant level.

Results: The results of this study showed that there was no statistically significant difference in the number of permanent birth nurses in children born using assisted fertility methods with normal pregnancy outcomes.

Conclusion: The type of fertility and permanent teeth growth of children is also appropriate and irrelevant to the fertility method, and the nurse of the children with the information of the results of this research can prevent the infertility couples' concerns about the permanent teeth of the child resulting from the assisted reproductive techniques to be Findings of the present study showed that there is no significant difference between the time of development of boys and girls in preschool.

Keywords: permanent teeth, assisted reproduction method, preschool child

Hasanpoor amiene F¹

Dashti F^{2*}

Sadeghi N³

1. MSC. BSc in
Midwifery instructor
Nursing and Midwifery
Faculty of Isfahan
(khorasgan) Branch,
Islamic Azad University,
Isfahan, Iran.

2. Midwifery
Community Health
Research Center, Isfahan
(khorasgan) Branch,
Islamic Azad University,
Isfahan, Iran.

3. Midwifery
Community Health
Research Center, Isfahan
(khorasgan) Branch,
Islamic Azad University,
Isfahan, Iran

Corresponding Author:

dashti@khusf.ac.ir

مقایسه‌ی تعداد رویش دندان‌های دائمی کودکان ۵-۶ ساله حاصل از روش‌های کمک باروری با

تحقیقی

باروری طبیعی در اصفهان سال ۱۳۹۶

چکیده

زمینه و هدف: رویش دندان یک فرآیند بیولوژیکی پیوسته است که از طریق آن دندان‌های در حال رشد از طریق فک‌ها وارد حفره دهان می‌شوند. عموماً رویش دندان دائم بین ۵ تا ۱۳ سالگی است. زمان و ترتیب رویش دندان‌ها در نژادهای مختلف متفاوت است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی تعداد رویش دندان‌های دائمی رویش یافته کودکان در مقطع پیش‌دبستانی اصفهان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقایسه‌ای بود، کودکان ۵ و ۶ ساله‌ی مقطع پیش‌دبستانی که ۴۲ کودک حاصل روش‌های کمک باروری (پسر و دختر) و ۴۲ کودک (پسر و دختر) حاصل از بارداری طبیعی می‌باشد و تعداد دندان‌های دائمی با آزمون من ویتی مقایسه شد. در کلیه‌ی آزمون‌های آماری، مقدار p کمتر از ۰/۰۵ به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد زمان رویش دندان دائمی کودکان متولد شده با استفاده از روش‌های کمک باروری تفاوت آماری معنی‌داری با کودکان حاصل از بارداری طبیعی نداشت.

نتیجه‌گیری: نوع روش باروری و رویش دندان‌های دائمی کودکان نیز بی‌ارتباط با روش باروری می‌باشد و پرستار کودکان با اطلاع‌رسانی نتایج این پژوهش می‌تواند مانع نگرانی در زوج‌های نابارور درباره رویش دندان‌های دائمی کودک حاصل از روش‌های کمک باروری شود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد زمان رویش کودکان پسر و دختر در پیش‌دبستانی هیچ تفاوت معنی‌داری ندارد.

کلمات کلیدی: رویش دندان دائمی، روش کمک باروری، کودک پیش‌دبستانی

فرازنده حسن پور^۱
فروزنده دشتی^۲
نرگس صادقی^۳

۱. دانشجوی رشته کارشناس ارشد پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوارسگان)، ایران.
۲. کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوارسگان)، ایران
۳. استادیار، دکترای پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوارسگان)، ایران

نویسنده مسئول: فروزنده دشتی
dashti@khusif.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۷/۱/۳۱

تاریخ پذیرش: ۹۷/۶/۵

بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهند که شرایط محیطی، شرایط اجتماعی، ارتباطات عاطفی و هیجانی و وضعیت تغذیه در رشد جسمی، اجتماعی و روانی کودک بسیار موثر است (۲). از آنجایی که کودکان به طور میانگین تمام دندان‌های شیری را در سن ۶-۱۲ سالگی از دست می‌دهند و سال‌های ابتدایی به آن‌ها جوجه اردک رشت می‌گویند، چون دندان‌های دائمی نسبت به صورت کوچک آنها بزرگتر به نظر می‌رسد. رویش اولین دندان دائمی در

مقدمه: کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و تأمین سلامت جسمی، روانی آنها، آینده‌های بهتر را نوید می‌دهد. بنابراین، برای ارتقاء سلامت جامعه باید در جهت تأمین سلامت کودکان برنامه‌ریزی گردد و برنامه‌های تأمین سلامتی در بزرگسالی تداوم یابد (۱). توجه به کودکان و مراقبت از رشد و سلامت آنان نه تنها زندگی سالم در دوران کودکی را تضمین می‌کند بلکه شرایط برخورداری از زندگی سالم در دوران نوجوانی و بزرگسالی را نیز فراهم می‌کند.

باشد به علت اثرات مهاری بر میزان ترشحات تیروکسین، در سنین پایین و استفاده مزمن می‌تواند اثرات مشابه هیپوتیروئیدیسم بر سلامت فرد بگذارد که تاخیر رویش دندان و ضریب هوشی پایین از جمله این آثار است (۷).

روش بررسی: این مطالعه یک مطالعهٔ توصیفی - مقایسه‌ای است که به مقایسهٔ تعداد رویش دندان‌های دائمی کودکان ۶-۵ ساله حاصل از روش‌های کمک باروری با باروری طبیعی در اصفهان سال ۱۳۹۶ می‌پردازد. کد شناسایی پایان نامه: ۰۴۱۹۶۱۲۲۸۱۰۴. کمک باروری گرفته، آدرس و شماره تلفن افرادی که در نیمه اول ۱۳۹۰ تا نیمه دوم ۱۳۹۱ از روش کمک باروری استفاده کرده بودند، از پزشکان مراکز ناباروری در تاریخ ۱۲/۱/۹۵ اخذ شد و با تمام والدینی که از روش‌های کمک باروری، باردار و زایمان موفق داشتند، تماس تلفنی برقرار شد. برای انجام این تحقیق از تاریخ ۳۱/۲/۹۶ تا ۳۱/۶/۹۶ با خانواده‌ها تماس گرفته و در مورد تحقیق با آنها صحبت می‌شد. سپس از ۱ آبان تا ۱۵ آذر یک قرار ملاقات با خانواده‌ها گذاشته شد و در مرحله اول ملاقات با رعایت ملاحظات اخلاقی و پرکردن مشخصات جمعیت‌شناسی پرسشنامه به مادران داده شد تا به مربی داده شود و از آن‌ها بخواهند که پرسشنامه را برای کودک تکمیل کنند. با اجازه از اداره کل آموزش پرورش و ارسال مجوز به کارتابل مراکز و داشتن معرفی به مراکز پیش‌دبستانی و همکاری مدیر مرکز، محقق تحقیق در حال اجرا را برای والدین کودکان که جهت انجام کاری به پیش‌دبستانی آمده بودند توضیح می‌داد. تعداد نمونه در گروه ۴۲ نفر (پسر و دختر) ۵ ساله و در مقطع پیش‌دبستانی بودند. در روش‌های کمک باروری ۲۱ کودک (۱۰ پسر، ۱۱ دختر) در پیش‌دبستانی ۱ و ۲۱ کودک (۹ پسر، ۱۲ دختر) در پیش‌دبستانی ۲ ثبت‌نام کرده بودند و در روش بارداری

حدود ۶ سالگی است. قبل از ظهور آثار آن‌ها در فک در زیر دندان‌های شیری مشخص است. ریشه‌ها به تدریج جذب شده، بنابراین وقتی که یک دندان شیری می‌افتد، فقط تاج آن باقی می‌ماند در ۶ سالگی تمام دندان‌های شیری وجود دارند و دندان‌های دائمی نیز نسبتاً خوب شکل گرفته است. رویش دندان‌های دائمی با آسیاها، ۶ سالگی شروع شده که عقب‌تر از آسیاهای شیری رویش می‌یابد. مشخصه افتادن دندان‌های شیری و رویش دندان‌های دائمی در کودکان، متفاوت است (۳). رویش دندان یک فرآیند بیولوژیکی پیوسته است که دندان‌های در حال رشد از فک‌ها وارد حفره دهانی شوند. زمان و روند رویش دندان‌ها، عوامل مهم در برنامه‌ریزی درمان دندان‌پزشکی و همچنین در دندان‌پزشکی قانونی برای تخمین زدن سن کودک است (۴). به طور کلی انسان در طول زندگی دارای دو گروه دندان شیری (اولیه) و دائمی می‌شود. دندان‌های شیری ۱۰ عدد در هر فک و جماعت ۲۰ دندان هستند. تعداد دندان‌های دائمی انسان (با در نظر گرفتن چهار دندان عقل) جملاً ۳۲ دندان در فک است (۵). رویش دندان تابع یکسری نیروهای متنوع فیزیولوژیک می‌باشد که نهایتاً سبب قرار گرفتن دندان در محیط دهان و در تعاض با دندان‌های دیگر می‌شود. روند تکامل و تشکیل ریشه دندان اساساً به عنوان اصلی‌ترین عامل و پذیرفته شده‌ترین تئوری در توجیه مکانیسم رویش دندان می‌باشد. نقش هورمون‌ها در پیش‌برد این روند بسیار مهم است و در مواردی که هورمون رشد دچار کمبود فعالیت می‌شود اثر مستقیم آن بر روند رشد و رویش دندان، در نسج نرم چند هفته و در محیط دهان از چند هفته تا چند ماه متغیر است و قطعاً دندان‌های تک ریشه مسیری سریع‌تر از چند ریشه را طی می‌کنند (۶). اگر فلوراید آب آشامیدنی بیش از حد مجاز

مقایسه‌ی تعداد رویش دندان‌های دائمی کودکان، فرازنده حسن پور و همکاران

Archive of SID

دندان محسوب می‌شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss 22 آنالیز شد. سطح معنی‌داری در کلیه تحلیل‌ها $p < 0.05$ درنظر گرفته شد.

یافته‌های: بر اساس نتایج جدول ۷-۴، در بین کودکان ۵ ساله، طبق نتیجه‌ی آزمون منویتی اختلاف معناداری بین کودکان ۵ ساله دو گروه از نظر تعداد دندان دائمی مشاهده نشد ($p < 0.05$)

طبیعی ۲۱ کودک (۱۴ پسر، ۷ دختر) در پیش دبستانی ۱ و ۲۱ کودک (۱۰ پسر، ۱۱ دختر) در پیش دبستانی ۲ ثبت‌نام کرده بودند. آزمودنی‌ها به روش در دسترس از پیش دبستانی‌های دولتی و غیر انتفاعی انتخاب شدند و از نظر سطح تحصیلات والدین تفاوت معنی‌داری نداشتند. ابتدا دستکش پوشیده می‌شد و از کودکان خواسته می‌شد دهان خود را باز کنند و در نور طبیعی دهان کودکان چک می‌شد و در صورت قرمز شدن لشه‌ها کودک لمس می‌شد و در صورت کوچکترین بیرون زدگی یک

جدول شماره ۱: مقایسه تعداد دندان دائمی کودکان دو گروه بارداری با روش‌های کمک باروری با بارداری طبیعی به تفکیک جنس و سن

سطح معناداری	آماره آزمون	روش کمک باروری		روش طبیعی		تعداد دندان	جنسیت	سن
		درصد	تعداد	درصد	تعداد			
۰/۲۸۹	U=۸۴/۰۰	۷۸/۶	۱۱	۹۲/۹	۱۳	۰	پسر	۵ سال
		۲۱/۴	۳	۷/۱	۱	۱	دختر	
		۱۰۰/۰	۱۴	۱۰۰/۰	۱۴	کل		
۰/۶۰۶	U=۲۱/۰۰	۴۲/۹	۳	۵۷/۱	۴	۰	پسر	عسال
		۵۷/۱	۴	۴۲/۹	۳	۱	دختر	
		۱۰۰/۰	۷	۱۰۰/۰	۷	کل		
۱/۱۰۰	U=۴۵/۰۰	۲۲/۲	۲	۳۰/۰	۳	۰	پسر	عسال
		۳۳/۳	۳	۲۰/۰	۲	۱	دختر	
		۴۴/۴	۴	۵۰/۰	۵	۲		
		۱۰۰/۰	۹	۱۰۰/۰	۱۰	کل		
۰/۴۱۳	U=۵۲/۰۰	۳۳/۳	۴	۳۶/۴	۴	۰	پسر	۵ سال
		۰/۰	۰	۲۷/۳	۳	۱	دختر	
		۶۶/۷	۸	۳۶.۴	۴	۲		
		۱۰۰/۰	۱۲	۱۰۰/۰	۱۱	کل		
۰/۲۹۸	U=۱۸۹/۰۰	۶۶/۷	۱۴	۸۱/۰	۱۷	۰	هم دختر و هم پسر	عسال
		۳۳/۳	۷	۱۹/۰	۴	۱		
		۱۰۰/۰	۲۱	۱۰۰/۰	۲۱	کل		
۰/۴۵۸	U=۱۹۳/۵۰	۲۸/۶	۶	۳۳/۳	۷	۰	هم دختر و هم پسر	عسال
		۱۴/۳	۳	۲۳/۸	۵	۱		
		۵۷/۱	۱۲	۴۲/۹	۹	۲		
		۱۰۰/۰	۲۱	۱۰۰/۰	۲۱	کل		

محاسبه زمان رویش های دائمی مورد استفاده قرار گرفت.

اختلاف معنی‌داری بین طرف راست و چپ در هر فک وجود ندارد. در فک پایین های دائمی به طور قابل توجهی زودتر از فک بالا ظاهر می‌شدن، رویش های مولر در دختران به طور متوسط ۴ تا ۵ ماه پیش از پسران بود (۹). در مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک زمان رویش های دائمی، افراد ۱۳-۵ ساله در شهر شیراز انجام شد تقدم رویشی در های دختران نسبت به پسران مشاهده می‌گردد. های فک پایین در اکثر موارد نسبت به های همتای خود در فک بالا زودتر رویش می‌یابند. ولی در دو گروه تفاوت معنی‌داری یافت نشد (۱۰).

نتایج بناکار و همکاران، برونادل کجاو همکاران با این مطالعه هم‌خوان بود. با مطالعات کوتیسا و همکاران، آلمناتنی و همکاران هم‌خوان و همسو نبود. که می‌توان این طور نتیجه‌گیری نمود که رویش به الگوهای تغذیه و ژنتیک نیز مرتبط می‌باشد و فرهنگ غذایی ایرانیان و ساختار وراثتی ایران با ملل دیگر متفاوت می‌باشد. همچنین میزان اختلاف ۲-۳ ماه بود و در این تحقیق اندازه گیری بر اساس ماه برای کودکان در نظر گرفته نشده بود.

نتیجه گیری: براساس نتایج یافته‌ها رویش های کودکان بی‌ارتباط با روش باروری می‌باشد و پرستار کودکان با اطلاع‌رسانی نتایج این پژوهش می‌تواند مانع نگرانی در زوج‌های نابارور در باره مهارت اجتماعی کودک حاصل از روش‌های کمک باروری شود.

تقدیر و تشکر: محقق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، مسئولین محترم مدارس، معلمان، کلیه والدین و کودکان عزیز، که در اجرای این پژوهش نقش داشته‌اند، به خاطر مساعدت‌ها و همکاریشان کمال قدردانی را دارد.

در بین کودکان ۶ ساله، طبق نتیجه‌ی آزمون منویتنی

اختلاف معناداری بین کودکان ۶ ساله دو گروه از نظر تعداد دائمی مشاهده نشد ($p < 0.05$). همچنین در هر کدام از کودکان ۵ و ۶ ساله، اختلاف معناداری در تعداد دختران و پسران بین دو گروه بارداری با روش‌های کمک باروری و بارداری طبیعی مشاهده نشد ($p < 0.05$).

بحث: بر اساس نتایج جدول ۱، در بین کودکان ۵ ساله، در گروه روش کمک باروری ۳۳/۳ درصد کودکان و در گروه بارداری طبیعی ۱۹ درصد کودکان دارای یک دائمی بوده‌اند.

در این مطالعه تفاوتی بین جنسیت کودک در رویش نیز مشاهده نشد، پژوهش مرتبط با این نتیجه در دو گروه با بارداری با روش‌های کمک باروری با بارداری طبیعی یافت نشد، ولی از نظر اختلاف رویش بین دختر و پسر طبق تحقیق کوتیسا و همکاران (۲۰۱۳)، متوسط زمان رویش در دختران نسبت به پسران کمتر بود یعنی دختران زودتر از پسران در آوردنند. در مطالعات گذشته زمان و ترتیب رویش دائمی در کودکان اسپانیایی انجام گرفت، در این مطالعه هیچ تفاوت آماری معنی‌داری در زمان ظهور یافت نشد، با این وجود ما متوجه شدیم که های قوس پایین قبل از قوس بالا رویش می‌یابد. رویش در هر دو فک متفاوت بود، اما در هر دو جنس یکسان بود (۸). در مطالعه‌ی آلمناتنی و همکاران استانداردهای زمان رویش های دائمی در کودکان لیتوانی، ساکنین شهر ویولون در یک مطالعه مقطعی انجام شد، داده‌ها از ۳۵۹۶ نفر لیتوانی جمع‌آوری شد، کودکان ۴ تا ۱۶ ساله به طور تصادفی مهد کودک و مدارس راهنمایی ویلیو انتخاب شده‌اند. نرم‌افزار آماری مینی تپ ۱۵ برای

References

1. Abanto J, Carvalho TS, Mendes FM, Wanderley MT, Bönecker M, Raggio DP. Impact of oral diseases and disorders on oral health-related quality of life of preschool children. *Community dentistry and oral epidemiology*. 2011;39(2):105-14.
2. Abri S, Hajyousefi A, Hajbabayi H, Rahgozar M. Comparison of Social Development Between 3-6 Years Old Children Who Use Rural Child Care Center Services and Who Dont. *Social Welfare Quarterly*. 2011;11(41):343-68.
3. Wong. Wong Children's Nursing Lesson (Healthy Baby and Patient Child). Tehran,: Communityman; 1394. 976 p.
4. Kutesa A, Nkamba EM, Muwazi L, Buwembo W, Rwenyonyi CM. Weight, height and eruption times of permanent teeth of children aged 4–15 years in Kampala, Uganda. *BMC oral health*. 2013;13(1):15.
5. A M. National Dental Books: house Jihad university; 1394. 400 p.
6. Ansari Gh VGM, Mirkarimi M. Oral anomalies in children and adolescents. First Edition ed: praises the truth; 1392. 224 p.
7. Seraj B, Shahrabi M, Afshar H, Heydari A, Moshrafian S, Fallah-Zadeh M, et al. Evaluation of intelligence quotient in children with early first permanent molar eruption. *Majallah i Dandanpizishki (Journal of Islamic Dental Association of Iran)*. 2010;22(1).
8. Del Cojo MB, Lopez NG, Martinez MM, Garcia MDN, Nova D. Time and sequence of eruption of permanent teeth in Spanish children. *Eur J Paediatr Dent*. 2013;14(2):101-3.
9. Almonaitiene R, Balciuniene I, Tutkuviene J. Standards for permanent teeth emergence time and sequence in Lithuanian children, residents of Vilnius city. *Stomatologija*. 2012;14(3):93-100.
10. Benakar Sh ZH, Proof of the Oath. An epidemiological study on the incidence of permanent teeth, 5-13 years old people in Shiraz. *Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences*. 1995:13-1.