

Relationship between clinical symptoms and manometric findings in women with functional constipation

Afsaneh Sadat Mirshahvelayati¹, Farideh Dehghan Manshadi*², Mojgan Foroutan³, Alireza Akbarzadeh Bagheban⁴

1. Student Research Committee. Msc. Department of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran.
2. Assistant Professor of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran. (Corresponding author) manshadi@sbmu.ac.ir
3. Assistant Professor, Department of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Velenjak, Tehran, Iran
4. Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Article Received on: 2015.1.31

Article Accepted on: 2015.7.14

ABSTRACT

Background and Aim: Functional constipation is a widely prevalent anorectal condition. The most commonly used instrument to evaluate constipation is the Rome III criteria .Clinical diagnostic techniques such as anorectal manometry is also performed to assess constipation. Issues of cost, accessibility, requirement for specialized skill and denial of patient comfort, makes its use waned. Rome III criteria can be used as an assessment tool easier than the other modalities, such as manometry. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between clinical symptoms based on Rome III criteria with manometric findings in women with functional constipation.

Material & Methods: 35 female patients with a mean age of 38.51 ± 10.24 years and functional constipation diagnosed by specialist were included in this study. After complication of Rome III criteria and background information questionnaire, digital evaluation and anorectal manometry were assessed. For data analysis SPSS software version 22, Pearson and Spearman correlation coefficient was used.

Results: Our results indicated significant negative correlation between the severity of Rome III criteria pressure of upper anal during squeeze and push maneuver, between rectal, upper anal resting pressure and level of gas or fecal incontinence and between rectal pressure of squeeze with number of delivery and also between severity of Rome III criteria and strength and endurance of pelvic floor muscles by digital assessment. Positive correlation between lower anal pressure during push and resting tone was observed ($p<0.05$).

Conclusion: According to this study, the clinical assessment of patients with functional constipation, Rome III criteria and manual pelvic floor muscle examination such as strength and endurance, as a non-invasive and low cost method is recommended. However, to achieve an accurate diagnosis, in addition to the mentioned methods, the use of anorectal manometry is recommended.

Keywords: Functional constipation, Anorectal manometry, Rome III criteria

Cite this article as: Afsaneh Sadat Mirshahvelayati ,Farideh Dehghan Manshadi ,Mojgan Forutan ,Alireza Akbarzadeh Bagheban. Relationship between clinical symptoms and manometric findings in women with functional constipation. J Rehab Med. 2015; 4(3): 94-100.

بررسی ارتباط علائم بالینی با یافته های مانومتریک در زنان مبتلا به بیوست عملکردی

afsanah sedat mir shah valiyi¹, freydeh dehghan mansadi^{2*}, mazkan firoozan³, ali-reza akbarzadeh bagban⁴

۱. کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجویی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۲. دکتری تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۳. فوق تخصص گوارش، دانشیار مرکز تحقیقات کبد و گوارش بیمارستان طالقانی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴. دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده مقدمه و اهداف

بیوست عملکردی یکی از انواع بیوست است و مهمترین روش تشخیصی بالینی آن، معیار رم III می‌باشد. ابزارهای بیوفیزیولوژیک چون مانومتری آنورکتال نیز به عنوان ابزار تشخیصی بیوست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مساله چون تحمیل هزینه، دسترسی مشکل، نیاز به داشت تخصصی و عدم پذیرش راحت بیمار، استفاده از آن را با مشکلاتی رویرو کرده است. استفاده از معیار رم III می‌تواند راه آسانتر و در دسترس تر نسبت به روش‌های دیگر تشخیصی چون مانومتری باشد و همچنین فیزیوتراپیست‌ها نیز می‌توانند از آن جهت ارزیابی بیماران مبتلا به بیوست استفاده کنند. این سو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط علائم بالینی با یافته های مانومتری در زنان مبتلا به بیوست عملکردی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

۳۵ بیمار خانم با میانگین سنی $38/51 \pm 10/24$ سال و با مشکل بیوست عملکردی با تشخیص پزشک متخصص گوارش در این مطالعه شرکت کردند و پس از تکمیل اطلاعات زمینه‌ای، فرم مربوط به معیار رم III، تحت ارزیابی بالینی و مانومتری قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS ویراست ۲۲ و آزمون‌های ضریب همبستگی پرسون و اسپیرمن استفاده شد.

یافته‌ها

نتایج بیانگر رابطه معنی‌دار منفی بین شدت معیار رم III و فشار آنال فوقانی در حین انقباض و push، فشار استراحت رکتوم و آنال فوقانی با میزان بی‌ اختیاری مدفوع و گاز، فشار رکتوم حین انقباض با تعداد زایمان و امتیاز کلی علائم معیار رم III با قدرت و استقامت عضلات کف لگن حین معاینه بود. همچنین رابطه معنی‌دار مثبت بین فشار آنال تحتانی حین push و تون استراحت مقدار دیده شد ($P < 0.05$).

نتیجه گیری

بر اساس مطالعه حاضر، برای ارزیابی بالینی بیماران مبتلا به بیوست عملکردی، استفاده از معیار رم III و شاخص‌های مربوط به معاینه دستی مانند قدرت و استقامت عضلات کف لگن، به عنوان روش‌های غیرتکننی، کم‌هزینه و به خصوص برای همکاران فیزیوتراپیست جهت ارزیابی بالینی پیشنهاد می‌شود. هر چند جهت دستیابی به تشخیص دقیق، علاوه بر روش‌های فوق، استفاده از مانومتری توصیه می‌شود.

وازگان کلیدی

بیوست عملکردی، مانومتری آنورکتال، معیار رم III

* دریافت مقاله ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ پذیرش مقاله ۱۳۹۴/۴/۲۳

نویسنده مسئول: دکتر فریده دهقان منشادی. تهران، میدان امام حسین (ع)، خیابان دماوند، رویروی بیمارستان بوعلی، دانشکده توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

تلفن: ۷۷۵۶۱۷۲۱

آدرس الکترونیکی: manshadi@sbmu.ac.ir

مقدمه و اهداف

بیوست یکی از شایعترین مشکلات شکمی – روده ای است^[۱] که میزان شیوع آن در افراد بزرگسال حدود ۳۰٪ است^[۲]. بیوست در زنان بیشتر از مردان دیده می شود و میزان شیوع آن با افزایش سن افزایش می یابد^[۱۹۵,۴,۱]. اگرچه کاهش حرکات روده ای و به دنبال آن کاهش دفع در تعريف بیوست استفاده شده، در مطالعات اخیر علائمی چون زور زدن بیش از حد، مزاج سفت، استفاده از دست حین دفع و احساس دفع ناقص نیز در تکمیل علائم بیوست به کار برده شده است^[۶,۴]. یکی از شایعترین انواع بیوست، بیوست عملکردی است که بر اساس معیار رم III تعریف می شود^[۱۸۶,۵,۴]. مصرف کم فیبر در رژیم غذایی، آب و مایعات ناکافی و کاهش فعالیت فیزیکی از موارد اتیولوژیک مشکل بیوست عملکردی است^[۱۹,۷]. بیوست با تاثیر بر کیفیت زندگی شخص مبتلا مشکلات اجتماعی و هزینه های مالی فراوانی را بر فرد تحمیل می کند^[۲]. علاوه بر پرسشنامه رم III ارزیابی های آنورکتال جهت تشخیص مشکل بیمار با هدف انتخاب برنامه درمانی مناسب، انجام می گیرند که می توان آنها را به دو دسته آناتومیک و عملکردی تقسیم کرد. آزمون های های آناتومیک شامل سونوگرافی داخل آنال، دفکوگرافی و ام آر آی و آزمون های عملکردی شامل مانومتری آنورکتال، بالون اکسپلائز، دفکوگرافی، ام آر آی داینامیک و آزمون ترانزیت روده ای می باشد^[۱۰]. در این میان، مانومتری آنورکتال یک روش ارزیابی مرسوم این ناحیه بوده که به بررسی فشار های آنال و رفلکس های ناحیه می پردازد. پارامترهای آن عبارتند از فشار حالت استراحت و انقباض ارادی کanal آنال، مدت زمان حفظ انقباض اس芬کترها، رفلکس والسالوا یا cough (افزایش مختصر تنفس آنال در پاسخ به افزایش داخل شکمی) و وجود رفلکس مهاری آنورکتال^[۱۰,۹]. به طور کل متداول ترین معیار تشخیصی مورد استفاده در این زمینه معیار رم است^[۸,۵]. در سال ۲۰۰۴ S.S.C.RAO و همکاران مطالعه ای بر پایه ای بررسی تست های عملکردی کولورکتال و معیار رم II انجام دادند. از میان افراد مورد مطالعه که بر مبنای پرسشنامه رم II به عنوان افراد با مشکل بیوست عملکردی وارد مطالعه شدند، ۳۰٪ از نظر آزمون عملکردی مانومتری آنورکتال طبیعی بوده و از نظر میزان فشار ها و الگوی دفع مشکلی نداشتند. در حالیکه ۷۰٪ بیماران در آزمون مانومتری انواعی از مشکل در الگوی دفع یا دیس سینزی عضلات کف لگن را حین دفع نشان دادند^[۷].

مواد و روش ها

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل : فرم اطلاعات جمعیت شناختی و زمینه ای، متر نواری و ترازو، فرم مربوط به معیار رم III و دستگاه مانومتری شرکت (Medical Measurment Systems) مدل M.M.S (G3-8)GI Solar در فرم جمعیت شناختی قد، وزن، سن، جنس، وضعیت تاہل، تعداد زایمان، بعضی علائم گوارشی مانند بی اختیاری مدفوع (جامد یا مایع) و گاز در یک سال گذشته وجود داشت. در بخش معاینه بالینی، تست مربوط به میزان قدرت حداکثر و استقامت عضلات کف لگن همراه با توشه رکتال (وارد کردن انگشت به داخل رکتوم فرد) انجام گرفت. درجه بندی قدرت عضلات با استفاده از مقیاس تغییر شکل یافته آکسفورد به صورت رتبه ای از صفر تا پنج صورت پذیرفت^[۱۳].

این مطالعه از نوع تحلیلی بود که به شکل مقطعی انجام گردید. در این تحقیق از میان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مانومتری بخش گوارش بیمارستان طالقانی تهران، ۳۵ بیمار خانم در دامنه سنی ۲۰ تا ۵۸ سال و با شکایت سختی دفع و مشکلات دفعی (حداقل به مدت ۶ ماه) از شهریور سال ۹۲ الی دی ماه سال ۹۳ انتخاب شدند. این انتخاب بر اساس معیار رم III (جدول ۱)^[۱۸,۴] و تشخیص نهایی پزشک متخصص گوارش صورت گرفت. بر مبنای این معیار، اگر افراد حداقل دو مورد از نشانه هایی چون زور زدن حین دفع، داشتن مزاج سفت، احساس دفع ناقص، حس وجود سد یا مانع حین دفع، نیاز به کمک دستی و فشار به اطراف مقدع به منظور تخلیه، تعدد دفع کمتر از ۳ مرتبه در هفته و عدم وجود مزاج نرم بدون مصرف ملین را حداقل در ۲۵٪ موقع دفعی و در طول مدت حداقل ۶ ماه گذشته داشتنده، به عنوان بیوست عملکردی شناخته شدند. معیار عدم ورود فرد به مطالعه، بیوست ثانویه به علت مصرف دارو، بیوست به علت مسایل پاتولوژیک و بیماری های متابولیک، مشکلات ساختاری روده ای، بیماری های نوروژنیک، سابقه جراحی در یک سال گذشته و بارداری در نظر گرفته شدند. پس از تکمیل فرم مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی و علائم زمینه ای و پرسشنامه رم III توسط بیمار، وزن و قد وی اندازه گیری شد. بر این اساس شاخص

توده بدنی به صورت وزن (بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر مربع قد (بر حسب متر) محاسبه گردید. از سوالات مطرح شده در موارد زمینه ای، بی اختیاری مدفوع و یا گاز به صورت گزینه ای تحت عنوان هرگز، گاهی اوقات، اغلب، تقریباً همیشه و به طور دائم سوال شد. سوالات فرم رم III به صورت گزینه ای شامل: هرگز، گاهی اوقات، اغلب، تقریباً، همیشه و به طور دائم می شدند. گزینه های هرگز و گاهی اوقات، طبیعی و باقی گزینه ها نشانگر مشکل در بیش از ۲۵٪ موضع بود. جهت ارزیابی معیار رم، به گزینه های سوالات آن، به ترتیب شدت علائم، امتیاز یک تا ۵ داده شد و در انتهای، مجموع امتیازات نشان دهنده امتیاز کلی علائم رم بود.

پس از آن معاینه داخلی انجام شد؛ بدین شکل که بیمار روی تخت به پهلوی چپ خوابیده، با انجام توشه رکتال تون استراحت آنال توسط تراپیست با ذکر یکی از موارد تون پایین، طبیعی و یا بالا ارزیابی شد. بعد از آن تراپیست، از بیمار خواست دور تا دور انگشت وی را فشار دهد و تا جایی که می تواند به سمت داخل بکشد. درجه بندی قدرت بر اساس مقیاس تغییر شکل یافته آسفورد بود. بعد از ۵ ثانیه استراحت از بیمار خواسته شد انقباض را نگه دارد. مدت زمان نگه داشتن انقباض حداکثر و تا کاهش ۲۵٪ آن، بر حسب ثانیه، از ۱۰-۰ ثبت شد. در مرحله بعد بیماران تحت ارزیابی با مانومتری آنورکتال قرار گرفتند. برای انجام مانومتری بیمار رژیم غذایی روزانه خود را داشت ولی از وی خواسته می شد ترجیحاً حداقل چند ساعت قبل از انجام تست دفع داشته باشد. نحوه انجام مانومتری به این شکل بود که بیمار هوشیار به پهلوی چپ خوابیده، آزمونگر پروب را داخل کانال آنال و رکتوم قرار می داد. در مرحله اول، بیمار بدون هیچ حرکتی در حالت استراحت قرار می گرفت. در این حالت فشار استراحت رکتوم و آنال ثبت می شد. در مراحل بعد بیمار انقباض حداکثر در عضلات کف لگن و تلاش در جهت دفع بالون را انجام داد. هر مرحله دو بار با ۳۰ ثانیه استراحت بینشان انجام می گرفت. بدین شکل فشار حداقل انقباض حداکثر و فشار های مربوط به push نواحی رکتوم و آنال ثبت می شد. تمام فشارها بر حسب میلی متر جیوه بود. در انتها با انتقال آب به داخل بالون حجم بالون بالا می رفت. در حجمی که بیمار احساس اولیه دفع را داشت آستانه دفع ثبت می شد. سپس آزمونگر حجم آب داخل بالون را زیاد می کرد تا جایی که بیمار نتواند تحمل کند؛ این حجم کمپلیانس رکتوم بود. حجم آستانه احساس اولیه دفع و کمپلیانس رکتوم بر حسب میلی لیتر بود. بعد از انجام تست بالون خارج می شد.

برای تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS ویراست ۲۲ و به دلیل تابعیت متغیر ها از تابع نرمال، از ضریب همبستگی پیرسون و در بررسی متغیر های رتبه ای از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

جدول ۱: معیار رم III

داشتن حداقل دو مورد از موارد زیر در مدت ۳ ماه گذشته با شروع حداقل از ۶ ماه گذشته
• نیاز به زور زدن حین دفع حداقل در ۲۵٪ موضع دفع
• داشتن مراج سفت حداقل در ۲۵٪ موضع دفع
• احساس دفع ناقص حداقل در ۲۵٪ موضع دفع
• احساس وجود سد یا مانع حین دفع حداقل در ۲۵٪ موضع دفع
• نیاز به استفاده از کمک دستی به منظور تسهیل دفع حداقل در ۲۵٪ موضع دفع
• تعدد دفع کمتر از ۳ مرتبه در هفته
• مراج نرم بدون مصرف ملین به ندرت وجود داشته باشد

یافته ها

اطلاعات جمعیت شناختی بیماران در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: اطلاعات جمعیت شناختی و زمینه ای زنان شرکت کننده در مطالعه (n=۳۵)

خصوصیت	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار
سن (سال)	۲۰	۵۸	۳۸/۵۱	۱۰/۲۴
BMI (کیلوگرم/متر مربع)	۱۹/۸۴	۲۸/۴۰	۲۴/۴۹	۲/۰۴
قدرت عضلات کف لگن	۱	۵	۲/۸۵	۰/۸۷
استقامت عضلات کف لگن	.	۱۰	۴/۵۱	۲/۳۶

در بررسی تون استراحت آنال مشخص شد که ۲۵/۷٪ بیماران (۹ بیمار) تون پایین، ۵۱/۴٪ (۱۸ بیمار) تون طبیعی و ۲۲/۹٪ (۸ بیمار) تون بالا

داشتند. بیماران بی اختیاری را به صورت $68/6\%$ (۲۴ بیمار) هرگز، $11/4\%$ (۴ بیمار) گاهی اوقات، $11/4\%$ (۴ بیمار) اغلب و $8/6\%$ (۳ بیمار) تقریباً همیشه تجربه کرده بودند. از نظر تعداد زایمان $42/9\%$ (۱۵ بیمار) زایمان نداشتند، 20% (۷ بیمار) یک زایمان، $17/1\%$ (۶ بیمار) دو زایمان، $14/3\%$ (۵ بیمار) سه زایمان و $5/5\%$ (۲ بیمار) چهار زایمان داشتند.

جدول ۳: شاخص های مانومتری و رم III زنان شرکت کننده در مطالعه (n=۳۵)

شاخص	مجموع امتیازات رم III	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار
فشار استراحت رکتوم (mmHg)	۸۳	۵	۲۸/۷۱	۱۵/۴۶	۰/۰۵
فشار استراحت آنال فوکانی (mmHg)	۱	۱۳۱	۴۹/۴۲	۲۶/۰۶	۰/۰۵
فشار استراحت آنال تحتانی (mmHg)	۱۳	۱۲۷	۷۷/۶۰	۲۵/۳۷	۰/۰۵
فشار رکتوم حین انقباض (mmHg)	۹	۱۲۹	۵۰/۵۱	۲۹/۷۸	۰/۰۵
فشار آنال فوکانی حین انقباض (mmHg)	۹	۱۴۶	۷۲/۰۸	۳۲/۷۱	۰/۰۵
فشار آنال تحتانی حین انقباض (mmHg)	۴۲	۳۱۳	۱۴۲/۰۲	۶۰/۶۸	۰/۰۵
فشار رکتوم حین push (mmHg)	۱۴	۱۳۳	۴۴/۶۰	۲۸/۳۹	۰/۰۵
فشار آنال فوکانی push (mmHg)	۸	۱۴۰	۵۱/۹۴	۳۶/۷۹	۰/۰۵
فشار آنال تحتانی push (mmHg)	۳۲	۲۳۴	۱۰۷/۴۲	۴۶/۹۶	۰/۰۵
۴/۲۷					

نتایج به دست آمده بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شدت معیار رم III با فشار آنال فوکانی در حین انقباض و حین push بود ($P<0/05$). رابطه موجود در هر دو متغیر منفی بود. بدین معنا که فرد هر چه امتیاز کلی بالاتری از معیار رم گرفته بود، مقدار این دو شاخص مانومتری کمتر بود. ضریب همبستگی فشار آنال فوکانی حین انقباض و امتیاز رم، $-0/368$ ($P=0/03$) و برای فشار آنال فوکانی حین push و معیار رم، $-0/352$ ($P=0/03$) به دست آمد. سایر شاخص های مانومتری از جمله فشار رکتوم و آنال تحتانی در استراحت، حین انقباض و push، فشار استراحت آنال فوکانی، کمپلیانس رکتوم و آستانه حس دفع رابطه معنی داری را با نمره کلی معیار رم III نشان ندادند ($P\geq0/05$).

در بررسی ارتباط شاخص های مانومتریک و معیار رم با عوامل زمینه ای (جدول ۴) نشان داد که بین شاخص های مانومتری از جمله فشار استراحت رکتوم و آنال فوکانی با میزان بی اختیاری مدفوع و گاز، بین فشار رکتوم حین انقباض و تعداد زایمان ارتباط معنی دار منفی برقرار بود ($P<0/05$). همچنین بین فشار آنال تحتانی حین push و تون استراحت آنال رابطه معنی دار مشت دیده شد ($P<0/05$). به این معنی که هر چه تون استراحت آنال در معاینه داخلی کمتر بود، فشار آنال تحتانی حین PUSH نیز کمتر بود. همچنین بین قدرت و استقامت عضلات کف لگن با امتیاز کلی علائم معیار رم، رابطه معنی دار منفی نشان داده شد ($P<0/05$).

جدول ۴: ارتباط شاخص های معنی دار مانومتریک و معیار رم با اطلاعات زمینه ای، پرسشنامه و معاینه داخلی (n=۳۵)

شاخص ها	(rs)	مقدار p
مجموع امتیاز رم III و قدرت عضلات کف لگن	-0/۳۹۳	.۰/۰۲
مجموع امتیاز رم III و استقامت عضلات کف لگن	-0/۴۶۲	.۰/۰۰۵
فشار استراحت رکتوم و بی اختیاری	-0/۳۴۸	.۰/۰۴
فشار استراحت آنال فوکانی و بی اختیاری	-0/۴۰۴	.۰/۰۱۶
فشار رکتوم حین انقباض و تعداد زایمان	-0/۴۶۷	.۰/۰۰۵
فشار آنال تحتانی حین push و تون استراحت مقعد	0/۴۲۴	.۰/۰۱۱

شایان ذکر است که بین شاخص های مانومتری با قدرت و استقامت عضلات کف لگن و همچنین بین امتیاز کلی معیار رم III با تعداد زایمان، بی اختیاری گاز و مدفوع و تون استراحت آنال ارتباط معنی داری مشاهده نشد ($P\geq0/05$).

بحث و نتیجه گیری

به طور کلی در این مطالعه ارتباط برخی از شاخص های مانومتری با امتیاز کلی معیار رم III مشاهده شد. نتایج نشان دهنده وجود یک ارتباط منفی بین فشار آنال فوکانی حین انقباض و push با شدت علائم رم بود. با توجه به این که آنال فوکانی بیانگر اسفنکتر داخلی است، می توان این طور استنباط کرد که بیشترین ناحیه ای که در اثر ابتلا به یبوست عملکردی تحت تاثیر قرار می گیرد، اسفنکتر داخلی است. نشان داده شده است که در حالت طبیعی با انقباض ارادی، اسفنکتر خارجی منقبض می شود که این عمل همراه با انقباض عضله پوبورکتالیس است و نتیجه آن افزایش فشار کanal آنال می باشد^[۱۱]. اما نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر پایین تر بودن فشار آنال در افراد با شدت علائم بیشتر یبوست بوده که می تواند نشان دهنده ضعف عملکرد و توانایی این ناحیه باشد. در مکانیسم طبیعی دفع با افزایش حجم داخل رکتوم و اتساع دیواره آن، اسفنکتر داخلی ریلکس می شود (رفلکس مهاری آنورکتال). ریلکس شدن اسفنکتر حاکی از کاهش فشار ناحیه است^[۱۲]. هرچند این بررسی بیانگر کاهش معنی دار فشار آنال فوکانی در افراد با شدت علائم بیشتر بود. در توضیح این نتیجه می توان گفت کمتر بودن فشار آنال فوکانی push در این افراد دلیل بر کاهش قدرت این ناحیه بوده و تمامی این افراد لزوماً مشکل دیس سینرژی عضلات کف لگن و عملکرد اسفنکتر ها را ندارند^[۱۳]. دیگر شاخص های مانومتری با امتیاز کلی رم III رابطه معنی داری نشان ندادند. این مطلب در تایید مطالعه ای است که S.S.C.RAO و همکاران با بررسی آزمون های عملکردی آنورکتال و معیار رم II انجام داده و به این نتیجه رسیدند که معیار رم جهت تشخیص و طبقه بندی نوع مشکل بیماران مبتلا به یبوست عملکردی کارآیی لازم را ندارد و انجام آزمون های دیگر ناحیه چون مانومتری آنورکتال لازم است صورت بگیرد^[۱۴]. Jose M.. و همکارانش با تعديل مطالعات قبلی، مستنداتی در تایید آزمون های فیزیولوژیک جهت بررسی یبوست مزمن ارائه کردند. در این مطالعه مانومتری آنورکتال با سطح خوب، روش قابل قبولی جهت تشخیص و ارزیابی این دسته از بیماران عنوان شد^[۱۵].

در بررسی، ارتباط شاخص های مانومتری و شدت علائم رم III با شاخص های زمینه ای و بعضی علائم گوارشی مثل بی اختیاری گاز و مدفوع، مشاهده شد که بین فشار استراحت رکتوم و آنال فوکانی با شدت علائم بی اختیاری گاز و مدفوع و فشار استراحت رکتوم با تعداد زایمان رابطه منفی وجود داشت. در بررسی های انجام شده بر فعالیت الکتریکی عضلات این ناحیه، مشخص شده است که در روند کنترل گاز و مدفوع اسفنکتر داخلی (آنال فوکانی) با انقباض های مداوم، سینوسی، به صورت موج آهسته و فرکانس ۲۰-۴۰ سیکل در دقیقه، نقش اصلی فشار ناحیه در حالت استراحت داشته و مهم ترین جزء در کنترل گاز و مدفوع محاسبه می شود^[۱۶،۱۷]. رابطه نشان داده شده در این تحقیق نیز از این موضوع تبعیت کرده و نشان دهنده کاهش فشار اسفنکتر داخلی با شدت علائم بی اختیاری است. افزون بر اینکه فشار استراحت رکتوم نیز با این مشکل مرتبط نشان داده شد. از نقطه نظر زایمان و تاثیر آن بر ناحیه آنورکتال، مطالعات پیشین با بررسی نوع زایمان، بر عملکرد ناحیه، نشان دهنده تاثیر زایمان طبیعی بر آسیب مقدار و اسفنکتر ها بوده و به دنبال آن مسائلی چون بی اختیاری و مشکلات دفع ایجاد می گردد^[۱۸،۱۹]. در حالیکه این تحقیق با تأکید بر افزایش تعداد زایمان بر کاهش فشار استراحت رکتوم احتمال اثرباری تعدد زایمان بر عملکرد آنورکتال را بیان می کند. رابطه مثبت بین فشار آنال تحتانی حین push با تون استراحت آنال در معاينه بالینی و همچنین رابطه منفی بین قدرت و استقامت عضلات کف لگن با امتیاز کلی علائم رم هم جهت بودن ارزیابی تون اسفنکتر خارجی را در هر دو روش ارزیابی نشان می دهد. از این روی به نظر می رسد معاينه داخلی بتواند روش مناسبی جهت ارزیابی تون استراحت مقدار و عملکرد اسفنکتر خارجی باشد. J. E. Lang نیز در مطالعه خود، تون استراحت مقدار را بر انقباض و عملکرد آن موثر می داند^[۲۰]. هر چند K. Tantiphlachiva و همکارانش در مطالعه ای که با هدف ارزیابی دستی ناحیه آنورکتال در بیماران با مشکل یبوست عملکردی انجام دادند، مشاهده شد اگرچه فشار اسفنکترهای آنال اکثر بیماران در مانومتری پایین بود، در معاينه داخلی، میزان تون استراحت مقدار طبیعی بیان شد. آنها توضیح دادند که تون استراحت طبیعی، دلیل بر د مشکل دیس سینرژی عضلات کف لگن نمی باشد^[۲۱].

وجود رابطه معکوس بین امتیاز رم با سطح قدرت و استقامت عضلات کف لگن، می تواند نشانگر این مساله باشد که وجود علائمی چون زور زدن حین دفع و یا استفاده از مانورهای خارجی (کمک دستی) می تواند در کاهش کارآیی و عملکرد این عضلات موثر باشد^[۲۲]. مطالعه حال حاضر ارتباطی بین شاخص های مانومتری و سطح قدرت و استقامت عضلات کف لگن نشان نداد. هر چند J. E. Lang و همکارانش رابطه اندکی را بین این شاخص ها گزارش کردند^[۲۳]. احتمال می رود کم بودن تعداد نمونه ها در مطالعه حاضر دلیل این اختلاف باشد. علاوه بر این می توان گفت شاید ماهیت کمی شاخص های مانومتری نمی تواند در مقایسه آنها با شاخص های کیفی-رتبه ای مانند قدرت و استقامت نتایج روشنی به دست بدهد.

بر اساس یافته های مطالعه حاضر، برای ارزیابی بالینی بیماران مبتلا به بیوست عملکردی، استفاده همزمان از معیار رم III و شاخص های مربوط به معاینه دستی مانند قدرت و استقامت عضلات کف لگن، به عنوان روش های غیر تهاجمی، ارزان و کم هزینه و به خصوص برای همکاران فیزیوتراپیست چهت ارزیابی بالینی و روند درمانی بیماران پیشنهاد می شود. هر چند چهت ارزیابی و دستیابی به تشخیص دقیق، علاوه بر ارزیابی بالینی و معیار رم II، استفاده از مانومتری توصیه می شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه افسانه سادات میر شاه ولایتی به راهنمایی دکتر فریده دهقان منشادی، مشاوره دکتر مژگان فروتن و دکتر علیرضا اکبر زاده باغان می باشد. نویسندها مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمام کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند، به ویژه کارکنان درمانگاه مانومتری وابسته به مرکز تحقیقات کبدوگوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابزار می دارند.

منابع

1. Jamshed, N., Z.-E. Lee, and K.W. Olden, Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 84(3): p. 299-306.##
2. Phillips, C., et al., Assessment of constipation management in long-term care patients. Journal of the American Medical Directors Association, 2001. 2(4): p. 149-154.##
3. Mugie, S.M., M.A. Benninga, and C. Di Lorenzo, Epidemiology of constipation in children and adults: a systematic review. Best practice & research Clinical gastroenterology. 25(1): p. 3-18.##
4. Rao, S.S., Constipation: evaluation and treatment of colonic and anorectal motility disorders. Gastrointestinal endoscopy clinics of North America, 2009. 19(1): p. 117-139.##
5. McCrea, G.L., et al., A review of the literature on gender and age differences in the prevalence and characteristics of constipation in North America. Journal of pain and symptom management, 2009. 37(4): p. 737-745.##
6. Remes-Troche, J.M. and S.S. Rao, Diagnostic testing in patients with chronic constipation. Current gastroenterology reports, 2006. 8(5): p. 416-424.##
7. Garrigues, V., et al., Prevalence of constipation: agreement among several criteria and evaluation of the diagnostic accuracy of qualifying symptoms and self-reported definition in a population-based survey in Spain. American journal of epidemiology, 2004. 159(5): p. 520-526.##
8. Varma, M.G., et al., The constipation severity instrument: a validated measure. Diseases of the Colon & Rectum, 2008. 51(2): p. 162-172.##
9. Joshi, H. and O. Jones, Clinical, radiological and physiological assessment of anorectal function. Surgery (Oxford). 32(8): p. 404-407.##
10. Van Koughnett, J.A.M. and G. Da Silva, Anorectal Physiology and Testing. Gastroenterology Clinics of North America. 42(4): p. 713-728.##
11. Sun, W.M. and S.S. Rao, Manometric assessment of anorectal function. Gastroenterology Clinics of North America, 2001. 30(1): p. 15-32.##
12. Whitehead, W.E. and M.M. Schuster, Manometric and electromyographic techniques for assessment of the anorectal mechanism for continence and defecation, in Psychophysiology of the Gastrointestinal Tract. 1983, Springer. p. 311-329.##
13. Lang, J.E., H. Brown, and E. Crombie, Assessment of the anal sphincter muscle: Comparison of a digital and a manometric technique. Physiotherapy, 2007. 93(2): p. 121. ۱۲۸-##
14. Chaliha, C., et al., Anal function: effect of pregnancy and delivery. American journal of obstetrics and gynecology, 2001. 185(2): p. 427-432.##
15. Zetterström, J., et al., Effect of delivery on anal sphincter morphology and function. Diseases of the Colon & Rectum, 1999. 42(10): p. 1253-1260.##
16. Tantiphlachiva, K., et al., Digital rectal examination is a useful tool for identifying patients with dyssynergia. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 8(11): p. 955-960.##
17. Rao, S., et al., Investigation of the utility of colorectal function tests and Rome II criteria in dyssynergic defecation (Anismus). Neurogastroenterology & Motility, 2004. 16(5): p. 589-596.##
18. Bassotti, G. and V. Villanacci, A practical approach to diagnosis and management of functional constipation in adults. Internal and emergency medicine. 8(4): p. 275-282.##
19. Bharucha, A.E., J.H. Pemberton, and G.R. LOCKE III, American Gastroenterological Association technical review on constipation. Gastroenterology. 144(1): p. 218.##
20. Rao, S., et al., Minimum standards of anorectal manometry. Neurogastroenterology & Motility, 2002. 14(5): p. 553-559.##
21. Barnes, P. and J. Lennard-Jones, Function of the striated anal sphincter during straining in control subjects and constipated patients with a radiologically normal rectum or idiopathic megacolon. International journal of colorectal disease, 1988. 3(4): p. 207-209.##