

مقایسه ابعاد شخصیتی در بیماران وابسته به مواد افیونی آلوده و غیر آلوده به ویروس

نقص ایمنی اکتسابی انسانی با جمعیت عمومی

فاطمه رنجبر کوچکسرایی^۱، وحید دنیوی^۲، حبیب صدر^۳

۱- گروه روانپژوهشی دانشکده پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲- گروه روانپژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا ۳- گروه روانپژوهشی بیمارستان ۵۲۲ منطقه ای تبریز ناجا، نویسنده مسئول.

اطلاعات مقاله	نوع مقاله
مقدمه: HIV یکی از گسترده‌ترین اپیدمی‌ها در جهان در حال حاضر می‌باشد. تقریباً تمام موارد آلوودگی به HIV ناشی از رفتارهای پرخطر مثل سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی می‌باشد و ویژگیهای شخصیتی نقش مهمی در این مورد بازی می‌کنند. درک ویژگیهای شخصیتی افراد آلووده به HIV می‌تواند در برنامه‌های پیشگیرانه HIV و همچنین اداره و درمان این بیماران مفید باشد. این مطالعه ابعاد شخصیتی افراد وابسته به مواد آلووده به HIV و غیرآلووده به HIV و جمعیت عمومی را مقایسه کرده است.	پژوهشی
تاریخچه مقاله دریافت : ۹۵/۵/۲۰ پذیرش : ۹۵/۹/۱۱	
کلید واژگان شخصیت، ویروس نقص ایمنی انسانی، وابستگی به مواد.	
روش کار: ۴۰ بیمار وابسته به مواد HIV مثبت و ۴۰ بیمار وابسته به مواد HIV منفی مورد ارزیابی شخصیتی با پرسشنامه شخصیتی NEO قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از هر دو گروه با نمرات جمعیت عمومی مورد مقایسه قرار گرفتند.	
یافته‌ها: در مقایسه با جمعیت عمومی نوروتیسیسم در هر دو گروه HIV مثبت و HIV منفی وابسته به مواد از میانگین جمعیت عمومی بالاتر بود و برونقرایی، Openness و قابلیت توافق در گروه HIV مثبت و Openness مسئولیت پذیری در گروه HIV منفی از میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود.	نویسنده مسئول Email: sadr.nhr@hotmail.com

نسبتاً اندکی وجود دارد که اثرات صفات شخصیتی را بر رفتارهای خطرساز HIV نشان دهد. با درک صحیح خصوصیات شخصیتی افراد آلوده به HIV می‌توان با شناخت افراد در معرض خطر از این امر برای بهبود برنامه های پیشگیری بهره جست. همچنین فهم ویژگیهای شخصیتی در اداره و درمان طبی و روانپردازی این افراد کمک کننده است. در این مطالعه ما به بررسی خصوصیات شخصیتی افراد آلوده به HIV پرداخته ایم.

روش کار

در این مطالعه تعداد ۴۲ نفر بیمار آلوده به HIV در دسترس وابسته به مواد در مرکز مراقبت بیماریهای رفتاری تبریز و تعداد ۴۱ نفر بیمار وابسته به مواد غیرآلوده به HIV از بیماران مراجعه کننده به بخش تندرستی بیمارستان رازی انتخاب و پس از مقدمات لازم و کسب مجوز از مراکز مربوطه جهت مصاحبه با بیماران آلوده به HIV مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران برای رد کردن اختلالات روانپزشکی ماذور سایکوتیک براساس مصاحبه ساختار یافته بر مبنای DSM-IV-TR مورد مصاحبه قرار می گرفتند (۵). سپس بیماران پرسشنامه شخصیتی NEO را پاسخ می دادند. با توجه به اینکه در بیماران آلوده به HIV فقط یک نفر زن وجود داشت آن هم از مطالعه

مقدمه

HIV در حال تبدیل شدن به یک مشکل بهداشتی پریدمی باشد (۱). با توجه به اعلام سازمان بهداشت جهانی بزرگ می باشد (۲). در سال ۲۰۰۹ به طور متوسط حدود سی و سه میلیون و سیصد هزار نفر در جهان آلوده به HIV بوده اند (۲). برخی تخمین می زنند که روزانه شانزده هزار آلودگی جدید اتفاق می افتد و هر ده ثانیه یک فرد به HIV آلوده می شود (۱ و ۳). میزان گزارش ایدز در ایران از سال ۱۳۶۴ سیر رو به افزایش داشته است (۴). سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹ میزان آلودگی HIV در ایران را ۷۴ الی ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده است (۲). یعنی در خوشبینانه ترین حالت از هر هزار نفر ایرانی یک نفر احتمالاً به HIV آلوده می باشد.

در حالی که اولین بیماران HIV از خطر آگاه نبودند، ولی در حال حاضر اکثر بیماران از خطر ایدز آگاه بوده ولی به خاطر اعتیاد، آسیب پذیریهای شخصیتی و سایر مشکلات روانپزشکی قادر به کنترل رفتارهای پر خطر خود نمی باشند (۱). همچنین ادامه رفتارهای پر خطر در بین اینگونه افراد پس از آلوده شدن به HIV یک روند نگران کننده در اپیدمی HIV می باشد (۱).

اختلالات روانپزشکی به عنوان مانع اصلی چسبندگی به درمان نیز در تمام مطالعات شناسایی شده اند (۱). پژوهش‌های تجربی

یافته ها

در مقایسه ابعاد شخصیتی ۵ گانه بین دو گروه وابسته به مواد آلوده به HIV و وابسته به مواد غیر آلوده به HIV میانگین نوروتیسیسم در گروه آلوده به HIV نسبت به گروه غیرآلوده به HIV از لحاظ عدد بالاتر بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین برونگرایی در گروه آلوده به HIV کمتر از گروه غیرآلوده به HIV بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین قابلیت توافق در گروه آلوده به HIV بود بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین مسئولیت پذیری در گروه آلوده به HIV از لحاظ عددی از گروه غیرآلوده به HIV بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین مسئولیت پذیری در گروه آلوده به HIV از لحاظ عددی بالاتر از گروه غیرآلوده به HIV بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. این مقایسه با جزئیات در جدول شماره ۱ آورده شده است.

حذف گردید و تمام بیماران هر دو گروه از جنس مذکر بودند. یک نفر از گروه آلوده به HIV به علت ابتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید و یک نفر از گروه غیرآلوده به HIV به علت ابتلا به اختلال خلقی دو قطبی حذف گردیدند و در مجموع داده های ۴۰ نفر از گروه آلوده به HIV و ۴۰ نفر از گروه غیرآلوده به HIV در تستهای آماری وارد گردید. تمام بیماران در هر دو گروه تحت درمان با متادون نگهدارنده بودند و معیارهای وابستگی به مواد را بر اساس DSM-IV-TR داشتند. تمام بیماران حداقل تحصیلات ابتدایی داشتند و در پر کردن پرسشنامه تست شخصیتی مشکل خاصی نداشتند. داده های به دست آمده از دو گروه وابسته به مواد آلوده به HIV و گروه NEO وابسته به مواد غیرآلوده به HIV با میانگین ابعاد تست در جمعیت عمومی که در دسترس بود مورد مقایسه قرار گرفت (۶). جهت بررسی تفاوتها بین دو گروه بررسی شده از ANOVA استفاده شد. جهت بررسی تفاوت میانگین های بدست آمده از هر دو گروه با میانگین جمعیت عمومی از تست One sample t-test استفاده شده است.

جدول شماره ۱ - مقایسه میانگین ابعاد شخصیتی ۵ گانه در دو گروه بیماران وابسته به مواد آلوده به HIV و غیرآلوده به HIV

P Value	میانگین در گروه غیرآلوده به HIV \pm انحراف معیار	میانگین در گروه آلوده به HIV \pm انحراف معیار	ابعاد شخصیتی
۰/۷۹۶	۲۶/۳۵ \pm ۶	۲۶/۷۵ \pm ۶	(Neuroticism)
۰/۴۴۴	۲۴/۱ \pm ۶	۲۳/۱ \pm ۵	(Extroversion)
۰/۶۹۳	۲۵/۶۷ \pm ۴	۲۵/۲۷ \pm ۴	باز بودن ذهن به تجربیات جدید (Openness)
۰/۹۱۷	۲۹/۸۷ \pm ۵	۲۹/۷۵ \pm ۵	قابلیت توافق (Agreeableness)
۰/۵۰۱	۳۱/۰۵ \pm ۶	۳۲ \pm ۶	مسئولیت پذیری (Conscientiousness)

نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود و این اختلاف معنی دار می باشد. میانگین قابلیت توافق در گروه آلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود و این اختلاف معنی دار می باشد. میانگین قابلیت توافق در گروه غیرآلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود ولی برخلاف گروه آلوده به HIV معنی دار نمی باشد. میانگین مسئولیت پذیری در گروه آلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود ولی این اختلاف معنی دار نبود. میانگین مسئولیت پذیری در گروه غیرآلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود ولی این اختلاف معنی دار نمی باشد. این مقایسه ها با جزئیات در جدول شماره ۲ و ۳ آورده شده است.

در مقایسه میانگین ابعاد شخصیتی ۵ گانه هر دو گروه با میانگین نرم ایرانی میانگین نوروتیسیسم در گروه آلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی بالاتر بود و از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. میانگین نوروتیسیسم در گروه غیرآلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی بالاتر بود و از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. میانگین برونگرایی در گروه آلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود و از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. میانگین برونگرایی در گروه غیرآلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود ولی این اختلاف معنی دار نمی باشد. میانگین Openness در گروه آلوده به HIV نسبت به میانگین جمعیت عمومی پایین تر بود و این اختلاف معنی دار می باشد. میانگین Openness در گروه غیرآلوده به HIV

جدول شماره ۲: مقایسه میانگین ابعاد شخصیتی ۵ گانه افراد وابسته به مواد آلوده به HIV با جمعیت عمومی

PV	میانگین در جمعیت عمومی ± انحراف معیار	میانگین در افراد وابسته به مواد آلوده به HIV ± انحراف معیار	ابعاد شخصیتی
۰/۰۰۱	۲۲/۹۲±۸	۲۶/۷۵±۶	نوروتیسیسم (Neuroticism)
۰/۰۰۳	۲۶/۸۹±۶	۲۳/۱±۵	برونگرایی (Extroversion)
۰/۰۰۲	۲۷/۹۴±۴	۲۵/۲۷±۴	باز بودن ذهن به تجربیات جدید (Openness)
۰/۰۲۵	۳۱/۶۲±۵	۲۹/۷۵±۵	قابلیت توافق (Agreeableness)
۰/۳۷۹	۳۲/۹۰±۷	۳۲±۶	مسئولیت پذیری (Conscientiousness)

جدول شماره ۳ - مقایسه میانگین ابعاد شخصیتی ۵ گانه افراد وابسته به مواد غیر آلوده به HIV با جمعیت عمومی

PV	میانگین در جمعیت عمومی ± انحراف معیار	میانگین در افراد وابسته به مواد غیر آلوده به HIV ± انحراف معیار	ابعاد شخصیتی
۰/۰۰۳	۲۲/۹۲±۸	۲۶/۳۵±۶	نوروتیسیسم (Neuroticism)
۰/۰۷	۲۶/۸۹±۶	۲۴/۱±۶	برونگرایی (Extroversion)
۰/۰۰۱	۲۷/۹۴±۴	۲۵/۶۷±۴	باز بودن ذهن به تجربیات جدید (Openness)
۰/۰۵۵	۳۱/۶۲±۵	۲۹/۸۷±۵	قابلیت توافق (Agreeableness)
۰/۰۶۵	۳۲/۹۰±۷	۳۱/۰۵±۶	مسئولیت پذیری (Conscientiousness)

می گردد. در مقابل افراد بی ثبات هیجانات شدید و تند دارند که به آسانی برانگیخته شده و به کندی به حالت پایه برمی گردد(۱).

با ترکیب ابعاد فوق ۴ مزاج به شرح زیر به دست می آید: برونگرایی بی ثبات، برونگرایی با ثبات، درونگرایی بی ثبات و درونگرایی با ثبات. پژوهش‌های بالینی نشان می دهد که از ۴ مزاج، افراد برونگرایی بی ثبات بسیار مستعد به وارد شدن در رفتارهای خطر ساز HIV هستند(۱). در بخش روانپردازشی سرویس ایدز جان هاپکینز تخمین زده است که حدود ۶۰٪ از بیماران با این ترکیب برونگرایی و بی ثباتی هیجانی تظاهر می کنند. در افراد برونگرایی بی ثبات بیشتر احتمال وارد شدن در رفتارهای پر خطر HIV، سکس واژینال و آنال بدون حفاظت مصرف الكل و مواد، تزریق مواد بدون توجه به خطرات آنها وجود دارد. (۱). دومین تیپ شخصیتی بیشتر مشاهده شده بیماران آلوده به HIV که ممکن است حدود ۲۵٪ از بیماران جان هاپکینز را شامل شوند بیماران برونگرایی با ثبات (برونگرایی بالا و نوروتیسیسم پایین) می باشد. برونگرایان با ثبات نیز علاقه مند به زمان حال و لذت طلب هستند. ولی لذت جویی آنها به شدت گروه قبلی نمی باشد. برونگرایان با ثبات ممکن است

بحث و نتیجه گیری

خیلی از مدل‌های شخصیتی از جمله پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO افراد را در متن ابعاد مزاجی درون گرایی-برون گرایی و بی ثباتی-باثباتی توضیح می دهند. بعد درون گرایی-برون گرایی به تمایل پایه ای فرد به پاسخ به حرکات به صورت یا تهییج یا مهار اطلاق می شود(۱). از خصوصیات افراد برون گرا به حال حاضر فکر کردن، احساساتی بودن، به دنبال پاداش بودن، تمرکز بر تجربه فوری، هیجانی بودن، غلبه احساسات بر تفکر، اجتماعی بودن، خطر کردن، تکانشی عمل کردن، تمایل به بی مبالاتی، بی ثباتی و خوش بینی می باشد و انگیزه اولیه آنها لذت آنی و رهایی آنی از ناراحتی است. در مقابل خصوصیات افراد درونگرایانه نگری، عبرت گرفتن از گذشتہ، عمل بر پایه شناخت و تعقل، خطر نکردن، غلبه منطق بر احساسات، وارد نشدن در فعالیتهای لذت بخش با عاقب بد احتمالی، آرام بودن، دوری از هیجان، غیر تکانشی بودن، مرتب بودن، قابل اعتماد بودن و تا اندازه ای بدینی می باشد (۱). بعد شخصیتی دوم بی ثباتی- ثبات به صورت درجه هیجانی بودن و بی ثبات و نوسانی بودن تعریف می شود. هیجانات افراد با ثبات به آرامی و اندک برانگیخته شده و سریعاً به حالت پایه بر

HIV رابطه معکوس با ارزیابی خطر decision making دارند، ارزیابی خطر در زنان بیشتر است و در روابط جنسی موقتی بیشتر از دائمی است(۱۱). مکری و همکاران در تهران Impulsivity و امید به زندگی پایین و سرنگ مشترک را علت احتمالی گسترش HIV در بی خانمانهای تزریقی هروئینی در تهران دانسته اند (۱۲) Seth C. Klichman با در سری ۱۵۷ مرد و ۶۴ زن در کیپ تاون آفریقای جنوبی ذکر کردند که Sensation seeking پیش بینی کننده رفتارهای پر خطر HIV بوده و با تمایل به مصرف الکل در روابط جنسی در ارتباط است Judith A. Erlen (۱۳) و همکاران با انجام تست NEO در سه گروه بیماران روانپژوهی و بیماریهای عروق کرونر و HIV مثبت متوجه شدند که افراد HIV مثبت جوان نوروتیسیسم بالا و agreeableness پایین دارند و افراد HIV مثبت بروونگرایی پایین دارند. و نیز زنان HIV مثبت نوروتیسیسم بالا و Openness، Conscientiousness، پایین دارند (۱۴).

Todd M. Solomon و همکاران با برسی خصوصیات شخصیتی مردان وابسته و غیروابسته به متامفتابین که با مردان رابطه جنسی داشته اند نشان دادند که گروه وابسته به متامفتابین نوروتیسیسم بالا و Agreeableness و Christian S. Hendershot و همکاران ذکر کردند که Sensation seeking به طور مستقیم پیش بینی کننده خطر HIV و رفتارهای پر خطر HIV می باشد (۱۵).

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که نوروتیسیسم هم در گروه آلوده به HIV و هم در گروه غیر آلوده به HIV به طور معنی داری از جمعیت عمومی بالاست که با مطالعات قبلی از جمله مطالعه مرکز ایدز جان هاپکینز، و سایر مطالعات که در بالا اشاره شد همخوانی دارد. بیماران مورد مطالعه ما در کنار نوروتیسیسم بالا به طور معنی داری بروونگرایی پایین تراز جمعیت عمومی دارند. نتایج به دست آمده در مطالعه ما متفاوت از نتایج بررسی مرکز ایدز جان هاپکینز بوده و تا حدودی برعکس آن می باشد. زیرا که درونگرایی بی ثبات (تیپ شخصیتی بیماران مطالعه ما) در بررسی جان هاپکینز در رتبه سوم قرار دارد. ممکن است چنین نتیجه گرفت که بیماران وابسته به مواد آلوده به HIV در کشور ما با ویژگیهای شخصیتی متفاوت از غرب هستند و احتمالاً نیز به روشهای متفاوت آلوده شده اند. UNAIDS نیز بر اساس گزارش مرکز ملی مطالعات انتیاد ایران اعلام کرده است علت دو سوم موارد آلودگی به HIV مصرف تزریقی مواد می باشد. (۱۶). مطالعه دیگری راههای انتقال ویروس HIV در ایران تا تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱ از طریق انتیاد تزریقی (۶۵٪) و در درجات بعدی نامشخص (۴/۲۱٪) و آمیزش جنسی (۴/۸٪) و فراورده

آنقدر خوش بین و خونگرم و دموی باشند که باور نکنند که ممکن است به HIV آلوده شوند (۱). شخصیتهای درونگرا کمترین رواج را در بین این گروه بیماران دارند. تمرکز آنها بر آینده، اجتناب از نتایج منفی و بد و عقلانیت به احساسات آنها را به سمت رفتارهای پیشگیرانه و محافظت شده سوق می دهد. خطر HIV برای درونگرایان با توجه به بعد باثباتی سی شباتی هیجانی تعیین می شود. حدود ۱۴٪ از بیماران جان هاپکینز با ترکیبی از درونگرایی و بی ثباتی تظاهر می کنند. درونگرایان بی ثبات مضطرب، دمدمی و بدین هستند. گرایش . درونگرایان بی ثبات به دارو، سکس یا هر دو نه به خاطر لذت، بلکه به خاطر رهایی یا کناره جستن از ناراحتی و درد است. این بیماران نگران آینده و پیامدهای بد هستند ولی فکر می کنند که کنترل کمی بر سرنوشت خود دارند. درونگرایان با ثبات یک درصد باقیمانده بیماران را شامل می شوند. این بیماران با شخصیتهای کنترل شده خود کمترین احتمال را در وارد شدن در رفتارهای خطرناک یا لذت طلبانه دارند. به طور تیپیک این افراد در نتیجه انتقال خون یا فرو رفتن سوزن به خاطر حرفه خود به HIV آلوده می شوند (۱).

Fassino S در مطالعه ای گزارش کرد که بیماران HIV مثبت وابسته به مواد نمرات بالاتر در novelty seeking و Self-transcendence و Harm avoidance نمرات پایین در HIV مثبت در مقایسه با افراد سالم داشته باشند و بیماران HIV غیر وابسته به مواد به طور معنی داری نمرات بالاتری در Krista.K Trobst Self-transcendence داشتند (۷). همکاران با انجام تست NEO متوجه شدند که نوروتیسیسم بالا، مسئولیت پذیری پایین و قابلیت توافق پایین با رفتارهای پر خطر HIV در ارتباط هستند (۸). Malloryo Johnson بررسی ۱۲۷ بیمار شرکت کننده در واکسیناسیون آزمایش HIV دریافت که نوروتیسیسم با پیش بینی خطر آلودگی به HIV ارتباط دارد و افراد با نوروتیسیسم بالا بیشتر به دنبال آزمایش HIV بودند و به دنبال پیشگیری از آلودگی به HIV با واکسن بودند (۹). Ball SA و همکاران با انجام تست ۵ عاملی Zuckermen-Kuhlmen کوکائین دریافتند که ابعاد نوروتیسیسم اضطراب، Impulsive و پرخاشگری- خصوصیت به طور معنی sensation seeking داری با فعالیت جنسی پر خطر HIV و شدت اعتیاد، میزان افسردگی و سایر علائم روانپژوهی کی در ارتباط می باشد (۱۰). در تست NEO نوروتیسیسم با سکس بدون حفاظت همراه است. در مدل EPQ بروونگرایی با بی بند و باری جنسی، تمایل به نوع طلبی جنسی و شرکای جنسی متعدد در ارتباط است (۱۱). PurnimaMehrotra. ارزیابی و درک خطر به عنوان یک انگیزه برای رفتارهای احتیاطی می باشد و Sensation Seeking و Impulsive

دارد. به نظر میرسد که Agreeableness پایین با قدرت و مهارت‌های سازگاری اجتماعی و بین فردی پایین همراه است و از این طریق افراد را در معرض طرد و آسیب‌های روانشناختی قرار داده و به سمت مواد و رفتارهای پرخطر برای فرار از این وضعیت‌ها سوق می‌دهد.

با توجه به موارد فوق، بیماران وابسته به مواد آلوده به HIV در ایران ممکن است بیشتر از طرق متفاوت از علل شایع در غرب بویژه مصرف تزریقی مواد آلوده شده باشند. شاید در رابطه با پیشگیری از گسترش HIV این توصیه عاقلانه باشد که در کشور ما علاوه بر برنامه‌های پیشگیرانه مبتنی بر کاهش رفتارهای خطرساز HIV از جمله رفتارهای جنسی پرخطر، بیشترین تمرکز باید بر پیشگیری و کنترل و کاهش سوء مصرف تزریقی مواد از جمله برنامه‌های کاهش آسیب مثل برنامه متأدون نگهدارنده در این گروه از بیماران باشد.

از محدودیتهای مطالعه ما این بود که با توجه به عدم دسترسی به افراد آلوده به HIV غیر وابسته به مواد، این مطالعه در افراد آلوده به HIV وابسته به مواد که همگی تحت درمان متأدون نگهدارنده بودند انجام شد و ویژگی‌های شخصیتی افراد غیروابسته به مواد آلوده به HIV که ممکن است از راههای دیگر آلوده شده باشند مشخص نمی‌باشد.

همچنین محدودیت در افراد وابسته به مواد غیر آلوده به HIV نیز وجود داشت بدین صورت که افراد وابسته به مواد مورد مطالعه همگی تحت درمان متأدون نگهدارنده بودند و لازم است ابعاد شخصیتی افراد وابسته به مواد باشد کمتر و غیر تزریقی نیز به دست باید که در این صورت مقایسه جامع و بهتری از ابعاد شخصیتی در حیطه وابستگی به مواد و HIV انجام خواهد شد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه همکاران مرکز مراقبت بیماریهای رفتاری تبریز، بخش تدرستی بیمارستان رازی تبریز و سایر اساتید محترم و همکاران به ویژه آقای رسول تیموری و خانم نسرین صاحب‌اری که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

های خونی (۷/۴٪) گزارش شده است (۴). شاید این مسئله که درونگرایان بی ثبات نه به خاطر لذت بلکه به خاطر فرار از درد و رنج به رفتارهای پرخطر کشیده می‌شوند دلالت ضمنی بر این نکته باشد که بیماران مورد مطالعه ما و امثال آنها در کشورمان به خاطر فرار از درد و فشارهای روانی به سمت مواد و تزریق کشیده شده و از این راه به HIV آلوده می‌گردند. البته این مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد. از جمله می‌توان در HIV مطالعات دیگر ابعاد شخصیتی در بیماران آلوده به HIV غیروابسته مواد را سنجید و به نتایج و قضاؤت بهتری رسید. متسافانه در این مطالعه به علت عدم دسترسی به این بیماران آلوده به HIV غیروابسته به مواد امکان انجام این بررسی میسر نشد.

در نتایج به دست آمده در این مطالعه میانگین بروونگرایی در گروه آلوده به HIV در مقایسه با گروه غیرآلوده به HIV پایین بود یعنی بیماران آلوده به HIV مطالعه ما درونگرایان هستند. این نشان می‌دهد که هرچند بروونگرایی به همراه نوروتیسیسم بالا احتمال آلودگی به HIV را بالا می‌برد (۱). ولی لزوماً درونگرایی نیز محافظت کننده نمی‌باشد و احتمالاً یک حالت متعادلی از بروونگرایی و درونگرایی لازم است.

میانگین بعد باز بودن ذهن به تجربیات جدید (Openness) در این مطالعه در هر دو گروه آلوده به HIV و غیرآلوده به HIV از میانگین جمعیت عمومی کمتر بود. و از لحاظ آماری نیز معنی دار می‌باشد. همچنین در مقایسه دو گروه وابسته به مواد آلوده به HIV و غیرآلوده به HIV میانگین Openness در گروه آلوده به HIV کمتر است. در بیماران مورد مطالعه ما ممکن است پایین بودن Openness باعث کاهش توانایی تطابق با موقعیت‌های جدید در آنها می‌شود و منجر به آسیب های روانشناختی و اجتماعی می‌شود. همچنین Openness پایین با انکار خطر آلودگی به HIV همراه است (۱).

در مطالعه ما میزان قابلیت توافق (Agreeableness) در بیماران آلوده به HIV در مقایسه با جمعیت عمومی به طور معنی داری پایین می‌باشد که با مطالعه Krista.KTrost و همکاران (۸)، مطالعه Judith A. Erlen و همکاران (۱۴) و مطالعه Todd M. Solomon و همکاران (۱۵) همخوانی

References

- 1-SadockBJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan &Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol1and 2, 9th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2009.
- 2-WHO UNAIDS. UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2010. Online available from http://www.unaids.org/global_report/Global_report.htm/en.pdf. Internet, accessed 6 January 2012.
- 3-Kaplan HI, Sadock BS. Synopsis of psychiatry. 10th ed. Lippincott Williams &Wikins, Philadelphia, 2007.
- 4-Hatami H. medical, Epidemiological and social aspects of HIV/AIDS. Tagebostan publication, Kermanshah, 2003. (Persian).
- 5-Mohammadkhani P, JahaniTabesh A, Tammayifar Sh. Patern of structured interview for DSM-IV-TR disorders. Faradid Publication, Tehran, 2005 (Persian).
- 6-Afshari S. Evaluation of association between season of birth and personality dimensions. MD thesis. Islamic Azad University, Tabriz, 2005 (Persian).
- 7-Fassino S, Leonbruni P, Amianto F, Abbate – Daga G. Personality profile of HIV outpatients: preliminary results and remarks on clinical management. *Psychotherapy & Psychosomatic*. 2004; 73: 361-365.
- 8-Trost KK, Herbst JH. Personality pathways to unsafe sex: personality, condom use, and HIV risk behaviors. *Journal of Research in Personality*. 2002; 36: 117–133.
- 9-Johnson OM. Personality correlates of HIV vaccine trial participation. *Personality and Individual Differences*. 2000; 29: 459-467.
- 10-Ball SA, Schottenfeld RS. A five-factor model of personality and addiction, psychiatric, and AIDS risk severity in pregnant and postpartum cocaine misusers. *Substance use & misuse*. 1997; 32(1): 25-41.
- 11-Purnima M; Seth MN; Rick SZ; Philip P. Demographic and personality factors as predictors of HIV/STD partner-specific risk perceptions: implications for interventions. *AIDS Education and Prevention*. 2009; 21 (1): 39-54.
- 12-Ekhtiari H, Mokri A, Jahani M.R, Shirzad H, MahinTorabi S, Elahi B, Razzaghi ME. Impulsive personality characteristics of homeless HIV(+) IV heroin users (IHU) in comparison with homeless HIV(-) IHUs and nonhomeless IV(-) IHUs. *European Psychiatry*. 2007; 22: 101-220.
- 13-Seth CK, Leickness S, Sean J, Redwaan V, Demetria C. Sensation seeking and alcohol use predict HIV transmission risks: Prospective study of sexually transmitted infection clinic patients, Cape Town, South Africa *Addictive Behaviors*. 2008; 33: 1630–1633.
- 14-Judith AE, Carol SS, Ann B, Mary PL, Linda G, Yookyung K, Paul AP, Julius K, Susan S. Personality traits and chronic illness: a comparison of individuals with psychiatric, coronary heart disease, and HIV/AIDS diagnoses. *Applied Nursing Research*. Article in press 2009.
- 15-Todd MS, Mathew VK, Perry NH, Robert WM, Molly KP. Personality traits and mental health states of methamphetamine-dependent and methamphetamine non-using Addictive Behaviors. 2010; 35: 161–163.
- 16-Christian SH, Susan AS, William HG, Jeanette N. Alcohol use, expectancies, and sexual sensation seeking as correlates of HIV risk behavior in heterosexual young adults. *Psychology of Addictive Behaviors*. 2007; 21(3): 365-372.
- 17-WHO UNAIDS. 2009 AIDS epidemic update. Online available from http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2009_aids_epidemic_update/en.pdf. Internet; accessed 6 January 2012.

Comparing the personality dimensions in positive and negative Human Immunodeficiency**Virus (HIV) substance dependent patients with general population**

Ranjbar Kouchak-Saraiee (MD), Donyavi V (MD), Sadr H (MD)*

Abstract

Introduction: HIV is one of the most spread epidemics in the modern world. Almost all of HIV infected cases are due to high risk behaviors such drug use and risky sexual behaviors and personality characteristics play an important role in this way. This study has compared personality dimensions of HIV positive, HIV negative opioid dependent patients and general population.

Methods: 40 HIV positive opioid dependent patients and 40 HIV negative opioid dependent patients were assessed with five factor NEO personality questionnaire. Then results of these two groups compared with general population.

Results: In both HIV positive and negative groups neuroticism was higher than general population. Extroversion, openness and agreeableness in HIV positive group were than general population and openness in HIV negative group was lower than general population.

Conclusion: in this study in HIV positive and HIV negative groups neuroticism was higher and extroversion was lower than general population and this combination of personality dimensions is different with most common combination of personality dimensions in HIV positive patients (high neuroticism and high extroversion).

Key words: personality, HIV, substance dependence.

*Corresponding author. Psychiatrist, Tabriz 522 NEZAJA hospital, Tabriz. E-mail: sadr.nhr@hotmail.com