

بررسی تأثیر برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختلال دوقطبی نوع یک

پرهام محبی^۱، مسعود فلاحت خشکناب^{۲*}، ابوالفضل ره گوی^۳، کیان نوروزی تبریزی^۲، محمد رضا خدایی^۴

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

^۲ دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

^۳ مربي، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

^۴ دانشیار، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: مسعود فلاحت خشکناب، دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ایمیل:

msflir@yahoo.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

چکیده

مقدمه: تبعیت دارویی در بین بیماران با اختلال دوقطبی ضعیف می‌باشد و عدم تبعیت دارویی یکی از علت‌های مکرر بازگشت بیماری و بستری مجدد در آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختلال دوقطبی نوع یک انجام شده است.

روش کار: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده می‌باشد که جامعه آماری آن کلیه بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بیمارستان روانپزشکی ایران در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۵ بود. از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس معیارهای رورود ۴۰ بیمار انتخاب و به صورت تصادفی با استفاده از اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله گروه مداخله در طی ۱۶ جلسه فشرده (سه بار در هفته) تحت آموزش نظری و عملی برنامه بازگشت به اجتماع قرار گرفتند. بیماران گروه کنترل در طول اجرای پژوهش، فقط درمان‌های رایج در مرکز (دارویی، کاردیمانی، رواندرمانی) را دریافت نمودند. بیماران قبل و سه ماه بعد از مداخله، مقیاس ارزیابی تبعیت دارویی (MARS) را تکمیل کردند. داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS19 و با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه مداخله و شاهد از نظر توزیع متغیرهای زمینه‌ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین نمرات میزان تبعیت دارویی بیماران قبل از مداخله در گروه مداخله $1/0.5 \pm 0.05$ و در گروه شاهد $1/0.59 \pm 0.05$ بود که بعد از مداخله در گروه مداخله به 0.92 ± 0.01 و در گروه شاهد به 0.65 ± 0.06 رسید. و این اختلاف در گروه مداخله معنی دار بود ($P \leq 0.001$).

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که انجام برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع باعث افزایش تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اختلال دوقطبی، برنامه بازگشت به اجتماع، توانبخشی روانی-اجتماعی، پرستاری، تبعیت دارویی

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه

اختلال دوقطبی با تغییر در عملکرد روانی و اجتماعی، تغییر پذیری و نامتناسب بودن شرایط خلقی، خلق بالا و افسرده و نوسانات بزرگ در سطح خلقی با علایم افسردگی، هیپومانیا و یا دوره‌های ترکیبی در می‌باشد (۱). تبعیت دارویی در بیماران با اختلال روانی و فیزیکی

دوز دارویی مناسب برای پزشکان امکان پذیر نمی‌باشد مورد توجه فراوان قرار گرفته است و همچنین در بیمارانی که تبعیت دارویی آنها کامل نمی‌باشد امکان تغییر و افزایش دوز دارویی وجود خواهد داشت (۵). استراتژی‌های مؤثر بر روی تبعیت دارویی بیماران دوقطبی می‌تواند شامل مداخلات روانی و اجتماعی از قبیل درمان‌های رفتار شناختی، درمان‌های روانی اجتماعی، درمان‌های فردی اجتماعی، آموزش‌های روانی فردی و گروهی و برنامه بازگشت به اجتماع می‌باشد (۶، ۷).

برنامه بازگشت به اجتماع یکی از چند برنامه زندگی اجتماعی و مستقل است که Liberman و همکارانش در مرکز تحقیقاتی اسکیزوفرنیا و بازتوانی روانی دانشگاه یو سی آ (UCLA) طراحی کرده‌اند. این برنامه برای آموزش بیماران اسکیزوفرنیا و اختلالات روانی بزرگ است. مطالب آموزشی نوین درباره برنامه ترجیص را با بخش‌هایی از مدیریت دارو و مدیریت عالیم توسط خود فرد و سازمان دهن اوقات فراغت ادغام می‌کند و اطلاعات و مهارت‌هایی را به بیماران آموزش می‌دهد که برای زندگی در جامعه مورد نیاز است (۸، ۹).

مداخلات دارودارمانی به تنهایی برای مدیریت اختلال دوقطبی اولیه به دلیل میزان بالای عدم تبعیت دارویی مؤثر نمی‌باشد و کمیود فعلی پژوهش‌های پرستاری در مورد بیماری دوقطبی ممکن است در نتیجه این دیدگاه نادرست باشد که درمان دارویی به خصوص تشییت کننده‌های خلقی، به تنهایی درمان کامل و موفقی برای اختلال دوقطبی می‌باشد و پژوهش‌ها حاکی بر این می‌باشند که روانپرستاران بهترین ساختار را برای ارائه مداخلات روانی به دلیل تجربه و مهارتی که آنها در مراقبت از بیماران دو قطبی دارند را برخوردار می‌باشند و روانپرستاران می‌توانند به عنوان هسته ارائه این مداخلات در نظر گرفته شوند. از آن جایی که روانپرستاران به طور معمول با بیماران و خانواده آنها در گیر هستند می‌توانند در آموزش روانی خانواده بیماران مفید واقع شوند و آنها می‌توانند نقش مهمی را در تکمیل مداخلات روانی در بالین بیمار ارائه کنند. با توجه به اینکه مداخلات آموزشی روانی مؤثر شناخته شده است و بر اساس راهنمای آموزش روانی گروهی، روانپرستاران به راحتی قادر به اجرای آن می‌باشند و ساختار گروهی این مداخلات فرستی را برای طرح ریزی آموزش، حمایت و خود مدیریتی فراهم می‌کند، این خط مشی‌ها خود مدیریتی و تمرکز بر روی افزایش تبعیت دارویی را تشویق می‌کند و این یک ضرورت اخلاقی برای روانپرستاران می‌باشد که مراقبت‌هایی را در حالی که منابع فشرده و انداز در اختیار دارند در مدت زمان کوتاه ارائه دهند در حالی که مزایای طولانی مدت، در قالب طولانی کردن دوره‌های تشییت خلق، بهبود عملکرد شغلی و اجتماعی و تسکین عالیم جانبی بیماری را در بر می‌گیرد (۱۰). با توجه به اینکه میزان عود بیماری دوقطبی بالا می‌باشد (۱۱، ۱۲)، (۱۳، ۱۴) و با توجه به اینکه برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع می‌تواند باعث بهبود تبعیت دارویی گردد و از عود بیماری دوقطبی بکاهد (۱۵، ۱۶)، از آنجایی که در ایران تأثیر این مداخله در پژوهش‌ها بررسی نشده است، لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر روی میزان تبعیت دارویی در بیماران دوقطبی طراحی گردیده است.

روش کار

طولانی مدت ضعیف و مشکل می‌باشد. تبعیت دارویی نقش ضروری در بدست آوردن پیامدهای مطلوب در درمان بیماری‌های وخیم روانی از قبیل اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی دارد و همانند بیماران اسکیزوفرنیا بیماران با اختلال دو قطبی ممکن است مشکلات شناختی و فقدان بینش را داشته باشند. اما در دو دهه گذشته شواهد حاکی از آن می‌باشد که درمان دارویی برای فراهم کردن پاسخ درمانی مورد انتظار به تنهایی شکست خورده است و فاکتورهای روانی اجتماعی و عدم تبعیت دارویی منجر به آمیز زندگی، قطع شدن روابط اجتماعی و عدم تبعیت دارویی شد (۱۷). در پژوهشی، Pope Scott گزارش داده‌اند که یکی از سه بیمار با اختلال دوقطبی، حداقل ۳۰ درصد از داروهای تجویزی را دریافت نمی‌کنند (۱۸) و Sajatovic همکاران دریافتند که علت عدم تأثیر بخشی درمان با لیتیم در بیماران Velligan و McFarland نیز پژوهش مشاهده گردید که مصرف کربنات لیتیم در بیماران دوقطبی پس از اولین دوره تجویز دارو، بدون مشاوره مجدد با پزشک متوقف شده است (۱۹، ۲۰). در پژوهشی دیگر که توسط Miklowitz و همکاران انجام شد، بیش از ۶۰ درصد بیماران با اختلال دوقطبی دوره بازگشت به بیماری را در طی دو سال پیگیری مداوم داشتند که فاکتورهای روانی اجتماعی از قبیل فقدان حمایت اجتماعی، مجرد بودن، سطح تحصیلات و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و فقدان دانش در مورد بیماری، تبعیت دارویی را در این بیماران تحت تأثیر قرار می‌دهد (۲۱). عدم تبعیت دارویی به طور قابل توجهی خطر تشدید بیماری و بستری مجدد در بیمارستان را افزایش می‌دهد و میزان عدم تبعیت دارویی در بیماران دوقطبی ۲۰-۶۶ درصد می‌باشد که اهمیت بهبود بخشیدن تبعیت دارویی در این بیماران تاکید شده است (۲۲). عدم تبعیت دارویی در بیش از ۵۰ درصد افراد با اختلال روانی مزمن شایع می‌باشد و اگر بیماری مصرف داروهای ضد روانپریشی را متوقف کند خطر بازگشت بیماری سه تا پنج برابر خواهد بود (۲۳). عدم تبعیت دارویی در بیماران روانی حاد باعث افزایش هزینه‌های مستقیم درمانی (مداخلات اورژانسی و بستری بیماران) و هزینه‌های غیر مستقیم (فقدان قابلیت بهروری) می‌شود و برطبق تحقیقات انجام شده عدم تبعیت دارویی در بیماران دوقطبی با ویزیت در منزل اورژانسی و بستری مجدد آنها همبستگی بالایی دارد و بطور کلی مشکل پیروی دارویی، همبستگی بالایی با افزایش هزینه‌های سلامتی برای بیماران مزمن روانی دارد. بر طبق نتایج پژوهش‌های انجام شده عوامل تأثیرگذار بر روی پیروی درمان بیماران دوقطبی شامل نگرش منفی نسبت به درمان بیماری یا اعتقاد نداشتن به درمان، فقدان بینش و عدم آگاهی نسبت به بیماری، فقدان اثر بخشی دارو، پذیرش دارویی ضعیف، عدم حمایت اجتماعی و خانوادگی، ترس از عوارض دارویی یا واپستگی به دارو، عوارض غیرقابل کنترل یا تاثیرات جانی داروها، اعتقاد به اینکه درمان دارویی در طولانی مدت نیاز نمی‌باشد، پیچیدگی رژیم دارویی، انگ همراه با بیماری روانی و درمان آن و بطور کلی فقدان حمایت اجتماعی برای کمک به درمان دارویی می‌باشد (۲۴، ۲۵). تبعیت از درمان دارویی به دلیل پیشگیری از بیماری و کاهش طول مدت بستری در بیمارستان، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش بهره وری افراد اهمیت فراوان دارد. مشکل عدم تبعیت دارویی به دلیل اینکه در صورت عدم تبعیت دارویی پاسخ درمانی مورد نظر و تعیین

رضایت نامه کتبی از آن‌ها وارد مطالعه شدند. نمونه‌های انتخاب شده پرسشنامه مقیاس تبعیت دارویی (MARS) توسط بیماران را قبل از مداخله تکمیل نمودند و در صورت بسیاد بودن آزمودنی، پژوهش‌گر یا یکی از اعضای دیگر خانواده محتوی موجود در پرسشنامه‌ها را برای بیمار می‌خواند و پرسشنامه تکمیل شد و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد (هر کدام ۲۰ نفر) قرار گرفتند. برنامه پژوهشی در اتاق مخصوص گروه درمانی بیماران، که مجهز به وسائل صوتی و تصویری و میز و صندلی مناسب جهت بیماران بود انجام گرفت. این برنامه در غالب جلسه یک ساعته می‌باشد که به صورت هفتگی برگزار گردید. جلسات ۱ تا ۸ ویژه بیمارانی است که برای ترخیص از بیمارستان یا مراکز نگهداری آماده می‌شوند و جلسات ۹ تا ۱۶ در بیمارستان، خارج از بیمارستان، مراکز سلامت روانی یا محل سکونت بیماران انجام گرفت. جلسات و عنوانین در جدول (۱) ارائه شده است (۱۶).

جدول ۱: جلسات و عنوانین آنها

جلسه	موضوع جلسه
اول	معرفی برنامه بازگشت به اجتماع
دوم	نشانه‌ها و علایم اختلالات روانی ناتوان کننده
سوم	معین کردن آمادگی برای ترخیص
چهارم	طرح ریزی برنامه بازگشت به اجتماع
پنجم	ارتباط برقرار کردن با اجتماع
ششم	مقابله با استرس‌های موجود در اجتماع
هفتم	طرح ریزی یک برنامه روزانه
هشتم	تمرین قرار ملاقات گداشتن (ویزیت) و انجام آن
نهم	داروها چگونه از عود جلوگیری می‌کنند
دهم	ازیابی تاثیرات داروها
یازدهم	حل مسائل و مشکلات دارویی
دوازدهم	حل کردن مشکلات و عوارض جانبی دارویی
سیزدهم	تعیین علایم هشدار
چهاردهم	پیگیری علایم هشدار
پانزدهم	پیشبرد طرح اورزانس
شانزدهم	ورود به اجتماع

مداخله شامل یک بسته که شامل برنامه بازگشت به اجتماع برای آموزش افراد مبتلا به اختلالات روانی ناتوان کننده بود که از نظر محتوایی شامل نشانه‌ها و رفتارهای قبل از ترخیص از بیمارستان یا برای رسیدن به یک زندگی مستقل، برنامه‌ریزی برای ترخیص یا انتقال به موقعیت‌های زندگی، ارتباط با ارائه دهنده خدمات اجتماعی، درک منافع مصرف داروها، مسائل و مشکلات دارویی و کاهش احتمال عود بود. هدف از برنامه بازگشت به اجتماع این است که شرکت کننده‌گان، با مهارت‌های اطلاعاتی آشنا شوند که بتوانند از آنها در حین انتقال از سیستم سلامت روان، بیمارستان‌ها یا مراکز اقامتی تحت کنترل را ترک کرده و سعی در ایجاد یک زندگی مستقل‌تر اجتماعی داشته باشند. به علاوه قادر شوند به طور طولانی‌تر از خدمات بازتوانی روانی اجتماعی

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی قبل - بعد با گروه شاهد است. در این مطالعه جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران که مرحله حاد بیماری سپری کرده بودند و در شرایط پایداری قرار داشتند. محیط پژوهش در این مطالعه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران بود. حجم نمونه با توان ۸۰٪ و سطح اطمینان ۹۵٪ با استفاده از فرمول زیر، ۱۰ نفر در هر گروه

$$\frac{(z_{1-\alpha/2}+z_{1-\beta})^2}{n} = \frac{\sigma^2}{(d)^2}$$

برآورد گردید σ^2 البته با توجه به راهنمای برنامه بازگشت به اجتماع لیبرمن، حداقل تعداد شرکت کننده‌گان در گروه، ۸ نفر می‌باشد در نظر گرفته شود که با توجه به احتمال در نظر گرفتن ریزش نمونه‌ها، تعداد ۲۰ نفر در هر کدام از گروه‌های شاهد و مداخله در نظر گرفته شد (۱۷). معیار ورود به مطالعه شامل دارای تشخیص قطعی بیماری دو قطبی نوع یک توسط روانپزشک و ثبت شده در پرونده، قرار داشتن در محدوده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال، قادر به حضور در جلسات، عدم قرار داشتن در علایم فارح حاد مانیا در زمان ورود به مصاحبه، عدم وجود مشکلات و معلولیت‌های جسمی و موافق بیمار یا قیم قانونی برای شرکت در پژوهش با امضای رضایت نامه کتبی می‌باشد. همچنین معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل ابتلاء تشنج غیرقابل کنترل، داشتن سابقه سوء مصرف فعال مواد می‌باشند. در این پژوهش، نمونه‌گیری به صورت در دسترس انجام شد، که در آن بیماران دوقطبی بستری در بخش‌های مردان که با توجه به معیار ورود، واحد شرایط بودند وارد مطالعه شدند. سپس به صورت تصادفی و به کمک جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله (شامل ۲۰ نفر) و گروه شاهد (شامل ۲۰ نفر)، تقسیم گردیدند. روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش شامل سنجش ویژگی‌های جمعیت شناختی و پرسشنامه ارزیابی تبعیت دارویی بود. مقیاس ارزیابی تبعیت دارویی (Medication Adherence Rating Scale: MARS) که این پرسشنامه شامل ۱۰ سؤال با پاسخ بلی و خیر است که به راحتی توسط خود بیمار یا درمانگر قابل پاسخ دادن است. این مقیاس توسط تامسون در سال ۲۰۰۰ تهیه شده و به سادگی تبعیت دارویی بیماران را ارزیابی می‌کند. پایایی این ابزار توسط کوک در سال ۲۰۰۲ در ترکیه در حد مطلوب گزارش شده است. نمره بین صفر تا ۷ نشانگر همکاری ضعیف و پایین و نمره بین ۸ تا ۱۰ نشانگر همکاری بالا می‌باشد. می‌توان گفت که مقیاس MARS مقیاس پایا و مطمئن بوده و از مقیاس‌های قبلی که در مورد بیماران روانپزشکی به کاربرده شده پایدارتر است، در شیراز در پژوهشی توسط هدایتی، جوادپور و ده بزرگی در سال ۲۰۱۳، ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی ۹۱/۰ بدست آمده است (۱۷-۲۱).

روش اجرا پژوهش به این صورت است که پژوهشگر پس از دریافت تایید از کمیته پژوهش و تحقیقات تكمیلی و کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و اخذ معرفی نامه از دانشگاه و ارائه آن به مدیریت و دفتر پرستاری بیمارستان روانپزشکی ایران و کسب اجازه از آنها و پس از معرفی خود به بیماران، هدف از انجام پژوهش توضیح داده شد و با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، افرادی که معيار ورود به مطالعه و تمایل به شرکت کردن در پژوهش را داشته‌اند انتخاب و پس از ارائه توضیحات واضح و شفاف در خصوص اهداف مطالعه، روش اجرای آن و نیز حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخذ

از گرداوری توسط نسخه ۱۹ نرم افزار SPSS و با آزمون‌های تی زوجی، تی مستقل، آزمون کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر، تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها

در این پژوهش ۴۰ بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی بسته‌ی در بیمارستان روانپزشکی ایران شرکت داشتند که تمام شرکت کنندگان پایان کار باقی ماندند و ریزش وجود نداشت. همسان بودن دو گروه مداخله و شاهد از نظر متغیرهای دموگرافیک با استفاده از تی مستقل، آزمون کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام شد و نتایج نشان داد که آزمون‌های هر دو گروه از نظر وضعیت تأهله، سن، تحصیلات و وضعیت اشتغال تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات میزان تبعیت دارویی گروه مداخله و شاهد در پیش آزمون تفاوت آماری معناداری نداشتند ($P = 0.48$). اما بعد از مداخله میانگین نمرات میزان تبعیت دارویی گروه مداخله و شاهد تفاوت آماری معناداری داشت ($P < 0.001$). همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین میانگین نمرات میزان تبعیت دارویی در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد ($P = 0.26$) ولی بین میانگین نمرات میزان تبعیت دارویی در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری بود ($P < 0.001$) که می‌توان مداخله را مؤثر دانست (جدول ۲).

فراگیر بهره‌گیرند. اجزای برنامه بازگشت به اجتماع شامل کتاب‌های راهنمای مریبان، نوار ویدیویی و کتاب کار (ویژه شرکت کنندگان) می‌باشد. روش انجام مداخله به این صورت بود که مری اهداف هر جلسه را تشریح داده و اصطلاحات را توضیح می‌دهد و شرکت کنندگان را به یادگیری تشویق می‌کند. در قسمت نمایش ویدیویی هنر پیشگان نقش بیماران را بازی می‌کنند و به آنها مهارت‌ها و مفاهیم لازم آموزشی را نشان می‌دهند و مریبان به تناسب فیلم را متوقف می‌کرد و سوالات مددجو در کتاب راهنمای مریبان را می‌پرسند، تا هم توجه شرکت کنندگان جلب شود و هم ارزیابی درباره درک مطالب در هر جلسه صورت گیرد. در مرحله ایقای نقش، شرکت کنندگان مهارت‌هایی را که در نوار ویدیویی نشان داده شده است، بر اساس یک چهارچوب ساختار یافته تمرین می‌کرند و شرکت کنندگان مشکلاتی را که احتمال دارد درخصوص بیماری، داروها و زندگی در اجتماع با آن روبرو شوند پیش بینی و حل می‌کرند و با کمک مری شرکت کنندگان مهارت‌هایی را که در فیلم و جلسات یاد می‌گرفتند، در داخل کلاس در مورد خودشان بکار می‌برند. تمرینات خارج از کلاس را در جهت پر کردن برگه‌های کار داخل کتاب کار، توسط بیمار در فاصله بین دو جلسه تکمیل می‌شود. شرکت کنندگان بعد از اینکه «برنامه بازگشت به اجتماع» را تکمیل می‌کرند، از این چک لیست برای کنترل عوارض داروها، عوارض جانبی و علامت‌ها طرح برنامه و مقابله با موقعیت‌های اضطراری استفاده می‌کرند. پس از انجام مداخله تکمیل مجددًا پرسشنامه مقایس می‌گردند (MARS) توسط بیماران بعد از مداخله تکمیل گردیدند. داده‌ها پس

جدول ۲: مقایسه میانگین میزان تبعیت دارویی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه مداخله و شاهد

گروه	تعداد	پیش آزمون	پس آزمون	آزمون تی مستقل	آماره	مقدار احتمال	آزمون تی وابسته (زوجی)
مداخله	۲۰	۴۰/۵	۱۰/۵	$P < 0.001$	۰/۸۷	۰/۹۲	میانگین آماره
	۲۰	۴/۳۵	۱/۵۹				
شاهد	۲۰	۴/۳۵	۱/۵۹	$P < 0.001$	۱/۱۴	۱/۵۶	میانگین انحراف معیار
	۲۰	۰/۷	۰/۴۸				
آزمون تی مستقل		۰/۷		$P < 0.001$		۰/۰۰۱	

جدول ۳: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات تبعیت دارویی به تفکیک گروه مداخله و شاهد

خطا	خطا	خطا	خطا	خطا	خطا	خطا	منبع
پیش آزمون	۲۹/۳۳	۱	۲۹/۳۳	۱	۰/۹۰۳	۳۷	مجموع مجذورات درجه آزادی
گروه	۱۴۵/۹۴	۱	۱۴۵/۹۴	۱	۰/۹۰۳	۳۷	میانگین میջورات آماره F
مقدار احتمال	۰/۹۰۳	۰/۹۰۳	۰/۹۰۳	۰/۹۰۳	۰/۹۰۳	۰/۹۰۳	اندازه اثر
توان آزمون	۰/۶۰۱	۰/۶۰۱	۰/۶۰۱	۰/۶۰۱	۰/۶۰۱	۰/۶۰۱	میانگین میջورات آماره

بحث

نتایج مطالعه نشان داد که برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختلال دوقطبی نوع یک تأثیر دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین میزان تبعیت دارویی گروه مداخله، بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معناداری تغییرکرده است که افزایش میزان تبعیت دارویی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون را نشان می‌داد. نتایج برخی از مطالعات قبلی هم راستا با نتایج پژوهش حاضر می‌باشد. محمدزاده ننه کران و همکاران در یک مقاله‌ای

برای بررسی فرضیه «برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختلال دوقطبی نوع یک تأثیر دارد» از آزمون آماری «تحلیل کوواریانس» استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که پس از کنترل آماری تفاوت میانگین نمرات گروه‌ها در پیش آزمون، مداخله (برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع) بر میانگین نمرات پس آزمون اثر گذاشته است ($P < 0.001$). با توجه به اندازه اثر، می‌توان گفت که درصد تغییرات متغیر وابسته در پس آزمون، ناشی از مداخله است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید گردید (جدول ۳).

روی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع در بیماران اسکیزوفرنیا انجام شده بود نتایج نشان داد که بهبودی معنی داری در چهارچوب عملکرد اجتماعی و اشتغال مجدد بیماران با اختلال اسکیزوفرنیا در مقایسه با آموزش روانی مشاهده شد و نیز عملکرد اجتماعی در طی ۶ و ۲۴ ماه پیگیری بعدی به طور معنی داری بهبود یافته بود^(۱۴). نتایج پژوهش Deveci و همکاران بیانگر آن بود که آموزش مهارت‌های اجتماعی بر روی عالیم مثبت و منفی بیماری و عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا مؤثر می‌باشد و نیز باعث افزایش بینش و در نتیجه پذیرش دارویی در بیماران می‌شود و می‌تواند به عنوان یک درمان الحاقی همراه دارو درمانی به کار برد شود^(۱۵). نتایج مطالعه مروری Armijo و همکاران که تأثیر درمان جامع‌نگر بر روی بیماران با اختلال روانپریشی و اسکیزوفرنیا را مورد بررسی قرار می‌داد نشان داد که مداخله باعث کاهش عالیم منفی و سایکوتیک و کمتر شدن تعداد روزهای بستری در بیمارستان و هم ابتلایی با اختلال سوء مصرف مواد و بهبود عملکرد کلی و تبعیت درمانی در آنها می‌شود^(۱۶). نتایج پژوهش Sato و همکاران حاکی از بهبودی معنی داری در پذیرش درمانی بیماران و نیز قادر به تسریع ترجیح بیماران با اختلال روانپریشی و حمایت از ترجیح آنها باشد^(۱۷). تفاوت عمدۀ مطالعه حاضر با مطالعات بررسی شده در جامعه پژوهش و متغیر وابسته آن می‌باشد. در مطالعه حاضر محقق بر آن شد تا یک گروه از بیماران روان که مبتلا به اختلال دو قطبی هستند را مورد بررسی قرار داده و تبعیت از رژیم دارویی که یکی از مباحثت مهم در بیماری‌های مزمن است را ارتقا دهد. ابزار و جامعه پژوهش از دیگر تفاوت‌های عمدۀ با مطالعات بررسی شده می‌باشد. از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به انجام مطالعه در مردها و نیز حجم کم نمونه اشاره نمود علاوه بر این می‌توان به عدم امکان پیگیری طولانی ترجهت نیل به یافته‌های روشنتر و قاطعتر را اشاره نمود. لذا پیشنهاد می‌گردد مطالعه‌ای در دو جنس و با حجم نمونه بیشتری انجام شده و نتایج با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند و نیز انجام مطالعه‌ای در سایر اختلالات روانی و نیز با داشتن دوره پیگیری طولانی تر مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه گیری

یافته‌های پژوهش حاضر ضمن تأیید و حمایت از فرضیه تحقیق نشان داد که اجرای برنامه بازگشت به اجتماع موجب افزایش بهبودی همکاری دارویی بیماران دوقطبی و تبعیت بهتر آنان از رژیم دارویی تجویز شده می‌شود. این بدین معنی است که این طرح درمانی به عنوان یک مداخله پرستاری و یک روش غیردارویی می‌تواند به خوبی فاکتورهای روانشناختی مؤثر در پیروی ضعیف دارویی را مورد هدف قرار دهد و برای روند درمان و کاهش عالیم روانی این بیماران مفید باشد. بینش ضعیف و آگاهی کم در مورد بیماری و نگرش بیمار نسبت به بیماری از فاکتورهای روانشناختی مؤثر در پیروی ضعیف دارویی می‌باشد، همچنین ترس از هر نوع عوارض جانبی دارو و نگرش منفی در مورد درمان با همکاری ضعیف دارویی همراه است.

سپاس گزاری

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می‌باشد. همچنین پژوهشگران بر خود لازم می‌دانند، بدین وسیله از مشارکت بیماران و کارکنان بیمارستان روانپریشکی ایران تشکر نمایند.

تحت عنوان بررسی تأثیر برنامه باز ورود به جامعه بر عملکرد بیماران اسکیزوفرنی، بعد از بررسی ۲۴ بیمار در دو گروه مداخله و شاهد و انجام مداخله یک ماهه فقط برای گروه مداخله، به این نتیجه رسیدند که عملکرد کلی و دانش و مهارت ورود به جامعه در بیماران گروه مداخله به صورت معنی داری بهتر شده است^(۲۲). همچنین نتایج مطالعه Xiang و همکاران در چین که با هدف تأثیر برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع انجام شده بود نشان داد که انجام این مداخله باعث بهبود عملکرد اجتماعی، بینش و عالیم روانی در گروه مداخله شده است^(۲۴). سوхک و همکاران در یک مطالعه کارآزمایی بالینی با هدف تعیین تأثیر مداخله شناختی-رفتاری بر تبعیت از رژیم دارویی بیماران همودیالیزی، بعد از اجرای مداخله به این نتیجه رسیدند که میزان تبعیت از رژیم دارویی این بیماران در گروه مداخله به صورت معنی داری تغییر کرده و از نظر آماری این تغییر معنی دار بود^(۲۳). بالجانی و همکاران در مطالعه خود تحت عنوان تأثیر مداخلات خودمدیریتی بر تبعیت از رژیم دارویی و سبک زندگی در بیماران قلبی-عروقی، برای گروه آزمون مداخلات خودمدیریتی مربوط به سبک زندگی سالم و تبعیت از رژیم دارویی طولانی مدت را اجرا نمودند ولی گروه کنترل مداخلات روتین را دریافت کردند. در پس آزمون مشخص شد که میزان تبعیت از رژیم دارویی و سبک زندگی در بیماران گلبهای میزان تبعیت از رژیم دارویی در بیماران گروه مداخله به صورت معنی داری نسبت به گروه مداخله افزایش یافته بود^(۲۴). بر اساس مطالعات انجام شده و جمع بندي پژوهش‌هایی که در جوامع مختلف و بر روی بیماران گوناگون انجام شده است می‌توان دریافت که انجام مداخلات برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع و سایر مداخلات مرتبط می‌تواند بر میزان تبعیت از دارو مؤثر باشد و این میزان به صورت معنی داری بعد از مداخله بهتر شده بوده است.

نتایج همچنین بیانگر آن بود که با مقایسه میزان تبعیت دارویی آزمودنی‌های گروه‌های شاهد و مداخله، قبل و بعد از اجرای برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع، نتایج نشان داد که میانگین میزان تبعیت دارویی در پیش آزمون بین گروه مداخله و شاهد تفاوت آماری معناداری با یکدیگر نداشتند ولی بعد از انجام مداخله میزان تبعیت دارویی آزمودنی‌های گروه مداخله به طور معنی داری از گروه شاهد افزایش یافته بود. این نتایج هم راستا با نتایج مطالعات دیگر می‌باشد به طوری که نتایج مطالعه مروری Melo-Dias نشان داد که که بعد از مداخله آزمودنی‌های گروه مداخله در مطالعات مورد استفاده، پذیرش دارویی بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند^(۱۲). همچنین نتایج مطالعه Redlich و همکاران نشان داد که مدل جامع‌نگر در بیماران با اختلال روانی باعث افزایش تبعیت درمانی و پیوستگی درمانی در آنها می‌شود که در نهایت باعث نتایج بالینی مطلوب‌تری در آنها می‌شود^(۱۵). نتایج پژوهش Cosden و همکاران حاکی از آن بود که برنامه جامعه نگر باعث کاهش تکرار و بهبود عملکرد روانی بیماران با اختلال روانی مجرم، بهبود عملکرد کلی و رضایت مندی از الکل و دارو، افزایش دیسترس روانی و اجتماعی و نیز استفاده از الکل و دارو، افزایش مهارت‌های زندگی مستقل و نیز ارتقاء کیفیت زندگی آن‌ها شده بود^(۲۶). Rossotto و همکاران مدل بازگشت به اجتماع را مؤثر بر میزان بالای تبعیت و پیوستگی درمانی در مرحله نقاهت و پیگیری بعدی اعلام کردند و آن‌ها همچنین اظهار داشتند که بیماران میزان ستری مجدد کمتری داشتند^(۲۷) در پژوهشی که توسعه Xiang و همکاران بر

References

1. Martínez-Arán A, Vieta E, Reinares M, Colom F, Torrent C, Sánchez-Moreno J, et al. Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. *Am J Psychiatr.* 2014.
2. Sajatovic M, Bauer MS, Kilbourne AM, Vertrees JE, Williford W. Self-reported medication treatment adherence among veterans with bipolar disorder. *Psychiatr Serv.* 2006;57(1):56-62. [DOI: 10.1176/appi.ps.57.1.56](https://doi.org/10.1176/appi.ps.57.1.56) PMID: 16399963
3. Crowe M, Whitehead L, Wilson L, Carlyle D, O'Brien A, Inder M, et al. Disorder-specific psychosocial interventions for bipolar disorder--a systematic review of the evidence for mental health nursing practice. *Int J Nurs Stud.* 2010;47(7):896-908. [DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2010.02.012](https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.02.012) PMID: 20233615
4. Scott J, Pope M. Nonadherence with mood stabilizers: prevalence and predictors. *J Clin Psychiatry.* 2002;63(5):384-90. PMID: 12019661
5. Velligan DI, Weiden PJ, Sajatovic M, Scott J, Carpenter D, Ross R, et al. The expert consensus guideline series: adherence problems in patients with serious and persistent mental illness. *J Clin Psychiatry.* 2009;70 Suppl 4(Suppl 4):1-46; quiz 7-8. PMID: 19686636
6. Johnson RE, McFarland BH. Lithium use and discontinuation in a health maintenance organization. *Am J Psychiatry.* 1996;153(8):993-1000. [DOI: 10.1176/ajp.153.8.993](https://doi.org/10.1176/ajp.153.8.993) PMID: 8678195
7. Miklowitz DJ, George EL, Richards JA, Simoneau TL, Suddath RL. A randomized study of family-focused psychoeducation and pharmacotherapy in the outpatient management of bipolar disorder. *Archives of General Psychiatry.* 2003;60(9):904-12.
8. Jonsdottir H, Opjordsmoen S, Birkenes AB, Engh JA, Ringen PA, Vaskinn A, et al. Medication adherence in outpatients with severe mental disorders: relation between self-reports and serum level. *J Clin Psychopharmacol.* 2010;30(2):169-75. [DOI: 10.1097/JCP.0b013e3181d2191e](https://doi.org/10.1097/JCP.0b013e3181d2191e) PMID: 20520290
9. Sharifi A, Shabani A, Ahmadzad-Asl M. The pattern of adherence in patients with bipolar I disorder; an eight weeks study. *Iranian J Psychiatr Behav Sci.* 2009;3(2):39-43.
10. Staring AB, Van der Gaag M, Koopmans GT, Selten JP, Van Beveren JM, Hengeveld MW, et al. Treatment adherence therapy in people with psychotic disorders: randomised controlled trial. *Br J Psychiatry.* 2010;197(6):448-55. [DOI: 10.1192/bjp.bp.110.077289](https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.077289) PMID: 21119150
11. Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, Schaffer A, Beaulieu S, Alda M, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2013. *Bipolar Disord.* 2013;15(1):1-44. [DOI: 10.1111/bdi.12025](https://doi.org/10.1111/bdi.12025) PMID: 23237061
12. Karbalaie Noori A, Hosseini SA. Effect of Community Re-entry Program (CRM) in Patients with Schizophrenia. *J Rehabil.* 2013;14(2):22-8.
13. Melo-Dias C. Psychosocial rehabilitation: The community re-entry program (CREP) in psychiatric inpatient settings, systematic review. *Am J Nurs.* 2015;4(2-1):51-9.
14. Xiang YT, Weng YZ, Li WY, Gao L, Chen GL, Xie L, et al. Efficacy of the Community Re-Entry Module for patients with schizophrenia in Beijing, China: outcome at 2-year follow-up. *Br J Psychiatry.* 2007;190(1):49-56. [DOI: 10.1192/bjp.bp.106.023697](https://doi.org/10.1192/bjp.bp.106.023697) PMID: 17197656
15. Redlich AD, Steadman HJ, Robbins PC, Swanson JW. Use of the criminal justice system to leverage mental health treatment: effects on treatment adherence and satisfaction. *J Am Acad Psychiatry Law.* 2006;34(3):292-9. PMID: 17032951
16. Chatterjee S, Pillai A, Jain S, Cohen A, Patel V. Outcomes of people with psychotic disorders in a community-based rehabilitation programme in rural India. *Br J Psychiatry.* 2009;195(5):433-9. [DOI: 10.1192/bjp.bp.108.057596](https://doi.org/10.1192/bjp.bp.108.057596) PMID: 19880934
17. Bahredar MJ, Asgharnejad Farid AA, Ghanizadeh A, Birashk B. The efficacy of psycho-educational group program on medication adherence and global functioning of patients with bipolar disorder type I. *Int J Community Based Nurs Midwifery.* 2014;2(1):12-9. PMID: 25349841
18. Eker F, Harkin S. Effectiveness of six-week psychoeducation program on adherence of patients with bipolar affective disorder. *J Affect Disord.* 2012;138(3):409-16. [DOI: 10.1016/j.jad.2012.01.004](https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.01.004) PMID: 22316565
19. Thompson K, Kulkarni J, Sergejew AA. Reliability and validity of a new Medication Adherence Rating Scale (MARS) for the psychoses. *Schizophr Res.* 2000;42(3):241-7. PMID: 10785582
20. Nejad Farid AA, Bahredar MJ. The effectiveness of mental training program on quality of life, prevention of disease, recurrence following treatment with bipolar I disorder and mental health, their carers 2013.
21. Javadpour A, Hedayati A, Dehbozorgi GR, Azizi A. The impact of a simple individual psycho-education program on quality of life, rate of relapse and medication adherence in bipolar disorder patients. *Asian J Psychiatr.* 2013;6(3):208-13. [DOI: 10.1016/j.ajp.2012.12.005](https://doi.org/10.1016/j.ajp.2012.12.005) PMID: 23642977
22. Mohammadzadehnanekaran S, Karbalainouri A, hosseini S. The effect of community re-entry program on function patients with schizofrenia. Tehran:

- University of social welfare and rehabilitation sciences; 2012.
23. Sookhak F, Zolfaghari M, Asadi Noghabi AA, Haghani H. Effect of a Cognitive-Behavioral Intervention on Medication Adherence in Patients' Undergoing Hemodialysis. *J Hayat*. 2014;20(3):85-94.
24. Baljani E. Impact of medication adherence and self-management interventions on lifestyle in cardiovascular patients. *J Hamadan Fac Nurs Midwifery*. 2012;20(3):58-67.
25. Deveci A, Esen-Danaci A, Yurtsever F, Deniz F, Gurlek Yuksel E. [The effects of psychosocial skills training on symptomatology, insight, quality of life, and suicide probability in schizophrenia]. *Turk Psikiyatri Derg*. 2008;19(3):266-73. [PMID: 18791879](#)
26. Armijo J, Mendez E, Morales R, Schilling S, Castro A, Alvarado R, et al. Efficacy of community treatments for schizophrenia and other psychotic disorders: a literature review. *Front Psychiatry*. 2013;4:116. [DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00116](#) [PMID: 24130534](#)
27. Sato S, Ikebuchi E, Anzai N, Inoue S. Effects of psychosocial program for preparing long-term hospitalized patients with schizophrenia for discharge from hospital: randomized controlled trial. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2012;66(6):474-81. [DOI: 10.1111/j.1440-1819.2012.02393.x](#) [PMID: 23066765](#)

Effect of the Community Re-entry Program on Medication Adherence in Patients with Bipolar Disorder Type I

Parham Mohebi¹, Masud Fallahi Khoshknab^{2,*}, Abolfazl Rahgoi³, Kian Norouzi Tabrizi², Mohammad Reza Khodaie Ardakani⁴

¹ MSc, Department of Psychiatric Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

² Associate Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

³ Instructor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

⁴ Associate Professor, Department of Psychiatry, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

* Corresponding author: Masud Fallahi Khoshknab, Associate Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: msflir@yahoo.com

Received: 25 Oct 2016

Accepted: 26 Apr 2016

Abstract

Introduction: Drug adherence is poor among patients with bipolar I disorder (BID) and lack of adherence to medication is one of the frequent causes of relapse and readmission in these patients. This study aimed to examine the effect of a community re-entry rehabilitation program on drug adherence in patients with BID.

Methods: This randomized clinical trial study was conducted on all patients with BID admitted to Iran Psychiatric Hospital in the first 6 months of 2016. Forty patients were selected by purposive sampling and randomly divided into two groups of intervention and control. The intervention group received the theoretical and practical training of the community re-entry program (CRP) over 16 sessions (three times a week). Patients in the control group only received current treatment at the center (drug therapy, occupational therapy, and psychotherapy). The patients completed medication adherence rating scale (MARS) before and three months after the intervention. Data were analyzed using chi-square test, independent t-test and ANOVA with the SPSS 19 software.

Results: The results showed no significant difference between the intervention and control groups regarding the distribution of demographic characteristics. The mean score of patients' medication adherence before the intervention was 4.05 ± 1.05 in the intervention group and 4.35 ± 1.59 in the control group, while after the intervention it was 8.31 ± 0.92 in the intervention group and 4.65 ± 1.56 in the control group, which showed a significant difference in the intervention group ($P \leq 0.001$).

Conclusions: Results showed that implementing CRP can enhance drug adherence in patients with BID.

Keywords: Bipolar I Disorder, Community Re-Entry Program, Psychosocial Rehabilitation, Nursing, Drug Adherence