

بررسی تغییرات قوه‌ی نامیه، مقدار پرولین و کلروفیل ژنوتیپ‌های بومی برنج تحت تنش شوری

شاهین مردانی نژاد^۱ و منصوره وزیرپور^۲

چکیده

در این تحقیق به منظور مقایسه تحمل تنش شوری ژنوتیپ‌های بومی برنج، تغییرات درصد جوانه زنی، مقدار پرولین و کلروفیل توده‌های بومی نوگران و سرخه، ارقام معرفی شده از این توده‌ها شامل زاینده‌رود و سازندگی و لاین‌های خالص شده از این توده‌ها شامل لاین‌های ۶۷-۹۷ و ۶۷-۴۷ در واکنش به غلظت‌های ۰ تا ۱۰ دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. طبق نتایج حاصل از این آزمایش، با افزایش غلظت کلرید سدیم در محیط، درصد جوانه‌زنی بذر، وزن خشک ریشه چه و کلئوپتیل و مقدار کلروفیل کلیه‌ی ژنوتیپ‌های بومی برنج کاهش یافت. مقایسه‌ی میانگین درصد جوانه‌زنی نشان داد که ژنوتیپ‌های ۶۷-۴۷، نوگران، سرخه و ۶۷-۹۷ نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها در این صفت برتری دارند. در مورد وزن خشک ریشه چه، کلئوپتیل و مقدار کلروفیل، ژنوتیپ ۶۷-۴۷ نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها عملکرد بهتری داشت. نتایج بررسی مقدار پرولین نشان داد که مقدار این اسید آمینه در کلیه‌ی ژنوتیپ‌ها با افزایش مقدار کلرید سدیم محیط به طور معنی‌دار افزایش می‌یابد و بیشترین مقدار پرولین برگ و ریشه در ژنوتیپ سرخه مشاهده شد. با توجه به شوری نسبی خاک منطقه‌ی مورد بررسی، کشت ژنوتیپ ۶۷-۴۷ نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها توصیه می‌شود. هم‌چنین به دلیل آسیب‌پذیری شدید کلروپلاست‌های ژنوتیپ ۶۷-۹۷ در غلظت‌های بالای تیمار به کار رفته و حساسیت به بیماری در چنین شرایطی، این ژنوتیپ برای کشت توصیه نمی‌شود.

واژه‌های کلیدی: ژنوتیپ بومی برنج، تنش شوری، پرولین، کلروفیل، قوه‌ی نامیه

تاریخ دریافت مقاله: ۸۵/۵/۷ تاریخ پذیرش: ۸۶/۸/۲۴

۱- عضو هیأت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه shmardani@yahoo.com

۲- کارشناس پژوهشی زیست‌شناسی عمومی

مردانی نژاد، ش. بررسی تغییرات قوه‌ی نامیه، مقدار پرولین و...

مقدمه و بررسی منابع

برنج پس از گندم مهم‌ترین غله دنیا است. عدم زهکشی مناسب و شوری، از جمله عواملی است که کشت برنج را محدود می‌کند، بنابراین لازم است ارقامی سازگار با شرایط رشد خاص تولید گردند (۵). برنج یک گیاه حساس به شوری است، با این حال ارقام مختلف این گیاه وقتی در معرض شوری قرار می‌گیرند، به‌طور متفاوت پاسخ می‌دهند. چندین عامل در مقاومت گیاه برنج به شوری شرکت دارند که در این میان محدودیت ورود یون سدیم مهم‌ترین عامل در تعیین مقاومت به شوری است. تحمل به شوری به توانایی یک گیاه در رشد و کامل کردن چرخه زندگی‌اش در حضور غلظت‌های بالایی از کلرید سدیم (غالباً کلرید سدیم) اطلاق می‌گردد (۱۳).

روی و همکاران (۱۹۹۳) دریافته‌اند که کاربرد غلظت‌های کم پرولین ۲۰ تا ۳۰ میلی‌مولار، رشد گیاهچه‌های حساس برنج را تحریک کرده و اثر کلرید را کاهش می‌دهد اما غلظت‌های بالاتر از ۴۰ تا ۵۰ میلی‌مولار، بازدارندگی رشد گیاهچه‌ها را در مقایسه با تیمار نمک کلرید سدیم به‌تنهایی تشدید می‌کند (۱۹).

باقریه نجار (۱۳۷۳) در تحقیقی اعلام نمود که مصرف ۱۰ میلی‌مول در لیتر کلرید سدیم در محلول غذایی، رشد برگ آخر را در گیاهچه‌ی برنج رقم آرام افزایش داد و مصرف ۸۰ میلی‌مول کلرید سدیم رشد برگ آخر را کاهش داد (۱).

شهدی کومله (۱۳۷۳) در تحقیقی اعلام کرد که شوری خاک در سطح ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ میلی‌اکی والان در کیلوگرم خاک، باعث کاهش وزن خشک قسمت هوایی، سطح برگ و تبخیر در دو رقم مورد

بررسی می‌گردد. در این تحقیق رقم IR₃ بیش از رقم قصرالدشتی به شوری حساس بود (۲). نتایج بررسی فراست (۱۳۷۳) نشان داد که تیمار کلرید سدیم تأثیر معنی‌داری بر جوانه‌زنی، رشد کلئوپتیل و ریشه چه دارد، به‌طوری‌که تیمار گیاهان با ۱۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم ۱۶ درصد باعث کاهش جوانه‌زنی نسبت به گروه شاهد گردید. رشد ریشه چه در مقایسه با رشد کلئوپتیل حساسیت بیشتری داشت، با این حال در کم‌ترین سطح شوری (۲۵ میلی‌مولار)، طول ریشه چه اندک افزایشی نسبت به گیاهان شاهد نشان داد. در این تحقیق رقم شاه‌پسند مقاوم‌تر از رقم عنبروری گزارش شد. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری بر برخی جنبه‌های رشد اثر منفی دارد (۵).

کاووسی (۱۳۷۴) طی بررسی اثر شوری بر برخی اجزای تولید ارقام سپید رود، حسن سرایی و خزر به این نتیجه رسید که با افزایش شوری، اجزای تولید افت می‌نمایند. وی برای کشت در محیط با شوری پایین، رقم حسن سرایی و در محیط با شوری بالا، رقم سپیدرود را توصیه نمود (۶).

خاتون و همکاران (۱۹۹۵) در بررسی اثر شوری بر فیزیولوژی تولید مثل پنج ژنوتیپ برنج به این نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت تیمارها، وزن خشک کلیه‌ی ژنوتیپ‌ها کاهش می‌یابد، هم‌چنین اعلام نمودند که برگ‌های پیر بیش از برگ‌های جوان توانایی نگهداری یون سدیم را دارند (۱۶).

خاتون و فلاورز (۱۹۹۵) اثرات شوری بر تولید مثل برنج را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، در تیمار ۱۰ میلی‌مولار ۳۸ درصد، در تیمار ۲۵ میلی‌مولار ۷۲ درصد و در تیمار ۵۰ میلی‌مولار، تولید دانه

طریق با افزایش غلظت کلرید سدیم، بر مقدار پرولین اندام رویشی افزوده می‌شود (۲۱).

نتایج بررسی صالح (۱۳۷۸) نشان داد که با افزایش سطوح کلرید سدیم ۰، ۱۲/۵، ۳۷/۵ و ۵۰ میلی‌اکی والان در کیلوگرم، کاهش وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و مقدار کلروفیل در گیاه برنج کاملاً مشهود است (۳).

با توجه به اهمیت برنج در کشور و بالا بودن سطح کشت آن به خصوص در منطقه لنجان اصفهان، بارندگی کم و بالا بودن هدایت الکتریکی خاک‌های برنج کاری در این منطقه که بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات کشاورزی بین ۵/۰ تا ۸ دسی‌زیمنس بر متر اندازه‌گیری و ثبت شده است و حساسیت این گیاه نسبت به تنش شوری، بررسی آزمایشگاهی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف در حال ترویج این گیاه در منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو در این تحقیق واکنش ژنوتیپ‌های مختلف برنج این منطقه اعم از توده‌های بومی، ارقام معرفی شده از این توده‌ها و لاین‌های خالص شده از این توده‌ها به مقادیر مختلف تنش شوری مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در تابستان ۱۳۸۲ در شرایط گلخانه‌ای و هیدروپونیک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش توده‌های بومی برنج نوگران و سرخه، همراه ارقام معرفی شده از این توده‌ها شامل سازندگی و زاینده رود و لاین‌های خالص شده از این توده‌ها شامل ۴۷-۶۷ و ۶۷-۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند.

قوه نامیه‌ی ژنوتیپ‌های مورد بررسی در تیمارهای ۰، ۲/۵، ۵، ۷/۵ و ۱۰ دسی‌زیمنس بر متر کلریدسدیم

ثبت نشد. هم‌چنین معیارهای رشد تحت تأثیر این تنش قرار گرفتند (۱۵).

لین و کائو (۱۹۹۵) در تحقیقی اعلام نمودند که رشد کلئوپتیل برنج در محیط حاوی کلرید سدیم توسط تیمار پرولین به‌طور معنی‌دار افزایش می‌یابد، در صورتی‌که کاربرد پرولین در غلظت بالا بازدارندگی رشد ریشه‌های برنج را تحت تنش شوری افزایش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد اثر مقادیر مختلف اسید آمینه‌ی پرولین بر رشد نشاها به‌علت نقش‌های متفاوت آن در تنظیم رشد ریشه چه و کلئوپتیل است (۱۷).

مونز و همکاران (۱۹۹۵) اعلام نمودند که افزایش سریع آبسزیک اسید در ریشه‌هایی که در معرض شوری ۱۵۰ میلی‌مولار کلرید سدیم بودند، در ارقام مقاوم ۶ تا ۲۰ برابر نسبت به ارقام حساس مشاهده شد. در این تحقیق اعلام شد که اسید آبسزیک پاسخ ملکولی است که باعث مقاومت این ارقام شده است (۱۸).

خان و همکاران (۱۹۹۷) با بررسی اثر کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و ویژگی‌های نشای ژنوتیپ‌های معطر دانه ریز، محلی دانه زبر و پرمحصول جدید اعلام نمودند که اثر تیمارهای ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم باعث کاهش شاخص جوانه‌زنی و وزن تر و خشک نشا می‌گردد، با این حال ژنوتیپ‌های معطر حساس‌تر از سایر ژنوتیپ‌ها بودند (۱۴).

نتایج بررسی تینچارت و همکاران (۱۹۹۸) نشان داد که نمک کلرید سدیم موجب تحریک ژن‌های سنتزکننده‌ی پرولین می‌شود. سنتز پرولین از گلوتامات از طریق پیرولین ۵ کربوکسیلیت، نیازمند عمل دو آنزیم است که در نتیجه‌ی تحریک کلرید سدیم، ژن‌های سنتزکننده‌ی این دو آنزیم تحریک می‌شوند. بدین

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس صفات اندازه گیری شده (جدول ۱) نشان می‌دهد که با افزایش تیمار کلرید سدیم کاهش معنی‌داری در قوه نامیه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف اتفاق افتاده است. این کاهش در ژنوتیپ‌های مختلف نسبت به گروه شاهد در حدود ۵ تا ۱۶ درصد بود و مقایسه میانگین این صفت در بین ژنوتیپ‌ها (جدول ۲) نشان داد که ژنوتیپ‌های ۴۷-۶۷، نوگران، سرخه و ۹۷-۶۷ نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها عملکرد بهتری داشتند (نمودار ۱). به عبارت دیگر ژنوتیپ‌های ۴۷-۶۷، نوگران، سرخه و ۹۷-۶۷ از نظر جوانه‌زنی در سازگاری با تنش شوری به‌خصوص در مقادیر بالای کلرید سدیم نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها برتری نشان دادند.

نتایج این آزمایش با نتایج فراست (۱۳۷۳) مطابقت داشت، در آن آزمایش کاهش ۱۶ درصدی جوانه‌زنی نسبت به گروه شاهد در تیمار ۱۰ دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم گزارش شد که در این آزمایش بسته به نوع ژنوتیپ در حدود ۵ تا ۱۶ درصد کاهش در جوانه‌زنی بذرها مشاهده شد (۵). نتایج آزمایش خان و فلاورز (۱۹۹۵) نیز نشان داد که افزایش تیمار کلرید سدیم شاخص جوانه‌زنی را کاهش می‌دهد (۱۵).

کاهش درصد جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های مختلف را می‌توان چنین توجیه نمود که اثرات سمی یون‌ها و صدمه بر رویش دانه از جوانه‌زنی دانه ممانعت می‌کند (۲۰) و تنش اسمزی محیط باعث کاهش جذب آب توسط دانه می‌شود. با گذشت زمان با تجمع یون سدیم در واکئول و تراکم مواد سازگارکننده، جذب آب برای دانه آسان می‌گردد.

نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس صفت وزن خشک ریشه چه و کلئوپتیل نشان داد که با افزایش

در ظروف پتری پس از ۵ روز مورد بررسی قرار گرفت.

وزن خشک ریشه چه و کلئوپتیل سه روز پس از جوانه‌زنی اندازه‌گیری شد. به‌منظور پیگیری مراحل بعدی آزمایش، گیاهچه‌ها به محیط کشت هیدروپونیک با محلول غذایی یوشیدا (۲۲) و بسته به نوع تیمار حاوی ۰ تا ۱۰ دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم انتقال داده شدند. پس از گذشت دو هفته در محیط هیدروپونیک، وزن تر نمونه‌ها اندازه‌گیری شد، سپس نمونه‌های هر تیمار به آن انتقال داده شدند و پس از ۷۲ ساعت، وزن خشک نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. به‌منظور بررسی مقدار پرولین برگ و ریشه‌ی (نشای) ژنوتیپ‌های مختلف، ۵۰ میلی‌گرم وزن خشک اندام رویشی هر ژنوتیپ در تیمار مربوطه به‌طور جداگانه به کمک روش بیتس و همکاران (۱۹۷۳) اندازه‌گیری و ثبت شد (۹).

به‌منظور بررسی مقدار کلروفیل، ۵۰ میلی‌گرم برگ از هر ژنوتیپ مورد بررسی در تیمار مربوطه به‌طور جداگانه به کمک روش برانیسما (۱۹۶۱) اندازه‌گیری و ثبت شد (۱۱). در این روش پس از استخراج کلروفیل، نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شدند و سپس به کمک اسپکتروفوتومتر در طول موج ۶۲۵ نانومتر، مقدار کلروفیل بر حسب میلی‌گرم در هر گرم بافت محاسبه شد.

تجزیه واریانس صفات مورد بررسی و مقایسه‌ی میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۱ درصد به کمک نرم افزار Spss صورت گرفت و نمودارها با استفاده از همین نرم افزار رسم شدند.

افزایش در برگ بیشتر و منظم تر از ریشه بود. در مقایسه‌ی میانگین پرولین برگ و ریشه در بین ژنوتیپ‌ها (جدول ۴) بیشترین مقدار پرولین به ژنوتیپ سرخه مربوط می‌باشد (نمودار ۵ و ۶).

افزایش مقدار پرولین ناشی از افزایش مقدار کلرید سدیم را می‌توان چنین توجیه کرد که آنزیم‌های مسیر گلوتامات تحت تنش کلرید سدیم فعال شده و سنتز پرولین افزایش می‌یابد (۱۰)، زیرا کلرید سدیم موجب تحریک ژن‌های سنتزکننده‌ی این آنزیم‌ها می‌شود (۲۲). تغییرات مقدار پرولین در اندام‌های هوایی افزایش بیشتر و منظم‌تری نسبت به ریشه نشان می‌دهد. این مسأله را می‌توان چنین توجیه کرد که در ریشه فقط قسمت انتهایی در سنتز پرولین همکاری دارد که این قسمت در مقایسه با وزن خشک کل ریشه بسیار ناچیز است، در حالی که در اندام‌های هوایی، قسمت‌های سبز توانایی سنتز پرولین را دارند (۸).

صالح (۱۳۷۸) به کاهش مقدار کلروفیل برگ گیاه برنج با افزایش تیمار کلرید سدیم اشاره کرد (۳). نتایج تحقیقات اشرف و نقوی (۱۹۹۲) نیز نشان می‌دهد که تنش شوری موجب تخریب کلروپلاست و تغییر تعداد و اندازه‌ی کلروپلاست‌ها می‌شود (۷). کاهش مقدار کلروفیل را می‌توان چنین توجیه کرد که کلروپلاست محل اصلی سنتز پرولین است، از آن‌جا که اسید گلوتامیک ماده‌ی لازم برای سنتز کلروفیل و پرولین است، لذا این امکان وجود دارد که کلرید سدیم، اسید گلوتامیک را در جهت سنتز بیشتر پرولین در اندام‌های هوایی پیش برد (۲۱) که این هم ناشی از تحریک ژن‌های سنتزکننده‌ی آنزیم‌های سنتزکننده‌ی پرولین می‌باشد و از این رو سنتز کلروفیل کاهش می‌یابد. این توجیه با نتایج حاصل از

میزان شوری، کاهش معنی‌داری در وزن خشک ریشه‌چه و کلئوپتیل هر ژنوتیپ رخ می‌دهد (جدول ۱). در مقایسه‌ی میانگین وزن خشک ریشه‌چه و کلئوپتیل بین ژنوتیپ‌ها (جدول‌های ۲ و ۳) مشخص شد که بیشترین وزن خشک به ژنوتیپ ۶۷-۴۷ و کم‌ترین مقدار آن به ژنوتیپ ۶۷-۹۷ مربوط می‌باشد (نمودارهای ۱ و ۲).

نتایج تحقیقات شهدی (۱۳۷۳) با نتایج این آزمایش مطابقت داشت. او در تحقیق خود به کاهش وزن خشک قسمت هوایی ناشی از افزایش تیمار کلرید سدیم اشاره نموده است (۲). هم‌چنین کاووسی (۱۳۷۸) در تحقیقی نشان داد که اجزای تولید با افزایش شوری به‌طور معنی‌دار کاهش می‌یابند (۶). نتیجه بررسی این صفت با تحقیق خاتون و فلاورز (۱۹۹۵) نیز مطابقت دارد (۱۵).

با افزایش تیمار کلرید سدیم کاهش وزن خشک در اندام‌های هوایی به‌طور منظم مشهود بود و این را می‌توان بدین‌گونه توجیه کرد که تراکم یون سدیم در اندام‌های هوایی بیشتر از ریشه می‌باشد.

نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس مقدار کلروفیل نشان داد که با افزایش تیمار شوری، کاهش معنی‌داری در مقدار کلروفیل هر ژنوتیپ مشاهده می‌شود (جدول ۱). در مقایسه‌ی میانگین مقدار کلروفیل بین ژنوتیپ‌ها (جدول ۳) مشخص شد که بیشترین مقدار کلروفیل به ژنوتیپ ۶۷-۴۷ و کم‌ترین مقدار آن به ژنوتیپ ۶۷-۹۷ و سرخه مربوط می‌باشد (نمودار ۴).

نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس مقدار پرولین ریشه و برگ ژنوتیپ‌های مختلف نشان داد که برای صفت مورد بررسی با افزایش تیمار، مقدار پرولین تمامی ژنوتیپ‌ها افزایش معنی‌دار نشان می‌دهد. این

مردانی نژاد، ش. بررسی تغییرات قوه‌ی نامیه، مقدار پرولین و...

مقدار پرولین و رنگ‌پریدگی برگ‌ها، این ژنوتیپ را برای ابتلا به بیماری‌های قارچی بسیار مستعد می‌نماید.

با توجه به شوری نسبی خاک‌های منطقه‌ی مورد بررسی، کشت ژنوتیپ ۶۷-۴۷ قابل توصیه بوده و از طرفی به دلیل تخریب بسیار زیاد کلروپلاست و حساسیت بالای ژنوتیپ ۶۷-۹۷، کشت این ژنوتیپ در منطقه توصیه نمی‌شود.

این آزمایش مطابقت دارد، به طوری که مطابق نمودارهای (۵ و ۶)، مقدار کلروفیل ژنوتیپ سرخه با بیشترین مقدار پرولین اندازه‌گیری شده نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها، با افزایش تیمار کلرید سدیم بیش از سایر ژنوتیپ‌ها کاهش می‌یابد. ژنوتیپ ۶۷-۹۷، خالص شده‌ی توده بومی سرخه می‌باشد و مقدار کلروفیل این ژنوتیپ مانند سرخه کاهش قابل توجهی در مقادیر بالای تیمار به کار رفته داشت. آسیب‌پذیری شدید کلروپلاست در این ژنوتیپ، به خصوص در غلظت‌های بالای کلرید سدیم محیط، علاوه بر کاهش

جدول ۱- تجزیه‌ی واریانس صفات مختلف ژنوتیپ‌های مورد بررسی در پنج سطح تیمار کلرید سدیم

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات (MS)				
		قوه‌ی نامیه	وزن خشک ریشه‌چه	وزن خشک کلئوپتیل	پرولین ریشه	پرولین برگ
تکرار	۲	۰/۴۱۱ ^{ns}	۰/۰۰۱ ^{ns}	۰/۰۰۱ ^{ns}	۱/۲۷E-۰۰۵ ^{ns}	۴/۰۸E-۰۰۵ ^{ns}
غلظت (NaCl) ژنوتیپ	۴	۴۸/۸۸۵ ^{**}	۰/۰۲۹ ^{**}	۰/۰۶۹ ^{**}	۰/۰۲۵ ^{**}	۰/۰۵۷ ^{**}
خطای آزمایشی	۵	۷۲/۲۰۴ ^{**}	۰/۰۱۷ ^{**}	۰/۰۲۰ ^{**}	۰/۰۰۶ ^{**}	۰/۰۰۷ ^{**}
کل	۷۸	۹/۰۰۵	۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	۰/۰۰۰	۰/۰۰۱

** و ns به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد و غیر معنی‌دار

جدول ۲- مقایسه‌ی میانگین قوه‌ی نامیه و وزن خشک ریشه‌چه ژنوتیپ‌های مورد بررسی در واکنش به مقادیر

مختلف کلرید سدیم

ژنوتیپ	قوه‌ی نامیه					وزن خشک ریشه‌چه				
	۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰
سازندگی	۹۸/۳ a	۹۲/۰۰ b	۹۰/۰۰ b	۸۹/۶۶ ab	۸۳/۶۶ a	۹۰/۷۳ b	۰/۱۸ b	۰/۱۵ ab	۰/۱۴ b	۰/۱۳ b
زاینده رود	۹۷/۵ a	۹۲/۵ b	۸۹/۵ b	۸۵/۰۰ b	۷۸/۰۰ b	۸۸/۵ c	۰/۲ ab	۰/۱۶ a	۰/۱ c	۰/۱۲ bc
۶۷-۴۷	۱۰۰ a	۹۹/۱۶ a	۹۴/۱۶ a	۹۳/۰۰ a	۸۲/۰۰ b	۹۳/۶۶ a	۰/۲۱ a	۰/۱۹ a	۰/۱۷ a	۰/۱۷ a
نوگران	۹۸/۳ a	۹۸/۳۳ a	۹۵/۵ a	۹۰/۸۳ a	۸۹/۶۶ a	۹۴/۴۳ a	۰/۱۸ bc	۰/۱۲ b	۰/۱ c	۰/۱۱ c
سرخه	۹۷/۵ a	۹۴/۱۶ ab	۹۳/۳ ab	۹۱/۰۰ a	۸۷/۵ a	۹۲/۶۶ a	۰/۱۶ c	۰/۱۴ ab	۰/۱۰ c	۰/۱۱ c
۶۷-۹۷	۹۸/۱۲ a	۹۷/۵ ab	۹۲/۵ ab	۹۰/۰۰ ab	۸۸/۱۶ a	۹۳/۱۳ a	۰/۱۳ d	۰/۰۸ d	۰/۰۷ d	۰/۰۷ d


جدول ۳- مقایسه‌ی میانگین وزن خشک کلئوپتیل و مقدار کلروفیل ژنوتیپ‌های مورد بررسی در واکنش به مقادیر مختلف کلریدسديم

ژنوتیپ	وزن خشک کلئوپتیل					مقدار کلروفیل برگ					
	۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	میانگین	۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰
سازندگی	۰/۷۲a	۰/۵۵bc	۰/۴۲a	۰/۳۶ab	۰/۲a	۰/۴۴b	۰/۲۰۸a	۰/۱۷۷b	۰/۱۶b	۰/۱۳۴c	۰/۱۱b
زاینده رود	۰/۵۵c	۰/۵c	۰/۴۱ab	۰/۳۳ab	۰/۲۱b	۰/۴۰c	۰/۱۹۳b	۰/۲۱۴a	۰/۱۸۴a	۰/۱۵۲b	۰/۱۴۴a
۶۷-۴۷	۰/۷۴a	۰/۶۴a	۰/۴۵a	۰/۳۸a	۰/۳۰b	۰/۵۰a	۰/۲۰۵a	۰/۲۱۶a	۰/۱۸۵a	۰/۱۷۲a	۰/۱۵۸a
نوگران	۰/۶۵b	۰/۴۸d	۰/۳۴b	۰/۳۲ab	۰/۲۴a	۰/۴۰a	۰/۱۲۵c	۰/۱۰۷c	۰/۱۰۱c	۰/۰۹۸d	۰/۰۸۵c
سرخه	۰/۷ab	۰/۴۹cd	۰/۳۷b	۰/۳۴ab	۰/۲۵a	۰/۴۳a	۰/۱۲۰c	۰/۱۰۰c	۰/۰۷۵d	۰/۰۶۷e	۰/۰۶۲d
۶۷-۹۷	۰/۷۶a	۰/۵۶b	۰/۳۸b	۰/۲۶b	۰/۱۷a	۰/۴۲a	۰/۱۰۵d	۰/۰۹۸c	۰/۰۶۵d	۰/۰۶۵e	۰/۰۶۱d


جدول ۴- مقایسه‌ی میانگین مقدار پرولین برگ و ریشه‌ی ژنوتیپ‌های مورد بررسی در واکنش به مقادیر مختلف کلریدسديم

ژنوتیپ	میانگین پرولین برگ					میانگین پرولین ریشه					
	۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	میانگین	۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰
سازندگی	۰/۱۷۶c	۰/۱۸۹bc	۰/۲۰۰b	۰/۲۱۸c	۰/۳۱۷c	۰/۲۲b	۰/۰۵۱b	۰/۰۵۸d	۰/۰۶۳c	۰/۱۳۶b	۰/۱۲۰c
زاینده رود	۰/۱۷۷c	۰/۱۸۰bc	۰/۲۱۳b	۰/۲۴۵b	۰/۳۰۶c	۰/۲۲۴b	۰/۰۴۲a	۰/۰۸۱b	۰/۰۹۴b	۰/۱۲۶c	۰/۱۲۰c
۶۷-۴۷	۰/۱۴۴d	۰/۲۰۴b	۰/۲۳۰a	۰/۲۴۱b	۰/۳۰۲c	۰/۲۲۴b	۰/۰۸۵c	۰/۰۸۸b	۰/۰۹۹b	۰/۲۰۰a	۰/۱۱۷b
نوگران	۰/۱۱۶e	۰/۱۷۴c	۰/۱۸۵c	۰/۲۱۵c	۰/۳۶۷b	۰/۲۱۱b	۰/۰۶۵c	۰/۰۶۸c	۰/۰۸۵b	۰/۱۳۷b	۰/۰۹d
سرخه	۰/۲۱۰a	۰/۲۲۱a	۰/۲۴۰a	۰/۲۷۷a	۰/۳۸۷a	۰/۲۶۷a	۰/۰۸۸a	۰/۱۱a	۰/۱۴۵a	۰/۱۹۰a	۰/۱۵۲a
۶۷-۹۷	۰/۱۹۰b	۰/۲۰۰b	۰/۲۰۸b	۰/۲۱۴c	۰/۲۱۸d	۰/۲۰۶b	۰/۰۷۹a	۰/۰۸۵b	۰/۱۰۸b	۰/۱۹۴a	۰/۱۳۳b


مردانی نژاد، ش. بررسی تغییرات قوهی نامیه، مقدار پرولین و...




نمودار ۱- درصد جوانه زنی ژنوتیپ‌های بومی برنج در واکنش به مقادیر مختلف کلرید سدیم



نمودار ۲- تغییرات وزن خشک ریشه چه ی ژنوتیپ‌های بومی برنج در واکنش به مقادیر مختلف کلرید سدیم




نمودار ۳- تغییرات وزن خشک کلئوپتیل ژنوتیپ‌های بومی برنج در واکنش به مقادیر مختلف کلریدسدیم




نمودار ۴- تغییرات مقدار کلروفیل ژنوتیپ‌های بومی برنج در واکنش به مقادیر مختلف کلریدسدیم

مردانی نژاد، ش. بررسی تغییرات قوه‌ی نامیه، مقدار پرولین و...



نمودار ۵- تغییرات مقدار پرولین برگ ژنوتیپ‌های برنج در واکنش به مقادیر مختلف کلرید سدیم



نمودار ۶- تغییرات مقدار پرولین ریشه‌ی ژنوتیپ‌های برنج در واکنش به مقادیر مختلف کلرید سدیم

سپاسگزاری

مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان به خصوص مسئول محترم تحقیقات برنج این مرکز، ریاست و معاونت محترم پژوهش واحد مبارکه و پیام نور گلپایگان قدردانی می‌شود.

بدین وسیله از کلیه‌ی زحمات حوزه معاونت پژوهشی سازمان مرکزی و داوران محترم دانشگاه آزاد اسلامی که فرصت انجام این تحقیق را برای اینجانب میسر نمودند قدردانی می‌شود. از همکاری

منابع

- ۱- باقریه نجار، م. ب. ۱۳۷۳. بررسی اثر متقابل عامل شوری و ماده‌ی کلروکلین کلراید بر میزان رشد و جذب فسفر در گیاه برنج. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس.
- ۲- شهدی کومله، ع. ۱۳۷۳. بررسی تأثیر منبع و سطوح شوری و میزان ازت بر رشد و ترکیب شیمیایی دو رقم برنج *Oryza Sativa L.* پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- ۳- صالح، ج. ۱۳۷۸. تأثیر سطوح شوری و منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج و باقلا. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- ۴- عابدی، ح. ۱۳۷۷. برنج. نشریه تحقیقی ترویجی، کتاب سوم، انتشارات سازمان کشاورزی استان اصفهان.
- ۵- فراست، م. ۱۳۷۳. بررسی تأثیر تنش شوری و دما بر جوانه‌زنی و مراحل اولیه‌ی رویش ارقام برنج. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- ۶- کاوسی، م. ۱۳۷۴. تعیین مدل مناسب پیش‌بینی عملکرد برنج در شوری‌های مختلف سپیدرود، حسن سرایی و خزر. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- 7- Ashraf, M. M., and I. Naqvi. 1992. Effect of varying Na⁺/Ca²⁺ ratios in salin sand culture on some physiological parameters of four *Brassica* species. *Acta Physiological Plantarum* 14:197-205.
- 8- Bar-Num, N., and A. Polijakooff-Mayber. 1997. Salinity stress and the content of proline in roots of *Pisum sativum* and *Tamarix teragyna*. *Ann. Bot.* 41:173-179.
- 9- Bates, L. S., R. P. Waldren, and I. D. Tear. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant and Soil.* 39: 205-207.
- 10- Brayn, J. K. 1990. The biochemistry of plants. *Advances in the biochemistry of amino acid biosynthesis.* Academic Press, New York, 161-196.
- 11- Brunisma, J. 1961. A Comment on the spectrophotometric determination of chlorophyll. *Biochem Biophys Acta* 52:576-578.
- 12- Frederik, L. D., J. P. Billard, J. L. Saos, and C. Hualt. 1993. Effect of NaCl and gabaculine on chlorophyll and proline levels during growth of radish cotyledons. *Plant Physiol. Biochem.* 31(3): 303-310.
- 13- Greenway H. and R. Munns. 1980. Mechanisms of salt tolerance in non halophytes. *Annual Review of Plant Physiology*, 31, 149-190.
- 14- Khan M. S. A., A. Hamid, and M. A. Karim. 1997. Effect of sodium chloride on germination and seedling characters of different types of rice (*Oryza sativa L.*). *J. Agron. Crop Sci.* 179: 163-169.
- 15- Khatun S., and T. J. Flowers. 1995. Effects of salinity on seed set in rice. *Plant Cell Environ.* 18: 61-67.

- 16- Khatun, S., C. A. Rizzo, and T. J. Flowers. 1995. Genotypic variation in the effect of salinity on fertility in rice. *Plant Soil* 173: 239-250.
- 17- Lin, C. C., and C. H. KAO. 1995. NaCl stress in rice seedlings Effects of L-proline, L-glycinebetaine, and D-asparagine on seedling growth. *Biological Plantarum* 37(2): 305-308.
- 18- Moons, A., G. Bauw, E. Prinsen, M. M. Van Montagu, and D.V.D. Straeten. 1995. Molecular and physiological responses to abscisic acid and salts in roots of salt-sensitive and salt-tolerant Indica rice varieties. *Plant Physiol.* 107: 177-186.
- 19- Roy, D., N. Basu, A. Bhunia, and S. K. Banerjee. 1993. Counteraction of exogenous L-proline with NaCl in salt sensitive cultivar rice. *Biol Plant.* 35: 69-72.
- 20- Saleki, R., P. G. Young, and D. D. Lefelovre. 1993. Mutants of *Arabidopsis thaliana* capable of germination under saline conditions. *Plant Physiol.* 101: 839-845.
- 21- Trinchart, J. C., Y. S. Yang, and J. Rigaud. 1998. Proline accumulation inside symbiosomes of *Faba* bean nodules under salt stress. *Physiological Plantarum* 104: 38-49.
- 22- Yoshida, S. F., D. A. Cock, and J. H. Gomez. 1976. Laboratory manual for physiological studies of rice, ed. 3. International Rice Research Institute. The Philippines.