

ارزیابی زیست محیطی با رویکرد اکوسیستمی و بوم‌شناختی سرزمین

"مطالعه موردی حوزه آبخیز کلیبر چای"

مهرداد اکبرزاده^۱، سasan بابایی کفایی^۲، جابرداودی^۳ و علی فرامرزی^۳

چکیده

در ارزیابی برای توسعه سرزمین تعیین کاربری فعلی آن شامل زراعت (دیم و آبی)، دامداری و دامپروری، حفاظت خاک و آبخیزداری و... مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی امکان توسعه در سرزمین ارزیابی می‌شود. این پژوهش به منظور ارزیابی حوزه آبخیز کلیبر چای با دو رویکرد اکوسیستمی و بوم‌شناختی سیمای سرزمین صورت پذیرفت. بدین منظور منطقه مورد مطالعه دوبار و هر بار با یک رویکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع‌آوری و تهیه داده‌ها و اطلاعات شاخص‌های کمی و کیفی سرزمین بی مقیاس و به صورت کمی تبدیل شده و لایه محدودیت بر پایه منطق بولین در روی نقشه و در هر رویکرد اعمال گردید. برای این منظور با استفاده از اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم حمایت گروهی، وزن شاخص‌ها در هر رویکرد با در نظر گرفتن ماتریس‌های سازگار و میزان خطای قابل قبول محاسبه گردید. نهایتاً ارزیابی با استفاده از وزن‌دهی برای شاخص‌ها در هر رویکرد با اعمال مدل جبرانی خطی صورت پذیرفت. داده‌های به دست آمده پس از اعمال ضرایب با مدل جبرانی خطی در هر رویکرد در چهار دسته از بالاترین ترجیح به پایین ترین ترجیح مرتب شدند و نتیجه به دست آمده پس از اعمال داده‌های حاصله در قالب یک نقشه ترکیبی از هر دو رویکرد و یک ماتریس مشخص شد. انتخاب قطر ماتریس به عنوان مناسب‌ترین سایت‌ها برای هر رویکرد مورد توصیه، داده‌های به دست آمده توسط نقشه ترکیبی را نیز تایید کرد. این تحقیق مناطق دارای ترجیح خوب، متوسط و ضعیف برای توسعه سرزمین را در حوزه آبخیز کلیبر چای مشخص نمود. نتایج این پژوهش ۴۹۸۵/۱۲ هکتار از واحد هیدرولوژیک مورد مطالعه را که دارای مساحت ۵۴۸۷۲/۳ هکتار می‌باشد، مناسب برای توسعه در هر رویکرد نشان داد. هم‌چنین بیشترین همپوشانی در پایین ترین ترجیحات در هر رویکرد مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی زیست محیطی، توسعه سرزمین، اکوسیستم، بوم‌شناسی، ارسباران، حوزه آبخیز کلیبر چای

تاریخ دریافت مقاله: ۸۶/۱۲/۱۶ تاریخ پذیرش: ۸۸/۱/۲۲

۱- دانش آموخته دوره دکتری تخصصی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهر

۲- عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگا

۳- اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اکبرزاده، م. ارزیابی زیست محیطی با رویکرد اکوسیستمی و بوم‌شناختی...

ارزیابی موردنی حوزه آبخیز کلیبرچای با مساحت ۵۴۸۷۲/۳ هکتار، با دو رویکرد اکوسیستمی و بوم‌شناختی سیمای سرزمین انجام پذیرفت تا مناسب‌ترین ترجیحات در تعیین محل‌های مستعد برای توسعه سرزمین در حوزه آبخیز مورد مطالعه مشخص و همچنین تفاوت این دو رویکرد ارزیابی با یکدیگر در نتایج حاصله و نیز نقاط مشترک آن‌ها مشخص گردد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق نقشه‌های توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و نقشه‌های موجود از منطقه که توسط مهندسین مشاور جامع ایران تهیه شده بودند، به کمک داده‌های ماهواره‌ای مبنای تهیه Etm سایر نقشه‌ها قرار گرفتند. از داده‌های سنجیده ماهواره‌ای لندست ۷ برای تولید نقشه‌ها و دقیق نقشه‌های موجود در منطقه مورد مطالعه استفاده گردید که توسط نرم‌افزارهای ILWIS و ArcGIS9.2 پردازش و با کمک GPS داده‌های موجود زمین مرجع شده و اقدام به تهیه نقاط کنترل زمینی (GPS) گردید.

با توجه به این‌که در این پژوهش علمی دو رویکرد به صورت موازی برای ارزیابی سرزمین مورد استفاده قرار گرفته‌اند ابتدا روش ارزیابی با رویکرد اکوسیستمی و سپس روش ارزیابی با رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین را ذکر می‌کنیم:

الف- روش ارزیابی با رویکرد اکوسیستمی

در این تحقیق پس از تهیه نقشه‌های ارتفاع جهت و شبیب، اقدام به تهیه نقشه واحدهای شکل زمین گردید. سپس نقشه سنگ‌ها، نقشه خاک و قابلیت اراضی و نقشه و اطلاعات رستنی‌ها بر روی نقشه

مقدمه و بررسی منابع

منطقه رویشی ارسباران یکی از پنج ناحیه رویشی اصلی ایران می‌باشد که در شمال غرب ایران و استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل واقع شده و با دارا بودن حداقل مساحت نسبت به ۴ ناحیه رویشی دیگر بهدلیل قرار داشتن در شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی دارای فون و فلور منحصر به‌فرد بوده و قابلیت بالایی برای توسعه سرزمین دارد. این منطقه همچنین دارای بخش‌های حاصل‌خیز زراعی و توده‌های خاص جنگلی واقع در مناطق کوهستانی می‌باشد که بخش عمده از سلسله جبال قره داغ را شامل می‌شود. کل این منطقه که رود ارس شمالی‌ترین مرز آن را تشکیل می‌دهد با نام حوزه آبخیز ارسباران شمالی نامیده می‌شود که طول ۲۱۲/۵ کیلومتر می‌باشد و از سمت غرب به سمت شرق در جریان است. با این احتساب ۱۲ درصد آب رودخانه ارس از خاک ایران سرچشمه گرفته و ۳۴ درصد از ارس از خاک ترکیه و ۵۴ درصد از جمهوری ارمنستان و آذربایجان تأمین می‌گردد. واحد هیدرولوژیک مورد مطالعه رودخانه کلیبر چای را در بر می‌گیرد که از رودخانه‌های مهم تأمین‌کننده آب رود ارس می‌باشد و در مختصات جغرافیایی ۴۱ درجه و ۵۶ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی تا ۴۷ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی و ۳۹ درجه و ۰۱ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

از آنجا که شیوه‌های اصلی ارزیابی زیست محیطی سرزمین تاکنون به صورت موازی در کشور مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و مطالب بسیار اندکی نیز در این خصوص در سطح بین‌المللی وجود دارد. (۱۰۲ و ۳۷ و ۸۰). از این‌رو این پژوهش علمی با هدف

وزن هر شاخص برای هر رویکرد تعیین گردید و در نتایج به دست آمده پس از فیلترینگ در لایه محدودیت با در نظر گرفتن نوع رویکرد ارزیابی اعمال گردید. شکل شماره ۲ وزن هر شاخص در هر رویکرد را نشان می‌دهد. نتایج حاصل در چهار گروه برای هر رویکرد از بالاترین ترجیح برای توسعه سرزمنی به پایین‌ترین ترجیح مرتب شدند.

داده‌های به دست آمده به صورت یک نقشه ترکیبی و ماتریس 4×4 قرار گرفت که قطر ماتریس بیشترین ترجیحات را برای منطقه با هدف توسعه و با توصیه هر دو رویکرد نشان داد.

نتایج و بحث

نقشه یگان‌های زیست محیطی که در رویکرد اکوسیستمی به دست آمد شامل ۱۱۳۶۸ پلی‌گون بود و نقشه انقطاع به دست آمده از منطقه که در رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمنی حاصل شد، ۱۷۵۰ پلی‌گون را نشان داد که پس از اعمال لایه محدودیت، مساحت باقی‌مانده در منطقه مورد مطالعه $10450/1$ هکتار را نشان داد. شایان ذکر است که کل مساحت منطقه مورد مطالعه $54872/3$ هکتار می‌باشد که پس از اعمال لایه محدودیت در رویکردهای بوم‌شناسی سیمای سرزمنی و اکوسیستمی به ترتیب 81 پلی‌گون و 303 پلی‌گون باقی ماندند. نهایتاً با اعمال فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن هر شاخص مشخص و در پلی‌گون مربوطه با توجه به رویکرد و با استفاده از روش افزاینده خطی ساده ضرب گردید. میزان نرخ اشتباہ در اعمال فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن شاخص‌ها $0/09$ به دست آمد که با توجه به نظر ساعتی (خطای زیر $0/01$) رقم قابل قبولی می‌باشد.

واحدهای شکل زمین قرار گرفت. ($1, 4, 6, 5, 8, 7$ و 9). پس از اعمال لایه محدودیت بر اساس منطقه بولین داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقشه یگان‌های زیست محیطی تهیه گردید. (شکل شماره ۱).
ب- روش ارزیابی با رویکرد بوم‌شناختی سیمای سرزمنی

در ارزیابی با این رویکرد از نقشه جاده، راه‌ها و آبادی‌ها و نقشه پوشش گیاهی و نقشه کاربری اراضی، نقشه انقطاع تهیه گردید. سپس پهروها، کریدورها و ماتریکس‌ها تعیین و کنترل گردیدند. ($10, 11$ و 12 و 13 و 1). پس از تولید اطلاعات مورد نیاز برای هر رویکرد، شاخصه‌های تأثیرگذار برای توسعه سرزمنی توسط یک گروه کارشناسی مجبوب 12 نفره شناسایی و سپس کمی و بی مقیاس شدند (1 و 2 و 4). بعد از این‌که لایه‌ها و داده‌های موجود از منطقه مطالعاتی پردازش گردیدند و به واحدهای همگن تبدیل شدند، لایه محدودیت بر آن‌ها اعمال گردید. این لایه بر اساس منطق بولین تعیین و اعمال شد. خاطر نشان می‌گردد که این لایه محدودیت برای رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمنی نیز عیناً اعمال و تفاوتی در این خصوص لحاظ نشد (4 و 6 و 12 و 14). بر این مبنای مناطقی که دارای ارتفاع بالای 2000 متر از سطح دریا و شب 85% به بالا و خاک زهکشی ضعیف و شب 30% و بافت رسی بودند و همچنین کاربری اراضی شهری با حومه 10 کیلومتر و زیستگاه‌های حساس و مناطق تحت عملیات جنگل کاری که عملاً کاربردی در توسعه سرزمنی نمی‌توانند داشته باشند حذف گردید. (نقشه‌های شماره 3 و 2).

شاخصهای تأثیرگذار برای توسعه سرزمنی در منطقه با اعمال فرایند تحلیل سلسله مراتبی تلفیق شده و سپس با اعمال مدل وزن دهنی ساده خطی،

اکبرزاده، م. ارزیابی زیست محیطی با رویکرد اکوسیستمی و بوم‌شناسخنی...

تعیین کاربری آن می‌باشد. تحقیقات انجام شده در داخل کشور تاکنون صرفاً استفاده از یک رویکرد را شامل می‌شوند در صورتی که در این پژوهش به صورت مقایسه‌ای از دو رویکرد استفاده شده است. از تحقیقات انجام شده در داخل کشور می‌توان به ارزیابی زیست محیطی برای تعیین فرآیند توسعه در فرح زاد با تکیه بر رویکرد اکوسیستمی اشاره کرد که بر اساس نتایج آن، ۲۵ درصد مساحت منطقه برای توسعه مناسب بوده است (۱۱). همچنین در ارزیابی زیست محیطی دشت ارزن و بررسی توان توسعه در آن منطقه که با رویکرد اکوسیستمیک انجام شد، ۶ طبقه برای توسعه شامل زراعت، (آبی و دیم)، مدیریت مرتع، دامداری و دامپروری، حفاظت خاک و خاک‌ورزی، شیلات و جنگل کاری پیشنهاد شده است (۹). همچنین جعفری و کریمان (۱۳۷۸) برای تهیه الگوی مدیریتی در حوزه آبخیز تاش با استفاده از ارزیابی توان سرزمین از روش ارزیابی اکوسیستمیک استفاده و یک الگوی مدیریتی را با استفاده از ۶ طبقه توان ارزیابی شده پیشنهاد کردند (۷).

در سایر کشورها، لوك و همکاران (۲۰۰۶)، در ارزیابی انجام گرفته در چاتان قالا در ازمیر ترکیه به روش اکوسیستمک از داده‌های کلیماتولوژیک منطقه برای شبیه‌سازی برنامه آب و هوایی در ۱۵ سال آینده استفاده کردند. این پژوهش به تقسیم‌بندی سرزمین در چهار گروه منجر گردید که ۵/۵۳ درصد منطقه مورد مطالعه دارای قابلیت عالی برای توسعه، ۱۴/۸۳ درصد دارای قابلیت خوب برای توسعه، ۲۸/۱۳ درصد قابلیت متوسط برای توسعه و ۱۸/۱ قابلیت اندک برای توسعه را دارا شدند در صورتی که ۳۳/۴۱ درصد فاقد قابلیت توسعه شناسایی گردیدند.

نتایج به دست آمده در چهار گروه و برای هر رویکرد به شکل جداگانه به صورت زیر مرتب شدند:

۱. گروه اول بالاترین ترجیح در هر رویکرد
۲. گروه دوم مناطق دارای ترجیح خوب برای توسعه سرزمین

۳. گروه سوم مناطق دارای ترجیح متوسط برای توسعه سرزمین

۴. گروه چهارم مناطق دارای ترجیح ضعیف برای توسعه سرزمین

پس از مرتب کردن نتایج به دست آمده از هر رویکرد در گروه‌های چهارگانه، اقدام به ایجاد یک ماتریس چهار سطری و چهار ستونی گردید که با قرار دادن نقشه‌های به دست آمده از هر رویکرد پس از اعمال فرآیند تحلیل سلسه مراتبی و وزن دهی در هر نقشه با توجه به هدف ارزیابی (توسعه سرزمین) نقاط مشترک نیز هم در روی نقشه و هم با بررسی ماتریس حاصله به دست آمد. (شکل ۳ و نقشه ۳).

نتایج به دست آمده نشان داد که ۴۹۸۵/۱۲ هکتار از کل مساحت منطقه مورد مطالعه مناسب برای توسعه سرزمین در هر رویکرد می‌باشد. بیشترین مساحت مشترک بنابر توصیه هر رویکرد در گروه چهارم (دارای کمترین ترجیح) بوده و دومین مساحت مشترک در گروه اول با بیشترین ترجیح مشاهده شد. همچنین سومین اشتراک از نظر مساحت در سومین ترجیح برای توسعه در هر رویکرد بود و کمترین اشتراک در دومین ترجیح از نظر هر دو رویکرد مشاهده شد. اعداد به دست آمده از قطر ماتریس تهیه شده نیز داده‌های استنادی از ترکیب نقشه‌های نهایی را تایید کردند. (شکل ۳ و نقشه ۴).


بهترین رویکرد برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده از شبیه اکوسیستمی برای ارزیابی زراعی و

منطقه نیاز به مطالعات و پژوهش‌های بیشتری می‌باشد. با توجه به پژوهش علمی انجام شده پیشنهاد می‌شود که شیوه‌های ارزیابی سرزمین برای اکوسیستم‌های دیگر نیز انجام شده و قابلیت هر کدام از آن‌ها با توجه به نوع اکوسیستم و هدف ارزیابی برای مناطق مختلف کشور سنجیده شود، زیرا وجود یک مدل ثابت اکولوژیکی برای کل مناطق کشور ناکافی و غیر منطقی به نظر می‌رسد و تحقیقاتی از این دست می‌تواند در جهت تعریف مدل‌های مختلف برای هر اکوسیستم و تدوین برنامه توسعه آن‌ها مفید و کارآمد واقع گردد.


(۱۷). پژوهش انجام شده توسط رومانوا (۲۰۰۷) در بخشی از لینینگراد نیز نشان داد که ۱۰ درصد اراضی موجود در حوزه آبخیز براتیستا در حد متوسط قابلیت توسعه را دارا می‌باشند (۱۸).

نتیجه‌گیری کلی

در این تحقیق مناطق دارای ترجیح خوب، متوسط و ضعیف برای توسعه سرزمین در منطقه حوزه آبخیز کلیبرچای مشخص شد. نتایج نشان داد که ۴۹۸۵/۱۲ هکتار از کل مساحت منطقه بالاترین ترجیح را برای توسعه سرزمین دارا بودند. نتایج حاصله صرفاً به صورت مطالعه موردنی در واحد مطالعاتی قابل استفاده بوده و برای تعیین آن به کل حوزه‌های آبخیز




نقشه شماره ۱- موقعیت حوزه ارسباران شمالی منطقه مورد مطالعه در آن




شکل شماره ۱- شیوه ارزیابی با رویکردهای بوم‌شناسی سیمای سرزمین و اکوسیستمی



نقشه شماره ۲- نقشه انتقطع پس از اعمال لایه محدودیت با منطق بولین



نقشه شماره ۳- نقشه یگان‌های زیست محیطی پس از اعمال لایه محدودیت با منطق بولین




شكل شماره ۲- وزن شاخص‌ها در رویکردهای بوم‌شناسی سرزمین و اکوسیستمی

اکبرزاده، م. ارزیابی زیست محیطی با رویکرد اکوسیستمی و بوم‌شناسی...

GROUP_LSC	A_1	A_2	A_3	A_4
GROUP_LEC				
1	15288854.07	1522977.305	0	0
2	964989.9305	5455147.158	0	0
3	0	1115974.75	9341365.11	150984.8191
4	0	354486.0969	31667424.66	19765882.18

شکل شماره ۳- ماتریس حاصل از مرتب کردن گروهای مناسب با در نظر گرفتن ترجیحات در هر رویکرد



نقشه شماره ۴- نقشه حاصل از مرتب کردن گروهای مناسب برای توسعه سرزمین با در نظر گرفتن ترجیحات در هر دو رویکرد

منابع

- آذری دهکردی، ف. ۱۳۸۴. ارزیابی زیست محیطی دشت نتوران استان لرستان. مجله محیط‌شناسی، انتشارات دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ص. ۳۰-۳۶.
- آذری دهکردی، ف. ۱۳۸۶. اصول اکولوژی سیمای سرزمین (ترجمه). انتشارات آیلار، ص. ۹۶.
- ارسلان، ک. ۱۳۸۱. ارایه ارزیابی زیست محیطی برای تفریجگاه‌های بزرگ کشور: مطالعه موردی پارک جنگلی لویزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، ص. ۴۵-۶۸.
- اکبرزاده، م. ۱۳۸۲. تعیین کاربری اراضی حوزه آبخیز ایلگینه چای منطقه ارسباران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، ص. ۴۱-۵۶.
- بزرگیان، ق. ۱۳۸۲. ارزیابی توان اکولوژیک منطقه حفاظت شده حرا با GIS. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، ص. ۶۳-۵۶.
- بی‌نام، ۱۳۷۸. مشاور جامع ایران. گزارش مطالعاتی حوزه آبخیز ارسباران شمالی، جلد ۲، ص ۳۶۴.

- ۷- جعفری. م. و ع. کریمان. ۱۳۷۸. تهیه الگوی مدیریتی برای حوزه آبخیز تاش با استفاده از ارزیابی توان سرزمن. مجله محیط‌شناسی، انتشارات دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران. شماره ۱۶، ص. ۲۸-۲۸.
- ۸- حبیبی، ح. ر. و م. ر. آراسته. ۱۳۷۵. بررسی و رزیابی زیست محیطی واحد هیدرولوژیک آشتان، مجله محیط‌شناسی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، شماره ۹، ص. ۲۶-۱۸.
- ۹- گورگز، پ. و م. لقائی. ۱۳۷۹. ارزیابی زیست محیطی دشت ارزن و بررسی توان اکوتوریسم در آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، ص. ۸۰-۶۵.
- ۱۰- مخدوم، م. ۱۳۷۷. شالوده آمایش سرزمن. انتشارات دانشگاه تهران، ۲۸۵ ص.
۱۱. همایون. آ. و م. لقائی. ۱۳۷۷. ارزیابی توان اکولوژیک منطقه حفاظت شده دره فرح زاد. پایان‌نامه کارشناسی ارش، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ص. ۶۳-۵۶.
12. Boking, S. 2000. Structural analysis of the landscape ecology in Red Rock. *Landscape ecology* 15: 63-85.
13. Cole, M. M., Huntley, B. J. and Walker, B. H. 1982. The influencing of soils, geomorphology and geology on the distribution of plant communities in ecosystems. *Landscape Ecology* 4: 69-78.
14. David, R., and Gauston, F. 1998. An investigation to landscape ecology analysis. *Ecology* 148: 50-57.
15. Forman, T. 1986. Landscape ecology and environmental planning in the Netherlands. *Landscape Ecology* 8: 29-48.
16. Forman, T and Moore, P. N. 1992. Theoretical foundations for understanding boundaries in landscape mosaics. Springer, Verlag, New York, 236-258.
17. Look, A. 2006. Environmental evaluation and land management: case study of Chantghala, Turkey. Istanbul university, Orman fakultesi, 148 pp.
18. Romanova, A. P. 2007. Landscape and environmental planning in Russian. *Russian Ecology*, 2: 55-73.