

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۲۳

نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران
دوره ۶۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲

۳۸۹

بررسی اثر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از بخش قدامی روده ماهی قزلآلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)

- ❖ نرگس انوشه: گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
- ❖ سیدولی حسینی*: گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
- ❖ رسول مدنی: بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرماسازی رازی، کرج، ایران
- ❖ عباس زمانی: گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
- ❖ فربیا گلچین فر: بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرماسازی رازی، کرج، ایران

چکیده

آبزیان یکی از منابع مهم در تولید آنزیمهای گوارشی از جمله لیپازها هستند. در این پژوهش، تأثیر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده از بخش قدامی روده ماهی قزلآلای رنگین کمان بررسی شد. برای تخلیص، از سولفات آمونیوم در راسبسازی و از اوکترافیلتراسیون به منظور تغییض نمونه استفاده شد. فعالیت آنزیم به کمک سوبسترای نیترووفیل پالمیتات در دمایها و pH های مختلف بررسی شد تا بهترین دما و pH برای فعالیت آنزیم و پایداری آن مشخص شود. نتایج نشان داد که دما و pH بهینه برای فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از بخش قدامی روده ماهی قزلآلای رنگین کمان به ترتیب 40°C درجه سانتی گراد و 8 است. پایداری دما و pH لیپاز مذکور به ترتیب در $40-4$ درجه سانتی گراد و $8-6$ نشان داده شد.

واژگان کلیدی: پایداری دمایی، فعالیت آنزیم، قزلآلای رنگین کمان، لیپاز.

دنبال این مطالعات استفاده و کاربرد آنزیم‌ها نیز در صنایع مختلف گسترش یافته است (Shahidi and Kamil, 2001; Lu *et al.*, 2008; Sila *et al.*, 2012) از جمله تحقیقاتی که درباره آنزیم لیپاز و ویژگی‌های آن انجام شده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: در ایران حسینی و رضوی‌پور (۱۳۸۸) آنزیم لیپاز را از سویه‌های باسیلوس استخراج و محدوده دما و pH بهینه برای فعالیت آن را تعیین کردند، آسوده و قبری (۱۳۹۰) برای تولید محصولات متنوع اینا می‌کنند که محققان علت را به عملکرد اختصاصی آنزیم‌ها همچنین، قابلیت بالای فعالیت آنها در غلظت‌های پایین و در شرایط مختلف دمایی و pH ذکر کردند (Kamini *et al.*, 2000).
Lijima و همکاران (۱۹۹۸) pH مناسب برای فعالیت لیپاز استخراج شده از هپاتوپانکراس ماهی *Pagrus major* را تعیین کردند. Nayak و همکاران (۲۰۰۴) مشخص کردند که بهترین فعالیت لیپاز جداشده از روده ماهی *Labeo rohita* در دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و pH ۷ است. Islam و همکاران (۲۰۰۸) دو نوع لیپاز از ماهی *Liza parsia* را بررسی کردند و بهترین فعالیت آنزیم‌ها را در دمای ۳۵-۳۳ درجه سانتی‌گراد و pH: ۸-۸/۵ مشخص کردند. درباره لیپاز ماهیان می‌توان گفت که معمولاً در دماهای پایین فعالیت پایدارتری دارند، البته زیستگاه و دما و شرایط زیست ماهی تأثیر عمده‌ای در فاکتورهایی مانند دما و pH بهینه برای فعالیت آنزیم دارد. همچنین، اندام و بخشی از بدن که برای استخراج لیپاز به کار می‌رود در تعیین محدوده بهینه عملکرد آنزیم مؤثر است. در مقایسه با دیگر آنزیم‌های هیدرولیتیک، مانند پروتئازها و کربوهیدرازها، لیپازها به نسبت کمتر مطالعه شده‌اند و در این میان لیپازهای موجودات آبزی نسبت به لیپازهای مشابه در پستانداران، گیاهان و منابع میکروبی کمتر شناخته شده‌اند و تحقیقات کمتری نیز درباره آنها انجام گرفته است. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر پرورش قزل‌آلای در ایران

۱. مقدمه

در صنایع غذایی، آنزیم‌ها جزء ترکیباتی اند که به منزله کاتالیزور برای فرآوری مواد غذایی مختلف استفاده می‌شوند. استفاده تجاری از آنزیم‌ها در صنایع غذایی نخست، محدود به تعداد کمی از محصولات مانند فرآورده‌های غذایی تخمیری بوده است، اما امروزه واکنش‌های آنزیمی نقش مهمی را در صنایع غذایی برای تولید محصولات متنوع اینا می‌کنند که محققان علت را به عملکرد اختصاصی آنزیم‌ها همچنین، قابلیت بالای فعالیت آنها در غلظت‌های پایین و در شرایط مختلف دمایی و pH ذکر کردند (Kamini *et al.*, 2000).
Lijima و همکاران (۱۹۹۸) از مهم‌ترین آنزیم‌های گوارشی و جزء آنزیم‌های هیدرولیتیکی اند و در سطح مشترک بین چربی و آب به منزله کاتالیزور عمل می‌کنند و تری‌گلیسریدها را به اسیدهای چرب و گلیسرول هیدرولیز می‌کنند (Islam *et al.*, 2008). این آنزیم‌ها دارای کاربرد گسترده‌ای در صنایع غذایی و صنایع مرتبط با آن، به منزله کمک‌رسان فرآیند^۱، فرآوری روغن و تولید مواد روکن‌شگر^۲ (ibid). علاوه بر این، امکان استفاده آنها در شوینده‌ها^۳ و اصلاح ویژگی‌های تغذیه‌ای، حسی و فیزیکی تری‌گلیسریدهای موجود در غذای دام‌ها^۴ و غیره موجب شده است که توجه ویژه‌ای به استخراج آنها از منابع جانوری و گیاهی معطوف شود (Aryee *et al.*, 2007).

در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای درباره آنزیم‌های موجود در گونه‌های کم‌صرف آبزی و ضایعات ناشی از فرآوری آبزیان انجام شده است؛ به

-
1. Processing Aid
 2. Surfactant
 3. Detergents
 4. Modification of the Nutritional, Sensory and Physical Properties of the Triglycerides in Foodstuffs

۲. مواد و روش‌ها

۱.۲. آماده‌سازی نمونه

از بین ماهیان آماده برای عرضه به بازار تعداد ۱۵ عدد ماهی قزل‌آلای زنده در وزن بازاری (میانگین وزن ۹۰۰ گرم) در دی ۱۳۹۱ از کارگاه خصوصی پرورش ماهی در کرج به صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه بیوشیمی بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج منتقل شدند. روده ماهیان در حضور یخ جداسازی شد. نمونه‌های جداسازی شده در دمای ۲۰–درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت تا زمان انجام دادن آزمایش نگهداری شدند؛ نمونه‌ها بعد از خروج از فریزر به مدت ۲ ساعت در دمای یخچال (۴ درجه سانتی گراد) قرار گرفتند تا از حالت انجماد خارج شوند؛ سپس، عمل چربی‌زدایی با استفاده از استون سرد (۲۰–) انجام شد. برای چربی‌زدایی نمونه، پس از تعیین حجم با استون سرد با نسبت ۱ به ۳ مخلوط و عمل یکنواخت‌سازی با هموژنایزر (HeidolphDix 900, Sigma Co. St. Louis, MO, US) در حضور یخ انجام شد (Islam *et al.*, 2009). نمونه هموژن شده با استفاده از کاغذ صافی (Whatman grade No. 2, Lawrence, Kansas, USA) روی فیلتر چندین بار با استون سرد شسته شد تا چربی‌زدایی به طور کامل انجام گیرد. سپس، مواد روی فیلتر به مدت یک شب‌انه روز در دمای اتاق قرار گرفت تا خشک شود. پودر خشک شده با نسبت ۱ به ۱۰ با بافر استخراج (25mM Tris-HCl, pH=7.8, 5mM benzamidine-HCl, 1mM EDTA, 10%glycerol) مخلوط و به مدت یک ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد روی همزن مغناطیسی قرار گرفت. بعد از آن، در ۸۰۰۰g در دمای ۴ درجه سانتی گراد و به

رشد چشمگیری یافته است. به دنبال این روند رشد درخور توجه، مقدار زیادی از ضایعات از جمله امعا و احشای آنها به محیط وارد شده که منجر به آلودگی محیط زیست شده است. هر چند در برخی موارد از این ضایعات به منظور تولید آرد ماهی استفاده شده است، اما این شکل استفاده چندان مطلوب نیست. چرا که آنها حاوی مقادیر درخور ملاحظه‌ای از ترکیبات زیست‌فعال^۱ ارزشمندند که با عملیاتی خاص می‌توان استفاده بسیار مناسبی از آنها کرد. فعالیت آنزیم تحت تأثیر عواملی مانند دما، pH و غلظت سوبسترات است. همه پروتئین‌ها از جمله آنزیم‌ها در محدوده خاصی از دما و pH فعالیت دارند و پایدارند. دما با تغییر ساختار و شکل آنزیم و در نهایت تغییر در عملکرد آن تأثیر خود را اعمال می‌کند؛ به طوری که، در دمای بیش از حد مناسب برای فعالیت، آنزیم غیر فعال می‌شود یا تغییر شکل می‌دهد. pH نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم و مؤثر در فعالیت آنزیم است؛ به گونه‌ای که، pH خارج از حد بهینه باعث تغییر شکل آنزیم و تغییر در سرعت واکنش می‌شود. دما و pH دو فاکتور اصلی مؤثر در فعالیت و کارایی آنزیم‌اند، چرا که سنجش فعالیت آنزیم در یک محدوده فیزیولوژیکی دما و pH اطلاعات ارزشمندی درباره اختلافات بالقوه در فعالیت آنزیم در ماهی زنده به دست می‌دهد. همچنین، این داده‌ها برای شبیه‌سازی مناسب عمل گوارش تحت شرایط آزمایشگاهی مورد نیازند. عموماً در مقادیر دما و pH فیزیولوژیکی، لیپاز فعالیت مناسبی دارد (Nolasco *et al.*, 2011). بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و تعیین دما و pH مناسب برای فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است.

1. Bioactive Compounds

تغليظ شود. اولترافیلتراسيون برای تغليظ و تا حدودی تخلیص سریع ماکرومولکول‌های مانند پروتئین طراحی شده است. این دستگاه دارای غشایي منفذدار است که قطر منفذ آن بسیار کم و تا حدود ۰/۰۱ میکرون است. مواد ریز از این منفذ عبور می‌کنند و مواد درشت مانند پروتئین‌ها روی غشا باقی می‌مانند و در نتیجه این عمل تغليظ صورت می‌گیرد (ibid).

۳.۲. سنجش فعالیت آنزیم

برای سنجش فعالیت آنزیم، ۱ میلی‌لیتر از محلول سوبسترا (۱/۶۵ میلی‌مولار سوبسترا نیتروفنیل پالمیتات) (Sigma, St. Louis, MO, USA) حل شده در (50 mM Tris HCl, pH=8, 0.4% Tween, 0.1% Arabic gum) ایزوپروپانول) به ۹ میلی‌لیتر از بافر (Kordel *et al.*, 1991) میکرولیتر از این محلول با ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه آنزیمی مخلوط شد. پس از ۲۰ دقیقه انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، قرائت نوری در طول موج ۴۱۰ نانومتر در اسپکتروفوتومتر انجام سپس، فعالیت آنزیم بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (Kordel *et al.*, 1991):

$$\frac{\text{حجم مخلوط واکنش (میلی‌متر)}}{\text{میزان پروتئین (میلی‌گرم در میلی‌لیتر)}} \times \frac{1000}{\text{زمان واکنش (دقیقه)}} \times \frac{410}{17500} = \text{فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز (واحد در میلی‌گرم پروتئین)}$$

بعد از آن فعالیت آنزیم سنجش شد (ibid).

۵.۲. تعیین دمای پایداری

برای تعیین دمای پایداری، نمونه آنزیمی در دماهای ۴، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ برای ۳۰ دقیقه در حالت انکوباسیون قرار گرفت. در پایان دوره انکوباسیون نمونه آنزیمی به سرعت سرد شد سپس، با محلول سوبسترا-بافر مخلوط و برای ۲۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد

مدت ۴۵ دقیقه سانتریفیوژ (IEC Model B-22M programMable floor centrifuge, US) سپس، محلول رویی (سوپرناکت) به منزله عصاره خام آنزیمی در نظر گرفته شد (Aryee *et al.*, 2007).

۲.۲. راسب‌سازی با سولفات آمونیوم

نخست، عصاره خام آنزیمی با بافر استخراج مخلوط سپس، تا حصول اشباعیت ۶۰ درصد با سولفات آمونیوم (Sigma, St. Louis, MO, USA) با همزن مغناطیسی (در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ ساعت) مخلوط شد. سپس، در ۸۰۰ g و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۴۵ دقیقه سانتریفیوژ انجام شد. پس از آن، رسوب حاصل جمع‌آوری و با بافر استخراج مخلوط شد و به مدت یک شب در مجاور بافر استخراج، در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، عمل دیالیز درون کیسه‌های دیالیز (Sigma, St. Louis, MO, USA) انجام گرفت تا یون‌های سولفات آمونیوم حذف شوند. بعد از آن، در ۸۰۰ g و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۴۵ دقیقه سانتریفیوژ انجام شد. سپس، محلول از کاغذ صافی واتمن عبور داده شد و پس از آن اولترافیلتراسيون انجام گرفت تا نمونه

در این فرمول ۱۷۵۰۰ بیانگر ضریب تاریکی برای پارا-نیتروفنیل است که محصول هیدرولیز سوبسترا نیتروفنیل پالمیتات با آنزیم لیپاز است.

۴.۲. تعیین دمای بهینه

برای تعیین دمای بهینه، محلول سوبسترا بافر با نمونه آنزیمی مخلوط و به مدت ۲۰ دقیقه در دماهای ۴، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوباسیون شد و

در حالت انکوباسیون قرار گرفت (ibid); سپس، فعالیت نسبی آنزیم بر اساس فرمول زیر محاسبه شد:

$$\frac{\text{فعالیت اختصاصی آنزیم بر نمونه حرارت داده شده}}{\text{فعالیت اختصاصی در نمونه شاهد (بدون حرارت بدھی)}} \times 100$$

آنژیمی مخلوط شد و به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۳۷

درجه سانتی گراد به حالت انکوباسیون قرار گرفت و

فعالیت آنزیم اندازه گیری شد (ibid).

۶.۶. تعیین pH بهینه

برای تعیین pH بهینه، نخست محلول سوبسترا بافر با pH های مختلف (جدول ۱) تهیه سپس، با نمونه

جدول ۱. انواع بافرهای مورد استفاده برای آماده سازی محلول بافر- سوبسترا ۱/۶۵ میلی مولار نیتروفنیل پالمیتات

بافر	pH
۰/۲ مولار بافر فسفات	۶
۰/۲ مولار بافر فسفات	۷
۰/۲ مولار بافر تریس	۸
۰/۲ مولار بافر کربنات- بیکربنات	۹

گرفت. سپس، نمونه آنزیمی انکوبه شده با محلول

سوبسترا مخلوط و به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۳۷

درجه سانتی گراد قرار گرفت (ibid); فعالیت نسبی از

طریق فرمول زیر محاسبه شد:

۷.۲. تعیین pH پایداری

برای تعیین pH پایداری، نخست نمونه آنزیمی با

بافرهای مختلف (جدول ۲) مخلوط و به مدت ۳۰

دقیقه در حمام آبی با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار

$$\frac{\text{فعالیت اختصاصی آنزیم بر نمونه انکوبه شده با pH مختلف}}{\text{فعالیت اختصاصی در نمونه شاهد}} \times 100$$

جدول ۲. بافرهای مورد نیاز برای انکوباسیون نمونه آنزیمی در بررسی پایداری pH

بافر	pH
۰/۲ مولار بافر پتاسیم کلراید	۲
۰/۲ مولار بافر استات	۴
۰/۲ مولار بافر فسفات	۶
۰/۲ مولار بافر فسفات	۸

در صد مقایسه شدند. همه ارزیابی ها نیز در ۳ تکرار

انجام گرفت. برای آنالیز نتایج و رسم نمودارها از

نرم افزارهای ۱۷ و SPSS Excel استفاده شد.

۸.۲ آنالیز آماری

برای بررسی وجود یا نبود تفاوت معنی دار بین

میانگین نتایج از تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA)

استفاده شد. میانگین ها با آزمون دانکن در سطح ۵

بررسی اثر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از ...

۳. نتایج

افزایش و از ۴۰ تا ۶۰ فعالیت آن کاهش می‌یابد. بررسی پایداری pH آنزیم لیپاز نشان داد که با افزایش pH از ۲ تا ۴ فعالیت آنزیم به طور معنی‌داری افزایش و از ۴ تا ۶ فعالیت آن به طور معنی‌داری کاهش یافت. در محدوده pH ۸-۶ کاهش فعالیت آنزیم معنی‌دار نبود و آنزیم در این محدوده فعالیت پایداری داشت. pH بهینه برای فعالیت آنزیم لیپاز ۸ بود به طوری که، pH از ۶ تا ۸ افزایش و از ۸ تا ۹ کاهش یافت.

بر اساس نتایج، دمای بهینه برای فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ۴۰ درجه سانتی‌گراد بود؛ به طوری که، از دمای ۴ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد فعالیت آنزیم لیپاز به طور معنی‌داری افزایش و از ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد فعالیت آن به طور معنی‌داری کاهش یافت. پایداری دمایی نیز نشان داد که با افزایش دما از ۳۰ به ۴۰ فعالیت آنزیم

جدول ۳. اثر دما در فعالیت نسبی آنزیم لیپاز قزل‌آلای رنگین‌کمان (دمای بهینه)

دما	میانگین فعالیت \pm انحراف معیار
۴	۷۷/۴ \pm ۰/۹۷ ^c
۳۰	۸۷/۴ \pm ۰/۵ ^b
۴۰	۹۳/۷ \pm ۱/۲ ^a
۵۰	۶۴/۶ \pm ۰/۹۶ ^d
۶۰	۴۴/۷ \pm ۰/۹ ^e

اختلاف بین آن دسته که حرف مشترک ندارند معنی‌دار است.

جدول ۴. اثر دما در فعالیت نسبی آنزیم لیپاز قزل‌آلای رنگین‌کمان (دمای پایداری)

دما	فعالیت \pm انحراف معیار
۴	۹۷/۲ \pm ۱/۲ ^a
۳۰	۹۲/۲ \pm ۱/۳ ^b
۴۰	۹۸/۰ \pm ۱/۵ ^a
۵۰	۷۰/۱ \pm ۱/۳ ^c
۶۰	۶۵/۷ \pm ۱/۱ ^d

اختلاف بین آن دسته که حرف مشترک ندارند معنی‌دار است.

جدول ۵. اثر pH در فعالیت نسبی آنزیم لیپاز قزل‌آلای رنگین‌کمان (pH بهینه)

pH	فعالیت \pm انحراف معیار
۶	۱۰/۸ \pm ۱/۲ ^d
۷	۱۸/۰ \pm ۱/۵ ^c
۸	۴۱/۱ \pm ۱/۱ ^a
۹	۲۷/۲ \pm ۱/۳ ^b

اختلاف بین آن دسته که حرف مشترک ندارند معنی‌دار است.

جدول ۶. اثر pH در فعالیت نسبی آنزیم لیپاز قزلآلای رنگین کمان (pH پایداری)

فعالیت ± انحراف معیار	pH
$۳۲/۰۰ \pm ۱/۱^b$	۲
$۵۱/۹۴ \pm ۱/۱^a$	۴
$۳۲/۰۰ \pm ۱/۲^b$	۶
$۳۱/۰۰ \pm ۱/۵^b$	۸

اختلاف بین آن دسته که حرف مشترک ندارند معنی دار است.

درجه سانتی گراد و ۸ بود. بسیاری از مطالعات pH بهینه برای فعالیت لیپاز را بین ۶-۷ تعیین کرده‌اند (Iijima *et al.*, 1998; Aryee *et al.*, 2007; Noriega-Rodriguez *et al.*, 2009; Smichi *et al.*, 2010) با افزایش دما، به علت دناتوره شدن پروتئین فعالیت آنزیم کاهش می‌باشد. همچنین، قزلآلای رنگین کمان ماهی سردابی است و از آنجا که این ماهی در دماهای پاییز زیست می‌کند بنابراین، آنزیم‌های این گونه نیز در دمای پاییز آدپته و در دماهای بالا دناتوره می‌شوند و فعالیت خود را از دست می‌دهند. تفاوت در دمای بهینه برای ماهیان مختلف بستگی به دمای زیستگاه آبزی (Borlongan, 1990) و پایداری دمایی لیپازها دارد (Sukarno *et al.*, 1996).

در زمینه آنزیم لیپاز و ویژگی‌های بیوشیمیایی آن تحقیقاتی انجام شده است. آنزیم لیپاز از هپاتوپانکراس ماهی (red sae bream (*Pagrusmajor*) بررسی شد و نتایج نشان داد که فعالیت این آنزیم در pH ۷-۹ مناسب بود (Iijima *et al.*, 1998). آنزیم‌های لیپاز جداسده از بخش روده و هپاتوپانکراس در pH خشی و تا حدی قلیایی فعالیت بهتری دارند. تحقیقی درباره استخراج و بررسی rohu ویژگی‌های شیمیایی آنزیم لیپاز از روده ماهی (Labeorohita, Cyprinidae) انجام شد؛ نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین فعالیت آنزیم در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و ۷ pH بود (Nayak *et al.*, 2004).

۴. بحث و نتیجه‌گیری

بسیاری از لیپازها از منابع مختلف تخلیص شده‌اند و از نظر ویژگی‌هایی نظیر فعالیت، پایداری نسبت به دما و pH، اثر یون‌های فلزی و سایر خصوصیات شیمیایی بررسی شده‌اند (Sharma *et al.*, 2001). در سال‌های اخیر، به آنزیم‌های آبزیان به علت خواص منحصر به فردی مانند داشتن فعالیت بالا در دما و pH‌های مختلف توجه ویژه‌ای شده است (Klomklao, 2008). عمدۀ محققان وجود لیپازها و فعالیت‌های لیپولیتیک را در غدد هاضمه (digestive glands)، کبد و بافت‌های چربی (adipose tissues) گونه‌های مختلف آبزیان گزارش کرده‌اند (Aryee *et al.*, 2007).

به نظر بسیاری از محققان لوله گوارش ماهی، به خصوص زوائد پیلوریک و روده، محل آنزیم‌های گوارشی (پروتئازها، لیپازها و آمیلازها) با فعالیت بالاست (Deguara *et al.*, 2003; Jun-Sheng *et al.*, 2006; Xiong *et al.*, 2011). در این تحقیق اثر pH و دما در فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده از بخش قدامی روده ماهی قزلآلای رنگین کمان بررسی شد. بر اساس نتایج، آنزیم لیپاز استخراج شده از روده ماهی قزلآلای رنگین کمان در دمای ۴۰-۴ درجه سانتی گراد و pH=۶-۸ فعالیت پایداری داشت. دما و pH بهینه برای لیپاز تخلیص شده در این مطالعه به ترتیب ۴۰

دماهای پایداری برای فعالیت آنزیم متفاوت است. بنا بر نتایجی که در مطالعات ذکر شده در بالا گفته شد، چنین برداشت می شود که آنزیم استخراج شده از آبزیان در دماهای پایین فعالیت بیشتری دارد؛ در نتیجه برای غیرفعال کردن آنها نیازی به حرارت بالا نیست و در برخی موارد دمای محیط در این خصوص کافی است. بنابراین، از یک طرف باعث صرفه جویی در انرژی و از طرف دیگر، مانع تغییر در کیفیت فرآورده تولید شده به کمک آنزیم می شود. نتایج این پژوهش در صنایع، خصوصاً صنایع غذایی، اهمیت و کاربرد دارد. با توجه به اینکه بسیاری از مواد غذایی به دمای بالا حساس‌اند، آنزیم آبزیان که در دماهای پایین فعالیت بهتری دارد در این صنایع می‌تواند استفاده شود. از آنجا که در این مطالعه آنزیم لیپاز روده بررسی شده است، بنابراین، در pH قلیایی نسبت به pH اسیدی فعالیت بیشتری نشان می‌دهد. اختلاف در دمای بهینه برای فعالیت لیپاز در این پژوهش و مطالعاتی که در بالا به آن اشاره شد می‌تواند به علت اختلاف در زیستگاه و دمای زیست موجود زنده باشد. به‌طوری که، ماهی قزل‌آلă، که گونه‌ای سردابی است، آنزیم جداشده از آن حتی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد دارای فعالیت پایداری است.

آنزیم از عضلات پشتی ماهی کفال استخراج شد و ویژگی‌های آنها بررسی شد. بر اساس نتایج، بهترین pH برای فعالیت این آنزیم‌ها ۸/۵-۸ و پایداری فعالیت آنها در pH: ۲/۵-۱۰/۵ بود و حداقل فعالیت آنزیم در ۳۳-۳۵ درجه سانتی‌گراد نشان داده شد. لیپازهای جداشده از عضلات پشتی معمولاً در pH کمتری نسبت به لیپازهای استخراج شده از امعا و احشای ماهی فعالیت بهینه دارند. لیپازهای بخش امعا و احشای، به ویژه روده و پانکراس، در pH قلیایی فعالیت بیشتری دارند. بر اساس بررسی ای که درباره استخراج آنزیم لیپاز از امعا و احشای ماهی کفال خاکستری (*Mugil cephalus*) و خصوصیات بیوشیمیایی آن انجام شد، مشخص شد که بیشترین فعالیت آنزیم در pH=۸ و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و بیشترین پایداری در pH=۴-۱۰ و دمای ۵۰ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد بود (Aryee et al., 2007). لیپازی که از زوائد پیلوئیک ماهی (Sparus aurata) استخراج شد در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و pH=۸/۵ بیشترین فعالیت را داشت. این آنزیم در pH قلیایی نسبت به pH اسیدی پایداری بیشتری را نشان داد (Nolasco et al., 2011). به‌طور کلی، با توجه به بخشی از بدن ماهی که آنزیم از آن جداسازی و بررسی می‌شود دامنه pH و

References

- [1]. Aryee, A., Simpson, B., Villalonnga, R., 2007. Lipase fraction from the viscera of Grey mullet (*Mugil cephalus*) Isolation, partial purification and some biochemical characteristics. Enzyme and Microbial Technology 40, 394-402.
- [2]. Asoodeh, A., Ghanbari, T., 2011. Lipase biochemical features alkalo - thermophilic *Bacillus subtilis* strain isolated from DR8806. Seventh National Biotechnology Congress of Iran, Tehran - Institute for Energy.
- [3]. Borlongan, I.G., 1990. Studies on the Digestive Lipases of Milkfish, *Chanos chanos*, Aquaculture 89, 315-325.
- [4]. -Deguara, S., launcey, K., Agius, C., 2003. Enzyme activities and pH variations in the digestive tract of gilthead sea bream.1 Fish Bioi 62, 1033-1043.
- [5]. Hosseini, F., Razavipour, R., 2009. Optimization of lipase production by *Bacillus* strains isolated from activated sludge. Journal of Microbiology, First year (3).

- [6]. Iijima, N., Tanka, S., Ota, Y., 1998. Purification and characterization of bile salt activated lipase from the hepatopancreas of red sea bream, *Pagrus major*. Fish Physiology and Biochemistry 18, 59-69.
- [7]. Islam, M.A., Absar, N., Bhuiyan, A.S., 2008. Isolation, purification and characterization of lipase from Grey mullet (*Liza parsia* Hamilton, 1822). Asian Journal of Biochemistry 3(4), 243-255.
- [8]. Jun-Sheng, L., Jian-Lin, L., Ting-Ting, W., 2006. Ontogeny of protease, amylase and lipase in the alimentary tract of hybrid juvenile tilapia (*Oreochromis niloticus* × *Oreochromis aureus*). Fish Physiology and Biochemistry 32, 295-303.
- [9]. Kamini, N.R., Fujii, T., Kurosu, T., Iefuji, H., 2000. Production, purification and characterization of an extracellular lipase from the yeast, *Cryptococcus* sp. Process Biochemistry 36, 317-324.
- [10]. Klomklao, S., 2008. Digestive proteinases from marine organisms and their applications. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 30 (1): 37-46.
- [11]. Kordel, M., Hofmann, B., Schomburg, D., Schmid, R., 1991. Extracellular lipase of *Pseudomonas* sp. Strain ATCC 21808: purification, characterization, crystallization and preliminary X-ray diffraction data. Journal of Bacteriology 173, 4836-41.
- [12]. Lu, B.J., Zhou, L.G., Cai, Q.F., Hara, K., Maeda, A., Su, W.J., Cao, M.J., 2008. Purification and characterisation of trypsins from the pyloric caeca of Mandarin fish (*Siniperca chuatsi*). Food Chemistry 110, 352-360.
- [13]. Nayak, J., Nair, P.G.V., Mathew, S., Ammu, K., 2004. A study on the intestinal lipase of India major carp (*Labeo rohita*). Asian Fisheries Science 17, 333-340.
- [14]. Nolasco, H., Moyano-Lopez, F., Vega-Villasant, F., 2011. Partial characterization of pyloric-duodenal lipase of gilthead seabream (*Sparus aurata*). Fish Physiology and Biochemistry 37, 43-52.
- [15]. Noriega-Rodriguez, J.A., Gamez-Meza, N., Alanis-Villa, A., Medina-Juarez, L.A., Tejeda-Mansir, A., Angulo-Guerrero, O., Garcia, H.S. 2009. Extraction and fractionation of lipolytic enzyme from viscera of Monterey sardine (*Sardinops sagax caerulea*). International Journal of Food Science and Technology 44, 1223-1228.
- [16]. Shahidi, F., Janak Kamil, Y.V.A., 2001. Enzymes from fish and aquatic invertebrates and their application in the food industry. Trends in Food Science & Technology 12, 435-464.
- [17]. Sharma, R., Chistiww, Y., Banerjee, U.C., 2001. Production, purification, characterization, and applications of lipases. Biotechnology Advance 19, 627-662.
- [18]. Sila, A., Nasri, R., Bougatef, A., Nasri, M., 2012. Digestive alkaline proteases from the goby (*Zosterisessor ophiocephalus*): Characterization and potential application as detergent additive and in the deproteinization of shrimp wastes, Journal of Aquatic Food Product Technology 21, 118-133.
- [19]. Smichi, N., Fendri, A., Chaabouni, R., Ben Rebah, F., Gargouri, Y., Miled, N. 2010. Purification and biochemical characterization of and acid-stable lipase from the pyloric caeca of Sardine (*Sardinella aurita*). Applied Biochemistry and Biothecnology, 162: 1483- 1496.
- [20]. Sukarno, K., Takahashi, M., Hatano, Y., Sakurai, Y. 1996. Lipase from neon flying Squid hepatopancreas: Purification and properties. Food Chemistry, 57(4): 515-521.
- [21]. Xiong, D.M., Xie, C.X., Zhang, H.J., Liu, H.P., 2011. Digestive enzymes along digestive tract of a carnivorous fish *Glyptosternum maculatum* (Sisoridae, Siluriformes). Journal Animal Physiology and Animal Nutrition 95(1), 56-64.