

مقایسه کیفیت ماندگاری سوریمی ماهی کیلکا (*Clupeonella* *cultriventris*) تهیه شده به روش شستشو و تغییر pH طی دوره‌ی انجماد

زهرة قیامی^۱، حسین خدایی^۱، سید ولی حسینی^{۲*}

۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

۲. دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۷ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

چکیده

در تحقیق حاضر کیفیت ماندگاری سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (*Clupeonella cultriventris*) تهیه شده به دو روش شستشو و تغییر pH در طی دوره‌ی نگهداری انجماد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های تهیه شده به مدت سه ماه در شرایط انجماد نگهداری و کیفیت آن‌ها از نظر برخی از شاخص‌های مرتبط با کیفیت شامل شاخص اکسیداسیون ترکیبات ثانویه چربی (TBA)، مجموع ترکیبات ازتة فرار (TVB-N) و ظرفیت نگهداری آب (WHC) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان اکسیداسیون چربی (شاخص TBA) در روش شستشو بیشتر از روش تغییر pH بود ($P < 0/05$) ولی مقادیر آن در هر دو روش در سطح قابل پذیرش بودند. از نظر شاخص ظرفیت نگهداری آب، هر چند در هر دو روش مقدار آن در طول دوره‌ی نگهداری کاهش یافت، اما این کاهش در روش تغییر pH با شدت بیشتری اتفاق افتاد و تغییر معنی‌داری از این نظر با سوریمی تهیه شده به روش شستشو نشان داد ($P < 0/05$). مقادیر اندازه‌گیری شده TVB-N در سوریمی تهیه شده به روش شستشو کمی بیشتر از روش تغییر pH بود. نتایج نشان داد که مقادیر مرتبط با شاخص‌های کیفیت اندازه‌گیری شده در سوریمی تهیه شده به روش تغییر pH از مطلوبیت بهتری نسبت روش شستشو را دارا می‌باشد.

واژگان کلیدی: کیلکای معمولی، کیفیت سوریمی، تغییر pH، نگهداری در انجماد.

۱. مقدمه

کمتر از حالت یونیزه آب دوست خواهند بود. به همین دلیل در نقطه ایزوالکتریک، حلالیت پروتئین و ظرفیت اتصال آب به آن به کمترین مقدار خود می‌رسد (Gehring *et al.*, 2011). پروتئین‌های استخراجی به شیوه‌ی بازی. اسیدی دارای خصوصیات عملکردی مناسبی جهت استفاده در صنایع غذایی می‌باشند (Taskaya *et al.*, 2009). مطالعات نشان داده‌اند که همزمان با استخراج پروتئین به این شیوه، چربی موجود در ماده اولیه نیز استخراج می‌گردد (Gehring, 2011; Hultin and Kellehr, 2002). از آن‌جا که چربی ماهیان نقش اصلی را در بروز و تشدید فساد آن‌ها بازی می‌کند (Kristinsson *et al.*, 2000)، به نظر می‌رسد که محصول به‌دست آمده با این روش، قادر خواهد بود از مدت ماندگاری بالاتری نیز برخوردار باشد. تغییر pH ماهی در pH قلیایی، اجازه‌ی بازیابی پروتئین‌ها با خواص عملکردی بهتر را می‌دهد و بنابراین حرارت بهتری به ژل القا می‌شود و در نتیجه خواص بافت و رنگ بهتر می‌شود (Kristinsson *et al.*, 2006; Nolsoe *et al.*, 2009). بنابراین به‌نظر می‌رسد که هر کدام از شیوه‌های مذکور مورد استفاده در تهیه سوریمی، تأثیر خاصی بر کیفیت ماندگاری محصول به‌جای بگذارند. از همین رو مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر هر یک از دو روش شستشو و تغییر pH بر کیفیت ماندگاری محصول (طی دوره‌ی انجماد به مدت سه ماه براساس شاخص‌های (TBA، TVB-N و WHC) به‌دست آمده از کاربرد آن‌ها بر ماهی مورد مطالعه (کیلکای معمولی) می‌باشد.

۲. مواد و روش‌ها

۲.۱. آماده‌سازی نمونه‌ها

در این تحقیق از ماهی کیلکای معمولی دریای خزر در اوزان بازاری استفاده شد. نمونه‌های مورد نیاز (به میزان تقریبی ۸ کیلو) از صید روزانه بندر انزلی تهیه شد. انتخاب نمونه‌ها به‌صورت تصادفی و از بین نمونه‌ها سالم (فاقد آسیب دیدگی فیزیکی) و تقریباً هم‌اندازه بود. نمونه‌ها پس از تهیه و شستشو با آب تمیز، بلافاصله در جعبه یونولیت همراه با یخ (نسبت ۳ به ۱ از یخ و ماهی) به آزمایشگاه منتقل و سپس تخلیه

ماهیان به‌دلیل داشتن پروتئین با ارزش غذایی بالا (نظیر هضم آسان و دارا بودن تمامی اسیدهای آمینه ضروری)، همچنین ویتامین‌ها و مواد معدنی منحصر به فرد اهمیت بالایی در رژیم غذایی انسان‌ها دارند (Haliloglu *et al.*, 2004). صرف نظر از ارزش غذایی بالای پروتئین ماهی، آن‌ها دارای خصوصیات عملکردی منحصر به‌فردی نظیر توانایی تولید ژل، ظرفیت امولسیون‌کنندگی، ظرفیت نگهداری آب و غیره می‌باشند (Tahergorabi *et al.*, 2012)، که از این ویژگی‌ها می‌توان در صنایع غذایی-تبدیلی از جمله سوریمی (Surimi) استفاده کرد. سوریمی یک واژه ژاپنی است و به کنسانتره پروتئینی از گوشت چرخ‌کرده ماهی اطلاق می‌گردد، که طی فرآیند مختلف نظیر تهیه فیله از ماهی مورد نظر، استخوان-گیری و چرخ کردن گوشت آن و سپس شستشوی چند باره آن با آب سرد (به‌منظور حذف ترکیبات مختلف از قبیل چربی، خون، آنزیم‌ها و سایر پروتئین‌های سارکوپلاسمی) و در نهایت فرآیند آبگیری، مخلوط کردن گوشت شسته شده آن با مواد محافظت‌کننده از پروتئین در برابر سرما (سوریمی منجمد) به‌دست می‌آید. برآوردها نشان می‌دهد که میزان تولید جهانی سوریمی حدود هشت میلیون تن می‌باشد که تقریباً تمامی آن به روش مرسوم (شستشو) تهیه می‌شود (FAO, 2012). نظر به وجود برخی معایب در روش مرسوم تهیه سوریمی مانند بازدهی پایین، نیاز به مصرف آب فراوان و بدنبال آن مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع آن، حذف عمده ترکیبات ضد اکسیداسیون‌های طبیعی موجود در گوشت و غیره، محققین را بر آن داشت تا از روشی کارآتر جهت تهیه سوریمی از آبزیان استفاده نمایند.

یکی از مهمترین روش‌ها، تهیه پروتئین ایزوله شده ماهی (Fish protein isolate) به روش تغییر pH محیط (pH-shifting) می‌باشد. اساس تهیه پروتئین ایزوله شده ماهی به‌روش تغییر pH، بر تغییر در بار الکتریکی پروتئین ماهی از طریق افزودن اسید یا قلیا مبتنی بوده و بدین طریق موجب انحلال و رسوب پروتئین ماهی می‌گردد. پروتئین‌های ماهی در نقطه ایزوالکتریک خود از نظر بار الکتریکی خنثی بوده و

در فاز میانی، لازم است که pH مخلوط با اسید به pH ایزوالکتریک پروتئین یعنی pH حدود ۵/۵ رسانده شود که به آن اسیدکلریدریک ۶ مولار اضافه و به مدت ۱۰ دقیقه با دستگاه هموژنایزر مخلوط و سپس مجدداً تحت سانتریفیوژ در ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه و در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار گرفت (Nolsoe and Undel, 2008) و سپس پروتئین ایزوله از فاز رویی (آب) جدا شد.

۴.۲.۴. آزمایشات

۱.۴.۲. اندازه گیری تیوباربتوریک اسید TBA

مقدار ۱۰ گرم از نمونه با ۳۵ سی سی اسید پرکلریک ۴٪ هموژن و سپس به مدت ۱۰ دقیقه در محیط تاریک قرار داده شد و سپس محلول صاف گردید. سپس ۵ سی سی از محلول را به همراه ۵ میلی لیتر از معرف TBA به لوله های خشک درب دار منتقل و آنگاه در حمام آب با دمای ۹۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفت و پس از آن در دمای محیط سرد شد و مقدار جذب (As) توسط دستگاه اسپکتروفتومتری (UNICO, USA) در طول موج ۵۳۲ نانومتر در مقابل شاهد (Ab) قرائت گردید. مقدار TBA براساس رابطه زیر محاسبه گردید (Nolsoe and Undel, 2008).

میزان تیوباربتوریک اسید (میلی گرم مالون دی آلدئید در کیلوگرم بافت) = $\frac{8}{1} \times$ میزان جذب

۲.۴.۲. سنجش مجموع بازهای نیتروژنی فرار

(TVB-N)

اندازه گیری TVB-N به روش کلدال و با قرار دادن ۱۰ گرم نمونه به علاوه ۲ گرم اکسید منیزیم و افزودن ۲۵۰ سی سی آب مقطر داخل بالن و در نهایت جمع آوری بازهای از ته فرار در داخل محلول شامل اسید بوریک ۲ درصد و متیل رد به عنوان شاخص و تیتراژ محلول زرد رنگ حاصله با اسید سولفوریک ۰/۱ نرمال تا ایجاد رنگ ارغوانی، انجام گردید و سپس با فرمول زیر محاسبه گردید (برحسب میلی گرم نیتروژن در ۱۰۰ گرم نمونه سوریمی) (Goudlas and Kontominas, 2005):

TVB-N = وزن نمونه $\times (1/4 \times 100)$ میزان اسید


شکمی و شستشو داده شد. برای تهیه سوریمی و استخراج پروتئین از دو شیوه شستشو (مرسوم) و روش تغییر استفاده شد. نمونه ها پس از تهیه به مدت سه ماه در شرایط انجماد نگهداری و آن گاه در روزهای ۱، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ از لحاظ برخی از شاخص های ماندگاری مورد بررسی قرار گرفت.

۲.۲. روش شستشو

برای تهیه سوریمی به روش شستشو، مطابق روش Shimizu و همکاران (۱۹۹۲) عمل گردید. برای تهیه سوریمی، فیله ها به وسیله دستگاه چرخ گوشت با قطر منافذ ۲ میلی متر چرخ گردید. گوشت چرخ شده طی ۳ مرحله و در هر مرحله به مدت ۱۵ دقیقه با آب مقطر سرد (نسبت ۴ به ۱ آب به گوشت ماهی) با درجه حرارت تقریبی ۴ درجه سانتیگراد شستشو گردید. مرحله سوم شستشو با آب نمک ۰/۳ درصد انجام گردید. پس از هر مرحله شستشو، فرآیند آبگیری توسط پارچه حریر (تنظیف) به صورت دستی انجام شد (سوریمی). مواد کرایوپروتکتنت (از اختلاط سوریمی با شکر به میزان ۴٪، سوربیتول به میزان ۴٪ و سدیم تری پلی فسفات به میزان ۰/۳٪) به سوریمی اضافه و با آن مخلوط خواهد گردید (به منظور نگهداری سوریمی در شرایط انجماد). سوریمی تهیه شده در کیسه های نایلونی زیپ دار به ابعاد $2 \times 15 \times 20$ سانتی متر و به مقدار ۲۵۰ گرم بسته بندی گردید و به مدت سه ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد منجمد و نگهداری گردید.

۳.۲. روش تغییر pH

برای تهیه سوریمی، به روش تغییر pH نمونه ها به نسبت ۱ به ۶ با آب توسط همزن (هموژنایزر) به مدت ۵ دقیقه مخلوط گردید. در این روش، pH مخلوط نمونه ماهی با آب به کمک سود ۶ مولار به ۱۱/۵ افزایش داده شد. پس از این مرحله عمل سانتریفیوژ کردن نمونه ها در ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه و در دمای ۴ درجه سانتیگراد صورت پذیرفت، که حاصل آن تفکیک نمونه به سه فاز فوقانی (حاوی چربی)، فاز میانی (حاوی محلول پروتئینی) و فاز تحتانی (حاوی اسکلت، پوست، پروتئین های غیر قابل حل، و غیره) می باشد. برای ترسیب پروتئین موجود



شکل ۱- تغییرات WHC در کنستانتیره پروتئین کیلکای تهیه شده به دو روش سوریمی (شستشو) شستشو و تغییر pH.

سولفوریک مصرفی) و ۱۸ و رسم نمودارها با استفاده از برنامه اکسل (ویندوز ۲۰۰۷) انجام شد.

۳.۴.۲. اندازه گیری ظرفیت نگهداری آب

ظرفیت نگهداری آب از طریق سانتیفریوژ کردن تعیین می‌گردد (Cheng, 1979). پس از رفع انجماد و خشک کردن نمونه با دستمال کاغذی کاملاً خشک، وزن نمونه را مشخص کرده (W1) و آن‌گاه در درون تیوپ‌های سانتیفریوژ یخچال‌دار قرار داده شد و با دور ۲۸۰۰۰ g در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه سانتیفریوژ شد. سپس از آن نمونه‌ها از درون تیوپ خارج شده و با دستمال کاغذی مجدداً خشک شده و وزن نهایی (W2) آن‌ها یادداشت شد. ظرفیت نگهداری آب به صورت درصد و از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.

$$WHC = \{1 - [(W1 - W2) / W1]\} \times 100$$

۵.۲. آنالیز آماری

برای مقایسه میانگین نتایج حاصل از دو روش تهیه سوریمی با همدیگر، از آزمون Paired T-test استفاده شد (در سطح احتمال $\alpha = 0.05$). در خصوص شاخص‌های کیفی مربوط به دوره نگهداری هر کدام از روش‌ها (به طور جداگانه)، از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد. البته در ابتدا شرط نرمال بودن قبل از آزمون آنالیز واریانس، با آزمون Shapiro-wilk و همگنی واریانس داده‌ها به وسیله آزمون لون (Levene) مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه میانگین بین زمان‌ها و تیمارهای مختلف از آزمون دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد. برای مقایسه میانگین هر یک از شاخص‌ها در طی دوره نگهداری از آزمون دانکن استفاده شد. کلیه آنالیزهای آماری با کمک نرم افزار آماری تحت ویندوز SPSS

۳. نتایج

نتایج مربوط به شاخص‌های کیفی از جمله؛ ظرفیت نگهداری آب، TBA و TVB-N در طی دوره‌های نگهداری انجماد به مدت سه ماه اندازه گیری گردید و در شکل‌های زیر آورده شده است.

۱.۳. ظرفیت نگهداری آب WHC


نتایج نشان داد بین زمان و ظرفیت نگه داری آب تفاوت معنی‌دار بود، در هر دو روش با گذشت زمان کاهش ظرفیت نگهداری آب را شاهد بودیم ($P < 0.05$). ظرفیت نگهداری در روش تغییر pH در طول دوره‌ی نگهداری بیشتر از روش شستشو بود و تفاوت معنی‌داری داشت ($P < 0.05$) (شکل ۱).

۲.۳. مجموع بازهای فرار TVB-N


نتایج آنالیز آماری نشان داد زمان برای TVB-N معنی‌دار بود ($P < 0.05$). اختلاف بین روش تغییر pH و روش شستشو معنی‌دار ($P < 0.05$) و مقایسه واریانس‌ها نشان می‌دهد که TVB-N برای زمان‌ها معنی‌دار نیست ($P > 0.05$). هر دو به مرور زمان افزایش داشته و در ماه سوم هر دو روش دارای شیب نزولی گردید (شکل ۲).

۳.۳. اکسیداسیون چربی و سنجش TBA

نتایج آنالیز آماری نشان داد اثر زمان در میزان TBA نمونه‌ها معنی‌دار است ($P < 0.05$). تست همگنی واریانس‌ها نشان داد که روش شستشو و روش



شکل ۲ - تغییرات TVB-N در کنستانتیره پروتئین کیلکای تهیه شده به دو روش سوریمی (شستشو) و تغییر pH.



شکل ۳ - تغییرات TBA در کنستانتیره پروتئین کیلکای تهیه شده به دو روش سوریمی (روش شستشو) و روش تغییر pH.

نظر اسیدهای چرب غیراشباع غنی می‌باشد یکی از مشکلات اصلی ماهی کیلکا سرعت بالای آن در فساد و اکسیداسیون چربی می‌باشد. در فرآوری ماهیان پرچرب مثل کیلکا میزان ترکیبات ثانویه اکسیداسیون تا هنگامی که هیدروکسیدها وجود دارد روبه افزایش است (Moghaddam, 2004).

در تهیه محصولاتی نظیر سوریمی، مرحله اول بعد از تمیز کردن ماهی، چرخ کردن آن می‌باشد. چرخ کردن، گوشت ماهی را در معرض اکسیدانها و پروکسیدانهای مختلف قرار می‌دهد (Gigliotti *et al.*, 2012). ماهی‌ها به‌علت داشتن میزان اسیدهای بلند زنجیر به لیپولیز و همچنین اکسیداسیون حساس هستند (Lamsal, 2009). ترکیب سه کربنه مالون دی‌آلدئید (MAD) مهم‌ترین کربونیل تولید شده از اتواکسیداسیون چربی‌های بلند زنجیر چند غیراشباعی است (Fountoulakis *et al.*, 1991). اندازه‌گیری میزان TBA براساس واکنش یک مولکول مالون آلدئید و دو مولکول TBA است که باعث ایجاد رنگ صورتی

تغییر pH در میزان TBA اختلاف معنی‌داری دارند ($P < 0.05$) و تغییر میانگین TBA در ماه‌های مختلف متفاوت است ($P < 0.05$). مقدار TBA در طی نگه‌داری در روش شستشو و روش تغییر pH دارای روند صعودی بود. اما بعد از آن و به تدریج در روش شستشو حالت نزولی به خود گرفت. این کاهش در سطح ۵ درصد معنی‌دار نبود (شکل ۳).

۴. بحث و نتیجه‌گیری

هر کدام از شیوه‌های مذکور مورد استفاده در تهیه کنستانتیره پروتئینی ماهی، تأثیر خاصی بر کیفیت ماندگاری محصول دارد. از این رو مطالعه حاضر به دنبال دلایل تأثیر هر یک از دو روش شستشو و تغییر pH (pH آلكالینی) بر کیفیت ماندگاری محصول به دست آمده از بررسی آن‌ها بر ماهی مورد مطالعه (کیلکای معمولی) می‌باشد. یکی از مهم‌ترین پارامترها در زمینه فرآوری محصولات دریایی اکسیداسیون چربی آنها می‌باشد. هضم چربی ماهی کیلکا سریع و از

می‌شود و با روش اسپکتوفوتومتری سنجیده می‌شود (Gigliotti et al., 2012). در تحقیق حاضر در دوره -ی انجماد، افزایش معناداری در میزان TBA مشاهده گردید که نشان‌دهنده وقوع اکسیداسیون می‌باشد که با نتایج Teckour و همکاران (۲۰۰۶) مطابقت دارد، مقدار TBA در روش تغییر pH در روز اول کمتر از شستشو بود، اما پس از گذشت ۳۰ روز نگهداری در شرایط انجماد، اکسیداسیون چربی در روش تغییر pH با این که میزان چربی پایین‌تری را نسبت به شستشو داشت، افزایش یافت. این موضوع به دلیل بالا بودن ترکیبات اکسیداسیونی از جمله هموگلوبین در روش تغییر pH بود (Chen and Jaczynski, 2009). در مجموع به دلیل بالا بودن میزان چربی در سوریمی تهیه شده به روش شستشو روند اکسیداسیون در ماه دوم در این روش افزایش نسبتاً زیادی یافت و بیشتر از روش تغییر pH گردید و از ماه سوم به بعد با کاهش سطح اکسیداسیون در روش شستشو شاهد بودیم (Szczesniak, 1963) و Rasco و Kristinsson. (۲۰۰۳) آزمایشی را بر روی سوریمی تهیه شده به دو روش معمول شستشو در آب ۴ درجه سانتی‌گراد و تغییر pH روی گربه‌ماهی، کفال و ماکرل برای سنجش میزان اکسیداسیون چربی انجام دادند. نتایج نشان داد که اکسیداسیون چربی به جز در ماکرل، در روش شستشو مقدار پایین‌تری را دارا است. همین‌طور میزان اکسیداسیون در روش تغییر pH بالاتر از روش دیگر گزارش گردید پژوهش‌های سایر محققان بر سوریمی حاصل از روش شستشو از ماهیانی نظیر کپور معمولی *Cyprinus carpio* و ماکرل *Scomber scomberus* (Hamann, 1979)، ساردین *Sardinops sagax caeula* (Fountoulakis et al., 2003) الگوی مشابهی با پژوهش حاضر دارد.

از دیگر شاخص‌های شیمیایی فساد ترکیبات از ته، شاخص TVB-N می‌باشد که شامل اندازه‌گیری کل بازهای فرار، تری‌متیل‌آمین، دی‌متیل‌آمین، آمونیوم و دیگر ترکیبات مرتبط با فساد ماهی می‌باشد (Okada, 2005). این فساد با افزایش رهاسازی تری‌متیل‌آمین و ترکیبات آمونیاکی از پروتئین توسط فساد میکروبی ایجاد می‌گردد. (Lamsal, 2007). در مورد دلیل شیب نزولی سطح TVB-N می‌توان شستشوی ترکیبات دارای نیتروژن را حین تهیه سوریمی برشمرد

(Moghaddam, 2004). هرچند با افزایش مدت نگهداری ماهیان در سردخانه، مقادیر TVB-N به تدریج افزایش می‌یابد اما این افزایش در طی انجماد از سرعت افزایشی بسیار کمتری در مقایسه با ماهیان نگهداری شده در شرایط سرد دارد. زیرا انجماد سبب توقف یا کاهش سرعت فعالیت بسیاری از میکروارگانیسم‌ها می‌شود و در نتیجه مانع از تجمع TVB-N می‌شود که با نتایج گزارش Okada (۲۰۰۵) همخوانی دارد. در روش تغییر pH میزان فساد میکروبی کاهش می‌یابد و افزایش TVB-N کندتر صورت می‌پذیرد. تهیه پروتئین ایزوله در تغییر pH موجب غیرفعال کردن فساد میکروارگانیسمی که عامل افزایش TVB-N هستند، می‌شود (Okada, 2005). در همین راستا، نشان داده شده است که میزان TVB-N تولید شده در سوریمی تهیه شده از فانوس ماهی در طی دوره نگهداری افزایش می‌یابد (Moghaddam, 2004). سطح TVB-N در گوشت ماهی نباید بیشتر از ۳۵-۳۰ میلی‌گرم در هر ۱۰۰ گرم نمونه از آن باشد (Huss, 1988).

اندازه‌گیری ظرفیت نگهداری آب در عضله به-عنوان یکی از شاخص‌های مهم در بررسی کیفیت گوشت ماهیان حین نگهداری مطرح می‌باشد. همچنین از آنجایی که تخریب پروتئین در هنگام نگهداری ماهی در شرایط انجماد می‌تواند موجب از دست رفتن توانایی نگهداری آب عضله در هنگام انجماد گردد، اندازه‌گیری آن به‌عنوان یکی از روش‌های مناسب جهت بررسی کیفیت ماهی در دوره نگهداری در مطالعه محققان مختلف استفاده شده است (Lamsal, 2007). در روش شستشو ظرفیت نگهداری آب بیش‌تر از گوشت چرخ شده و کمتر از ظرفیت نگه‌داری آب در روش تغییر pH می‌باشد (Moghaddam, 2004). این نتایج ممکن است ناشی از حذف بالاتر پروتئین‌های سارکوپلاسمیک در روش شستشو به روش تغییر pH باشد. عمل انجماد می‌تواند ظرفیت نگهداری آب را در عضله ماهی کاهش داده و حالت سفتی آن را افزایش دهد که بروز هر دوی این‌ها به‌واسطه تخریب پروتئین و از دست رفتن خاصیت انعطاف‌پذیری پروتئین میوفیبریل، تشکیل پیوندهای دی‌سولفید، افزایش خاصیت هیدروفوبی یا آب‌گریزی

ماندگاری سوریمی‌های تولیدی براساس شاخص‌های TBA، TVB-N و WHC مورد بررسی قرار گرفت. شاخص TBA اکسیداسیون چربی برای روش شستشو بیشتر از روش تغییر pH بود. ظرفیت نگهداری آب در سوریمی تهیه شده به روش تغییر pH بالاتر بود که ویژگی‌های عملکردی آن را بالاتر می‌برد ولی در هر دو روش مورد مطالعه با گذشت زمان ظرفیت نگهداری آب کاهش یافته است. شاخص TVB-N در روش شستشو کمی بیشتر از تغییر pH بود، در مجموع شاخص‌های کیفیت مورد بررسی نشان می‌دهند که سوریمی ماهی کیلکای معمولی تهیه شده به روش تغییر pH از کیفیت بالاتری در طی سه ماه نگهداری در سردخانه برخوردار است.

در پروتئین عضله و تجمع پروتئین در طی دوره نکه-داری در شرایط انجماد رخ دهد که با نتایج این تحقیق تطابق دارد و با گذر زمان توانایی نکه‌داری آب کاهش یافته است (Folch, 1993). در خصوص ارتباط بین اکسیداسیون چربی و تجمع پروتئین و توانایی عضله در نگهداری آب بیان نمود که اکسیداسیون چربی می‌تواند در توانایی عضله جهت نگهداری آب و تجمع پروتئین موثر باشد. بدین شرح که رادیکال‌های آزادی که در طی عمل اکسیداسیون چربی و محصولات نهایی اکسیداسیون چربی تولید می‌شود، می‌توانند با جداسازی اتم هیدروژن از هر گروه سولفید -Sh و یا از طریق ایجاد واکنش با زنجیره جانبی پروتئین سبب تجمع پروتئین و کاهش ظرفیت نگهداری آب در عضله گردند (Folch, 1993). در تحقیق حاضر کیفیت

References

- Bakar, J., Zakipour Rahimabadi, E., Che Man, Y., 2008. Lipid characteristics in cooked, chill-reheated fillets of Indo-Pacific king mackerel (*Scomberomorus guttatus*). *LWT - Food Science and Technology* 41, 2144-2150.
- Chen, Y.C., Jaczynski, J., 2007. Gelatin from whole Antarctic Krill (*Euphausia superba*) by isoelectric solubilization/ precipitation as affected by additives. *Journal of Agriculture and Food Chemistry* 55(5), 1814-1822.
- Chen, Y.C., Tou, J.C., Jaczynski, J., 2009. Amino acid and mineral composition of protein and other components and their recovery yields from whole Antarctic krill (*Euphausia superba*) using isoelectric solubilization and precipitation. *Journal of Food Science and Technology* 74(2), H31-H39.
- Cheng, C.S., Hamann, D.D., Webb, N.B., Sidwell, V., 1979. Effects of species and storage time on minced fish gel texture. *Journal of Food Science and Technology* 1087-1092.
- FAO, 2012. Year book of fishery statistics (Vol. 98.1and2). Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
- Folch, J., Lees, M., Sloan-Stanley, G.H., 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. *Journal of Biological Chemistry* 226, 497-509.
- Fountoulakis, M., Lahm, H.W., 1998. Hydrolysis and amino acid composition analysis of proteins. *Journal of Chromatography A*. 826, 109-134.
- Gehring, C.K., Gigliotti, J.C., Moritz, J.S., Tou, J.C., Jaczynski, J., 2011. Functional and nutritional characteristics of proteins and lipids recovered by isoelectric processing of fish By-products and low-value fish – a review. *Journal of Food Chemistry* 124(2), 422-431.
- Gigliotti, J.C., Jaczynski, J., Tou, J.C., 2008. Determination of the nutritional value, protein quality and safety of krill protein concentrate isolated using an isoelectric solubilization/ precipitation technique. *Journal of Food Chemistry* 111(1), 209-214.
- Goudlas, A.E., Kontominas, M.G., 2005. Effect of salting and smoking-method on the keeping quality of chub mackerel (*Scomber japonicus*): biochemical and sensory attributes. *Journal of Food Chemistry* 93, 511-520.
- Haliloglu, H.I., 2004. Comparison of fatty acid composition in some tissues of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) living in seawater and freshwater. *Journal of Food Chemistry* 86, 55-59.
- Hamann, D., Webb, N.B., 1979. Sensory and instrumental evaluation of material properties of fish gels. *Journal of Texture Studies* 10, 117-121.
- Hamann, D., MacDonald, G.A., 1992. Rheology and texture properties of surimi and surimi-based foods. In: T.C. Lanier and C. M. Lee, (Eds.), *Journal of Surimi Technology*. 429-500.
- Hultin, H.O., Kelleher, S.D., 1999. Process for isolating a protein composition from a muscle fillets. *Journal of Food Science* 70, E477-483.
- Hultin, H.O., Kelleher, S.D., 2000. High efficiency alkaline protein extraction. U.S. Patent No. 6,136,959.
- Hultin, H.O., Kelleher, S.D., 2001. Process for isolating a protein composition from a muscle source and protein composition. U.S. Patent No. 6,288,216.
- Hultin, H.O., Kelleher, S.D., 2002. Protein composition and process for isolating a protein composition from a muscle source. U.S. Patent No. 6,451,975.

- Hultin, H.O., Kristinsson, H.G., Lanier, T.C., Park, J.W., 2005. Process for recovery of functional proteins by pH shift. In: J.W. Park (Ed.), *Surimi and surimi seafood* (2nd ed.). Boca Raton, USA: CRC Press. p. 107-140.
- Kristinsson, H.G., Hultin, H.O., 2003. Changes in conformation and subunit assembly of cod myosin at low and high pH and after subsequent refolding. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 51(24), 7187-7196.
- Kristinsson, H.G., Liang, Y., 2006. Effect of pH-shift processing and surimi processing on Atlantic croaker (*Micropogonias undulates*) muscle proteins. *Journal of Food Science and Technology* 71, 304-312.
- Kristinsson, H.G., Rasco, B.A., 2000. Fish protein hydrolysates: Production, biochemical, and functional properties. *Journal of Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 40(1), 43-81.
- Lamsal, B.P., Jung, S., Johson, L.A., 2007. Rheological properties of soy protein hydrolysates obtained from limited enzymatic hydrolysis. *LWT – Food Science and Technology* 40, 1215-1223.
- Lin, L., Park, J.W. 1995. Study of myofibrillar protein solubility during surimi processing: effects of washing cycles and ionic strength. Presented at the PFT Annual Meeting, Mazatlan, Mexico.
- Mackie, D. 1993. The differentiation of myeloid Leukaemia cells. *British Journal of Haematology*, 4, 1-40.
- Moghaddam, F., ZaliBoinee, H., 2004. An efficient and facile onestep synthesis of highly substituted thiophenes. *Tetrahedron* 60, 6085-6089.
- Nolsoe, H., Undeland, I., 2009. The acid and alkaline solubilization process for the isolation of muscle proteins: State of the art. *Journal of Food Bioprocess Technology* 2, 1-27.
- Okada, M., 1990. The history of surimi and surimi based product in Japan. In R.E. Martin and R.L. Collette, Eds. *Engineered Seafood Including Surimi*. Par Ridge, NJ: Noyes Data Corp.
- Shimizu, Y., Toyohara, H., Lanier, T.C., 1992. Surimi production from fatty and dark-flesh fish species. In: *Surimi Technology*. Lanier, T.C., Lee, C.M. (Eds.). Marcel Dekker, Inc. New York. p. 181-207.
- Szczesniak, A.S., 1963. Development of standard rating scales for mechanical parameters of texture and correlation between ejective and the sensory methods of texture evaluation. *J. Journal of Food Science and Technology* 28, 397-403.
- Tahergorabi, R., Beamer, K.S., Matak, E.K., Jaczynski, J., 2012. Isoelectric solubilization/precipitation as a means to recover protein isolate from striped bass (*Morone saxatilis*) and its physicochemical properties in a nutraceutical Seafood Product. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 60, 5979-5987.
- Tahergorabi, R., Sivanandan, L., Jaczynski J. 2012. Dynamic rheology and endothermic transitions of proteins recovered from chicken-meat processing *By-products* using isoelectric solubilization/precipitation and addition of TiO₂. *LWT – Food Science and Technology* 46(1), 148-155.
- Taskaya, L., Chen, Y.C., Beamer, S., Jaczynski, J., 2009b. Texture and colour properties of proteins recovered from whole gutted silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) using isoelectric solubilization/precipitation. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 89(2), 349-358.