

تأثیر نوبت‌های غذاهای و اندازه رهاسازی در رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور

* حبیب سرسنگی علی‌آباد^۱، محمد محمدی^۲، مجید عسکری‌حصنی^۳،
احمد بیطرف^۴، فرهاد رجبی‌پور^۵ و نسیرین مشایعی^۶

^۱ کارشناس شیلات، ایستگاه تحقیقات ماهیان آب‌های شور داخلی بافق، ^۲ کارشناسی ارشد شیلات، ایستگاه تحقیقات ماهیان آب‌های شور داخلی بافق، ^۳ کارشناس ارشد بیولوژی دریا و عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان، ^۴ کارشناس ارشد علوم دام، ایستگاه تحقیقات ماهیان آب‌های شور داخلی بافق، ^۵ کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، ایستگاه تحقیقات ماهیان آب‌های شور داخلی بافق

چکیده

جهت بررسی تأثیر نوبت‌های غذاهای و اندازه رهاسازی بر رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور، ماهیانی با وزن‌های اولیه ۱۰، ۲۵ و ۴۰ گرم به صورت همزمان رهاسازی و در سه تیمار تناوب غذایی ۲، ۳ و ۴ بار تغذیه در روز و هر یک با سه تکرار طی یک دوره ۱۰۲ روزه پرورش یافتند. در گروه وزنی ۱۰ گرم با افزایش تناوب غذایی از دو تا چهار بار تغذیه در روز برخی شاخص‌های رشد مانند وزن نهایی، رشد روزانه و افزایش وزن بهبود و ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت، لذا در گروه وزنی ۱۰ گرم حداقل سه نوبت غذاهای در روز لازم است. در گروه‌های وزنی ۲۵ و ۴۰ گرم اگرچه با افزایش تناوب غذایی افزایش محدودی در شاخص‌های رشد مشاهده شد، ولی این اختلاف‌ها در سطح ۵ درصد معنی‌دار نبود. بنابراین تناوب غذایی در قزل‌آلا با وزن اولیه حداقل ۲۵ گرم (وقتی میزان غذا محدود باشد) اثری بر شاخص‌های رشد ندارد. بدون در نظر گرفتن تناوب غذایی، در وزن اولیه ۱۰ گرم ضریب تبدیل غذایی به طور معنی‌داری کمتر از سایر وزن‌ها بود و ضریب رشد ویژه بین وزن‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نداشت. بنابراین وزن اولیه ۱۰ گرم برای شروع دوره پرورش مناسب‌تر است.

واژه‌های کلیدی: اندازه رهاسازی، آب لب شور، تناوب غذاهای، قزل‌آلای رنگین‌کمان

مقدمه

سازگاری، رشد و همچنین تکثیر آسان، باعث معرفی این ماهی به مناطق مختلف دنیا و توسعه آن شده است و هم‌اکنون در اکثر نقاط جهان با اقلیم‌های مختلف در حال پرورش می‌باشد. پرورش ماهی قزل‌آلا در ایران سابقه چندانی ندارد اما در سال‌های اخیر پیشرفت چشم‌گیری در زمینه تکثیر و پرورش آن صورت گرفته است، به طوری که میزان تولید این گونه از ۴۴۰ تن در سال ۱۳۶۸ به ۴۵۰۰۰ تن در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است (۲).

در فعالیتهای آبی‌پروری هزینه غذا حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه‌های پرورش را شامل می‌شود. بنابراین

ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان جزء ماهیان پرورشی است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی اهلی شده و به صورت قابل مصرف و قابل عرضه به بازار، پرورش داده می‌شود. هم‌اکنون صنعت تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا در حال توسعه است و اهمیت آن به ویژه در کشورهایی که قادر به مهیا کردن محیط آب شیرین یا شور برای پرورش آن هستند در حال افزایش است (۱). قابلیت‌های بسیار بالای

* - مسئول مکاتبه: h.sarsangi@yahoo.com

اختلافات موجود بین تیمارها از نظر وزن اولیه، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و میزان رشد بررسی و محاسبات و آنالیز نتایج حاصله با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS صورت گرفت. اثر متقابل نوبت‌های غذایی و اندازه رهاسازی بر شاخص‌های رشد توسط آزمون چند متغیره^۱ صورت گرفت. اثر نوبت‌های غذایی و اندازه رهاسازی هر یک به‌طور جداگانه بر شاخص‌های رشد با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل، با دو فاکتور نوبت غذایی در سه سطح (۲، ۳ و ۴ نوبت در روز) و اندازه رهاسازی در سه سطح (۱۰، ۲۵ و ۴۰ گرم) انجام گرفت. جهت آنالیز داده‌ها از آنالیز واریانس یک‌طرفه^۲ و جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده گردید. معادله‌های مورد استفاده به‌شرح زیر بودند:

$$FCR^3 = TFS / (FB - IB) \quad (۱۵)$$

$$SGR(\%/day)^4 = 100 (\ln Bw_2 - \ln Bw_1) / \Delta t$$

$$DGR(g/day)^5 = (Bw_2 - Bw_1) / \Delta t$$

$$WG^6 = FB - IB \quad (۹)$$

FCR= ضریب تبدیل غذایی

TFS= کل غذای مصرفی

FB= بیوماس نهایی

IB= بیوماس اولیه

SGR= ضریب رشد ویژه

BW₁= وزن اولیه

BW₂= وزن نهایی

Δt= روزهای پرورش

DGR= رشد روزانه

BW₁= متوسط وزن ابتدایی

BW_F= متوسط وزن نهایی

WG= افزایش وزن

نیاز همیشگی برای دانستن بهترین تناوب غذایی وجود دارد، زیرا تعیین بهترین تناوب غذایی برای رسیدن به بالاترین عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های پرورش گردد (۱۰). علاوه بر کمیت و کیفیت غذا، روش‌های غذایی نیز از جمله عوامل موثر در بهره‌برداری بهینه از غذا به شمار می‌رود که به‌صورت دستی یا با دستگاه‌های اتوماتیک و در دفعات مختلف انجام می‌شود (۵). همچنین اندازه رهاسازی ماهی برای دستیابی به رشد مناسب و کاهش هزینه حمل و نقل مورد توجه می‌باشد. فروش بچه‌ماهیان براساس وزن آنها صورت می‌گیرد، لذا تهیه بچه‌ماهیان با وزن اولیه پایین‌تر سبب صرفه‌جویی در هزینه اولیه و هزینه حمل و نقل می‌گردد. در این تحقیق برای بررسی اندازه بچه‌ماهی برای رهاسازی سه گروه وزنی ۱۰، ۲۵ و ۴۰ گرم به‌صورت هم‌زمان رهاسازی گردید و ماهیان در شرایط پرورشی کاملاً یکسان پرورش یافتند. ضمن اینکه جهت بررسی تناوب غذایی سه تیمار ۲، ۳ و ۴ بار تغذیه در روز مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در آبان ماه سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات ماهیان آب شور داخلی بافق واقع در کیلومتر ۱۰۰ جاده یزد- بافق انجام شد. بچه‌ماهیان در سه تیمار وزنی ۱۰، ۲۵ و ۴۰ گرم و سه تیمار تناوب غذایی ۲، ۳ و ۴ بار در سه تکرار تیمار بندی شدند. میزان غذای روزانه ماهی‌ها براساس جدول استاندارد با توجه به اندازه ماهی و درجه حرارت آب، محاسبه و این میزان غذا در وعده‌های غذایی ۲، ۳ و ۴ نوبت در دوره روشنایی و در زمان‌های مشخص به ماهی‌ها داده شد (جدول ۱).

برای محاسبه میزان غذای مورد نیاز و آگاهی از عملکرد رشد، هر ۱۴ روز یک بار ماهیان زیست‌سنجی شدند. دمای هوا، آب، میزان اکسیژن محلول، pH و شوری آب در حوضچه‌ها به‌صورت روزانه به کمک دستگاه‌های پرتابل WTW مورد سنجش قرار گرفتند.

- 1- Multivariation
- 2- One Way Anova
- 3- Food Conversion Ratio
- 4- Specific Growth Rate
- 5- Daily Growth Rate
- 6- Weight Gain

نتایج

مقایسه شاخص‌های رشد در ماهیان رهاسازی شده با وزن‌های اولیه ۱۰، ۲۵ و ۴۰ گرم در جدول ۲ نشان داده شده است. مطابق جدول ۲ در گروه وزنی ۱۰ گرم، افزایش دفعات غذایی، بهبود برخی شاخص‌های رشد مانند وزن نهایی، افزایش وزن و رشد روزانه را به همراه داشته اما باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی و ضریب

رشد ویژه شده است. حداکثر میزان وزن نهایی، افزایش وزن و رشد روزانه در تناوب ۴ بار تغذیه در روز مشاهده شد، اما بین تناوب ۳ و ۴ بار تغذیه در روز اختلاف معنی‌داری وجود نداشت ($P > 0/05$). در حالی که بین ۲ و ۳ بار تغذیه اختلاف معنی‌دار مشاهده شد ($P < 0/05$).

جدول ۱- ساعات غذایی در تناوب‌های مختلف

تناوب غذایی	۷:۳۰	۱۰:۳۰	۱۲	۱۳:۳۰	۱۶:۳۰
۲ بار تغذیه در روز	*				*
۳ بار تغذیه در روز	*		*		*
۴ بار تغذیه در روز	*	*		*	*

گرم و ۲۵ گرم اگرچه اختلاف در سطح ۵ درصد معنی‌دار نبود اما ماهیان ۱۰ گرمی از ضریب تبدیل غذایی بهتری برخوردار بودند. اثر تناوب غذایی بر ضریب رشد ویژه در ماهیان با وزن اولیه متفاوت در شکل ۱ نشان داده شده است. بالاترین مقدار در تیمار ۲ بار تغذیه مشاهده شد و در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری با تیمارهای دیگر نشان داد.

نتایج حاصل از مقایسه درصد بقا و ضریب تبدیل غذایی در ماهیان با اندازه‌های وزنی مختلف بدون در نظر گرفتن تناوب غذایی در جدول ۳ نشان داده شده است. مطابق با جدول ۳ ضریب تبدیل غذایی با افزایش وزن افزایش می‌یابد، به طوری که بالاترین ضریب تبدیل غذایی در گروه وزنی ۴۰ گرم و پایین‌ترین ضریب تبدیل غذایی در گروه وزنی ۱۰ گرم مشاهده شد و این اختلاف از نظر آماری در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود. بین گروه وزنی ۱۰

جدول ۲- مقایسه شاخص‌های رشد در تناوب‌های غذایی مختلف در ماهیان رهاسازی شده با وزن اولیه ۱۰، ۲۵ و ۴۰ گرم

وزن دفعات اولیه تغذیه	وزن اولیه (گرم)	وزن نهایی (گرم)	افزایش وزن (گرم)	رشد روزانه (گرم بر روز)	ضریب تبدیل غذایی	ضریب رشد ویژه	درصد بقا
۲	۹/۷۶ ± ۱/۰۵ ^{a*}	۶۴/۸۹ ± ۲/۳۸ ^b	۵۵/۱۲ ± ۲/۱۱ ^b	۰/۰۵۴ ± ۰/۰۲ ^b	۱/۴۵ ± ۰/۰۳ ^b	۱/۸۹ ± ۰/۰۲ ^a	۹۸/۶۶ ± ۲/۳۱ ^a
۳	۱۱/۰۶ ± ۰/۸ ^a	۸۲/۲۸ ± ۵/۹۹ ^a	۷۱/۲۱ ± ۶/۱۷ ^a	۰/۷ ± ۰/۰۶ ^a	۱/۱۸ ± ۰/۱۲ ^a	۱/۴۳ ± ۰/۰۹ ^b	۹۷/۳۳ ± ۳/۰۵ ^a
۴	۱۰/۹۳ ± ۱/۳۲ ^a	۸۳/۸۸ ± ۵/۰۴ ^a	۷۲/۹۵ ± ۳/۸۹ ^a	۰/۷۱ ± ۰/۰۴ ^a	۱/۲۲ ± ۰/۰۳ ^a	۱/۰۷ ± ۰/۱۱ ^c	۹۹/۳۳ ± ۱/۱۵ ^a
۲	۲۳/۴۷ ± ۰/۶۱ ^a	۱۱۰/۲۹ ± ۶/۱۱ ^a	۸۶/۸۲ ± ۵/۶۵ ^a	۰/۸۵ ± ۰/۰۵ ^a	۱/۳۸ ± ۰/۰۸ ^a	۱/۶۳ ± ۰/۰۳ ^a	۱۰۰ ± ۰/۰ ^a
۳	۲۴/۰۰ ± ۰/۲۰ ^a	۱۰۹/۷۹ ± ۶/۴۸ ^a	۸۵/۷۹ ± ۶/۳۶ ^a	۰/۸۴ ± ۰/۰۶ ^a	۱/۴۳ ± ۰/۱۵ ^a	۱/۴۷ ± ۰/۰۶ ^{a b}	۹۹/۳۳ ± ۱/۱۵ ^a
۴	۲۴/۰۳ ± ۱/۱۵ ^a	۱۱۳/۴۳ ± ۸/۰۴ ^a	۸۹/۳۹ ± ۷/۵۱ ^a	۰/۸۸ ± ۰/۰۷ ^a	۱/۳۵ ± ۰/۱۰ ^a	۱/۱۳ ± ۰/۱۰ ^b	۱۰۰ ± ۱/۰ ^a
۲	۳۹/۵۶ ± ۱/۴۰ ^a	۱۴۱/۲۳ ± ۸/۴۹ ^a	۱۰۱/۶۶ ± ۷/۱۱ ^a	۰/۹۹ ± ۰/۰۷ ^a	۱/۴۷ ± ۰/۰۶ ^a	۱/۸۷ ± ۰/۱۸ ^a	۱۰۰ ± ۰/۰ ^a
۳	۴۱/۲۰ ± ۱/۰۱ ^a	۱۳۷/۰۲ ± ۴/۴۱ ^a	۹۵/۸۲ ± ۴/۰۰ ^a	۰/۹۴ ± ۰/۰۴ ^a	۱/۵۲ ± ۰/۱۶ ^a	۱/۴۴ ± ۰/۰۸ ^b	۱۰۰ ± ۰/۰ ^a
۴	۴۰/۸۶ ± ۱/۲۰ ^a	۱۴۴/۴۱ ± ۹/۴۳ ^a	۱۰۳/۵۵ ± ۸/۵۲ ^a	۱/۰۱ ± ۰/۰۸ ^a	۱/۴۹ ± ۰/۰۰۸ ^a	۱/۰۹ ± ۰/۰۷ ^c	۱۰۰ ± ۰/۰ ^a

* اعداد با حروف مختلف دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < 0/05$)

بحث و نتیجه گیری

مطابق با جدول ۲ در گروه وزنی ۱۰ گرم، افزایش دفعات غذادهی، بهبود برخی شاخص‌های رشد مانند وزن نهایی، افزایش وزن و رشد روزانه را به همراه داشته اما باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه شده است. این یافته‌ها با مطالعات انجام شده بر روی ماهی باس (*Morone chrysops* × *M. saxatilis*) مطابقت دارد، به طوری که ماهیان باس که دو بار در روز تغذیه شدند وزن نهایی بالاتر و درصد افزایش وزن بیشتری نسبت به ماهیانی که یک بار در روز تغذیه شدند، نشان دادند (۱۰). همچنین Teshima و همکاران (۱۹۸۴) در تحقیقی روی خامه ماهی (*Channys channys*) مشاهده نمودند که تغذیه دو بار در روز رشد بیشتری را نسبت به تغذیه یک بار در روز در پی داشت. بالاترین ضریب تبدیل غذایی در گروه ماهیان با وزن اولیه ۱۰ گرم مربوط به تیمار ۲ بار تغذیه در روز بود و بین تیمار ۲ و ۳ بار تغذیه اختلاف معنی داری وجود داشت اما بین ۳ و ۴ بار تغذیه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. لوله گوارش ماهیان گوشت خوار بسیار کوتاه است و زمان عبور غذا از روده تقریباً ۳ ساعت تخمین زده شده است. مقدار غذای زیاد ممکن است سرعت حرکت غذا در روده را افزایش دهد و مقداری از غذا به صورت هضم نشده دفع گردد که باعث کاهش کارایی غذا و افزایش ضریب تبدیل غذایی می گردد (۱۱)، به همین دلیل در تیمار دو بار تغذیه در گروه وزنی ۱۰ گرم ضریب تبدیل غذایی نسبت به دو تیمار دیگر بالاتر بود.

مطابق با شکل ۱ با افزایش تناوب غذایی ضریب رشد ویژه کاهش یافته است و بالاترین مقدار در تیمار ۲ بار تغذیه مشاهده شد و در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری با تیمارهای دیگر نشان داد. این نتیجه در برخی مطالعات مشابه به دست آمده است، به طوری که پایین ترین میزان ضریب رشد ویژه مربوط به بالاترین تناوب غذایی و به ترتیب تناوب‌های کمتر دارای ضریب رشد ویژه بالاتری بود (۸). این نتیجه در مواردی که تغذیه در

سطوح معین و محدود شده صورت گیرد به دست می آید و در مواردی که تغذیه تا حد سیری و نامحدود انجام شود، تناوب‌های بالاتر دارای ضریب رشد ویژه بالاتری خواهند بود. نتایج حاصل از تحقیق نفیسی (۱۳۸۳) بر روی ماهی قزل آلی رنگین کمان حاکی از این بود که افزایش تناوب غذایی (تغذیه تا حد سیری) باعث افزایش ضریب رشد ویژه شده است. همچنین در تحقیق روی ماهی *Nibeia miichthioides* تناوب‌های مختلفی برای تغذیه استفاده شد و با کاهش تناوب غذایی شاخص‌های رشد نیز کاهش یافت (۱۴). این مطلب توسط Galano و همکاران (۲۰۰۳) نیز تأیید شده است. ضریب رشد ویژه در ماهی Snook (*Centropomus undecimalis*) در تیمار یک بار و دو بار تغذیه در روز تفاوت معنی داری نداشت، اما در تیمار سه بار تغذیه در روز ضریب رشد ویژه به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر بود.

نتایج حاصله نشان می‌دهد که درصد بقا در گروه‌های وزنی مختلف نسبت به تیمارهای غذادهی ۲، ۳ و ۴ بار تغذیه در روز تفاوت معنی داری نداشت (جدول ۲). این یافته در برخی مطالعات مشابه تأیید شده است. در تحقیقی که توسط Turker و Dernekbası (۲۰۰۶) بر روی قزل آلی رنگین کمان انجام شد تناوب‌های مختلف غذایی مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت معنی داری در درصد بقا قزل آلا در تیمارهای مختلف مشاهده نشد. در مطالعه‌ای دیگر که توسط Nunes و Carvalho (۲۰۰۶) بر روی میگوی وانامی (*Litopenaeus vannamei*) انجام شد تناوب‌های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بار در روز مورد بررسی قرار گرفت و در هیچ یک از تیمارها تفاوت معنی داری از نظر درصد بقا مشاهده نگردید.

مطابق با جدول ۳ ضریب تبدیل غذایی با افزایش وزن افزایش یافت، نتایج مشابه توسط Akbulut و همکاران (۲۰۰۲) بر روی رشد ماهی قزل آلی رنگین کمان با اندازه‌های اولیه ۵۲، ۷۷ و ۱۱۸ گرم به دست آمده است. آنها بیان نمودند که ضریب رشد ویژه با افزایش وزن


درصد بقا بین اندازه‌های مختلف، اختلاف قیمت بچه‌ماهیان ۱۰ گرمی و ۲۰ گرمی در هنگام خرید بچه‌ماهی و کاهش هزینه حمل در ماهیان با اندازه پایین‌تر، گروه وزنی ۱۰ گرم مناسب‌ترین وزن ارزیابی شد. ضمن این‌که با توجه به نتایج حاصل از تأثیر تناوب‌های غذایی بر رشد در گروه‌های وزنی مختلف، می‌توان بیان نمود که در وزن‌های پایین‌تر از ۲۵ گرم برای رشد بهینه حداقل ۳ نوبت غذادهی در روز لازم است، اما برای وزن‌های بالاتر از ۲۵ گرم، ۲ بار غذادهی در روز کافی است.

کاهش یافت، به طوری که بیشترین ضریب رشد ویژه در گروه اول (۵۲ گرم) و کمترین آن در گروه سوم (۱۱۸ گرم) مشاهده شد. همچنین ضریب تبدیل غذایی با افزایش وزن افزایش یافت و کمترین مقدار در ماهیان گروه اول و بیشترین مقدار در ماهیان گروه سوم مشاهده شد. بنابراین گروه اول (۵۲ گرم) را جهت شروع دوره پرورش معرفی نمودند. لذا در این تحقیق نیز با توجه به پایین‌تر بودن ضریب تبدیل غذایی در گروه ماهیان ۱۰ گرمی، عدم اختلاف معنی‌دار در ضریب رشد ویژه و

جدول ۳- مقایسه درصد بقا و ضریب تبدیل غذایی در ماهیان با اندازه‌های وزنی مختلف بدون در نظر گرفتن تناوب غذایی

گروه‌های وزنی			
۴۰ گرم	۲۵ گرم	۱۰ گرم	
۱/۵۸۲ ^b	۱/۴۵۰ ^a	۱/۳۵۶ ^{a*}	ضریب تبدیل غذایی
۱۰۰ ^a	۹۹/۷۷ ^a	۹۸/۴۴ ^a	درصد بقا

* اعداد با حروف مختلف دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < 0/05$)



شکل ۱- اثر تناوب غذایی بر ضریب رشد ویژه در ماهیان با وزن اولیه متفاوت

منابع

- عبدالله مشایی، م.، ۱۳۷۹. راهنمای پرورش و تکثیر ماهی قزل‌آلا. انتشارات نوربخش.
- نفیسی‌بهبادی، م.، و فلاحتی مروست، ع.، ۱۳۸۷. اصول تکثیر قزل‌آلای رنگین‌کمان. بوشهر: دانشگاه خلیج فارس.
- نفیسی‌بهبادی، م.، ۱۳۸۳. نقش تناوب غذادهی و انرژی جیره غذایی در شاخص‌های رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، دانشگاه خلیج فارس.

- Akbulut, B., Sahin, T., Nilgun, A., Muharrem, A., 2002. Effect of initial size on growth rate of Rainbow Trout, (*Oncorhynchus mykiss*), reared in cages on the Turkish Black Sea coast. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 133-136.
- Alanara, A., Kadri, S., Paspatis, M., 2001. Feeding management. In: *food intake in fish*. Houlihan, D., Boujard, T., and Jobling, M., (eds). Black Well Science, 418p.
- Carvalho, E.A., Nunes, A.J.P., 2006. Effects of feeding frequency on feed leaching loss and grow-out patterns of the white shrimp *Litopenaeus vannamei* fed under a diurnal feeding regime in pond enclosures. Aquaculture 252(2-4), 494-502.

7. Galano, T.G., Perez, J.C., Gaxieola, G., Sanchez, Y.A., 2003. Effect of feeding frequency on food intake, gastric Evacuation and growth in juvenile snook, *Centropomus undecimalis* (Bloch). *Rev. Invest. Mar.* 24(2), 145-154.
8. Gokcek, K.C., Mazlum, Y., Akyurt, I., 2008. Effects of feeding frequency on growth, and survival of Himiri Barbel fry under laboratory conditions. *Pakistan Journal of Nutrition* 7(1), 66-69.
9. Houlihan, D., Boujard, T., Jobling, M., 2001. *Food intake in fish*. Black well science, Berlin, 418p.
10. Kenneth, R.T., Carl, D.W., Ann, M.M., Ebony, J.G., 2000. Effects of different feeding frequencies on growth, body composition, and fillet composition of juvenile sunshine bass, *Morone chrysops* × *M. saxatilis*, grown Indoors. *Journal of Applied Aquaculture* 10(2), 55-65.
11. Lazo, J.P., Davis, D.A., Arnold, C.R., 1998. The effects of dietary protein level on growth, feed efficiency and survival of juvenile Florida pompano (*Trachinotus carolinus*). *Aquaculture* 169(3-4), 225-232.
12. Teshima, S.I., Kanazawa, A., Kawamura, G., 1984. Effects of several factors on growth of milkfish (*Chanos chanus*) fingerlings reared with artificial diets in aquaria. *Aquaculture* 37, 39-50.
13. Turker, A., Dernekbası, S.Y., 2006. Effects of restricted feeding on performances of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *J. of Fac. of Agric., OMU*, 21(2), 190-194.
14. Wang, Y., Kong, L., Li, K., Bureau, D.P., 2006. Effects of feeding frequency and ration level on growth, feed utilization and nitrogen waste output of cuneate drum (*Nibea miichthioides*) reared in net pens. *Aquaculture* 271, 350-356.
15. Zakes, Z., Kowalska, A., Czerniak, S., Demska-Zakes, K., 2005. Effect of feeding frequency on growth and size variation in juvenile pikeperch *Sander lucioperca*. *J. Anim. Sci.* 51(2), 85-91.

Archive of SID

Effect of feeding times and stocking size on growth and food conversion rate of rainbow trout in brackish water

*H. Sarsangi Aliabad¹, M. Mohammadi², M. Askari Hasani³, A. Bitaraf⁴,
F. Rajabipour⁵ and N. Moshaei⁶

¹B.Sc. of Fisheries, Bafgh Inland Saline Water Fisheries Research Station, ²M.Sc. of Fisheries, Bafgh Inland Saline Water Fisheries Research Station, ³M.Sc. of Marine Biology, Faculty Member of Bahonar University, Kerman, ⁴M.Sc. of Animal Science, Bafgh Inland Saline Water Fisheries Research Station, ⁵M.Sc. of Animal Physiology, Bafgh Inland Saline Water Fisheries Research Station, ⁶M.Sc. of Biosystematic of Animal, Bafgh Inland Saline Water Fisheries Research Station

Abstract

An experiment was conducted to evaluate the effect of feeding frequencies and stocking size on growth and food conversion ratio (FCR) of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in brackish water for 102 days. Three stocking sizes (10, 25 and 40g/fish) of rainbow trout and three fish feeding frequencies (twice, three and four times per day) were examined at the same time. The results showed that in the group with 10g initial weight increasing the feeding frequency, some growth factors like final weight, daily growth, and weight gain increased and the food conversion ratio (FCR) decreased. It means in this group (10g) two times feeding per day is not enough for an acceptable growth rate. In the two other groups (with initial weight 25 and 40g) although by increasing the feeding frequency, some growth factors had a little increase but these differences are not significant. Therefore, in rainbow trout culture with initial weight of at least 25g, two times feeding per day were enough. With connivance of feeding frequencies, the lowest FCR was in the group with 10g initial body weight and there was not any significant difference in SGR. So, according to the results, the suggestion is the fish should be stocked with 10g initial body weight.

Keywords: Stocking size; Brackish water; Feeding frequency; Rainbow trout

*- Corresponding Author; Email: h.sarsangi@yahoo.com