

اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه

Rutilus rutilus caspicus

کریم کلشاهی^۱، کیا امانی^۲، حمیدرضا مرادنژاد^۳ و محمدصادق آراملی^۴

^{۱،۴}دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ^۲دانشآموخته شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ^۳دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشکاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور

چکیده

اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه (*Rutilus rutilus caspicus*) در یک دوره ۱۴ روزه انجام گرفت. بچه ماهیان کلمه از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیچوال تهیه شدند. بعد از سازگاری، لاروهای کلمه با وزن اولیه ۳/۱ میلی گرم در تشت‌های ۴۰ لیتری با ۲۰ لیتر آب شیرین و تراکم ۱۰۰ عدد لارو در هر تشت ذخیره شدند. با استفاده از لامپ‌های فلوئوروسنت، ۲ تیمار نور شامل رنگ قرمز و سفید و ۲ تیمار نوری شامل ۲۴L/۰۰D و ۱۲L/۱۲D در ۴ تیمار مختلف که شامل نور قرمز و ۲۴L/۰۰D، نور قرمز و ۱۲L/۱۲D، نور سفید و ۲۴L/۰۰D و نور سفید و ۱۲L/۱۲D بود، مورد بررسی قرار گرفت. درجه حرارت در طول دوره آزمایش در محدوده بین ۱۸-۲۰ درجه سانتی‌گراد بود. دو تیمار نور قرمز ۱۲L/۱۲D و نور سفید ۱۲L/۱۲D اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند و کمترین رشد و بالاترین FCR را داشتند، در حالی که نور قرمز و مستمر ۲۴ ساعته بیشترین رشد و کمترین FCR و با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشت، همچنین دوره‌های نوری اختلاف معنی‌داری را در بازماندگی ماهی کلمه ایجاد نکردند، بهطوری‌که بازماندگی ماهی‌ها در کلیه سطوح نوری در حد نسبتاً بالایی قرار داشت.

واژه‌های کلیدی: بازماندگی، دوره نوری، رنگ نور، رشد، ماهی کلمه (*Rutilus rutilus caspicus*)

بطئی برخوردار بوده و با تلفات بالا نیز همراه است. ایجاد

مقدمه

تفاضای روز افزون مصرف آبزیان باعث شده که پرورش شرایط محیطی بهینه در مرحله نوزادی و جوانی ماهیان ماهیان به روش‌های مختلف گسترش یابد. آنچه رمز موفقیت بهمنظور حداکثر نمودن تولیدات پرورشی اهمیت ویژه‌ای دارد در تکثیر و پرورش ماهیان به شمار می‌آید بالا بردن بازده

تکثیر و تولید بچه ماهیان سالم و قوی جهت پرواریندی می‌باشد.

از میان مهمترین عوامل محیطی موثر در پرورش ماهی

می‌توان به درجه حرارت، شوری و نور اشاره نمود. نور

به عنوان یکی از فاکتورهای مهم فیزیکی برای کلیه آبزیان یکی از مشکلات موجود در پرورش ماهیان، پرورش در مرحله نوزادی می‌باشد چرا که در این مرحله لاروها از رشد

1- Dark = تاریکی

2- Light = روشنایی

* - مسئول مکاتبه: karimgol@gmail.com

می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد مطالعه حاضر در راستای دستیابی به اهدافی از جمله:

- ۱- تعیین اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه
- ۲- تعیین الگوهای رفتاری نوزادهای ماهی کلمه تحت تأثیر اثرات نور و دوره‌های نوری طراحی و به اجرا درآمده است که با یافتن اثرات رنگ نور و دوره های نوری مناسب می‌توان ماهیان با کیفیتی تولید نمود، تا اینکه در مراحل بعدی زندگی از رشد و بقاء مناسبی برخوردار باشند.

مواد و روش‌ها

این مطالعه در یک دوره ۱۴ روزه در اردیبهشت ۱۳۸۷ انجام شد. برای این مطالعه، نوزادهای ماهی با وزن اولیه تقریبی $3/1$ میلی گرم از استخرهای پرورشی از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال جمع‌آوری شدند. جهت سازگاری ماهی‌ها با شرایط جدید، ماهی‌ها به مدت یک هفته در ۲ تشت فایبرگلاسی 200 لیتری نگهداری شدند. نوزادهای کلمه در طول این مدت با غذای کنستانتره SFK مخصوص نوزادان ماهی سفید، تغذیه شدند. غذادهی روزانه در ۳ نوبت ($14/8$ و 21) انجام شد. درجه حرارت آب در تشت‌های آداسیون در محدوده $18-20$ درجه سانتی‌گراد تنظیم گردید.

برای انجام آزمایش، از دو سطح رنگ نور (نور قرمز، نور سفید) و دو دوره نوری (12 ساعت روشنایی - ساعت تاریکی و 24 ساعت روشنایی - صفر ساعت تاریکی) در یک طرح بلوك کامل تصادفی استفاده شد. بدین ترتیب، 4 تیمار و 3 تکرار به شرح زیر ایجاد شد: نور قرمز $12L/12D$ ، نور سفید $12L/12D$ ، نور قرمز $24L/00D$ ، نور سفید $24L/00D$. برای ایجاد نور از لامپ‌های فلوئورسنت معمولی (لامپ‌های 40 واتی پشت جیوه‌ای سفید و قرمز) در فاصله 40 سانتی‌متری از سطح آب در دوره‌های مختلف نوری مطابق روش Daniel و همکاران (۱۹۹۶) استفاده شد. همچنین، از نایلون‌های

شدت^۱، طیف^۲ و طول دوره نوری^۳ اثرات مهمی روی رشد، بازماندگی، رسیدگی جنسی، تولید مثل و حتی نسبتهاي جنسی آبزیان دارند (۲۴). در این میان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و بقاء نوزادهای ماهیان، دوره نوری است (۵)، با این وجود، مطالعات چندان زیادی در زمینه اثرات پارامترهای نوری روی آبزیان از جمله ماهی کلمه صورت نگرفته است.

مطالعات مختلف نشان از تفاوت‌های ویژه در رفتار، جذب غذا، رشد و بازماندگی آبزیان در شرایط مختلف نوری دارند (۶، ۷ و ۱۴). Pienaar و Britz در سال ۱۹۹۲ با انجام طرح‌های نوری روی نوزادهای Clarias gariepinus از خانواده کپور ماهیان به این نتیجه رسیدند که نوزادهای ذکر شده تحت تاثیر رژیم نوری با شدت نور پائین بهترین رشد را دارند که با نتایج مطالعات انجام شده روی نوزادهای خرچنگ گرد و بزرگ استرالیایی (Pseudocarcinus gigas) توسط Maguire و Gardner در سال ۱۹۹۸ و همچنین نوزادان گربه ماهی (Wallago attu) توسط Giri و همکاران در سال ۲۰۰۲ مشابه بودند. آنها همچنین گزارش کردند که ماهیان در تیمارهای روشنایی دارای رشد بالاتری نسبت به تیمارهای تاریکی می‌باشند.

در استخرهای خاکی پرورش آبزیان که به وسیله کوددهی کاملاً غنی از جوامع پلانکتونیک شدند، در مقایسه با استخرهای با شکوفایی‌های ضعیف، شدت‌های نوری کمتری در ناحیه کف استخر دیده می‌شود (۲۱). از طرف دیگر، مدت زمانی که چنین شدت نوری بر روی استخرها تاییده می‌شود نیز اهمیت بسزایی در رشد و بازماندگی آبزیان پرورشی خواهد داشت (۲۵). با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت رنگ نور و دوره‌های نوری از جمله عوامل محیطی بسیار مهم در ماهیان می‌باشند که روی الگوهای رشد، بقا و رفتار آنها تاثیر می‌گذارند (۱۴). از آنجا که دسترسی به اطلاعاتی در مورد تأثیر دوره‌های نوری و رنگ نور با شدت روشنایی مشخص

1- Intensity

2- Spectrum

3- Photoperiod

واریانس دو طرفه (Two-way ANOVA) انجام گردید. مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن (Duncan) در سطح اطمینان ۵ درصد انجام شد.

نتایج

پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره آزمایش نوسان کمی داشت، به طوری که میزان اکسیژن محلول، درجه حرارت و pH آب در کلیه تانک‌ها به ترتیب بالاتر از ۵ میلی‌گرم در لیتر، ۱۸–۲۰ درجه سانتی‌گراد و ۷/۸–۸/۵ متغیر بود.

وزن تراولیه و نهایی و همچنین مقادیر FCR برای بچه‌ماهی کلمه مورد آزمایش، در رنگ‌ها و دوره‌های مختلف نوری در جدول ۱ آمده است.

کمترین مقادیر FCR بچه‌ماهی‌ها در تیمار نور قرمز با ۲۴ ساعت روشنایی بدست آمد که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها داشت ($P < 0.05$). اما دو تیمار (نور قرمز ۱۲L/۱۲D) و (نور سفید ۱۲L/۱۲D) اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند ($P > 0.05$). ترتیب تیمارها بر اساس مقادیر FCR آنها از بیشترین به کمترین مقدار بترتیب به صورت نور سفید (۱۲L/۱۲D) < (نور قرمز ۱۲L/۱۲D) < نور سفید (۲۴L/۰۰D) < نور قرمز (۲۴L/۰۰D) بود (جدول ۱).

با وجود اختلافات جزئی در درصد بازماندگی بین تیمارها، اختلافات معنی‌داری در بین آنها مشاهده نشده و دامنه بازماندگی در کلیه تیمارها در حد مناسبی بوده است (جدول ۱).

سیاه بهمنظور جدا کردن تیمارها و ایجاد دوره‌های مختلف نوری استفاده شد.

لاروهای جوان در تشت‌های پلاستیکی ۴۰ لیتری با ۲۰ لیتر آب و تراکم ۱۰۰ عدد در هر تشت قرار گرفتند. از یک تور پلاستیکی جهت جلوگیری از بیرون پریدن ماهی‌ها و ایجاد پوشش بر روی هر تشت استفاده شد. در طول دوره آزمایش ماهی‌ها روزانه ۳ بار (در ساعت‌های ۸، ۱۴ و ۲۱) با استفاده از غذای کنستانتره SFK غذاده‌ی شدند. همچنین روزانه یک بار باقیمانده غذاها و فضولات از هر تشت خارج شدند. کیفیت روزانه آب با استفاده از دستگاه‌های اکسیژن متر، دماسنجه و pH سنج اندازه‌گیری شد.

وزن اولیه ماهی‌ها با ترازوی دیجیتالی اندازه‌گیری شد. میزان بازماندگی بچه‌ماهی‌ها (بر حسب درصد) در طول دوره آزمایش بر اساس تعداد نمونه‌های اولیه و نهایی لاروهای ذخیره شده تعیین گردید. در پایان دوره مجدداً ماهی‌های هر تشت توزین و در نهایت ضریب تبدیل غذایی (FCR) بر اساس وزن تر ماهی‌ها و با استفاده از معادله (۱) گردید:

$$\text{معادله (۱)} \quad \text{FCR}_W = \frac{C}{W_2 - W_1}$$

W_1 : وزن تراولیه بچه‌ماهی بر حسب میلی‌گرم

W_2 : وزن تراهنایی بچه‌ماهی بر حسب میلی‌گرم

C : کل غذای داده شده به بچه‌ماهی بر حسب میلی‌گرم تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها: پس از شمارش نمونه‌ها، رسم نمودارها با نرم افزار Excel و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS (Version 13.5) و با روش آنالیز تجزیه

جدول ۱- رشد بچه‌ماهی کلمه در شرایط مختلف رنگ نور و طول دوره نوری

تیمار	وزن اولیه (میلی‌گرم)	وزن نهایی (میلی‌گرم)	FCR	درصد بازماندگی
نور قرمز ۱۲L/۱۲D	^a ۳/۰۶ ± ۰/۰۶	^a ۲۱/۰۴ ± ۰/۱	^a ۰/۹۸ ± ۰/۰۰۲	^a ۸۷/۹۶ ± ۱/۳
نور سفید ۱۲L/۱۲D	^a ۳/۱ ± ۰/۲۶	^b ۲۰/۲ ± ۰/۰۵۵	^b ۱/۰۵ ± ۰/۰۳۶	^a ۸۶/۷۵ ± ۲/۰۳
نور قرمز ۲۴L/۰۰D	^a ۳/۱۳ ± ۰/۰۵	^c ۱۷/۵۸ ± ۰/۰۵	^c ۱/۲۴ ± ۰/۰۳۸	^a ۸۹/۹۳ ± ۰/۰۷۳
نور سفید ۲۴L/۰۰D	^a ۳/۱ ± ۰/۰۲	^c ۱۷/۰۶ ± ۰/۱۱	^c ۱/۲۸ ± ۰/۰۱	^a ۸۷/۴۸ ± ۰/۰۷۹

(مقادیر مربوط به میانگین ± انحراف از معیار (سه تکرار) در سطح کمتر از $P < 0.05$ می‌باشد)

* حروف مشابه نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار است.

بحث و نتیجه‌گیری

می‌گردد و استرس کمتری به بچه‌ماهیان این تیمارها وارد شده است. برتری FCR تیمارهای با نور قرمز نسبت به تیمارهایی با نور سفید می‌تواند تاییدی بر این مطلب باشد.

به دلیل وجود قطرات چربی در شبکیه چشم لاروها نور قرمز قدرت اکتساب غذا را بهبود می‌بخشد. قطرات چربی اشعه‌های با طول موج پایین‌تر را فیلتر کرده و به اشعه‌های با طول موج بالاتر اجازه عبور می‌دهند. نوزادهای پرورش یافته تحت تأثیر نور قرمز به دلیل افزایش توان دید از مواد غذایی در دسترس راحت‌تر تغذیه می‌کنند و استرس کمتری دارند. از این رو با بهبود جذب غذا توسط لاروها همچنین خواری در بین لارو ماهیانی که این چنین رفتاری را دارند کاهش می‌یابد، چرا که گرستگی یکی از عوامل مهم شروع همچنین خواری در لارو ماهیان است. همچنین در صورت فراهم بودن غذای کافی و نیز وجود نور قرمز ملایم در محیط با ایجاد کتراست نوری بیشتر، ماهی جهت مصرف غذایی بیشتر تحریک شده و در نتیجه رشد و بقای بهتر حاصل می‌شود. در چنین شرایطی نوزادها احساس امنیت غذایی بیشتری می‌کنند و در نتیجه رشد سریعتری خواهند داشت (۱۴). احتمالاً تاریکی مداوم توانایی کسب غذا را در لاروهای ماهیان استخوانی کاهش می‌دهد، زیرا ماهیان استخوانی جهت دریافت غذا به قدرت بینائی خود متکی هستند (۱۶). این موضوع بخصوص برای ماهیانی که تازه شروع به تغذیه فعال نموده‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۱۰).

Giri و همکاران (۲۰۰۲) بیان کردند که هیچ اختلاف معنی‌داری در رشد ماهی Wallago attu در دوره‌های نوری $D/0.0L$ ، $D/12L$ ، $D/24L$ و $D/240L$ وجود ندارد. با این وجود در تحقیق حاضر، FCR بهتری در تیمار نور قرمز ($D/0.0L$)، و تیمار نور سفید ($D/0.0L$) نسبت به سایر تیمارها دیده شد. شاید بتوان تصور کرد که دوره روشنایی ۲۴ ساعته تأثیر بیشتری در یافتن و تشخیص غذا ایجاد کرده و بدین ترتیب ماهی باوضوح

دسترسی به اطلاعاتی در مورد تأثیر دوره‌های نوری و رنگ نور با شدت روشنایی مشخص می‌تواند داده‌های با ارزشی را در اختیار قرار دهد که با دانستن این داده‌ها می‌توان ماهیان با کیفیت خوب تولید نمود، تا از رشد و بقاء مناسبی در مراحل بعدی زندگی برخوردار باشند. بنابراین برای تعیین اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی و همچنین الگوهای رفتاری بچه‌ماهیان کلمه، مطالعه حاضر طراحی و اجرا شده است. جوامع پلانکتونیک بالایی در آب‌های غنی از مواد مغذی به وجود آمده و بهمین دلیل رشد ماهی‌ها در این آبها بیشتر از آب‌های فقیر می‌باشد. احتمالاً برخی از فاکتورهای جنبی دیگر می‌توانند سبب افزایش رشد ماهی‌ها در استخراهی خاکی غنی از مواد غذایی گردند (۱۹). اختلافات معنی‌داری در مورد طیف و شدت نور در بین آبهایی غنی و فقیر از مواد مغذی وجود دارد (۲۰، ۲۱ و ۲۳). پلانکتون‌ها و ذرات آلی محلول نه تنها سبب کاهش شدت نور شده بلکه می‌توانند طیف نوری را از محدوده آبی - سبز به محدوده سبز - نارنجی تغییر دهند (۲۴). افزایش شکوفایی سبب ایجاد سایه بر روی استخراها شده و از تراکم جلبک‌های کفرزی جلوگیری می‌نماید؛ بهمین دلیل میزان استرس وارد به ماهی‌ها در این شرایط کاهش می‌یابد (۲۱ و ۲۲).

به نظر می‌رسد که در زمان تمیز کردن فضولات تشتلهای پرورشی، لاروها تحرک کمتری در رنگ نور قرمز در مقایسه با نور سفید دارند. این مسئله (تحرک کمتر) می‌تواند سبب صرف انرژی بیشتر برای رشد بدنی و سوماتیکی و در نهایت بهبود رشد ماهی‌ها گردد (۱۷). در مطالعه حاضر، بهتر بودن ضریب تبدیل غذایی ماهی‌های پرورش یافته در رنگ نور قرمز می‌تواند سبب FCR در افزایش میزان رشد آنها گردد. کم بودن FCR در تیمارهایی با رنگ نور قرمز در مقایسه با تیمارهای با رنگ نور سفید در این تحقیق می‌تواند نشان دهنده این مطلب باشد. به نظر می‌رسد نور قرمز باعث آرامش بیشتر ماهی‌ها

رفتار پرخاشگری در میان این ماهیان می‌گردد. نرخ رشد ویژه و بیوماس کل در نوزادهای ماهی سفید پرورش یافته در روشنایی ۲۴ ساعته نور قرمز بیشترین مقدار را داشته است و تاریکی کامل کمترین تأثیر را داشت (۱).

در مطالعه حاضر، دوره‌های نوری اختلاف معنی‌داری را در بازماندگی ماهی کلمه ایجاد نکردند. بازماندگی ماهی‌ها در کلیه سطوح نوری در حد نسبتاً بالایی قرار داشته است که با داده‌های بدست آمده توسط ایمانپور (۱۳۸۴) روی بازماندگی پرورش لاروی ماهی سفید دریای خزر مطابقت داشت.

به نظر می‌رسد رشد ماهی کلمه می‌تواند به طور بالقوه بوسیله دستکاری در رنگ و طول دوره نوری در سیستم‌های پرورشی بدون هیچ اثر سوء بر روی میزان بازماندگی، بهبود یابد. با توجه به این مطالعه، جهت دستیابی به میزان رشد و بازماندگی بالاتر در لاروهای ماهی کلمه، رنگ نور قرمز و دوره نوری ۲۴ ساعت روشنایی پیشنهاد می‌گردد.

اگر چه کترل نور در استخراهای پرورشی روباز به صورت عملی مقدور نمی‌باشد ولی یافته‌های این مطالعه می‌تواند راهکشای مناسبی برای سیستم‌های متراکم سرپوشیده باشد. با این وجود لازم است که مطالعات بیشتری در آینده بر روی اثرات شدت، طیف و طول دوره نوری بر روی مراحل مختلف زندگی ماهی کلمه صورت گیرد.

بیشتری قادر به دریافت غذا است. این مسئله می‌تواند یکی از دلایل برتری تیمارهای با دوره نوری ۲۴L/۰۰D نسبت به سایر تیمارهای باشد. *Dendrinos* و همکاران (۱۹۸۴) در تحقیق مشابهی دریافتند که ایجاد کتراست غذا در طول دوره حساس تغذیه اولیه در لارو ماهی نقش مهمی در بقاء لاروها ایفاء می‌کند. در همین آزمایشات بر روی لارو ماهی *Dover sole* دریافتند که کمترین درصد بازماندگی در شرایط تاریکی بدست آمده که علت آن ناشی از کاهش تمایز و کتراست غذا با محیط بود (۱۰ و ۱۸).

رشد و مصرف غذا در ماهیان بوسیله افزایش طول دوره نوری بهتر می‌شود (۱۵). در ماهی *Sebastes diploproa* مقایسه با ۱۲L/۸D دوره نوری در ۱۶L/۸D رشد بهتری نشان داد (۷). همچنین در سیم دریایی (*Dicentrarchus labrax*) بهترین رشد در دوره نوری ۱۸ ساعت روشنایی گزارش شد (۴). در خرگوش ماهی (*Siganus guttatus*) رشد بهینه در روشنایی مداوم گزارش شد (۱۱). در دوره‌های مختلف نوری، نور مستمر ۲۴ ساعته بیشترین رشد را در لارو *Britz* ماهی قزلآلای رنگین کمان داشته است (۲). و *Pienaar* (۱۹۹۲) با انجام طرح‌های نوری روی نوزادان *Clarias gariepinus* به این نتیجه رسیدند که نوزادان تحت رژیم نوری با شدت نور پایین‌تر بهترین رشد را داشتند. آنها عنوان کردند که افزایش نور و چراغانی کردن محیط سبب افزایش استرس و افزایش

منابع

- ۱-ایمانپور، م.ر.، ۱۳۸۴. اثرات طیف نور، دوره‌های نوری و غنی‌سازی روی پرورش لاروی و تنظیم اسمزی بچه ماهیان سفید. رساله دکتری شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۲-پاکزاده سورکی، م.، ۱۳۸۶. اثرات نورگرایی، رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد، بقاء و ماندگاری لارو ماهی قزلآلای رنگین کمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۳-مجدی‌نسب، ف.، ۱۳۷۶. مدیریت بهداشت در استخراهای پرورش میگو (تألیف پی. کال راچاکول، جی.اف.ترنیال) معاونت تکثیر و پرورش آبزیان.
- 4.Barahona-Frandes, M.H. 1979. Some effects of light intensity and photoperiod on the seabass larvae (*Dicentraarchus labrax* L.) reared at the Centre Oceanologique de Bretagne. Aquaculture 17, 311-321.
- 5.Barnabe, G. 1990. Rearing bass and gilthead bream. In: Barnabe, G. (Ed.), Aquaculture 2, 647-686.
- 6.Blaxter, J.H.S. 1968. Visual thresholds and spectral sensitivity of herring larvae. J. Exp. Biol. 48, 39-53.

- 7.Boehlert, G.W. 1981. The effects of photoperiod and temperature on laboratory growth of juvenile *Sebastes diploproa* and a comparison with growth in the field. Fish. Bull. 79, 789–794.
- 8.Britz, P.J., Pienaar, A.G. 1992. Laboratory experiments on the effect of light and cover on the behaviour and growth of African catfish, *Clarias gariepinus* (Pisces: Clariidae). J. Zool. Lond. 227, 43-62.
- 9.Daniel, H.V. et al. 1996. Effect of stocking density, salinity and light intensity on growth and survival of Southern flounder *Paraichthys lethostigma* larvae. Journal of Word Aquaculture. Soc. 27, pp.153-159.
- 10.Dendrinos, P., Dewan, S., and Thorpe, J.P. 1984. Improvement in the feeding efficiency of larval, post-larval and juvenile Dover Sole (*Solea solea* L.) by the use of staining to improve the visibility of Artemia used as food. Aquaculture 38, 137–144.
- 11.Duray, M. and Kohno, H. 1988. The effects of photoperiod and temperature on laboratory growth of juveniles *Sebastes diploprora* and a comparison with growth in the field. Fish. Bull. 79 (4),789-794.
- 12.Gardner, C., and Maguire, B.M. 1998. Effect of photoperiod and light intensity on survival, development and cannibalism of larvae of the Australian giant crab *Pseudocarcinus gigas* (Lamarck). Aquaculture 165, 51–63.
- 13.Gehrke, P.C. 1994. Influence of light intensity and wavelength on phototactic behaviour of larval silver perch *Bidyanus bidyanus* and golden perch *Macquaria ambigua* and the effectiveness of light traps. Journal of Fish Biology 44, 741–751.
- 14.Giri, S.S., Sahoo, S.K., and Sahu, B.B. 2002. Larval survival and growth in *Wallago attu* (Bloch and Schneider): effects of light, photoperiod and feeding regimes. Aquaculture 213, 151–161.
- 15.Gross, W.L.; Roelofs, E.W. and Fromm, P.O. 1965. Influence of photoperiod on growth of green sunfish, *Lepomis cyanellus*. J. Fish. Res. Bd. Can. 22, 1379–1386.
- 16.Hart, P.R., Hutchinson, W.G., and Purser, G.J. 1996. Effect of photoperiod, temperature and salinity on hatchery-reared larval of green back flounder *Rhombosolea tapirina*. Aquaculture 144, 303–311.
- 17.Hoang, T., Barchiesis, M., and Lee, S.Y. 2003. Influences of light intensity and photoperiod on moulting and growth of *Penaeus merguiensis* under laboratory condition. Aquaculture 216, 343–354.
- 18.Howell, B.R. 1997. Aspects of the development of cultivation techniques for flatfish. Ph.D Thesis, University of Liverpool, Port Erlin, 105 p.
- 19.Leberand, K.M., and Pruder, G.D. 1988. Using experimental microcosms in shrimp research: the growth-enhancing effect of shrimp pond water. J. World Aquac. Soc. 19, 197– 203.
- 20.Lei, Y.Z. 1992. Freshwater Aquaculture Chemistry, 2nd ed. Guang Xi Press, Nanning, pp. 34–37.
- 21.McFarland, W.N. 1986. Light in the sea-correlations with behaviours of fishes and invertebrates. Am. Zool. 26, 389–401.
- 22.Sahu, B.K. 2002. White Indian Shrimp culture. The First Handbook of: Asian Fisheries Technology and management (LFTM).
- 23.Valiela, I. 1995. Marine Ecological Processes, 2nd ed. Springer-Verlag, New York, p. 39.
- 24.Wang, F., Dong, D.S., Huang, G.Q., Wu, L.X., Tian, X.L., and Ma, S. 2003. The effect of light color on the growth of Chinese shrimp *Fenneropenaeus chinensis*. Aquaculture 228, 351–360.
- 25.Wang, F., Dong, S.-L., and Dong, S.-S., et al. 2004. The effect of light intensity on the growth of Chinese shrimp *Fenneropenaeus chinensis*. Aquaculture 234, 475–483.

**Photo's color effects and photoperiods on growth and survival rate in
Rutilus rutilus caspicus larvae of Caspian sea**

K. Golshahi¹, K. Amani², M.S.Aramli³ and H.R. Moradnezhad⁴

^{1,3}Islamic Azad University, North Tehran branch, Marine Science Faculty, ²M.Sc. Graduate of Fisheries, Islamic Azad University, SavadKoh Branch, ⁴M.Sc. student of Fisheries, Tarbiat Modares University, Natural Resources and Marine Science Faculty, Noor

Abstract

In a 14 days period, photo's color effects and photoperiod on growth and survival rate in *Rutilus rutilus caspicus* larvae have studied. The roach larvae have provided from fish reproduction and culture center of sijual. After adaptation, the larvae have stocked with primary weight 3.1 mg in som tanks (40 lit) that there were just 20 lit fresh water in, with 100/each tank. Using fluorescent lights, two photic treatment have studied that include red and white color and tow photoperiods that consisted of 12L/12D and 24L/00D in four different treatment including red photo and 24L/00D, red photo and 12L/12D, white photo and 24L/00D and white photo 12L/12D. Along analysis the temperature were in 18-20 °C. Results showed that red photo and 24L/00D have maximum rate of growth and minimum FCR and so have significant difference with other treatment, while to treatments red photo 12L/12D and white photo 12L/12D have not significant different and then they have minimum rate of growth and maximum FCR. Also, photoperiods didn't show any significant difference as larvae survival rate. In all of photic levels, the survival rate were relatively high.

Keywords: Survival rate; Photoperiod; Photo's color; Growth; *Rutilus rutilus caspicus*

*- Corresponding Author; E-mail: karimgol@gmail.com