

اثر سن، طول و وزن مولдин ماہی سفید (*Rutilus frisii kutum*, kamensky 1901)

ماده مهاجر به رودخانه شیروود بر کارایی تکثیر مصنوعی

*حسین خارا¹، نرگس علیجانپور¹، سیده زهرا فلاح شمسی¹

سیدهادی موسوی²، مینا رهبر¹ و محمدثه احمدنژاد³

¹ گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامیجان، مرکز تکثیر و بازسازی

ذخایر شهید رجایی ساری، ² پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی، بندaranzli

چکیده

ماهی سفید (*Rutilus frisii kutum*) از مهم‌ترین ماهیان استخوانی سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد که جهت تخم‌ریزی به رودخانه‌های متنهی به دریای خزر از جمله رودخانه شیروود وارد می‌شود. در روند تکثیر مصنوعی ماہی سفید، عوامل متفاوتی دخیل می‌باشند که از مهم‌ترین آن‌ها کیفیت و کمیت مولдин ماده و تخمک‌های استحصالی از آن‌ها می‌باشد. به همین دلیل بررسی اثر سن، وزن و طول مولдин ماہی سفید مهاجر به رودخانه شیروود روی کارایی تکثیر مصنوعی در فصل تکثیر ضروری به نظر رسید. بدین منظور از اسفند 1386 تا اردیبهشت 1387، 90 عدد مولد ماہی سفید ماده مورد بررسی قرار گرفتند. طبق بررسی‌های انجام گرفته میانگین طول کل 43/26 سانتی‌متر، میانگین وزن 832/08 گرم، میانگین سن 41/41 و وزن تخم 31/146 عدد، میانگین قطر تخمک 1/85 میلی‌متر، میانگین تعداد گرم تخم خشک 49/294 عدد، میانگین هم‌آوری مطلق 41370 عدد، میانگین هم‌آوری نسبی 52 و میانگین درصد لقاد 55/93 عدد بود. همچنین براساس آزمون کروسوکال والیس و من ویتنی بین سن ماہی و تمامی فاکتورها به غیر از هم‌آوری نسبی اختلاف معنی‌دار آماری به دست آمد. رابطه بین سن ماہی و فاکتورهای فوق خطی و ضعیف تا متوسط، ولی رابطه طول چنگالی و وزن با این فاکتورها متوسط تا قوی بود. با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که افزایش سن مولдин ماہی سفید اثر مثبتی روی کارایی تکثیر مصنوعی دارد.

واژه‌های کلیدی: رودخانه شیروود، سن، طول، کارایی تکثیر مصنوعی، ماہی سفید، وزن.

1980). با توجه به اهمیت این ماهی برای بازسازی و حفظ ذخایر آن در دریای خزر، شرکت سهامی شیلات ایران در سال‌های اخیر اقدام به احداث کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماہی در استان‌های شمالی کشور نمود که با تکثیر و پرورش و سپس رهاسازی میلیون‌ها قطعه بچه‌ماهی (2-1 گرمی) به رودخانه‌های متنهی به دریای خزر، نسل این گونه از انقراض حتمی نجات یافته است (رضوی‌صیاد، 1378).

سالیانه در بیش از 15 رودخانه متنهی به دریای خزر در سواحل ایران تکثیر مصنوعی ماہی

مقدمه

ماهی سفید گونه‌ای منحصر به فرد، بومی و دارای ارزش اکولوژیکی، اقتصادی و غذایی فراوان می‌باشد (رضوی‌صیاد، 1378) که نسل آنها در سال‌های اخیر به دلیل صید بی‌رویه، افزایش آلودگی‌ها، تخریب بستر رودخانه‌ها، عدم امنیت جهت مهاجرت و... کاهش یافته است (غنى‌نژاد و همکاران، 1379؛ رضوی‌صیاد، 1371؛ Coad, Walczak و Ralonde, 1971).

* مسئول مکاتبه: h_khara1974@yahoo.com

فوق رسیده شده و قابلیت لقاح تخمکها به طور کل از بین می‌رود (Lahnsteiner, 2000).

بنابراین با توجه به اهمیت این ماهی در تأمین بخش اعظمی از پروتئین مورد نیاز و بازسازی ذخائر این ماهی و به منظور افزایش درصد لقاح و بهبود کیفیت و سلامت لاروهای تفریخ شده، بررسی اثر سن، وزن و طول ماهی سفید ماده مهاجر به رودخانه شیرود روی کارایی تکثیر مصنوعی ضروری و مؤثر به نظر می‌رسد.

مواد و روش کار

این تحقیق در فصل مهاجرت تولیدمثی ماهی سفید به رودخانه شیرود از نیمه دوم اسفند 1386 تا پایان اردیبهشت 1387 انجام پذیرفت. برای این منظور 90 عدد ماهی سفید ماده به وسیله تور سالیک در مصب رودخانه شیرود صید شدند. سپس از ماهیان صید شده بدون تزریق هورمون و با فشار روی ناحیه شکمی تخم‌کشی انجام شد تخم‌ها درون تشتک‌های پلاستیکی ریخته شدند. پس از تخم‌کشی وزن کل تخمک، قطر تخمک و تعداد در گرم تخم خشک اندازه‌گیری می‌گردید. آنگاه بلا فاصله تخم‌های حاصله به وسیله اسپرم 2 تا 3 مولد نر، لقاح داده شدند. چند ثانیه بعد از افزودن اسپرم و هم زدن مخلوط تخمک و اسپرم، جهت افزایش امکان لقاح و در نهایت رفع چسبندگی به آن‌ها آب افزوده شد. تخم‌ها پس از آب‌کشی و از بین رفتن چسبندگی طی مراحل انکوباسیون درون انکوباتورهای سث‌گرین مستقر در داخل رودخانه ریخته شدند. همزمان با عمل تکثیر مصنوعی قطر تخم آب کشیده، تعداد در گرم تخم آب کشیده، هم‌آوری مطلق، هم‌آوری نسبی و درصد لقاح اندازه‌گیری شد (Billard, 1990). همچنین طول چنگالی مولдин ماده به وسیله تخته بیومتری با دقیقیت 1 میلی‌متر و وزن آن‌ها توسط ترازوی دیجیتال با دقیقیت 0/01 گرم اندازه‌گیری شد. سپس جهت تعیین سن

سفید انجام می‌شود که رودخانه شیرود بیشترین سهم را در تکثیر مصنوعی این ماهی ایفاء می‌نماید. رودخانه شیرود از به هم پیوستن دو شاخه اصلی و پر آب که در دو جهت نسبتاً موازی با یکدیگر جریان دارد، تشکیل می‌شود. طول این رودخانه 30 کیلومتر می‌باشد. از این رودخانه در طول سال به طور متوسط 125/29 میلیون مترمکعب آب وارد دریا می‌شود. رودخانه شیرود از نظر تنوع انواع ماهیان یکی از بالارزش‌ترین رودخانه‌های غرب استان مازندران محسوب گشته و در حال حاضر از مهم‌ترین جایگاه‌های مهاجرت ماهی سفید در فصل تخم‌ریزی به شمار می‌رود (ابو، 1373).

تاکنون مطالعات مختلفی راجع به تکثیر مصنوعی ماهی سفید انجام گرفته است (عمادی، 1353؛ آذری تاکامی، 1356؛ آذری تاکامی و رضوی صیاد، 1369؛ بهزادی، 1370؛ رضوی صیاد، 1374؛ سبحانی شانی، 1377؛ گرایلی افرا، 1379؛ رسولی، 1384؛ موسوی، 1383؛ نجارلشگری، 1385). ولی سن، وزن و طول از جمله فاکتورهای اساسی هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این در حالی است که ثابت شده رابطه معنی داری بین سن، طول و وزن و کارایی تکثیر ماهیان وجود دارد (Springate و Hemkaran, 1985؛ Gall, 1974؛ Kjorsvik, 1985؛ Murray and Beachman, 1990؛ Quinn, 1992؛ Bloomberg, 2004؛ Kayam, 2000؛ Alp and Hemkaran, 2003). با افزایش سن، وزن و به تاخیر افتادن عمل تخم‌کشی، به تدریج تغییراتی در ترکیب مایع سلومیک و محتوی تخمک‌ها اتفاق می‌افتد که احتمالاً همین تغییرات مرفوژولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیابی مسئول کاهش کیفیت تخمک‌ها، کاهش درصد لقاح، چشم‌زدگی، ظهور لارو و بروز ناهنجاری و تلفات در مراحل بعدی می‌باشند. با به تاخیر افتادن عمل تخم‌کشی، تخمک‌ها

پارامترهای سن، طول و وزن با پارامترهای مربوط به لفاح در جدول 3 آمده است.

با توجه به آزمون کروسکال-والیس، بین سنتین مختلف از نظر میانگین وزن تخمک استحصالی، قطر تخمک بعد از فرمالین زدن و هم‌آوری مطلق اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد ($P \leq 0.05$). نتایج آزمون من-ویتنی نشان می‌داد که بین گروههای سنی (3 و 5) (3 و 6) (4 و 5) (4 و 6) به صورت دو به دو از نظر میانگین فاکتورهای فوق اختلاف معنی دار آماری وجود دارد.

با توجه به آزمون کروسکال-والیس، بین سنتین مختلف از نظر تعداد در گرم تخم خشک، قطر تخم آب‌کشیده و تعداد در گرم تخم خشک اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد ($P \leq 0.05$) و آزمون من-ویتنی نشان داد که بین گروههای سنی 3 و 5 و 6 و 4 و 5 به صورت دو به دو از نظر تعداد در گرم تخم خشک، بین گروههای سنی 3 و 5 و همچنین 4 و 5 به صورت دو به دو از نظر قطر نیز تخم آب‌کشیده و بین گروههای سنی 3 و 4، 3 و 5 و 3 و 6 به صورت دو به دو از نظر تعداد در گرم تخم خشک اختلاف معنی دار آماری وجود داشت.

با توجه به آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه، بین سنتین مختلف از نظر میانگین قطر تخمک استحصالی اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید ($P \leq 0.05$). آزمون دانکن نشان داد که از نظر میانگین قطر تخمک استحصالی، بین گروههای سنی 3 و 4، 3 و 5، 3 و 6 و همچنین 4 و 6 اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($P \leq 0.05$).

با توجه به آزمون کروسکال-والیس، بین سنتین مختلف از نظر هم‌آوری نسبی و درصد لفاح اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد ($P > 0.05$). ولی آزمون من-ویتنی نشان داد که بین گروه سنی (4 و 5) از نظر درصد لفاح، اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($P \leq 0.05$).

ماهیان با استفاده از روش فلسفه‌خوانی، تعدادی فلسف از قسمت میانی بدن ماهی سفید بین باله پشتی و سینه‌ای برداشته شد (پرافکنده حقیقی، 1379).

برای محاسبه درصد لفاح، پس از گذشت 5 ساعت از عمل لفاح، زمانی که تخم‌های لفاح یافته به مرحله 8 سلولی به بالا رسیدند، تعداد معینی تخم به همراه محلول اسیداستیک رقیق شده با آب مقطر در داخل پتری دیش ریخته و در زیر لوب تخم‌های شفاف و لفاح یافته از تخم‌های مات و ناسالم و لفاح نیافتہ مشخص گردید، سپس طبق فرمول زیر مقدار آن محاسبه شد (رضوی‌صیاد، 1374).

$$\frac{\text{تعداد تخمک‌های لفاح یافته}}{\text{تعداد کل تخمک‌ها}} \times 100 = \text{درصد لفاح}$$

در پایان اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS.10.0.13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور با توجه به نرمال نبودن داده‌ها (آزمون Shapiro Wilk)، از آزمون کروسکال-والیس و آزمون من-ویتنی برای داده‌های با درصد اطمینان 95 درصد ($P \leq 0.05$) استفاده شد. از روابط رگرسیونی نیز برای تعیین میزان ضریب همبستگی فاکتورهای مختلف استفاده شد.

نتایج

وزن مولدهای ماده مهاجر به روختانه شیروود، 832/08 گرم (حداقل 315 و حداکثر 2216 گرم)، میانگین طول کل 43/26 سانتی‌متر (حداقل 32/4 و حداکثر 59/6 سانتی‌متر) و میانگین طول چنگالی، 54/7 39/20 سانتی‌متر (حداقل 29/1 و حداکثر 4/41 سانتی‌متر) بود. همچنین میانگین سنی آن‌ها، سال (حداقل 3 و حداکثر 7 سال) بود (جدول 1).

نتایج حاصل از سن روی پارامترهای مربوط به لفاح تخمک در جدول 2 و میزان همبستگی بین

جدول 1- زیست‌سنجی ماهیان سفید مولد ماده مهاجر به رودخانه شیرود

انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	فاکتور
368/19	832/08	2216	315	وزن (گرم)
5/82	43/26	59/6	32/4	طول کل (سانسی متر)
5/40	39/20	54/7	29/1	طول چنگالی (سانسی متر)
0/93	4/41	7	3	سن

جدول 2- اثر سن روی پارامترهای مربوط به لقاح تخمک

(n=90) کل	(n=1) 7	(n=9) 6	(n=32) 5	(n=32) 4	(n=16) 3	سن
/31±75/002 146 (36-416)	/00±0 416	/56±64/736 202 (125-312)	/28±72/366 167 (84-387)	/94±54/950 125 (53-258)	96/63±53/616 (36-224)	وزن تخمک استحصالی (گرم)
1/85±0/113 (1/30-2/04)	1/99±0	1/91±0/057 (1/98-1/83)	1/86±0/069 (1/74-2/04)	1/83±0/103 (1/58-1/99)	1/74±0/145 (1/30-1/90)	قطر تخمک (میلی متر)
2/68±0/19 (2/27-2/24)	2/85±0	2/65±0/1 (2/52-2/79)	2/76±0/16 (2/52-3/20)	2/66±0/19 (2/37-3/24)	2/56±0/213 (2/27-3/10)	قطر تخم آبکشیده (میلی متر)
1/99±0/1269 (1/7-2/4)	2/04±0	2/08±0/1100 (2/0-2/4)	2/04±0/1000 (1/8-2/2)	1/94±0/1199 (1/7-2/2)	1/93±0/1437 (1/8-2/2)	قطر تخمک بعد از فرمالین زدن (میلی متر)
/49±43/757 294 (199-446)	/00±0	/78±38/528 276 (231-351)	/38±31/555 278 (217-341)	/59±39/627 301 (245-387)	/31±55/530 326 (199-446)	تعداد در گرم تخم خشک
84/61±16/528 (39-145)	71/00±0	81/78±26/461 (39-138)	79/48±10/478 (59-102)	85/21±15/940 (65-145)	97/50±15/825 (66-131)	تعداد در گرم تخم آب کشیده
±18301/827 41370 -96824 (11903)		±15004/754 54979 -79363 (32895)	±16791/056 45579 -89744 (20181)	±15711/558 37217 -86346 (18550)	±15786/480 30138 -79386 (11903)	هم آوری مطلق
52±17/745 (26-148)	44±0	48±10/960 (34-68)	48±9/230 (30-71)	53±24/347 (26-148)	58±17/910 (37-108)	هم آوری نسبی
93/55±9/388 (40-100)	98/00±0	92/00±10/840 (64-100)	92/42±7/334 (70-100)	96/48±3/669 (82-100)	90/47±17/179 (40-100)	درصد لقاح

جدول 3- میزان همبستگی بین پارامترهای سن، طول و وزن با پارامترهای مربوط به لقاح (درصد)

پارامتر	سن	طول	وزن
وزن تخمک استحصالی (گرم)	0/53	0/84	0/91
قطر تخمک (میلی متر)	0/51	0/38	0/35
قطر تخم آب کشیده (میلی متر)	0/29	0/52	0/50
قطر تخمک بعد از فرمالین زدن (میلی متر)	0/41	0/43	0/46
تعداد در گرم تخم خشک	0/42	0/70	0/64
تعداد در گرم تخم آب کشیده	0/34	0/59	0/49
هم آوری مطلق	0/48	0/73	0/81

0/26	0/35	0/2	هم‌آوری نسبی
0/16	0/14	0/005	درصد لفاح

حداقل و حداکثر آن برابر 6/32-59/4 سانتی‌متر می‌باشد.

طبق نتایج به دست آمده، مولدین ماده 6 و 7 ساله در مقایسه با مولدین سنین پایین‌تر تخمک‌های بیشتری تولید کرده و هم‌آوری مطلق در سنین بالاتر بیشتر بوده است. این نتیجه مشابه تحقیق به گزین (1387) بر روی این ماهی بوده است. در بررسی صورت گرفته توسط رضوی‌صیاد (1374) بر روی ماهی سفید، هم‌آوری مطلق با افزایش طول و وزن ماهی، افزایش یافت. در تحقیقات گذشته از جمله Varghese (1973) به اثبات رسیده بود که نمودار خطی برای رابطه میان هم‌آوری و وزن ماهی وجود دارد و هم‌آوری مطلق با افزایش طول ماهی افزایش می‌یابد (Nikolsky, 1963); اثر مثبت اندازه مولدین ماده بر روی هم‌آوری ماهی آزاد چینوک Quinn (Oncorhynchus tshawytscha) (Bloomberg, 1992) و ماهیان آزاد اقیانوس اطلس Thorpe (Salmo salar) وحشی و پرورشی (Thorpe, 1984؛ Brannas, 1985؛ همکاران، 1989؛ Eskelinen Ruohonen و همکاران، 1989) نشان داده شد. همچنین وزن تخمدان یک ماهی با تعداد تخمک‌های موجود در آن تعیین می‌شود و هم‌آوری با افزایش وزن تخمدان افزایش می‌یابد (Bagenal, Bhatnagar, 1964). در تحقیقات صورت گرفته بر روی آزاد ماهیان از جمله قزل‌آلای قهوه‌ای (Salmo trutta macrostigma Alp) (Pitman, 2003)، قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (Pitman, 1979) (شمس‌پور و همکاران، 1387) و ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) (رهبر و همکاران، 1388) مشخص گردید که مولدین

بحث و نتیجه‌گیری

بر طبق تحقیق انجام شده ماهیان گروه‌های سنی 4 و 5 ساله هر یک 35/56 درصد از ماهیان بررسی شده را به خود اختصاص داده بود و سپس به ترتیب ماهیان ۳ (17/77 درصد)، ۶ (10/11) و ۷ ساله (11/11 درصد) قراردادشتند. در حالی‌که براساس منابع موجود مولدین ماهی سفید مهاجر به روختانه برای تولید مثل در محدوده سنی ۴، ۵ و ۶ سال قرار دارند و در دریای خزر ۹-۸ سال عمر می‌کند (کازانچف، 1981). با توجه به این موارد اگر صید یک عدد ماهی ۷ ساله به عنوان یک رکورد استثناء در نظر گرفته شود، سهم 17/77 درصدی ماهیان ۳ ساله جای بسی تعمل دارد که نشان‌دهنده شروع کاهش سن تولید مثل می‌باشد. میانگین وزن ماهیان مهاجرت‌کننده در بررسی انجام شده جهت تعیین هم‌آوری ماهی سفید توسط آذری‌تاكامی (1356)، برابر 1644 و حداقل و حداکثر طول کل بدن به ترتیب 34 و 61 سانتی‌متر بوده است. در تحقیق یادشده ماهیان بین 2 تا 7 سال و بیشتر بین 3 تا 5 سال گزارش شده است. کازانچف (1981) وزن ماهی مولد را بین 600 تا 3400 با میانگین 1750 و طول کل بدن را بین 28 تا 58 سانتی‌متر با میانگین طول کل 42/8 گزارش کرده است. همچنین وثوقی و مستجير (1371) نیز وزن ماهی سفید مولد را برابر 1635-1635 گرم و طول کل بدن را برابر 34-61 سانتی‌متر اعلام کرده‌اند. بر طبق نتایج به دست آمده از تحقیق ماهیان مهاجرت‌کننده جهت تولید مثل دارای میانگین وزنی برابر 832/08 گرم و حداقل و حداقل وزنی برابر 315 و 2216 گرم می‌باشند، میانگین طول کل بدن ماهیان سفید مولد به دست آمده نیز برابر 43/26 و

بررسی حاضر در بین گروه سنی 3 تا 7 ساله، بیشترین آن در مولدین 3 ساله مشاهده شد. اثر مثبت هم‌آوری نسی با سن (به‌گزین، 1387؛ رهبر و همکاران، 1387؛ رهبر و همکاران، 1388؛ شمسپور و همکاران، 1387)، وزن (به‌گزین، 1387) و طول (به‌گزین، 1387؛ رضوی‌صیاد، 1374) نیز مشابه به نتایج حاصل از این تحقیق بوده است. در این تحقیق متوسط هم‌آوری نسبی برابر 52 عدد و در بررسی به عمل آمده توسط آذری‌تاكامی (1356)، 53/48 عدد بوده است.

بر طبق بررسی‌های انجام شده هرچه سن ماهی ماده بالاتر باشد، میزان هم‌آوری مطلق و اندازه قطر تخمک استحصال شده و قطر تخم آب‌کشیده افزایش می‌یابد و به دنبال آن با افزایش قطر تخم میزان تعداد در گرم تخم خشک و آب‌کشیده کاهش پیدا می‌کند. در این بررسی بین وزن ماهی و درصد لقادح همبستگی چندانی وجود نداشت. اما نتایج نشان دادند که هرچه سن ماهی بیشتر باشد، درصد لقادح در ماهی افزایش می‌یابد. براساس نتایج این تحقیق، سن مولدین اثر مؤثری بر روی مراحل پس از لقادح دارد. این تحقیق با انجام مراحل عملی لقادح بر روی سنتین و وزن‌ها و اندازه‌های مختلف مولدین ماده و بررسی درصد لقادح، بهترین سن مولدین ماده ماهی سفید را پیشنهاد کرده تا با تعیین سن این مولدین و کاربرد آن‌ها در تکثیر مصنوعی از نظر کمی و کیفی لاروهای مناسبی برای پرورش و تکثیر در سال‌های بعد به دست آید. بنابراین طبق نتایج به‌دست آمده مولدین ماده بزرگ‌تر و مسن‌تر بهترین گزینه جهت تکثیر مصنوعی می‌باشند.

تشکر و قدردانی

ماده مسن‌تر در مقایسه با مولدین جوان‌تر، هم‌آوری بیشتر و تخمک‌های بزرگ‌تری تولید کردند. در بررسی حاضر بر روی ماهی سفید رودخانه شیرود نیز این نتایج به اثبات رسیده است.

قطر تخمک ماهی سفید 1/7-1/3 میلی‌متر است. تخمک‌ها پس از لقادح و جذب آب متورم شده، به قطر 2/7-3/1 میلی‌متر می‌رسند (آذری‌تاكامی، 1356؛ وثوقی و مستجير، 1371). در این بررسی متوسط قطر تخمک ماهی سفید برابر با 1/85 میلی‌متر و متوسط قطر این تخم‌ها پس از جذب آب برابر با 2/68 میلی‌متر می‌باشد.

در این بررسی تعداد در گرم تخمک خشک به‌طور متوسط برابر با 294 عدد تخم بود. در بررسی آذری‌تاكامی (1356) در یک گرم تخم‌دان به‌طور متوسط 343 عدد تخم (حداقل 225 و حداکثر 456 عدد) مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصله، مولدین ماده 3 ساله بیشترین میزان تعداد در گرم تخمک را نشان دادند. علت این امر رابطه بین قطر تخمک استحصالی و تعداد در گرم تخمک است که مولدین 3 ساله با تخمک‌های کوچک‌تر، بالاترین تعداد در گرم تخمک را داشته‌اند. مشابه این نتیجه نیز توسط به‌گزین (1387)، شمسپور و همکاران (1387) و رهبر و همکاران (1388) به‌دست آمد.

کیفیت تخمک با توجه به اندازه و وزن کل آن می‌تواند اثر مثبتی روی میزان لقادح داشته باشد، نتایج نشان دادند که هرچه سن ماهی بیشتر باشد درصد لقادح در ماهی افزایش می‌یابد، در حالی که بین وزن ماهی و درصد لقادح همبستگی چندانی وجود ندارد. هم‌آوری نسبی با افزایش سن (Belding، 1940؛ Springate و Meister Baum، 1971)، وزن (Kunin، 1990) و اندازه مولدین ماده (Lobon-Cervia و همکاران، 1997؛ Springate، 1990؛ Kunin، 1990 و Markevich، 1978) کاهش می‌یابد، به‌طوری‌که در

از آقایان مهندس حاتمی، مهندس قاسمی، مهندس اصغری، مهندس علی نیا و مهندس ماهی صفت به دلیل مساعدت‌هایشان نهایت سپاس و تشکر را داریم.

منابع

- ابو، م. 1373. هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه شیرود مرکز تحقیقات شیلات مازندران، صفحه‌های 116 تا 125 آذری تاکامی، ق. 1356. تعیین هم‌آوری ماهی سفید. مجله دانشکده دامپزشکی (دانشگاه تهران)، شماره 1 و 2، دوره سی و پنجم، صفحه‌های 70 تا 71.
- آذری تاکامی، ق.، و رضوی صیاد، ب. 1369. بررسی تکثیر مصنوعی و تکثیر ماهی سفید مجله دانشکده دامپزشکی (دانشگاه تهران). شماره یکم، دوره چهل و پنجم، صفحه‌های 40 و 60.
- بهزادی، ص. 1370. مطالعه رشد و نمو جنین ماهی سفید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، صفحه‌های 15 تا 22.
- به‌گزین، م. 1387. بررسی اثر توان باروری مولدین بر روی روند انکوباسیون و بازماندگی لارو ماهی سفید (*Rutilus frisii kutum*) در رودخانه تجن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 107 صفحه.
- پرافکنده‌حقیقی، ف. 1379. روش‌های تعیین سن آبیان، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 15 صفحه‌های 13 تا 15.
- رسولی، ب. 1384. نقش عوامل محیطی و شرایط کیفی آب رودخانه شیرود در رسیدگی جنسی ماهی سفید، سینیtar کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صفحه‌های 8 تا 21.
- رضوی صیاد، ب. 1374. ماهی سفید. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، 165 صفحه.
- رضوی صیاد، ب. 1378. مقدمه‌ای بر اکولوژی دریای خزر. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، 90 صفحه.
- رهبر، م.، خاراء، ح.، احمدنژاد، م.، صمدی، م.، خدادوست، ع.، موحد، ر.، و حیات‌بخش، م.ر. 1387. تعیین برخی از شاخص‌های هم‌آوری شاهکولی (*Alburnus chalcoides*, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلی. مجله علمی پژوهشی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، شماره 2 سال دوم، تابستان 1387. صفحه‌های 53 تا 59.
- رهبر، م.، نظامی، ش.، خاراء، ح.، و رضوانی، م. 1388. تعیین رابطه سن مولدین ماده با عوامل مؤثر در تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (*Salmo trutta caspius*, Kessler 1877). مجله علمی پژوهشی شیلات دانشگاه آزاد، واحد آزادشهر، شماره 4، سال سوم، صفحه‌های 99 تا 104.
- سبحانی ثانی، م. 1377. مجموع گزارش‌های بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهی سفید. گزارش به معاونت تکثیر و پرورش آبیان شیلات ایران. 68 صفحه.
- شمس‌پور، س.، نظامی، ش.، خاراء، ح.، و گلشاهی، ح. 1387. اثر سن بر عملکرد تولیدمثی مولدین ماده قزل‌آلای رنگین‌کمان (*oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1972) در سال دوم، شماره 2 تابستان 1387. صفحه‌های 73 تا 81.
- عمادی، ح. 1353. گزارش تکثیر مصنوعی ماهی سفید و تغییرات بیولوژیک جمعیت ماهی سفید. سازمان تحقیقات شیلات ایران، 57 صفحه.
- غنى‌نژاد، د.، مقیم، م.، عبدالملکی، ش.، و صیادپورانی، م. 1379. ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 79-78. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، بندرانزلی، 98 صفحه.
- کازانچف، ان. 1981. ماهیان دریای خزر و حوضه آبریز آن. ترجمه: شریعتی، ا. 1383، شرکت سهامی شیلات ایران، 171 صفحه.

- گرایلی افرا، ع. 1379. بررسی عوامل اکوفیزیولوژیکی بر روی استحصال تخم ماهی سفید در رودخانه‌های تجن و شیرود. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، گرایش شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 83 صفحه.
- موسی، ه. 1383. گزارشی در خصوص تکثیر و پرورش ماهی سفید. مجتمع تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری، 49 صفحه.
- نجارلشگری، س. 1385. مقایسه و بررسی برخی خصوصیات اسپرم مولدین ماهی سفید (*Rutilus frisii kutum*) رودخانه‌های شیرود، تنکابن (استان مازندران) و خشکرود (استان گیلان). پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 227 صفحه.
- وثوقی، غ. و مستجير، ب. 1371. ماهیان آب شیرین. مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران. 317 ص.
- Alp, A., Kara, C. and Bueyuekcapar, H.M., 2003. Reproductive biology of brown trout (*Salmo trutta macrostigma*, Dumeril 1858) in a tributary of the Ceyhan River Which flows into the eastern Mediterranean Sea. J. Appl. Ichthyol. / Z. Angew. Ichthyol. 19 (6), 346-351.
- Bagenal, T.B., 1963. The fecundity of Witches in the Firth of Clyde, J. Mar. biol. Ass. U.K. 43, 401-407.
- Baum, E.T. and Meister, A.L., 1971. Fecundity of Atlantic salmon (*Salmo salar*) from two Maine rivers. J. Fish. Res. Bd. Canada. 28, 764-767.
- Billard, R., 1990. Artificial insemination in fish. In Marshall's Physiology of reproduction. G. E. Lamming (Ed). 2, 870-888.
- Beacham, T.D., and Murray, C.B., 1985. Effect of female size, egg size, and water temperature on developmental biology of chum salmon (*Oncorhynchus keta*) from the Nitinat River, British Columbia. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 42, 1755-1765.
- Belding, D.L., 1940. The number of eggs and pyloric appendages as criteria of river varieties of the Atlantic salmon. Trans. Am. Fish. Soc. 67, 285-289.
- Bhatnagar, G.K., 1964. Observations on the spawning frequency and fecundity of certain Bhakra reservoir fishes. Indian J. Fish. 11A (1), 485-502. (Also. Adv. Abstr. Contr. Fish. Aquat. Sci. India, 1(4): 12.
- Brannas, E., Brannas, K., and Eriksson, L.O., 1985. Egg characteristics and hatchery survival in a Baltic salmon, *Salmo salar* L., population. Rept. Inst. Freshw. Res. Drottningholm. 62, 5-11.
- Coad, B.W., 1980. Environmental change and its impact on the freshwater fishes of Iran. Biological Conservation 19, 51-80.
- Eskelinen, U. and Ruohonen, K., 1989. Reproduction parameters of hatchery-reared Atlantic salmon broodstocks and a model to optimize the rearing cycle. Aquaculture, European Aquaculture Society, Brendene, Belgium. pp. 507-516.
- Gall, G.A.E., 1974. Influence of size of eggs and age of female on hatchability and growth of rainbow trout. Calif. Fish Game. 60, 26-35.
- Kayam, S., 2004. The Effect of Mating Different Age Groups of Broodstocks on the Reproductive Performance, Sex Ratio, Growth and Survival Rate of Rainbow Trout. J. Freshwat. Ecol. 19 (4), 695-699.
- Kjorsvik, E.A., Mangor-Jensen, A., and Holmetjord, I., 1990. egg quality in fishes. In: Blaxter, J.H.S., Southward, A.J. (Eds.), Adv. Mar. Biol. 26, 71-113.
- Kunin, M.A., and Markevich, N.B., 1978. On the quality of eggs of pink salmon acclimatized in the basins of the Barents and White Seas. Problems of fish physiology., /Voprosy fiziologii ryb., Publ. by: VNIRO; Moscow (USSR). pp. 85-94.
- Lahnsteiner, F., 2000. Morphological, physiological and biochemical parameters characterizing the overripening of rainbow trout eggs, Journal of Fish Physiology and biochemistry. 23, 107-118.
- Lobon-Cervia, J., Utrilla, C.G., Rincon, P.A., and Amezcuia, F., 1997. Environmentally induced spatio-temporal variations in the fecundity of brown trout *Salmo trutta* L.: tradeoffs between egg size and number. Freshwater Biology 38, 277-288.
- Nikolsky, G.V., 1963. The Ecology of Fishes. Academic Press, London. 350p.
- Pitman, R.W., 1979. Effects of female age and egg size on growth and mortality in rainbow trout. Prog. Fish-Cult. 41, 202-204.
- Quinn, T.P. and Bloomberg, S., 1992. Fecundity of Chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*) from the Waitaki and Rakaia Rivers, New Zealand. N.Z. J. MAR. FRESHWAT. RES. 26 (3-4), 429-434.

- Ralonde, R. and Walczak, P., 1971. Report on stock assessment and composition of the commercial bony fishes on the southern Caspian Sea. Fisheries Research Institute, Bandar Anzali. 38p.
- Springate, J.R.C., 1990. Egg quality and fecundity in rainbow trout: The determining factors and mechanisms of control. (DISS. ABST. INT. PT. B-SCI. & ENG.). 51, 4. 265.
- Springate, J.R.C., Bromage, N.R., and Cumaranatunga, P.R.T., 1985. The effects of different ration on fecundity and egg quality in the rainbow trout (*Salmo gairdneri*. Ed: Cowey, C.B., Mackie, A.M., and Bell, J.G. Nutrion and feeding in Fish. Academic press, London, UK.). pp. 371-391.
- Thorpe, J.E., Miles, M.S., and Keay, D.S., 1984. Developmental rate, fecundity and egg size in Atlantic salmon, *Salmo salar* L. Aquaculture 43, 289-305.
- Varghese, T.J., 1973. The fecundity of *Labeo rohit* Hamilten. Proc. Indian Acad. Sci. 77 B (5). *Journal of Fisheries, Islamic Azad University, Azadshahr Branch*
Vol. 4, No. 4, March 2011

Effect of female age, length and weight on artificial propagation efficiency in Kutum broods (*Rutilus frisii kutum*, Kamenskii 1901) migrating to the Shiroud River

***H. Khara¹, N. Alijanpour¹, S.Z. Fallah Shamsi¹, S.H. Mousavi²,**
M. Rahbar¹ and M. Ahmad Nejad³

¹Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Lahijan Branch,

²Breeding Central and Culture of Fishes of Shahid Rajaei, Sari, ³Inland Water Aquaculture Research Institute

Abstract

Kutum (*Rutilus frisii kutum*) is one of the economically valuable fishes in the Caspian Sea. This fish enters the rivers leading to the Caspian Sea for spawning. One of these rivers, which the fish migrate to, is Shiroud River. In the artificial propagation process of Kutum, different factors are involved in quality and quantity of female broods and their eggs. For this target, in the propagation season of 2008 we studied the effect of age, length and weight on artificial propagation efficiency in Kutum broods migrating to Shiroud River. For this reason, from February to May 2009 we studied the age, length and weight of 90 female Kutum. According to the results, average of total length was 43.26 cm, average of weight 832.08 grams, average of age 4.41, average of egg diameter 1.85 ml, average of egg number 294.49, average of absolute fecundity 41370, average of relative fecundity 52, average of fertilization percentage 93.55. Also, according to Kruskal wails test and Man-Whitney, there was a significant difference between age and total factors. Relationship between age and total factors was linear and weak to average, but relationship between fork length and weight with total factors were weak to strong.

Keywords: Shiroud River; Kutum; Age; Weight; Length; Artificial Propagation

* Corresponding Author; Email: h_khara1974@yahoo.com