

(گزارش کوتاه علمی)

## امکان پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) با غذای پلت شده در حوضچه‌های فایبرگلاس

\*حمید رمضانی<sup>۱</sup>، سیدمحمدوحید فارابی<sup>۱</sup> و محمود حافظیه<sup>۲</sup><sup>۱</sup>پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۵/۲۷

### چکیده

بررسی پرورش متراکم ماهی کپور به مدت ۸ هفته در حوضچه‌های فایبرگلاس (ابعاد ۲×۲ متر) با غذای پلت شده صورت گرفت. تعداد ۲۰۱ عدد بچه‌ماهی کپور *Cyprinus carpio* با میانگین وزنی کم‌تر از ۱۰۰ گرم انتخاب و در ۳ تیمار (<۵۰ گرم، ۷۰-۷۵ گرم، ۱۰۰-۱۰۵ گرم) با ۳ تکرار تقسیم گردید. بین وزن بچه‌ماهیان در تکرارهای تیمارهای مربوطه در ابتدای آزمایش اختلاف معنی‌دار آماری نداشته است. غذای پلت رایج در بازار برای تغذیه ماهیان انتخاب و با میانگین ۴ درصد وزن بدن در روز، غذادهی صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده از آزمایش نشان داد که میانگین نرخ رشد ویژه تیمار اول (۰/۵۴) بیش‌تر از تیمار دوم (۰/۳۴)، ولی با تیمار سوم (۰/۴۶) اختلاف معنی‌دار آماری نداشته است. همچنین ضریب تبدیل غذایی تیمار اول (۵/۲۸) و تیمار سوم (۶/۰۹) کم‌تر از تیمار دوم (۸/۷۵) بوده است ( $P < 0/05$ ). درصد نرخ رشد نسبی تیمار اول (۳۵/۶۶) و تیمار سوم (۲۰/۹۱) کم‌تر از تیمار دوم (۲۹/۲۴) بوده است ( $P < 0/05$ ). بررسی‌ها نشان داد که امکان نگهداری و پرورش تک‌گونه‌ای ماهی کپور معمولی در ابعاد کوچک با استفاده از جیره مصنوعی با وجود تغییرات کیفی آب، وجود دارد. اما در این بررسی میزان ضریب تبدیل غذایی به‌نسبت بالا و نرخ رشد پایین بوده است.

واژه‌های کلیدی: کپور معمولی، پرورش تک‌گونه‌ای، پلت

### مقدمه

کپور معمولی بومی آسیا است و امروزه در تمام نقاط دنیا از جمله اروپا، آسیا، آفریقا، شمال و جنوب آمریکا و استرالیا یافت می‌شود (Jester, ۱۹۷۴). محدودیت در پراکنش و پرورش این گونه در خطوط دمایی ۱۸ درجه سانتی‌گراد ظاهر می‌شود (Keleher, ۱۹۵۶). ماهی کپور در طبیعت در مناطق میانی و یا پایین‌دست رودخانه یا مرداب که آب به آرامی جریان دارد، زندگی می‌کند. زیستگاه این ماهیان بستری گل‌آلود با پوشش علف‌های هرز است. معمولاً نرها

با رشد سریع در سن یک‌سالگی به بلوغ می‌رسند و ماده‌ها به‌طور معمول بین ۳-۵ سالگی بالغ می‌شوند (Carlander, ۱۹۶۹). حداکثر وزن کپور معمولی بالغ ۳۷/۴ کیلوگرم در جنوب آفریقا (Sigler و Miller, ۱۹۶۳) و ۴۲/۱ کیلوگرم در شمال آمریکا (Jester, ۱۹۷۴) گزارش شده است. بچه‌ماهی نارس کپور به‌طور اختصاصی از زئوپلانکتون تغذیه می‌کند (Alikunhi, ۱۹۵۸؛ Filatov, ۱۹۷۲؛ Persons, ۱۹۷۹) که نمونه بارز آن پاروپایان و روتیفرها است. همچنین در صورت تراکم زئوپلانکتون، از فیتوپلانکتون نیز تغذیه می‌کند (Alikunhi, ۱۹۵۸؛

\*مستول مکاتبه: hamid\_ramzani@yahoo.com

غذای پلت شده به دلایل اقتصادی و بهداشتی ارتقاء یافته است. امروزه استفاده از پلت در ایران نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است، به طوری که سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در استان مازندران برای خرید غذای کنسانتره (پلت) توسط پرورش دهندگان ماهیان گرمابی به منظور تغذیه کپور معمولی هزینه می‌شود (برگرفته از اطلاعات آماری اتحادیه ماهیان گرم آبی استان مازندران). با توجه به این که ماهیان کپور در کف آب زیست می‌نمایند و پلت‌های موجود نیز از استحکام لازم برخوردار نمی‌باشند، مشخص نیست که چند درصد از غذا، توسط ماهی دریافت می‌شود. به علاوه با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی و بنا به گزارش پرورش دهندگان، از آنجا که صید کپور معمولی به واسطه تغذیه دستی به راحتی امکان پذیر است، از امنیت مناسبی در سیستم‌های پرورشی باز برخوردار نیست. هدف از این پژوهش معرفی سیستمی دیگر در پرورش ماهی کپور که در عین حال اقتصادی نیز باشد، بوده است.

### مواد و روش‌ها

**مکان و سیستم پرورش:** این آزمایش در تابستان ۱۳۸۹ در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، واقع در فرح‌آباد شهرستان ساری (مرکز استان مازندران) انجام شد.

**طراحی آزمایش:** در این آزمایش هر حوضچه فایبرگلاس به عنوان واحد آزمایشی (تکرار) است. همه پارامترها، به خصوص کیفیت آب برای تمام تیمارها یکسان بوده است. تعویض آب به صورت بارانی و پیوسته (۰/۱ لیتر در ثانیه) صورت گرفت. تغییرات حرارتی تحت شرایط طبیعی محیط پرورش بوده است. تنها اثر متغیر بین تیمارهای مختلف، وزن اولیه ماهیان در شروع آزمایش تعیین گردید. ماهیان در ابتدا و پایان دوره پرورش بیومتری گردیدند. به این ترتیب تعداد ۲۰۱ عدد بچه‌ماهی با میانگین وزنی کم‌تر از ۱۰۰ گرم

Panov و همکاران، ۱۹۷۳؛ Vaas و Vaas-van، ۱۹۵۹). هنگامی که در حال رشد باشند کفزی بوده و از موجودات و مواد بستر، مثل کرم‌ها و لارو حشرات آبی به موازات گیاهان سبز مثل دانه‌ها و جلبک‌ها و دتریتوس‌ها تغذیه می‌کنند (Vaas و Vaas-van، ۱۹۵۹). ماهیان بالغ کپور معمولی از نوع تغذیه‌کننده‌های فرصت طلب هستند که قادراند از هر منبع غذایی قابل دسترس استفاده کرده و آن را جذب و هضم نمایند (McCrimmon، ۱۹۶۸؛ Effendie، ۱۹۶۸؛ Moen، ۱۹۶۸؛ Perry، ۱۹۵۳؛ Sanchez، ۱۹۷۰؛ Sigler و Miller، ۱۹۶۳).

کپورماهیان از زمان‌های بسیار قدیم پرورش داده می‌شدند و بدون شک امروزه آن‌ها یکی از مهم‌ترین انواع گونه‌های پرورشی از خانواده ماهیان استخوانی با فلس کروی شکل و با تولیدی بالغ بر ۱۳ میلیون تن در سال هستند و بعد از کپور نقره‌ای و علف‌خوار مطرح می‌باشند (Lim و Webster، ۲۰۰۲). تولید کپور معمولی نسبت به دهه گذشته ۲ برابر شده است. در سال ۱۹۹۸ تولید کپور معمولی برابر ۲/۵ میلیون تن به ارزش اقتصادی ۲/۸ میلیارد دلار آمریکا بوده است. درصد زیادی از این نوع ماهیان در نواحی آسیایی به خصوص چین یافت می‌شوند (Tacon، ۱۹۹۳). هنگامی که تولید کپورماهیان به صورت گسترده انجام می‌شد، تنها ۳ درصد از آن را کپور معمولی در سیستم‌های متمرکز کشت و پرورش داده می‌شدند. امروزه این نسبت با پیشرفت علم و تکنولوژی تغییر یافته است. هم‌اکنون میانگین جهانی سهم گونه‌های مختلف کپورماهیان در سیستم‌های معمول پرورش برای کپور نقره‌ای ۲۴ درصد، کپور علف‌خوار ۲۲ درصد، کپور معمولی ۱۸ درصد، کپور اصیل هندی ۱۵ درصد، کپور سرگنده ۱۲ درصد، کپور کاراس ۸ درصد و کپور لجن‌خوار ۱ درصد است (Lim و Webster، ۲۰۰۲). به مرور زمان و تجارب به دست آمده از دوران گذشته، روش‌های سنتی تغذیه کپور به استفاده از

به نسبت برابر مورد آزمایش واقع گردید. ارزیابی ماهیان با توجه به پارامترهای رشد و تغذیه صورت گرفت. **غذای ماهیان:** غذا به صورت پلت از شرکت خوراک دام و طیور مازندران واقع در شهرستان بابل، خریداری شد. قطر پلت ۲ میلی متر بوده است و نتایج به دست آمده از آنالیز غذا در جدول ۲ آمده است.

(کمتر از ۵۰ گرم، ۷۰-۵۰ گرم و ۱۰۰-۷۰ گرم) در ۳ تیمار با ۳ تکرار، در ۹ حوضچه فایبرگلاس به مساحت تقریبی ۱ مترمربع (۱/۸۵×۱/۸۵×۰/۳ مترمکعب) به شرح جدول ۱، تقسیم گردید. این آزمایش به مدت ۸ هفته به طول انجامید. تأکید آزمایش مبنی بر انتخاب وزن مناسب در شروع پرورش در محیط محصور با غذای پلت بوده است، بنابراین با وزنهای مختلف و زی توده

جدول ۱- نحوه توزیع و اوزان بچه ماهیان در تیمارهای آزمایشی

| تیمارهای آزمایشی | تعداد ماهی در هر تیمار | تعداد ماهی در هر تکرار | وزن ماهیان (گرم) در شروع آزمایش |
|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| T <sub>۱</sub>   | ۹۰                     | ۳۰                     | ۳۹/۰۵±۰/۷۹                      |
| T <sub>۲</sub>   | ۶۹                     | ۲۳                     | ۵۹/۲۹±۰/۶۴                      |
| T <sub>۳</sub>   | ۴۲                     | ۱۴                     | ۹۳/۰۷±۳/۰۶                      |

جدول ۲- نتایج به دست آمده از آنالیز غذای کپور معمولی کارخانه دام و طیور مازندران (میانگین ± انحراف معیار)

| نوع ماده                       | نتایج به دست آمده از آنالیز |
|--------------------------------|-----------------------------|
| انرژی متابولیسم (کالری بر گرم) | ۲۷۱۰±۵۶                     |
| رطوبت (درصد)                   | ۸۹/۶۷±۱/۲۱                  |
| پروتئین خام (درصد)             | ۲۹/۰۳±۰/۷۳                  |
| فیبر خام (درصد)                | ۶/۴۴±۰/۰۶                   |
| چربی خام (درصد)                | ۹/۱±۰/۵۶                    |
| TVN (میلی گرم بر ۱۰۰ گرم)      | ۷۳±۱/۴۴                     |
| کلسیم (درصد)                   | ۱/۲±۰/۰۷                    |
| فسفر کل (درصد)                 | ۰/۸۸±۰/۰۱                   |
| خاکستر خام                     | ۱/۸±۰/۰۳                    |
| آلودگی قارچی                   | منفی                        |

\* آزمایشگاه تخصصی - تحقیقاتی مازندران واقع در شهرستان ساری (n=۲).

۲۰۰۷ آب و فاضلاب<sup>۱</sup> صورت گرفته است (Backiel و Stegman, ۱۹۶۸).

پارامترهای رشد و تغذیه: عوامل رشد محاسبه شده به شرح رابطه‌های زیر بوده است (Tacon و Albert, ۱۹۹۰).

(رابطه ۱)

= وزن اکتسابی (گرم)

میانگین وزن اولیه (گرم) - میانگین وزن نهایی (گرم)

**انجام آزمایش و غذادهی:** غذادهی ۲ بار در روز در ساعات ۸ صبح و ۱۵ عصر انجام شد. غذادهی به میزان ۴ درصد وزن بدن ماهی (Sanchez, ۱۹۷۰) صورت گرفت. تعویض آب به میزان ۰/۱ لیتر در ثانیه و شرایط نوری برای حوضچه‌ها طبیعی و یکسان بوده است. فاکتورهای کیفی آب شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول، شوری، هدایت الکتریکی و pH به صورت روزانه اندازه‌گیری شد. همه فرآیند آنالیز پارامترهای اندازه‌گیری شده آب، منطبق بر روش‌های استاندارد

1- Standard Method Water and Wast Water, 2007

(ANOVA) و مقایسه میانگین‌ها به روش آزمون دانکن (Duncans Test) در سطح ۵ درصد با استفاده از نرم‌افزار SPSS.18 انجام شد. در این پژوهش میانگین داده‌ها با انحراف از خطای استاندارد ارایه گردید.

### نتایج

در ابتدای آزمایش آنالیز واریانس وزن و طول اولیه در واحدهای آزمایشی (تکرار) تیمارهای مختلف نشان داد که بین تکرارهای مربوط به هر تیمار اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت ( $P > 0/05$ ). در صورتی‌که بین تکرارهای تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشته است ( $P < 0/05$ ). در طول آزمایش، بازماندگی ماهیان ۱۰۰ درصد بوده است. تغییرات برخی از پارامترهای آب به شرح جدول ۳ می‌باشد.

نتایج به‌دست آمده از بررسی کمی و کیفی آب نشان می‌دهد که به‌دلیل استفاده از آب رودخانه که به فاصله کمی از مصب واقع است درجه حرارت، شوری و هدایت الکتریکی از نوسان بالایی در طول دوره پرورش برخوردار بوده است. اما این وضعیت برای همه تیمارهای آزمایشی یکسان بوده است. نتایج به‌دست آمده از پرورش ماهی کپور در ۳ تیمار مختلف با میانگین وزنی متفاوت در جدول ۴ آمده است.

$$\text{RGR}(\%) = \frac{\text{میانگین وزن نهایی (گرم)} - \text{میانگین وزن اولیه (گرم)}}{\text{وزن اولیه (گرم)}} \times 100 = \text{درصد نرخ رشد نسبی}$$

(رابطه ۲)

$$\text{FCR}(\%) = \frac{\text{مقدار غذای مصرفی (گرم)}}{\text{افزایش وزن بدن (گرم)}} = \text{ضریب تبدیل غذایی}$$

(رابطه ۴)

$$\text{SGR}(\%) = \frac{\text{لگاریتم طبیعی وزن نهایی (گرم)} - \text{لگاریتم طبیعی وزن اولیه (گرم)}}{\text{دوره پرورش (روز)}} \times 100 = \text{ضریب رشد ویژه}$$

قبل از شروع آزمایش، تست نرمال بودن داده‌های وزن اولیه ماهیان در هر تیمار، تحت آزمون کلموگروف-اسمرینوف<sup>۴</sup> در سطح اطمینان ۵ درصد انجام شد. پس از اطمینان از برابر بودن واریانس طول و وزن ماهیان در تیمارها (Levene's Test for Equality of Variances)، آزمایش آغاز گردید. در پایان دوره آزمایش نیز وزن نهایی هر یک از تیمارهای آزمایشی تعیین شد. آزمایش تحت مقایسه اثر وزن اولیه در تیمارهای مختلف با روش تجزیه واریانس

جدول ۳- خلاصه وضعیت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در طول دوره پرورش (میانگین  $\pm$  انحراف معیار)

| شرح     | درجه حرارت (درجه سانتی‌گراد) | اکسیژن محلول (میلی‌گرم بر لیتر) | pH        | شوری ppt | هدایت الکتریکی (میکروئانه بر سانتی‌متر) |
|---------|------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|---|
| میانگین | ۰/۶۳±۲۱/۱۵                   | ۰/۱۱±۶/۷۷                       | ۰/۰۱±۷/۷۱ | ۰/۵±۴/۰۴ | ۰/۸۸±۶/۱۳                               |
| کمینه   | ۱۵/۰۰                        | ۵/۸۰                            | ۷/۵۰      | ۰/۵۰     | ۰/۵۰                                    |
| بیشینه  | ۲۸/۰۰                        | ۷/۵۰                            | ۷/۸۰      | ۱۰/۰۰    | ۱۵/۵۰                                   |
| دامنه   | ۱۳/۰۰                        | ۱/۷۰                            | ۰/۳۰      | ۹/۵۰     | ۱۵/۰۰                                   |
|         |                              |                                 |           |          | N=۵۶                                    |

- 1- Relative Growth Rate
- 2- Feed Conservation Rate
- 3- Specific Growth Rate
- 4- Kolmogrov-Smirnov

جدول ۴- میانگین وزن اولیه و نهایی و ضریب تبدیل غذا، رشد در تیمارهای مختلف

| تیمار                        | شرح     | تعداد نمونه | مقایسه آماری | میانگین وزن (گرم) | کمینه   | بیشینه  |
|------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------------|---------|---------|
| وزن اولیه (گرم)              | تیمار ۱ | ۹۰          | c            | ۰/۸±۳۹/۰۵         | ۳۷/۴۶   | ۳۹/۸۶   |
|                              | تیمار ۲ | ۶۹          | b            | ۰/۶۵±۵۹/۲۹        | ۵۸/۰۰   | ۶۰/۰۰   |
|                              | تیمار ۳ | ۴۲          | a            | ۳/۰۶±۹۳/۰۷        | ۸۸/۴۳   | ۹۸/۸۶   |
| وزن نهایی (گرم)              | تیمار ۱ | ۹۰          | c            | ۱/۴۸±۵۲/۹۶        | ۵۱/۳۰   | ۵۵/۹۰   |
|                              | تیمار ۲ | ۶۹          | b            | ۰/۹±۷۱/۶۸         | ۷۰/۷۰   | ۳۵/۵۰   |
|                              | تیمار ۳ | ۴۲          | a            | ۱/۱۸±۱۲/۱۱        | ۱۱۸/۳۰  | ۱۲۲/۳۰  |
| وزن اکتسابی (گرم)            | تیمار ۱ | ۳           | b            | ۱/۳۴±۱۳/۹۱        | ۱۱/۴۴   | ۱۶/۰۴   |
|                              | تیمار ۲ | ۳           | b            | ۰/۷۵±۱۲/۳۹        | ۱۰/۹۶   | ۱۳/۴۸   |
|                              | تیمار ۳ | ۳           | a            | ۱/۸۸±۲۷/۰۳        | ۲۳/۴۶   | ۲۹/۸۶   |
| غذای مصرفی در هر تکرار (گرم) | تیمار ۱ | ۳           |              | ۰/۰±۲۱۶/۰۰        | ۲۱۶/۰۰  | ۲۱۶/۰۰  |
|                              | تیمار ۲ | ۳           |              | ۰/۰±۲۴۷۵/۰۰       | ۲۴۷۵/۰۰ | ۲۴۷۵/۰۰ |
|                              | تیمار ۳ | ۳           |              | ۰/۰±۲۲۸۰/۰۰       | ۲۲۸۰/۰۰ | ۲۲۸۰/۰۰ |
| غذای مصرفی هر ماهی (گرم)     | تیمار ۱ | ۳           |              | ۰/۰±۷۲/۰۰         | ۷۲/۰۰   | ۷۲/۰۰   |
|                              | تیمار ۲ | ۳           |              | ۰/۰±۱۰۷/۶۱        | ۱۰۸/۰۰  | ۱۰۸/۰۰  |
|                              | تیمار ۳ | ۳           |              | ۰/۰±۱۶۲/۸۶        | ۱۶۳/۰۰  | ۱۶۳/۰۰  |
| ضریب تبدیل غذایی             | تیمار ۱ | ۳           | b            | ۰/۵۳±۵/۲۸         | ۴/۴۹    | ۶/۲۹    |
|                              | تیمار ۲ | ۳           | a            | ۰/۵۵±۸/۷۵         | ۷/۹۸    | ۹/۸۲    |
|                              | تیمار ۳ | ۳           | b            | ۰/۴۴±۷/۰۹         | ۵/۴۵    | ۶/۹۴    |
| نرخ رشد ویژه                 | تیمار ۱ | ۳           | a            | ۰/۰۵±۰/۵۴         | ۰/۴۵    | ۰/۶۰    |
|                              | تیمار ۲ | ۳           | b            | ۰/۰۲±۰/۳۴         | ۰/۳۰    | ۰/۳۶    |
|                              | تیمار ۳ | ۳           | ab           | ۰/۰۴±۰/۴۶         | ۰/۳۸    | ۰/۵۲    |
| درصد نرخ رشد نسبی            | تیمار ۱ | ۳           | a            | ۳/۵۳±۳۵/۶۶        | ۲۸/۷۲   | ۴۰/۲۴   |
|                              | تیمار ۲ | ۳           | b            | ۱/۳۱±۲۰/۹۱        | ۱۸/۳۱   | ۲۲/۴۷   |
|                              | تیمار ۳ | ۳           | ab           | ۲/۹۴±۲۹/۲۴        | ۲۳/۷۳   | ۳۳/۷۶   |

حروف لاتین (a, b, ...) نشان‌دهنده مقایسه میانگین‌ها در تیمارهای مختلف، تحت آزمون دانکن در سطح ۵ درصد صورت گرفته است.

مصرفی در تیمارهای مختلف آنالیز شد (جدول ۵).

در پایان آزمایش لاشه ماهیان برای تعیین ترکیبات تشکیل‌دهنده آن، به منظور تأثیر غذای

جدول ۵- نتایج به دست آمده از آنالیز لاشه کپور در پایان آزمایش: آزمایشگاه تخصصی- تحقیقاتی مازندران واقع در شهرستان ساری (n=۲)

| نوع ماده                       | نتایج به دست آمده از آنالیز |
|--------------------------------|-----------------------------|
| انرژی متابولیسم (کالری بر گرم) | ۲۵۴۰±۱۷۰                    |
| رطوبت (درصد)                   | ۸۰/۴۱±۹/۲۶                  |
| پروتئین خام (درصد)             | ۲۲/۲۳±۶/۸                   |
| فیبر خام (درصد)                | ۶/۴۱±۰/۰۲                   |
| چربی خام (درصد)                | ۶/۴۲±۲/۶۷                   |
| TVN (۱۰۰ گرم بر میلی گرم)      | ۷۲±۱                        |
| کلسیم (درصد)                   | ۱/۱۵±۰/۰۵                   |
| فسفر کل (درصد)                 | ۰/۸۶۵±۰/۰۱۵                 |
| خاکستر خام                     | ۱/۸۱±۰/۰۱۵                  |
| آلودگی قارچی                   | منفی                        |

### بحث و نتیجه گیری

است اگرچه تولیدات غذایی در این سطوح نیز ممکن است محدود شود (Soller و همکاران، ۱۹۶۵). در شوری ۷/۲ طی ۳۶ روز همه ماهیان موجود در آکواریوم‌های آزمایشگاهی تلف شدند (Soller و همکاران، ۱۹۶۵). اگرچه کپور شرایط شوری با دامنه بالا را پذیرا می‌باشد اما تغییر سریع از شیرین به شور می‌تواند کشنده باشد (Sigler و Miller، ۱۹۶۳). در این آزمایش با افزایش شوری به بالاتر از ۶ ماهیان به تدریج اشتهای خود را از دست دادند و عملاً ماهیان نه تنها تغذیه نمی‌کردند بلکه در کف حوضچه ثابت و بی حرکت بودند. همچنین تولید بالا تا درجه زیادی در ارتباط با حرارت می‌باشد. اواسط تابستان درجه حرارت آب به موازات تعداد روزهای با درجه حرارت بالاتر از ۲۰ درجه سانتی‌گراد به عنوان روزهای پایه برای تولید محسوب می‌شوند (Backiel و Stegman، ۱۹۶۸) و درجه حرارت مطلوب رشد در دامنه ۲۸-۲۰ درجه در شرایط آزمایشگاهی بهترین درجه حرارت بوده است (Huet، ۱۹۷۰)، در حالی که در آزمایش فوق داده‌های ثبت شده در طی ۸ هفته فقط ۴ هفته، شرایط دمایی مناسب برای پرورش ماهی کپور مهیا بوده است. دمای پایین‌تر از ۱۳ و بالاتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد سبب کاهش رشد می‌شود

نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که امکان نگهداری و پرورش کپور در حوضچه‌های فایبرگلاس وجود دارد و همان‌گونه که در جدول ۴ مشاهده می‌گردد، تیمار اول با میانگین وزنی کم‌تر از ۵۰ گرم به دلیل پایین بودن ضریب تبدیل غذایی، بالاتر بودن نرخ رشد ویژه و درصد نرخ رشد ویژه در مقایسه با سایر تیمارها از رشد مناسب‌تری برخوردار بوده است. اما با توجه به بالا بودن نسبی ضریب تبدیل غذایی و پایین بودن رشد در همه تیمارها می‌توان عامل را در مسایل دیگر جستجو کرد. به طوری که مطابق جدول ۳ میانگین شوری در طول دوره پرورش بالاتر از حد استاندارد بوده است. کپور معمولی ممکن است در آب‌های لب‌شور و شور یافت شود (McCrimmon، ۱۹۶۸) اما تولید در این شرایط در حد مطلوبی نیست (Bardach و همکاران، ۱۹۷۲). در این آزمایش در پایان ۴ هفته اول پرورش، همه شرایط آب تغییر نمود، به طوری که شوری از ۰/۵ ppt به ۱۰ ppt صعود کرد و عملاً شرایط نامناسبی را برای پرورش همه تیمارها ایجاد نمود. نتایج به دست آمده از پرورش کپور در شوری از ۵-۰/۱ در هزار در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که تولید در شوری ۳-۲ در هزار کاهش یافته

از آن‌ها پلت بوده است، مورد آزمایش قرار گرفت و به دلیل پایین بودن رشد در این تیمار در مقایسه با سایر تیمارها نتیجه‌گیری نمود که غذای مصنوعی به تنهایی برای رشد کپور کافی نیست و با تنوع غذایی می‌توان به رشد بالاتر رسید (Ash و Bista, ۲۰۰۱). نتیجه نهایی آن‌که امکان نگهداری و پرورش ماهی کپور در محیط محصور حوضچه‌های پرورشی با غذای پلت همراه با تنوع غذا وجود دارد. همچنین این روش می‌تواند در مناطقی مثل حاشیه رودخانه‌ها و یا حاشیه کانال‌های آبرسانی، با استفاده از آب‌های با اکسیژن پایین و کدورت بالا با توجه به مقاومت و تحمل ماهی کپور معمولی برای تولید به‌کار گرفته شود و یا در مناطقی که امکان ساخت استخر به‌خاطر مسایل حقوقی مالکیت و یا بافت خاک و یا شیب زیاد مقدور نباشد، برای تولید پروتئین آبری استفاده گردد.

(Gribanov و همکاران، ۱۹۶۸). در این آزمایش حدود ۱۰ روز، حرارت بالاتر از ۳۰ درجه وجود داشته است. آنالیز پلت غذایی (جدول ۲) و آنالیز لاشه به‌دست آمده (جدول ۵) در پایان آزمایش نشان از کاستی‌هایی در جیره مناسب برای پرورش ماهی کپور معمولی است، که البته اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان مثال اگرچه پروتئین بهینه در محدوده ۳۵-۳۰ درصد می‌تواند رشد ماهی کپور را تضمین نماید اما انرژی آن نیز باید در محدوده ۳۶۰۰-۳۱۰۰ کالری بر گرم باشد (Webster و Lim, ۲۰۰۲) که در غذای داده شده حدود ۲۷۱۰ کالری بر گرم بوده است و این نشان می‌دهد که پلت به تنهایی نمی‌تواند کارایی لازم را در رشد داشته باشد که با نتیجه گرفته شده از پرورش کپور در قفس مطابقت دارد که در آن کپور با میانگین وزنی ۴۷ گرم در چهار تیمار غذایی که یکی

#### منابع

1. Alikunhi, K.H., 1958. Observations on the feeding habits of young carp fry. *Indiana J. Fish.* 5 (1), 95-106.
2. Ash, K.R., Bista, J., 2001. Effect of Different Feed Ingredients on the Growth of Caged Common Carp. *Nepal Agric. Res. J.* 4-5, 60-63.
3. Backiel, T., Stegman, K., 1968. Temperature and yield in carp ponds, P 334-342. In: Proceedings of the world symposium on warm-water pond fish culture. FAO Fish Rep. 44, 4.
4. Bardach, J.E., Ryther, J.H., McLarney, W.O., 1972. Aquaculture: the farming and husbandry of freshwater and marine organisms. Wiley-Interscience, 868p.
5. Carlander, K.D., 1969. Handbook of freshwater fishery biology. I. Iowa State Univ. Press, Ames. 752p.
6. Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Rice, E.W., Greenberg, A.E., 2007. Standard methods for the examination of water and wastewater, American public Health Association, 21ST EDITION, 1179p.
7. Effendie, M.I., 1968. Growth and food habits of carp, *Cyprinus carpio* L. in Clear Lake, Iowa. M.Sc. Thesis, Iowa State Univ., Ames. 54p.
8. Filatov, V.L., 1972. Effectiveness of the utilization of natural foods by carp (*Cyprinus carpio* L.) larvae. *J. Ichthyol.* 12 (5), 812-818.
9. Gribanov, L.V., Korneev, A.N., Korneeva, L.A., 1968. Use of thermal waters for commercial production of carps in floats in the U.S.S.R. Proc. World Symposium Warm Water Pond Fish Culture. *FAG Fish Rep.* 44, 5 (411), 24.
10. Jester, D.B., 1974. Life history, ecology and management of the carp *Cyprinus carpio* Linnaeus, in Elephant Butte Lake. *New Mexico State Univ. Ag. Exp. Sta. Res. Rep.* 273, 80p.
11. Huet, M., 1970. Textbook of fish culture: breeding and cultivation of fish. Fishing News (Books) Ltd., London, 436p.
12. Keleher, J.J., 1956. The northern limits of distribution in Manitoba for cyprinid fishes. *Can. J. Zool.* 34 (4), 262-266.

13. McCrimmon, H.R., 1968. Carp in Canada. *Fish Res. Board Can. Bull.* 165, 93.
14. Moen, T., 1953. Food habits of the carp in northwestern Iowa lakes. *Proc. Iowa Acad. Sci.* 60, 665-686.
15. Panov, D.A., Motenkova, L.G., Chertikhin, V.G., 1973. Factors influencing predation by juvenile carp (*Cyprinus carpio*) on the young of phytophagous fishes in joint cultivation (experimental studies). *J. Ichthyol.* 13 (6), 915-920.
16. Persons, W.R., 1979. The use of open and closed backwater ponds of the Missouri River, Iowa as spawning and nursery areas for fish. M.Sc. Thesis, Iowa State Univ. Ames. 115p.
17. Perry, K.R., 1970. The distribution and food habits of bottom fishes in Tuttle Creek Reservoir. M.Sc. Thesis, Kansas State Univ., Manhattan, 85p.
18. Rehder, D.D., 1959. Some aspects of the life history of the carp, *Cyprinus carpio*, in the Des Moines River, Boone County, Iowa. *Iowa J. Sci.* 34 (1), 11-26.
19. Sanchez, C.Jr., 1970. Life history and ecology of carp, *Cyprinus carpio* Linnaeus, in Elephant Butte Lake, New Mexico. M.S. Thesis, New Mexico State Univ., Las Cruces. 65p.
20. Sigler, W.F., Miller, R.R., 1963. Fishes of Utah. Utah State Dept. Fish Game, Salt Lake City. 203p.
21. Sigler, W.F., 1955. An ecological approach to understanding Utah's carp populations. *Utah Acad. Sci. Arts Letters Proc.* 32, 95-104.
22. Soller, M., Shchori, Y., Moav, R., Wohlfarth, G., Lahman, M., 1965. Carp growth in brakish water. *Bamidgeh* 17 (1), 16-23.
23. Tacon, A., 1993. Feed Ingredients for Warm Water Fish: Fishmeal and Other Processed Feedstuffs. FAO Fisheries Circular NO. 856, FAO, Rome, 64p.
24. Tacon, A., Albert, G.J., 1990. Standard method for nutritional and feeding of farmed fish and shrimp. Argent Libration Press, pp. 4-27.
25. Vaas, K.F., Vaas-van Oven. A., 1959. Studies on the production and utilization of natural food in Indonesian carp ponds. *Hydrobiologia* 12, 308-392.
26. Webster, C.D., Lim, C.E., 2002. Nutrient Requirments and Feeding of Finfish for Aquaculture. CABI, 418p.