

اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان

*سیداحسان صابری^۱، افشین قلیچی^۲، مسعود هدایتی‌فرد^۳، عباس صادق‌قلو^۴ و فرحناز لکزایی^۵

^۱دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

^۲دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران، ^۳دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران

^۴دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران

^۵موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱/۲۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

چکیده

بررسی واکنش‌های استرسی بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان، *Oncorhynchus mykiss* بر روی پارامترهای کیفی آب نظیر: اکسیژن محلول DO، آمونیوم دفعی NH_4^+ و نوسانات pH در ۶ گروه آزمایشی ppm ۵، ۱۰، ۲۰ ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید، ppm ۵، ۱۰، ۳۰ عصاره گل‌میخک و ۱ گروه شاهد مشابه آزمایشات شبیه‌سازی بر روی بچه‌ماهیان انگشت‌قد *Winter flounder Pleuronectes* تحت تاثیر ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید در ۳ نوبت تکرار و بازه‌های زمانی یک ساعت یک‌بار به مدت ۵ ساعت شبیه‌سازی انجام پذیرفت که نتایج حاصله پس از گذشت ۵ ساعت حاکی از کاهش نسبی غلظت اکسیژن محلول تا ppm ۴/۴۲ و افزایش نسبی آمونیوم دفعی تا ۰/۴۵ mg/l بدون تلفات در گروه‌های تیمار لیدوکائین هیدروکلراید به همراه کاهش شدید غلظت اکسیژن محلول و افزایش شدید آمونیوم دفعی تا ppm ۲/۱ و ۲/۰۴ mg/l در ۲ گروه تیمار ppm ۳۰ و ۱۰ عصاره گل‌میخک به واسطه خواص بالای بیهوشی اورژنول و کاریوفیلین این عصاره بوده که بچه‌ماهیان از مرحله شوک بیهوشی خارج نشده و دچار تلفات ۱۰۰٪ گردیدند. هدف از شبیه‌سازی حمل و نقل طولانی مدت بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان به صورت مجزا با دو عصاره گیاهی گل‌میخک و ماده شیمیایی لیدوکائین هیدروکلراید بررسی سنجش مقاومت این گونه ماهی پرورشی، اقتصادی بوده که نتایج حاصله حاکی از تاثیرگذاری مثبت و غیرسمی ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید علی‌الخصوص تیمار ppm ۲۰ نسبت به ۲ گروه تیمار ppm ۱۰ و ۵ همین ماده بیهوشی و ۳ گروه تیمار عصاره گل‌میخک نسبت به گروه شاهد در کنترل شرایط حیاتی و فعالیت‌های متابولیسم دفعی بچه‌ماهیان دارد.

واژه‌های کلیدی: بیهوشی، حمل و نقل، عصاره گل‌میخک، قزل‌آلای رنگین‌کمان، لیدوکائین هیدروکلراید

مقدمه

علی‌الخصوص طی فعالیت‌های نمونه‌گیری، تکثیر مصنوعی، واکسیناسیون و دستکاری ماهیان مولد از کاربردهای بسیار وسیعی برخوردارند لذا این بیهوش کننده‌ها به ۲ دسته شیمیایی نظیر: Zoletil N D، 2-Phenoxyethanol، Midatrene، Metomidate

داروهای بیهوشی گیاهی و شیمیایی در علوم مختلف پزشکی، دامپزشکی و زیست‌شناسی آبزیان

*نویسنده مسئول: s.ehsans@yahoo.com

دفعی و کاهش استرس ماهیان طی حمل و نقل طولانی مدت پی بردند.

بیهوش کننده گیاهی عصاره گل میخک از خانواده میرتاسه حاوی عناصر قوی نظیر: اورژنول، استیل-اورژنول، گلوتامیک اسید، کاریوفیلین، وانیلین و بتا سسکیوترین با طعم و بوی بسیار تندی بوده که اغلب در دندان پزشکی ها و مراکز تحقیقاتی ماهیان خاویاری به عنوان یک ماده بی حس کننده موضعی مورد استفاده قرار می گیرد (میرحیدری، ۱۳۷۲) چنانچه برای اولین بار Hisaka و همکاران (۱۹۸۶) از این عصاره گیاهی بر روی ماهیان *Cyprinus carpio* در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد غلظت ppm ۱۰۰-۵۰ آزمایش نمودند. Soto و Burhanuddin (۱۹۹۵) بر روی مولدین خرگوش ماهی *Sigamus lineatus* در دمای ۲۹-۲۷ درجه سانتی گراد با غلظت ppm ۱۰۰ و Tamaru و همکاران (۱۹۹۶) بر روی بچه خرگوش ماهیان *S. lineatus* در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد غلظت ppm ۲۵ عصاره گل میخک را مورد بررسی قرار داده که با موفقیت فراوانی جهت بیهوشی و بی-حسی طی مدت زمان حمل و نقل همراه بوده است. Anderson و همکاران (۱۹۹۷) بر روی مولدین قزل آلاهی رنگین کمان در دمای ۱۱ درجه سانتی گراد غلظت ppm ۱۲۰ و مهرابی (۱۳۷۶) بر روی مولدین قزل آلاهی رنگین کمان غلظت ppm ۱۵۰ عصاره گل-میخک را به منظور بی حسی برای حمل و نقل طولانی مدت پیشنهاد نمودند که با موفقیت بالایی بدون نمونه ای همراه بوده است.

در آبی پروری انتقال ماهی از یک مکان به مکان دیگر امری اجتناب ناپذیر بوده و مهم ترین معضل این امر در زمان حمل و نقل کنترل ضایعات متابولیک و تأمین اکسیژن محلول ماهیان می باشد همچنین از بیهوش کننده ها در سطح وسیعی جهت کاهش استرس و جلوگیری از آسیب های مکانیکی در زمان

MS222 تری کائین متان سولفات، Benzocain hydrochloride، کینالدین، هیدرات کلرال و عصاره گل میخک (Soto و Burhanuddin، ۱۹۹۵) و غیرشیمیایی ها نظیر کاهش درجه حرارت و بیهوشی الکتریکی تقسیم بندی می گردند (Stoskopf، ۱۹۹۳) همچنین محققین در جستجو مناسب ترین راه حمل و نقل ماهیان همواره عواملی نظیر: تاثیرگذاری، کاهش اثرات جانبی، قیمت مناسب و تهیه آسان را نیز مد نظر قرار می دهند (چیت ساز، ۱۳۷۹). ماهیان قزل آلاهی رنگین کمان *Oncorhynchus mykiss* به واسطه قابلیت های تجاری و اقتصادی فراوان در کشورهای مختلفی نظیر ایران مورد توجه قرار دارند چنانچه که خاستگاه اصلی این گونه آزاد ماهیان مناطق آمریکای شمالی و اروپا بوده و در کشور ایران با مناطقی همچون هراز و فیروزکوه استان تهران، چهارمحال بختیاری و کردستان به واسطه آب و هوای سرد و معتدل آنان جهت تکثیر و پرورش سازگاری مناسبی پیدا نموده است.

Ferreira و همکاران (۱۹۸۴) با بررسی ۲ ماده بیهوشی آمیتال سدیم و بنزوکائین هیدروکلراید بر روی ماهیان *Java tilapia* و *Oreochromis mossambicus* و همکاران (۱۹۸۵) با بررسی نمک غیرسمی NaCl^{-1} بر روی ماهیان *Morone crysops* و *M. saxatilis* به عملکرد مناسب ۲ ماده بیهوشی مذکور و نمک NaCl^{-1} در کاهش تولیدات دفعی و کاهش مصرف اکسیژن محلول تا $1/3 \text{ L}$ اذعان داشتند همچنین Carrasco و همکاران (۱۹۸۴)؛ Park و همکاران (۱۹۸۸) طی آزمایشاتی بر روی ماهیان باس سیاه دریایی و *Rhynchocypris steindachneri* تحت تاثیر ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید به توانایی بالای این ماده بیهوشی در کنترل فعالیت متابولیسم-

انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان توسط کیت کاریزاپ $10 \text{ mg.NH}_3/\text{L}$ - $0/1$ و دستگاه کالیبره دیجیتالی Device Water Calculator (شکل ۱) صورت پذیرفت و داده‌های آماری آنان به صورت مجزا توسط آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (One-Way ANOVA)، آزمون T-tests و رگرسیون خطی با سطح اطمینان ۵ درصد تجزیه و تحلیل گردیدند (Duncan, ۱۹۵۵).

نتایج

آنالیز ۶ گروه تیمار لیدوکائین هیدروکلراید و عصاره گل‌میخک نسبت به گروه شاهد طی مدت زمان ۵ ساعت حاکی از تاثیرگذاری مثبت ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید نسبت به عصاره گل‌میخک در کاهش غلظت مصرف اکسیژن محلول و غلظت آمونیم دفعی تیمارها بدون عوارض جوانی سویی دارد، چنانچه که تیمارهای عصاره گل‌میخک به واسطه غلظت بالای عناصر اورژنول و کاربوفیلین این عصاره اختلال در کنترل فعالیت‌های متابولسم‌دفعی، کاهش شدید غلظت اکسیژن محلول و افزایش شدید غلظت آمونیم دفعی را پس از گذشت یک ساعت از شروع آزمایشات در ۲ گروه تیمار ۳۰ و ۱۰ ppm ایجاد نموده و به واسطه خارج نشدن از مرحله شوک بیهوشی بچه‌ماهیان این گروه‌های تیمار دچار تلفات ۱۰۰٪ گردند.

غلظت اکسیژن محلول ابتدایی ۷ مخزن شبیه‌سازی $6/3 \text{ ppm}$ ($\pm 0/05$) بوده که پس از گذشت ۱ ساعت از شروع آزمایشات تا 5 ppm در گروه شاهد، 20 ، 10 ، 5 ppm در گروه‌های تیمار $5/4$ ، $5/71$ ، $5/82$ لیدوکائین هیدروکلراید و $5/4$ ، $4/11$ ، $3/4 \text{ ppm}$ تیمارهای 5 ppm ، 10 ، 30 عصاره گل‌میخک تنزل یافته که حاکی از افزایش شدید مصرف اکسیژن محلول تیمارهای گل‌میخک دارد بدین صورت که


دستکاری و حمل و نقل ماهیان استفاده می‌گردد، لذا بر روی حمل و نقل طولانی مدت بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان با مواد بیهوشی مطالعات صورت پذیرفته و برای نخستین بار از ۲ ماده بیهوشی عصاره گل‌میخک و لیدوکائین هیدروکلراید به صورت شبیه‌سازی آزمایشاتی انجام پذیرفت تا عوارض جانبی و تاثیرات مثبت این دو ماده بیهوشی گیاهی و شیمیایی نسبت به یکدیگر جهت استفاده‌های کاربردی مشخص گردد.

مواد و روش‌ها

شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان تحت تاثیر ۲ ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید و عصاره گل‌میخک در کارگاه تکثیر ماهیان سردابی Caspian شهرستان فیروزکوه استان تهران با شرایط آب و هوای (10°C و 12°C) و میانگین طولی و وزنی (13 cm و 12 gr) به تعداد ۲۰۰۰ قطعه بچه‌ماهی در ۷ مخزن شبیه‌سازی به ابعاد $210 \times 51 \text{ cm}$ ، عمق 15 cm ، حجم 160 L آب و بارگیری 150 قطعه بچه‌ماهی 12 gr درون هر یک از مخازن شامل ۳ گروه تیمار 5 ، 10 ، 20 ppm لیدوکائین هیدروکلراید، ۳ گروه تیمار 5 ، 10 ، 30 ppm عصاره گل‌میخک و ۱ گروه شاهد در ۳ نوبت تکرار و طی بازهای زمانی یک ساعت یک‌بار به مدت ۵ ساعت و بررسی پارامترهای کیفی آب نظیر DO ، pH ، NH_4^+ و دمای آب در ساعات اولیه صبح و بدون دستگاه هواده با کاهش تراکم نسبی بچه‌ماهیان و اضافه گردیدن 1000 ppm نمک NaHCO_3 درون هر یک از مخازن گروه‌های تیمار لیدوکائین هیدروکلراید مشابه آزمایشات Park و همکاران (۲۰۰۹) جهت خنثی‌سازی اثرات احتمالی این ماده بیهوشی انجام پذیرفت. محاسبات غلظت اکسیژن محلول، آمونیم دفعی و نوسانات pH گروه‌های تیمار بچه‌ماهیان

بیش از حد تنفسی دچار Spam دهان و سرپوش آبخشی شده و پس از گذشت یک ساعت تلفات شدید ۱۰٪ مشاهده و ثبت گردید. آنالیز روند تغییرات غلظت اکسیژن محلول ۶ گروه تیمار لیدوکائین هیدروکلراید و عصاره گل میخک نسبت به گروه شاهد به کمک آزمون T-tests و رگرسیون خطی اختلاف معنی دار نامحسوسی را ما بین گروه‌های تیمار و گروه شاهد نشان می‌دهد (شکل ۱).

غلظت اکسیژن محلول تیمار ۳۰ ppm عصاره گل میخک نسبت به ساعت صفر ۲/۹ ppm و تیمار ۲۰ ppm لیدوکائین هیدروکلراید نسبت به ساعت صفر ۰/۴۸ ppm تنزل یافته که این اختلاف شدید نوسان غلظت اکسیژن محلول نشان از قدرت بیهوشی بیشتر عصاره گل میخک نسبت به ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید دارد و همچنین بچه ماهیان ۲ گروه تیمار ۳۰ و ۱۰ ppm عصاره گل میخک به واسطه تقلا




شکل ۱- تغییرات غلظت اکسیژن محلول تیمارهای لیدوکائین هیدروکلراید و عصاره گل میخک نسبت به گروه شاهد

غلظت آمونیوم دفعی مخازن شبیه‌سازی در ساعت صفر ۰/۱ mg/l ($\pm 0/002$) بوده که پس از گذشت ۵ ساعت از شروع آزمایشات این غلظت در گروه شاهد تا ۰/۶ mg/l ($\pm 0/006$)، گروه‌های تیمار ۲۰ ppm، ۰/۵، ۰/۵۵ mg/l تا ۰/۱۰ لیدوکائین هیدروکلراید تا ۰/۵، ۰/۴۵ و گروه‌های تیمار ۵ ppm، ۱۰، ۳۰ عصاره

روند تغییرات غلظت آمونیوم دفعی بچه ماهیان انگشت قد قزل‌آلای رنگین‌کمان نسبت به روند تغییرات اکسیژن محلول و نوسانات pH صعودی‌تر بوده به طوری که غلظت آمونیوم دفعی تیمارهای عصاره گل میخک نسبت به تیمارهای لیدوکائین هیدروکلراید به واسطه از بین رفتن تعادل بافری افزایش یافته است.

علی‌الخصوص دز ۲۰ ppm از توانایی کمتری در کنترل فعالیت متابولسمی و کاهش مصرف اکسیژن محلول و تولید آمونیم دفعی بچه‌ماهیان دارد. آنالیز روند تغییرات غلظت آمونیم دفعی ۶ گروه‌های تیمار لیدوکائین‌هیدروکلراید و عصاره گل‌میخک نسبت به یکدیگر و گروه شاهد به کمک آزمون T-tests و رگرسیون خطی اختلاف معنی‌داری را ما بین گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد نشان می‌دهد (شکل ۲).

گل‌میخک به دلیل غلظت بالای عناصر اورژنول و کاربوفیلین تا ۲ mg/l افزایش یافته که پس از گذشت ۱ ساعت از شروع آزمایشات تیمارهای عصاره گل‌میخک به دلیل فعالیت شدید تنفسی بچه‌ماهیان تعادل بافری مخازن آنان بر هم خورده و با ایجاد حالت Spam دهان، سرپوش آبششی و هیپرپلازی آبشش‌ها تلفات ۱۰۰٪ مشاهده گردید اما گروه تیمار ۵ ppm عصاره گل‌میخک به واسطه غلظت پایین‌تر اورژنول و کاربوفیلین با تلفاتی مواجه نبوده ولی در مقایسه با گروه‌های تیمار لیدوکائین‌هیدروکلراید




شکل ۲ - تغییرات غلظت آمونیم دفعی بچه‌ماهیان تیمارهای لیدوکائین‌هیدروکلراید و عصاره گل‌میخک نسبت به گروه شاهد

رابطه مستقیم و با غلظت مواد دفعی بچه‌ماهیان رابطه معکوسی دارد. pH اولیه تمامی مخازن شبیه‌سازی در ساعت صفر ۷/۴ ppm بوده که پس از گذشت ۵ ساعت از شروع آزمایشات با کاهش غلظت اکسیژن محلول و افزایش غلظت آمونیم دفعی بچه‌ماهیان همراه بوده و pH گروه شاهد تا ۵/۵ ppm و ۳ گروه تیمار ۵ ppm، ۱۰ ppm، ۲۰ ppm لیدوکائین‌هیدروکلراید تا ۵/۷۶، ۵/۹۱، ۶/۲۲ کاهش نامحسوسی پیدا نمودند اما

بررسی روند نوسانات pH گروه‌های تیمار لیدوکائین‌هیدروکلراید و عصاره گل‌میخک نسبت به گروه شاهد پس از گذشت ۵ ساعت از شروع آزمایشات حاکی از افزایش شدید استرس بچه‌ماهیان و فعالیت‌های تنفسی - دفعی آنان در ۳ گروه تیمار ۵ ppm، ۱۰ ppm، ۳۰ ppm عصاره گل‌میخک به همراه کاهش چشمگیر غلظت اکسیژن محلول و pH دارد بدین صورت که نوسانات pH با غلظت اکسیژن محلول

چسبندگی شدید لاملاهای آبششی بچه ماهیان (هیپرپلازی)، ادامه روند بیهوشی و تلفات ۱۰۰٪ آنان را به همراه دارد. طبق آنالیز آزمون T-tests و رگرسیون خطی نوسانات pH اختلاف معنی داری ما بین گروه‌های تیمار لیدوکائین هیدروکلراید و عصاره گل میخک نسبت به یکدیگر و گروه شاهد مشاهده گردید (شکل ۳).

۳ گروه تیمار ppm ۵، ۱۰، ۲۰ عصاره گل میخک پس از گذشت ۵ ساعت به واسطه اسیدی شدن محیط شبیه سازی تا ppm ۳/۹۱، ۴/۱۱، ۴/۸۲ با افت شدیدتری مواجه بودند که این نوسانات pH در ۲ گروه تیمار ppm ۳۰ و ۱۰ عصاره گل میخک موجب افزایش غلظت آمونیم دفعی تا ۲/۱ mg/l و کاهش غلظت اکسیژن محلول تا ppm ۲/۳ گردیده که



شکل ۳- تغییرات pH تیمارهای لیدوکائین هیدروکلراید و عصاره گل میخک نسبت به گروه شاهد

پرورش دهندگان، حمل و نقل بچه ماهیان با کمترین هزینه و تلفات به مزارع پرورشی می باشد لذا برای نخستین بار به صورت شبیه سازی ۵ ساعته از دو ماده بیهوشی عصاره گل میخک و ماده شیمیایی لیدوکائین هیدروکلراید جهت حمل و نقل طولانی مدت بچه ماهیان انگشت قد قزل آلابی رنگین کمان در مخازن حمل انجام پذیرفت تا عوارض جانبی و مناسب ترین دز بی حسی مشخص گردد. نتایج حاصله حاکی از برتری ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید نسبت به عصاره گل میخک در حفظ سلامت و کنترل

بحث

بیشترین کاربرد داروهای بیهوشی و بی حسی آبزیان مرتبط به مراکز تحقیقاتی ماهیان خاویاری، کپور ماهیان و آزاد ماهیان مولد بوده که به واسطه دامنه تحمل بالاتر این گونه ها جهت فعالیت هایی تعیین جنسیت، استحصالی و تخم کشی مورد استفاده قرار می گیرند اما تاکنون در مسافت های طولانی مدت حمل و نقل بچه ماهیان انگشت قد قزل آلابی رنگین کمان از بیهوش کننده های شیمیایی و گیاهی استفاده ای نشده است در صورتی که مهم ترین معضل

MS₂₂₂ دز ۳۰ ppm، Quinaldine sulfate دز ۱۰ ppm نسبت به گروه شاهد طی مدت زمان ۱۶ ساعت شبیه‌سازی اظهار نمودند که غلظت آمونیم‌دفعی گروه تیمار ۲۰۰ ppm ماده 2-phenoxyethanol نسبت به گروه شاهد بیشتر از ۴۰٪، گروه تیمار ۱۰ ppm ماده Quinaldine sulfate نسبت به گروه شاهد بیشتر از ۲۰٪ و گروه تیمار ۳۰ ppm ماده بیهوشی MS₂₂₂ نسبت به گروه شاهد بیشتر از ۱۲٪ قبل از شروع آزمایشات با افزایش همراه بوده که حاکی از توانایی بالای ماده بیهوشی MS₂₂₂ نسبت به ۲ ماده بیهوشی فوق‌الذکر در کنترل فعالیت‌های متابولیسم دفعی ۲ گونه ماهی و *Play fish* و *Xiphophorus maculatus* دارد. Park و همکاران (۲۰۰۹) جهت خنثی‌سازی اثرات احتمالی ماده بیهوشی لیدوکائین-هیدروکلراید بر روی بچه ماهیان *winter flounder* Pleuronectes انگشت قد ۱۰۰۰ ppm نمک غیرسمی NaHCO₃ اضافه نمودند که علت تولید گاز کربنیک CO₂ درون مخازن حمل و نقل را یون‌های کربنیک این نمک بیان نمودند همچنین Carrasco و همکاران (۱۹۸۴) طی آزمایشاتی بر روی ماهیان گوناگون با نمک غیرسمی NaHCO₃ نظریه مشابه‌ای با Park (۲۰۰۹) اظهار نمودند که با نتایج ماده بیهوشی لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان رابطه همسویی دارد.

Tsantilas و همکاران (۲۰۰۶) اثرات ماده بیهوشی 2-Phenoxyethanol را بر روی دو گونه ماهی سیم دریایی سفید (*Diplodus* ۳۰-۶۰ gr) و ماهی سیم تیز پوزه (*sargus* ۱۵-۳۰ gr) با دزهای بیهوشی ۰/۴ ml/l - ۰/۱ بررسی و اظهار نمودند در تسریع القای بیهوشی عامل وزن بسیار موثر بوده و مناسب‌ترین دز بی‌حسی 2-Phenoxyethanol را ۰/۱۶۷ ml/l به مدت ۶۰ دقیقه بدون نمونه‌ای تلفات برای دو گونه ماهی فوق پیشنهاد نمودند. همچنین Zahl و همکاران (۲۰۰۹) با

فعالیت‌های متابولیسم‌دفعی بچه‌ماهیان بدون هر گونه عوارض جانبی سویی نظیر بیهوش‌کننده‌های شیمیایی کینالدین، متو میدات، میدا تران‌ان‌ای، فنوکسی‌اتانول و MS₂₂₂ در فرایند بی‌حسی دارد چنانچه محققینی همچون Park و همکاران (۱۹۹۸) با بررسی اثرات بیهوشی ماده لیدوکائین‌هیدروکلراید و عوامل دمایی بر روی حمل و نقل ماهیان *Rhynchocypris steindachneri* عامل اصلی کاهش غلظت اکسیژن محلول مخازن حمل ماهیان را افزایش استرس بچه‌ماهیان بیان و اظهار نمودند گروه‌های تیمارهای لیدوکائین‌هیدروکلراید نسبت به گروه شاهد از توانایی بالاتری در کنترل فعالیت‌های متابولیسم‌دفعی و کاهش غلظت اکسیژن محلول برخوردارند و نسبت به عوامل دمایی دارای رابطه معکوسی بوده و با افزایش غلظت بیهوشی و کاهش درجه حرارت آب غلظت اکسیژن محلول مخازن حمل با کاهش نسبی همراه می‌گردد. همچنین Ferreira و همکاران (۱۹۸۴) با بررسی اثرات ماده بیهوشی بنزوکائین-هیدروکلراید بر روی بچه‌ماهیان *Oreochromis mossambicus* به صورت شبیه‌سازی نتایجی نظیر کاهش متابولیسم‌دفعی، کاهش غلظت اکسیژن محلول تا (یک سوم) ۱/۳ L و کنترل نوسانات pH را بیان و اظهار نمودند افزایش ماده بیهوشی بنزوکائین‌هیدروکلراید تا دز ۲۰ ppm تغییرات نامحسوسی را در غلظت اکسیژن محلول مشابه دز ۲۰ ppm لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی بچه‌ماهیان انگشت قد قزل‌آلای رنگین‌کمان پدیدار می‌نماید در صورتی که عصاره گل‌میخک با افزایش تا دز ۳۰ ppm موجب کاهش شدید غلظت اکسیژن محلول گردیده که نتایج این عصاره گیاهی با نتایج Park و Ferreira رابطه همسویی ندارد. Guo و همکاران (۱۹۹۵) با بررسی فعالیت متابولیسم‌دفعی ۲ گونه ماهی *Play fish* و *Xiphophorus maculatus* بر روی ۳ نوع ماده بیهوشی 2-Phenoxyethanol دز ۲۰۰ ppm،

نمودند که القای بیهوشی عصاره گل میخک بسیار آرام و سرعت بازگشت از آن بسیار کوتاه‌تر از چند ترکیب شیمیایی نظیر: کینالدئین و بنزوکائین هیدروکلراید می‌باشد در صورتیکه نتایج عصاره گل میخک بر روی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان خلاف این نظریه را در ۲ گروه تیمار ۳۰ و ۱۰ به واسطه اسیدی شدن آب درون مخازن حمل و ایجاد حات هیپرپلازی آبششی بچه‌ماهیان اثبات می‌نماید. همچنین Anderson و همکاران (۱۹۹۷) با بررسی عصاره گل میخک بر روی مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان غلظت ۱۲۰ ppm را در دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد جهت بیهوشی سبک پیشنهاد نمودند که با نتایج عصاره گل میخک بر روی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان رابطه همسویی ندارد زیرا که ۲ گروه تیمار ۳۰ و ۱۰ این عصاره به واسطه حساسیت بالای لاملاهای آبششی، از بین رفتن تعادل بافری و ادامه مرحله شوک بیهوشی با تلفات ۱۰۰٪ مواجه گشتند. Soto و Burhanuddin (۱۹۹۵) با بررسی اثرات عصاره گل میخک بر روی مولدین خرگوش-ماهی *S. lineatus* غلظت ۱۰۰ ppm را در دمای ۲۹-۲۷ درجه سانتی‌گراد پیشنهاد نمودند که فاقد هر گونه عوارض جانبی سویی نظیر مواد بیهوشی شیمیایی تریکائین متانسانسولفونیت و 2-Phenoxyethanol بوده که با نتایج عصاره گل-میخک بر روی بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان که دچار Spam دهان و سرپوش آبششی و تلفات شدید ۱۰۰٪ گردیدند، رابطه همسویی ندارد. Constantinos و همکاران (۲۰۰۵) با بررسی اثرات بیهوشی ۳۰ mg/l عصاره گل میخک در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و ۳۰۰ mg/l 2-Phenoxyethanol در دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد بر روی ماهی سیم دریایی *Sparus aurata* اظهار نمودند کاهش درجه حرارت آب افزایش القای بیهوشی را به همراه دارد و عصاره گل میخک به واسطه دز پایین‌تر آن نسبت به

بررسی اثرات بیهوش‌کننده‌هایی نظیر MS₂₂₂, Benzocainhydrochloride, 2-Phenoxyethanol, Metomidate در دماهای ۱۶°C و ۸ بر روی ماهی *Gadus morhua* اظهار نمودند القای بیهوشی ۳ ماده شیمیایی-MS₂₂₂, Benzocain hydrochloride, 2-Phenoxyethanol با افزایش وزن ماهی و درجه حرارت آب و ماده Metomidate با کاهش وزن و درجه حرارت آب افزایش می‌یابد که با نتایج افزایش القای بیهوشی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تحت تاثیر ماده لیدوکائین هیدروکلراید به واسطه افزایش وزن و درجه حرارت آب رابطه همسویی دارد. Nomura و همکاران (۲۰۰۹) با بررسی عملکرد فیزیولوژی و رفتاری ماهی *Salmo salar* طی حمل و نقل دریایی و Henry (۲۰۰۹) بر روی ماهی قزل-آلای تاسمانی اظهار نمودند استرس ناشی از حمل ماهیان درون بشکه‌ها، غلظت CO₂ محلول را تا ۸۰ mg/l افزایش داده که به واسطه آن غلظت کورتیزول پلاسما، گلوکز و لاکتات عضلات افزایش و اختلالات تنفسی و بی‌حالی موجب مرگ ماهیان می‌گردد که با افزوده شدن درصدی نمک NaCl⁻¹ درون مخازن استرس و فعالیت متابولیسمی ماهیان کاسته و تلفات کاهش می‌یابند اما Bosworth و همکاران (۲۰۰۷) با بررسی اثرات ماده آرامش‌بخش AQUI-^{STM} بر روی گربه‌ماهیان *Ictalurus punctatus* دز ۲۵ ppm را در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد فقط به مدت زمان ۱۰ دقیقه جهت بیهوشی پیشنهاد نمودند در صورتی که بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تحت تاثیر ماده لیدوکائین هیدروکلراید با دز ۲۰ ppm به مدت زمان ۵ ساعت فعالیت‌های متابولیسمی آنان تحت کنترل قرار دارد که با نتایج Bosworth رابطه همسویی ندارد.

Monday و Wilson (۱۹۹۷) اثرات بیهوشی عصاره گل میخک را بر روی ماهیان مولد *Pomacentrus amboinensis* بررسی و اظهار

درون مخازن حمل موجب کاهش کورتیزول پلاسما و افزایش اسید آمینه‌های آزاد گردیدند در صورتی که بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تحت تاثیر عصاره گل‌میخک در ۲ گروه تیمار ۳۰ و ۱۰ ppm با مشکل افزایش مصرف اکسیژن محلول و آمونیم‌دفعی بچه‌ماهیان همراه بودند اما Roth و همکاران (۲۰۰۶) طی آزمایشاتی بر روی آزاد ماهیان *S. salar*، افزایش فعالیت‌های شدید تنفسی، تولید گازهای سمی، اسیدی‌شدن pH، ایجاد شرایط بی‌هوازی، تخلیه بیشتر گلیکوژن و تجمع لاکتات درون عضلات و مرگ ماهیان را به واسطه استرس این ماهی طی حمل و نقل اعلام نمودند که با نتایج تیمارهای عصاره گل‌میخک بر روی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در ۲ گروه تیمار ۳۰ و ۱۰ ppm به دلیل بیهوشی سنگین و افزایش تجمع لاکتات و تخلیه گلیکوژن عضلات رابطه کاملاً همسویی دارد.

واکنش‌های استرسی بچه‌ماهیان ۱۲ گرم قزل‌آلای رنگین‌کمان تحت تاثیر ۲ ماده بیهوشی عصاره گل‌میخک و لیدوکائین هیدروکلراید حاکی از هر گونه عوارض جانبی مضر و سوء لیدوکائین هیدروکلراید بر روی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان دارد ولی عصاره گل‌میخک به واسطه ترکیبات بسیار قوی اورژنول و کاربوفیلین بر روی اندازه‌های کوچک متمرکز نبوده و بیشتر برای بیهوشی ماهیان مولد توصیه می‌گردد لذا غلظت ۲۰ ppm بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید به واسطه سهولت تهیه، قیمت مناسب و تاثیرگذاری مثبت بر روی عملکرد حیاتی بچه‌ماهیان به عنوان یک واسطه مناسب جهت حمل و نقل طولانی مدت بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان توصیه می‌گردد.

ماده 2-Phenoxyethanol از توانایی بالاتری در القای بیهوشی، نرخ تهویه و کاهش درصد مرگ و میر برخوردار بوده ولی در مقایسه با اثرات ماده لیدوکائین هیدروکلراید بر روی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان از توانایی پایین‌تری برخوردار است و رابطه همسویی ندارد همچنين Park و همکاران (۲۰۰۹) اثرات عصاره گل‌میخک در ۳ گروه تیمار با درجه حرارت‌های متفاوت بر روی ماهی سیم *Oplegnathus fasciatus* بررسی و غلظت ۱۰۰ mg/l در دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد را پس از ۱ ساعت بی‌حسی پیشنهاد نمودند که به واسطه آن کورتیزول پلاسما تا $1/41 \pm 1/88 \mu\text{g/dl}$ و گلوکز پلاسما تا $1/41 \pm 1/88 \mu\text{g/dl}$ افزایش و اظهار نمودند تحت تاثیر این عصاره سرعت القای بیهوشی افزایش و زمان برگشت‌پذیری طولانی‌تر بوده و با کاهش درجه حرارت آب سرعت القای بیهوشی آن تسریع می‌گردد در صورتی که بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان تحت تاثیر عصاره گل‌میخک در تیمارهای ۳۰ و ۱۰ ppm پس از گذشت ۱ ساعت از شروع بی‌حسی با افزایش مصرف اکسیژن محلول، pH و Spam دهان و سرپوش آبشش و تلفات ۱۰٪ همراه گردیدند که با نتایج Park رابطه همسویی ندارد. Zeppenfeld و همکاران (۲۰۱۳) اثرات عصاره *Aloysia triphylla* را بر روی گربه ماهی نقره‌ای *Rhamdia quelen* در ۲ گروه تیمار $40 \mu\text{l/l}$ و ۳۰ و یک گروه شاهد طی مدت زمان ۶ ساعت بررسی نمودند که بیشترین درصد آمونیم در گروه شاهد مشاهده گردید و گروه تیمار $40 \mu\text{l/l}$ *A. triphylla* علاوه بر کاهش مصرف اکسیژن محلول، آمونیم، pH

منابع

۱. چیت‌ساز، ح. ۱۳۷۹. مطالعه اثرات بیهوشی گل‌میخک (عصاره و اسانس) در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، ۷۴ صفحه.
۲. مهرابی، ی. ۱۳۷۶. مطالعه مقدماتی اثر بیهوشی پودر گل‌میخک بر روی قزل‌آلای رنگین‌کمان، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۴۱-۴۰، صفحات ۱۶۲-۱۶۰.

۳. میرحیدری، ح. ۱۳۷۲. معارف گیاهی. جلد دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صفحات ۴۲۱-۴۱۶.

4. Anderson, W.G., Mckinley, R.S., and Colvecchia, M. 1997. The use of clove oil as an anesthetic for rainbow trout and its effects on swimming performance. National American journal Fishery Management, 17: 301-307.
5. Bosworth, B.G., Small, B.C., Gregory, D., Kim, J., Black, S., and Jerrett, A. 2007. Effects of rested-harvest using the anesthetic AQUI-S™ on channel catfish, *Ictalurus punctatus*, physiology and fillet quality. Aquaculture, 262(2-4): 302-318.
6. Carrasco, S., Sumano, H., and Navarro, R. 1984. The use of Lidocaine sodium bicarbonate as anesthetic in fish aquaculture, 41: 395-398.
7. Constantinos, C.M., Gloriana, C., Irini, S., and Alberta, P.M. 2005. Comparative efficacy of clove oil and 2-phenoxyethanol as anesthetics in the aquaculture of European sea bass (*Dicentrarchus labrax*) and gilthead sea bream (*Sparus aurata*) at different temperatures. Aquaculture, 246(1-4): 467-481.
8. Duncan, D.B. 1995. Multiple range and multiple F tests. Biometrics 1, 1-42.
9. Ferreira, J.T., Schoobee, H.J., and Smith, G.L. 1984. The use of Benzocaine hydrochloride as an aid in the transport of fish. Aquaculture 42:169-174.
10. Grizzle, J.M., Mauldin, A.C., Young, D., and Henderson, E. 1985. Survival of juvenile striped bass (*Morone saxatilis*) and Morone hybrid bass (*Morone crysops* and *Morone saxatilis*) increased by addition of calcium to soft water. Aquaculture 46:167-171.
11. Guo, F.C., Teo, L-H., and Chen, T-W. 1995. Effects of anesthetics on the water parameters in simulated transport experiment of *play fish*; *Xiphophorus maculatus* (Gunther). Aqua. Res. 26, pp: 265-271.
12. Hisaka, Y., Takase, K., and Ogasawara, S. 1986. Anesthesia and recovery with tricaine methansulfonate, eugenol and thiopental sodium in carp (*Cyprinus carpio*). Japanese Journal of Veterinary Science, 48:340-351.
13. Henry, R.K. 2009. Fish transport in the aquaculture sector: An overview of the road transport of Atlantic salmon in Tasmania. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 4(4):163-168.
14. Monday, P.L., and Wilson, S.K. 1997. Comparative efficacy of clove oil and other chemicals in Anesthetization of *Pomacentrus amboinensis*, a coral reef fish. Journal of Fish Biology, 51: 931-938.
15. Nomura, M., Sloman, K.A., Von Keyserlingk, M.A., and Farrell, A.P. 2009. Physiology and behavior of Atlantic salmon (*Salmo salar*) smolts during commercial land and sea transport. Physiology & Behavior, 96(2): 233-243.
16. Park, L.S., Lim, C.H., and Choi, M.S. 1998. The evaluation of Lidocaine Hydrochloride as anesthetic for the transportation of *Rhynchocypris steindachneri*. J. Korean Fish. Soc. 3, pp: 785-790.
17. Park, I.S., Park, M.O., Hur, J.W., Kim, D.S., Chang, Y.J., and Kim, Y.J. 2009. Anesthetic effects of Lidocaine-hydrochloride on water parameters in simulated transport experiment of juvenile winter flounder, *Pleuronectes americanus*. Aquaculture, 294: pp: 76-79.
18. Park, M.O., Im, S.Y., Seol, D.W., and Park, I.S. 2009. Efficacy and physiological responses of rock bream, *Oplegnathus fasciatus* to anesthetization with clove oil. Aquaculture, 287(3-4): 427-430.
19. Roth, B., Slinde, E., and Aridest, J. 2006. Pre or post mortem muscle activity in Atlantic salmon (*Salmo salar*). The effect on rigor mortis and the physical properties of flesh. Aquaculture. 257: 504-510.
20. Soto, C.G., and Burhanuddin, F. 1995. Clove oil as a fish anesthetic for measuring length and weight of rabbit fish (*Signus lineatus*). Aqua Culture, 135: 149-152.
21. Stoskopf, M. 1993. Anesthesia In: Aquaculture for Veterinarians. Pergamon press., pp: 79-90.
22. Tamaru, C.S., Carlstrom, C., and Fitzgerald, W.J. 1996. Clove oil, minyak cengkeh, a natural fish anesthetic. Proceeding of the Pacon Conference on Sustainable Aqua Culture. 95, pp: 256-371.
23. Tsantilas, H., Galatos, A.D., Athanassopoulou, F., Prassinou, N.N., and Kousoulaki, K., 2006. Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for two size classes of white sea bream, *Diplodus sargus* L., and sharp snout sea bream, *Diplodus puntazzo* C. Aquaculture, 253(1-4): 64-70.
24. Zahl, I.H., Kiessling, A., Samuelsen, O.B., and Hansen, M.K. 2009. Anesthesia of Atlantic cod (*Gadus morhua*) Effect of pre-anaesthetic sedation, and importance of body weight, temperature and stress. Aquaculture, 295(1-2): 52-59.
25. Zeppenfeld, C.C., Toni, C., Becker, A.G., Miron, D.S., Parodi, T.V., and Baldissotto, B. 2013. Physiological and biochemical responses of silver catfish, *Rhamdia quelen*, after transport in water with essential oil of *Aloysia triphylla* (L'Herit) Britton. Aquaculture, 418-419: 101-107.