

بررسى فلور کوه خرگوشان، استان لرستان

محمد مهدى دهشیرى *

گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایي گیاهان و معرفی فلور، تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایي گیاهان کوه خرگوشان انجام گرفت. اين کوه، با مساحت ۶۰۰۰ هكتار، در شرق شهرستان پلدختر و جنوب‌غربی شهرستان خرم‌آباد واقع شده است. حداکثر ارتفاع اين کوه از سطح دريا ۲۳۲۹ متر است. نمونه‌های گیاهی از نقاط مختلف کوه خرگوشان طی دو فصل رویشي بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ جمع‌آوری و شناسایي شد. طيف زیستی گیاهان اين منطقه با تعیین درصد گونه‌های متعلق به هر يك از شکل‌های زیستی ترسیم شد. جايگاه کوه خرگوشان از نظر جغرافیایي گیاهی ايران بر اساس اطلاعات به دست آمده از پراکنش جغرافیایي گونه‌های شناسایي شده و منابع موجود بررسی شد. از ۲۱۱ گونه شناسایي شده در منطقه کوه خرگوشان سه گونه نهانزاد آوندی، يك گونه بازدانه، ۱۷۶ گونه دولپه و ۳۱ گونه تک لپه حضور دارد. اين گونه‌ها به ۵۰ تيره و ۱۵۰ جنس تعلق دارد. بيشترین عنای گونه‌اي در تيره‌های Fabaceae (۲۷ گونه، ۱۲/۷۹ درصد)، Asteraceae (۲۲ گونه، ۱۰/۴۲ درصد)، Apiaceae (۱۷ گونه، ۸/۰۵ درصد) و Lamiaceae (۱۶ گونه، ۷/۵۸ درصد) دیده شد. از نظر شکل زیستی، ۳۶/۴۹ درصد تروفیت، ۳۱/۲۸ درصد همي كريپتو菲ت، ۱۸/۹۶ درصد كريپتو菲ت، ۸/۰۶ درصد فانروفيت، ۵/۲۱ درصد كامفيت هستند. ۱۳۸ گونه (۶۵/۴ درصد) در فلور کوه خرگوشان، بومزاد ناحيه ايراني-توراني هستند؛ از اين تعداد ۳۲ گونه بومزاد ايران است که در ميان آنها پراکنش چهار گونه (*Hedysarum gypsophilum*, *Dionysia gaubae*, *Astragalus lurorum* and *Phlomis lurestanica*) به استان لرستان محدود می‌شود.

واژه‌های کلیدی: فلور، جغرافیایي گیاهی، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایي، کوه خرگوشان

در پنهانه کشور اکوسیستم‌های مهمی به وجود آید که هر کدام غنى از گیاهان متنوع و همچنین اجتماعات گیاهی ویژه خود است. از اکوسیستم‌های مهم کلان کشور می‌توان به منطقه رویشي زاگرس اشاره کرد. شناسایي پوشش گیاهی يك منطقه ضمن اين که اساس بررسی‌ها و مطالعات اکولوژيک است، به عنوان

مقدمه

از ميان کشورهای جنوب‌غرب آسیا، ايران دارای متنوع ترین پوشش گیاهی است. اين تنوع رویسي از وسعت زياد ايران، گوناگونی اقليمي و توپوگرافی و نيز تاریخچه فلور و پتانسیل تکاملی آن ناشی می‌شود (Asri and Mehrnia, 2002).

* dehshiri2005@yahoo.com

Copyright©2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/>), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

Dehshiri و Vajari (۲۰۰۵)، Veiskarami و Vajari (۲۰۰۵)، Abrari و همكاران Vajari (۲۰۰۵)، Goudarzi (۲۰۰۷)، Abasi و Yarahmadi (۲۰۰۹)، همكاران Ramak (۲۰۰۹) و Mehrnia (۲۰۱۵) و (۲۰۱۴) انجام گرفته است.

از آنجا که بررسی های فلوریستیک مانند شناسنامه ای نشان دهنده وضعیت حال و گذشته یک منطقه است، بنابراین در پیش بینی های آینده نقش به سزایی دارد. با توجه به احداث بزرگراه خرم آباد- اندمیشک در سال های اخیر، تا حال حاضر در کوه خر گوشان کار عمده، دقیق و متصرکزی برای مشخص نمودن ترکیب فلوریستیک صورت نگرفته است. این کوه با خط الرأس حدود ۳۰ کیلومتر به عنوان یک دیواره کوهستانی و بخشی از سیستم زاگرس در مرز لرستان و خوزستان واقع شده است که از یک سو به فلات داخلی مرتبط است و از سوی دیگر به جلگه های خوزستان متنه می شود؛ بنابراین، منطقه کوه خر گوشان در آخرین قسمت ناحیه ایرانی- تورانی قرار دارد. از آنجا که مطالعه مناطق مرزی بین دو ناحیه رویشی حائز اهمیت است و به نظر می رسد از نظر پوشش گیاهی و رُستنی ها از ویژگی های خاصی برخوردار است و میزان بومزادی در این قبیل مناطق بالا باشد، مطالعه حاضر تلاش می کند تا عناصر رویشی کوه خر گوشان را در مقیاس کوچک به تصویر بکشد و به معرفی شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان این کوه پردازد.

روش بررسی

موقعیت کوه خر گوشان: کوه خر گوشان با مساحت ۶۰۰۰ هکتار با مختصات $47^{\circ} 56'$ تا $48^{\circ} 09'$

راهکاری مناسب برای تعیین قابلیت های منطقه از جنبه های مختلف است و نیز عاملی مؤثر در ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آن در آینده به شمار می رود و با توجه به آثار عوامل مخرب در انقراض برخی از گونه های با اهمیت، شناسایی هرچه سریعتر آنها در مناطق مختلف و برنامه ریزی در جهت حفظ آنها ضرورت می یابد (Ghahreman, 1994).

استان لرستان به عنوان یکی از مهم ترین کانون های گیاهان بوم زاد ناحیه رویشی ایرانی- تورانی حوزه جنگل های زاگرسی به شمار می رود Abrari Vajari (2007) et al.. این استان از یکسو دارای تنوع اقلیمی و تنوع گیاهی بالایی است که نیاز به شناسایی دارد و از سوی دیگر توسعه چشمگیر استان در دهه های اخیر، تغییرات کاربری اراضی مرتعد و عدم تعادل بین دام و مرتع، خطر کاهش تنوع زیستی و انقراض برخی گونه های گیاهی را افزایش داده است (Abasi et al., 2009).


پوشش گیاهی مناطق کوهستانی ایران توسط پژوهشگران مختلفی مطالعه شده است. نخستین جمع آوری گیاهان از مناطق کوهستانی زاگرس توسط Olivier (1795) انجام گرفت. پس از وی سایر گیاه شناسان از جمله Aucher-Eloy (1835)، Bornmuller (1867- ۱۸۶۵)، Haussknecht (1889- ۱۸۸۹)، Darlington (1910)، Cowan (1939)، Nabelek (1939)، Maleki (1929)، Trott (1939- ۱۹۳۴)، Koie (1945)، Rechinger (1970)، Gentry (1955) از این مناطق نمونه های گیاهی جمع آوری کردند (Parsa, 1978).

در استان لرستان مطالعاتی در مناطق کوهستانی دیگر توسط Abrari (2002)، Mehrnia و Asri (2002)

خرم آباد که نزدیک ترین ایستگاه های هواشناسی به کوه خرگوشان است، میانگین بارش سالیانه در پلدختر و خرم آباد به ترتیب 360 و 436 میلی متر طی سال های 1383 تا 1392 بوده است. بیشترین میزان بارش در پلدختر و خرم آباد به ترتیب در آذر (72 میلی متر) و فروردین ماه (80 میلی متر) است و اغلب بارندگی ها در شش ماهه دوم سال رخ می دهد. متوسط دمای حداکثر گرمترين ماه، متوسط دمای حداقل سردترین ماه و متوسط دمای سالیانه پلدختر به ترتیب $28/5$ ، $16/7$ و $22/6$ درجه سانتیگراد است. متوسط دمای حداکثر گرمترين ماه، متوسط دمای حداقل سردترین ماه و متوسط دمای سالیانه خرم آباد به ترتیب 25 ، 9 و 17 درجه سانتیگراد است. طبقه بندي اقليمي دومارتن نشان می دهد که اقليم منطقه کوه خرگوشان نيمه خشک است.

طول شرقی و $۰^{\circ} ۰۵' ۳۳''$ تا $۰^{\circ} ۹'$ عرض شمالی، جزو کوه های زاگرس به شمار می رود که در شرق شهرستان پلدختر و جنوب غربی شهرستان خرم آباد در استان لرستان واقع شده است (شکل ۱). دستری کوه خرگوشان از طریق بزرگراه خرم آباد-اندیمشک است که از کنار آن می گذرد. این کوه، با حدائق ارتفاع حدود 1372 متر و حداقل ارتفاع 2329 متر از سطح دریا و در جهت جنوب شرقی- شمال غربی که روند کلی ارتفاعات زاگرس است ناحیه ای کاملاً کوهستانی با دره های کم و بیش عمیق و یال صخره ای را به وجود آورده است که در بسیاری از عرصه ها فاقد پوشش خاکی و یا دارای پوشش خاکی کم عمق است (Jafari, 1989; N.G.O., 2000; Judaki, 2013).

بر اساس آمار ایستگاه های هواشناسی پلدختر و



شکل ۱- موقعیت کوه خرگوشان (مقیاس ۱:۳۰۰۰۰۰)

گونه‌های ايران (Ghahreman and Attar, 1998) و Red (Ghahreman and Attar, 1998) data book (Jalili and Jamzad, 1999) برای شناسايی گونه‌های بومزاد، نادر و در معرض خطر استفاده گردید. گونه‌های گیاهی شناسایی شده در هرباریوم مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نگهداری شد.

نتایج

در مجموع، در کوه خرگوشان ۲۱۱ گونه از ۱۵۰ جنس و ۵۰ تیره گیاهی شناسایی شد. از این تعداد، ۳ گونه نهانزاد آوندی، ۱ گونه بازدانه، ۳۱ گونه تک‌لپه و ۱۷۶ گونه دولپه هستند که فهرست تیره‌ها و گونه‌های شناسایی شده در کوه خرگوشان و همچنین ناحیه رویشی، شکل زیستی، وضعیت حفاظتی و پراکنش آنها در پیوست ۱ آمده است.

تیره‌های Apiaceae، Asteraceae، Fabaceae و Lamiaceae به ترتیب با ۲۷، ۲۲، ۱۷ و ۱۶ گونه گیاهی دارای بیشترین سهم از نظر غنای گونه‌ای و ۲۴ تیره هر یک با یک گونه گیاهی کمترین سهم را در غنای گونه‌ای کوه خرگوشان داشتند. بزرگترین جنس‌های گیاهی کوه خرگوشان عبارتند از: *Astragalus* با ۱۳ گونه، *Salvia* و *Silene* هر یک با ۶ گونه و *Gallium* با ۴ گونه.


همان طور که در شکل ۲ نشان داده شده است گیاهان علفی چندساله دولپه با ۷۹ گونه (۳۷/۴۶ درصد) بیشترین شکل رویشی گونه‌های شناسایی شده را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که فقط یک گونه درختچه‌ای بازدانه *Ephedra ciliata* (۰/۴۷ درصد) در کوه خرگوشان دیده شد.

نتایج مربوط به طیف زیستی گونه‌های گیاهی کوه خرگوشان نشان داد که تروفیت‌ها با ۷۷ گونه (۳۶/۴۹ درصد)، فراوان‌ترین و کامفیت‌ها با ۱۱ گونه (۵/۲۱)

روش تحقیق

به منظور معرفی فلور کوه خرگوشان، از روش پیمایشی که یکی از روش‌های مرسوم مطالعات تاكسونومیک منطقه‌ای است، استفاده شد (Mesdaghi, 2001). در این روش، جمع آوری نمونه‌های گیاهی با مراجعه به نواحی مختلف کوه خرگوشان طی دو فصل رویشی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ صورت گرفت. گونه‌های گیاهی موجود در کوه خرگوشان، پس از جمع آوری، خشک و پرس شدند. نمونه‌ها با استفاده از فلورا ایرانیکا (Rechinger, 1963-2015)، فلور عراق (Townsend and Guest, 1960-1985)، فلور فلسطین (Zohary and Feinbrun-Dothan, 1966-1986)، فلور ترکیه (Davis, 1965-1988)، گونه‌ای ایران (Assadi, 1986-2011)، فلور رنگی ایران (Ghahreman, 1988-2016)، رده‌بندی گیاهی (Mozaffarian, 2006) و کروموفیت‌های ایران (Ghahreman, 1990-1994) شناسایی و در پایگاه IPNI جستجو و مقابله شد. به منظور تعیین پراکنش جغرافیایی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی شناسایی شده از کوه خرگوشان، از فلورهای نامبرده و منابع موجود در زمینه جغرافیای گیاهی ایران از جمله Zohary (۱۹۸۶)، Takhtajan (۱۹۷۳) و Léonard (۱۹۹۱-۱۹۹۲) استفاده شد. شکل زیستی گیاهان بر اساس سیستم Raunkiaer (۱۹۳۴) مشخص و طیف زیستی آنها به صورت هیستوگرام ترسیم شد. شکل زیستی در این سیستم بر مبنای جوانه‌های احیاکننده که در سال بعد شاخه‌ها و برگ‌های جدید را ایجاد می‌کنند، بنا شده است و به پنج طبقه فائزوفیت‌ها، کامفیت‌ها، همی کرپیوفیت‌ها، کرپیوفیت‌ها و تروفیت‌ها تقسیم می‌گردد (Ghahreman, 1994؛ Moghadam, 2001). از مرجع تنوع زیستی


* در پیوست ۱ نشان داده شده است. در میان آنها، *Astragalus lurorum* پراکنش چهار گونه و *Hedysarum gypsophilum*, *Dionysia gaubae* و *Phlomis lurestanica* به استان لرستان محدود می‌شود. بر اساس وضعیت حفاظتی، ۲۰ گونه جزو گیاهان با تهدید کمتر (LR)، سه گونه آسیب‌پذیر (VU) و ۹ گونه اطلاعات اندکی در مورد آنها وجود دارد (Jalili and Jamzad, 1999) (DD).




شکل ۳- هیستوگرام درصد فراوانی شکل‌های زیستی گیاهان کوه خرگوشان

درصد) کمترین شکل زیستی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند (شکل ۳).

نتایج مربوط به پراکنش جغرافیای گیاهی گونه‌های کوه خرگوشان، نشان‌دهنده غلبه گونه‌ای ناحیه رویشی ایرانی-تورانی است. این گونه‌ها ۶۵/۴ درصد فلور کوه خرگوشان را تشکیل می‌دهند (شکل ۴). از ۲۱۱ گونه شناسایی شده ۳۲ گونه بوم‌زاد ایران است (Ghahreman and Attar, 1998) که با علامت



شکل ۲- تعداد گونه‌های متعلق به هر یک از شکل‌های رویشی در کوه خرگوشان



شکل ۴- هیستوگرام درصد فراوانی نواحی رویشی گیاهان در کوه خرگوشان (IT=ایرانی-تورانی، M= مدیترانه‌ای، ES= اروپا-سیبری، SS= صحراء-سندي، PL= چند ناحیه‌ای (بیش از سه ناحیه)، Cosm= جهان‌وطن).

Vajari Veiskarami و Abrari (2005) در مطالعه فلوریستیک منطقه هشتادپهلو خرم‌آباد که یکی از کوه‌های نزدیک به کوه خرگوشان است، ۲۰۵ گونه گیاهی متعلق به ۱۵۵ جنس و ۴۹ تیره را معرفی کردند

بحث و نتیجه‌گیری

در کوه خرگوشان، ۲۱۱ گونه گیاهی متعلق به ۱۵۰ جنس و ۵۰ تیره شناسایی شد که با توجه به وسعت اندک، بیانگر غنای گونه‌ای بالای این منطقه است.

در کوه خرگوشان گونه‌های *Astragalus* (جنس گون) تقریباً نیمی از گیاهان تیره Fabaceae را تشکیل می‌دهد (۱۳ گونه از مجموع ۲۷ گونه این تیره). گونه‌ها بزرگترین جنس گیاهان مرتعی ایران هستند. از ۱۳ گونه گون موجود در کوه خرگوشان، ۶ گونه بوم‌زاد ایران است که نشان دهنده شرایط مناسب کوه خرگوشان برای گسترش گونه‌های این جنس است.

۱۷ گونه درختی و درختچه‌ای در کوه خرگوشان دیده می‌شود که با افزایش ارتفاع از تراکم و تنوع آنها کاسته شده و در عوض گیاهان علفی و بوته‌ای جایگزین آنها می‌گردد. از جمله این درختان می‌توان به گونه بلوط ایرانی (*Quercus brantii*) اشاره کرد که پوشش غالب را در ارتفاعات پایین کوه خرگوشان، به ویژه شیب شمالی آن، همانند سایر کوه‌های لرستان تشکیل می‌دهد. در بسیاری از عرصه‌ها، با توجه به عمق اندک خاک، گیاهان درختی و درختچه‌ای با کاهش رشد رویشی مشاهده می‌شود و اغلب در لابه‌لای صخره‌ها رویش دارند.

شكل زیستی گیاهان، صرف نظر از این که ویژگی تاكسونوميك آنها را نشان می‌دهد، بیانگر سازش گیاهان با شرایط زیست محیطی نیز است. طیف زیستی گیاهان کوه خرگوشان بیانگر فلور مناطق کوهستانی کم ارتفاع و نیمه خشک است که در آن تروفیت‌ها (درصد ۳۶/۴۹) و پس از آنها همی‌کرپتوفیت‌ها (درصد ۳۱/۲۸) بیشترین و کامفیت‌ها با ۱۱ گونه (درصد ۵/۲۱) کمترین سهم را دارند.

تخرب بخش‌هایی از کوه خرگوشان و خشکسالی‌های چند سال اخیر سبب شده است تا این منطقه با هجوم گیاهان یک‌ساله (با توجه به کوتاه بودن فصل رویش)، مواجه شوند و تروفیت‌ها (۳۶/۴۹)

که از نظر تعداد تاكسون‌ها با نتایج حاضر تشابه زیادی دارد. تیره‌های ۲۷ (گونه) Asteraceae و ۲۲ (گونه) Fabaceae گیاهان غالب کوه خرگوشان هستند که با (Abrari Vajari and Veiskarami, Dehshiri and Goudarzi, 2005; Mehrnia and Ramak, Yarahmadi et al., 2009) ۲۰۰۹ در مورد سایر رویشگاه‌های استان لرستان (2014) مطابقت دارد.

از گونه‌های با ارزش مرتعی گراس‌های کوه سری در کوه خرگوشان می‌توان به انواع گونه‌های *Melica* اشاره نمود. *Bromus sterilis* گیاهان پیازی مانند: *Gagea dubia*, *G. gageoides*, *Tulipa neglectum* و *Muscari neglectum* حضور دارد. بهره‌برداری و استفاده خوارکی گونه‌هایی *Smyrniopsis ribes* (Rheum ribes) و *Rheum aucheri* نظیر ریواس موجب تخریب رویشگاه و کاهش بسیار زیاد جمعیت آنها شده است، به طوری که نمونه‌های آنها به صورت پراکنده و در لابه‌لای صخره‌ها یافت می‌شود. شکل‌های کوتوله بوته‌ای خاردار و بالشتکی (همچون جنس‌های *Acantholimon*, *Astragalus* و *Acanthophyllum*) گونه‌های پایا و چند ساله ارتفاعات کوه خرگوشان را تشکیل می‌دهند.

تعداد اندک گونه‌های خاردار و یا بالشتکی در کوه خرگوشان (از قبیل *Astragalus* و *Echium*) می‌تواند به دلایلی از قبیل ارتفاع کمتر از ۲۵۰۰ متر آن، برداشت کوتاه‌مدت از گونه‌های چوبی، چرای کم دام و تغییرات اندک کاربری اراضی مرتعی باشد (Asri and Mehrnia, Abrari Vajari and Veiskarami, 2005; Noroozi et al., 2008; Akhani, 2005).

(۶۵/۴ درصد) متعلق به ناحیه ایرانی-تورانی است. علت اصلی غالبیت عناصر ایرانی-تورانی ممکن است دوری این ناحیه رویشی از مناطق دیگر و شرایط محیطی خاص (اقليم نیمه خشک) حاکم بر منطقه باشد. همچنین حضور جنس‌هایی نظیر: *Allium Acantholimon*

Ferula Echinops Astragalus Amygdalus

Silene Scrophularia Pistacia Phlomis

Tulipa Stachys و *Archibald* (۱۹۹۵) فراوانی گیاهان می‌دهند. طبق نظر *Abasi et al.*, ۲۰۱۴ همی‌کریپتووفیت‌ها و کریپتووفیت‌ها حدود نیمی از طیف زیستی عناصر گیاهی کوه خرگوشان را تشکیل می‌دهند. همی‌کریپتووفیت‌ها و کریپتووفیت‌ها در یک منطقه نشان‌دهنده اقلیم کوهستانی است. همی‌کریپتووفیت‌ها با سازوکارهایی (از قبیل ذخیره‌سازی آب، کاهش تبخیر آب توسط گُرک‌ها و کاهش فاز رویشی) قادرند شرایط سخت محیط مانند کمبود آب را تحمل نمایند (Mehrnia and Ramak, 2014). فراوانی کریپتووفیت‌ها (همانند *Liliaceae*) را می‌توان ناشی از سازگاری این گیاهان در برابر عدم چرای دام (به علت قرارگیری جوانه‌های انتهایی شان در زیر خاک) دانست (Roques et al., 2001). همچنین، بر اساس نظر *Sharifi* و *Hemkaran* (۲۰۱۲) حضور درصد نسبتاً زیاد همی‌کریپتووفیت‌ها و کریپتووفیت‌ها در کوه خرگوشان نشانگر حفظ رطوبت خاک ناشی از ذوب برف در مدت فصل رویش گیاهان است.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کوه خرگوشان، با اقلیم نیمه خشک، می‌تواند از جنبه ذخایر ژنتیکی حائز اهمیت باشد، زیرا ۲۱۱ تاکسون در محدوده ارتفاع ۹۵۷ متر (۱۳۷۲ تا ۲۳۲۹ متر) انتشار یافته است که از

درصد) غالب‌ترین شکل زیستی عناصر گیاهی کوه خرگوشان را تشکیل دهنده. این نتایج با گزارش‌های پیشین در خصوص فراوانی تروفیت‌ها در اکوسیستم‌های آسیب دیده کوهستانی استان لرستان مطابقت دارد (Mehrnia and Ramak, 2002; Asri and Mehrnia, 2002)

(Abasi et al., 2014)

همی‌کریپتووفیت‌ها و کریپتووفیت‌ها حدود نیمی از طیف زیستی عناصر گیاهی کوه خرگوشان را تشکیل می‌دهند. طبق نظر *Archibald* (۱۹۹۵) فراوانی گیاهان همی‌کریپتووفیت‌ها و کریپتووفیت‌ها در یک منطقه نشان‌دهنده اقلیم کوهستانی است. همی‌کریپتووفیت‌ها با سازوکارهایی (از قبیل ذخیره‌سازی آب، کاهش تبخیر آب توسط گُرک‌ها و کاهش فاز رویشی) قادرند شرایط سخت محیط مانند کمبود آب را تحمل نمایند (Mehrnia and Ramak, 2014). فراوانی کریپتووفیت‌ها (همانند *Liliaceae*) را می‌توان ناشی از سازگاری این گیاهان در برابر عدم چرای دام (به علت قرارگیری جوانه‌های انتهایی شان در زیر خاک) دانست (Roques et al., 2001). همچنین، بر اساس نظر *Sharifi* و *Hemkaran* (۲۰۱۲) حضور درصد نسبتاً زیاد همی‌کریپتووفیت‌ها و کریپتووفیت‌ها در کوه خرگوشان نشانگر حفظ رطوبت خاک ناشی از ذوب برف در مدت فصل رویش گیاهان است.

پژوهش جغرافیایی مجموعه گونه‌های گیاهی یک منطقه، بازتاب تأثیرپذیری از ناحیه یا نواحی رویشی مختلف است (Asri, 1998). کوه خرگوشان جزو پهنه رویشی هولارتیک است که بر اساس طبقه‌بندی Zohary (۱۹۷۳) جزو ناحیه رویشی ایرانی-تورانی است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین درصد عناصر شناسایی شده در کوه خرگوشان

اميده بازگشت و استقرار مجدد آنها افزایش می‌يابد. اما گياهاني که به ناحيه رويشي خاصی تعلق دارند در صورتی که اين گياهان با خطر انقراض روبه رو شوند، احتمال استقرار مجددشان کاهش خواهد یافت. از راهکارها، سازوکارها و ابزارهای اقتصادي و اجتماعي برای حفاظت از گونه‌های در حال انقرض می‌توان به تصویب حفاظت از گونه‌های در حال انقراض توسط مسئولان محیط زیست، فرهنگ‌سازی در میان مسئولان سایر سازمان‌ها و مردم، واگذاری بخشی از مسؤولیت‌ها و بودجه‌های حفاظتی به تشکل‌های مردمی کارдан به ویژه جوانان و کمک گرفتن از مشاوران امین و درستکار اشاره نمود.

سپاسگزاری

گزارش حاضر با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به انجام رسیده و کلیه حقوق آن مربوط به این دانشگاه است. از آقای دکتر ولی الله مظفریان به خاطر مساعدت در شناسايي تعدادي از نمونه‌های گياهي قدردانی می‌گردد.

اين تعداد، ۳۲ گونه (۱۵/۱۶ درصد) بوم زاد ايران است. بر اساس فهرست IUCN (۲۰۰۱) و مطالعه Jalili و Jamzad (۱۹۹۹)، به ترتيب ۶۲/۵ و ۹/۳۷ درصد اين گونه‌ها در طبقه‌بندی LR (بانگرانی کمتر) و VU (آسيب‌پذير) قرار می‌گيرند. از ميان گونه‌های بوم زاد، *Astragalus lurorum*، *Hedysarum gypsophilum*, *Dionysia gaubae* و *Phlomis lurestanica* به استان لرستان محدود می‌شود و گونه *H. gypsophilum* تا کنون فقط از کوه خرگوشان گزارش شده است (Dehshiri and Goodarzi, 2016). طبق تعریف، مناطقی از کره زمین که دارای گونه‌های بوم زاد فراوان باشد، نقاط داغ تنوع زیستی (biodiversity hotspots) نامیده می‌شود. با استناد به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که کوه خرگوشان یکی از نقاط داغ گونه‌زایی و پناهگاه گیاهان بوم زاد در کشور است. از طرفی، هرچه گیاهان یک منطقه نقاط اشتراك بيشتری با سایر نواحی عمدۀ رویشي جهان داشته باشند، نگرانی در خصوص انقراض گونه‌های گیاهی آن منطقه کاهش خواهد یافت، زира

منابع

- Abasi, S., Hosseini, S. M., Pilevar, B. and Zare, H. (2009) Effects of conservation on woody species diversity in Oshtorankooch region, Lorestan. Iranian Journal of Forest 1(1): 1-10 (in Persian).
- Abasi, S., Zare, H., Hosseini, S. M. and Pilehvar, B. (2015) Study on flora, vegetation structure and chorology of plants in some part of protected area of Oshtorankooch, Lorestan Province. Journal of Environmental Sciences and Technology 17(1): 125-135 (in Persian).
- Abrari Vajari, K. and Veiskarami, G. (2005) Floristic study of Hashtad-Pahlu region in Khorramabad (Lorestan). Pajouhesh va Sazandegi 18: 58-64 (in Persian).
- Abrari Vajari, K., Sepahvand, A. and Veiskarami, G. (2007) Floristic study of Oshtorankouh region (case study of Gahar lake). Forest and Rangeland 76, 77: 59-65 (in Persian).
- Akhani, H. (2005) The illustrated flora of Golestan National Park, Iran. vol. 1. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- Archibold, O. W. (1995) Ecology of word vegetation. Chapman and Hall Inc., London.

- Asri, Y. (1998) Vegetation of Orumieh lake salt marshes. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Asri, Y. and Mehrnia, M. (2002) Introducing the flora of central part of the Sefid-Kuh protected area. Iranian Journal of Natural Resources Research 55: 363-376 (in Persian).
- Assadi, M. (Ed.) (1988-2016) Flora of Iran. vols. 1-85. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Davis, P. H. (1965-1988) Flora of Turkey. vols. 1-10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Dehshiri, M. M. and Goudarzi, M. (2005) Floristic studies of Borujerd area. Journal of Sciences (Islamic Azad University) 15(58): 459-476 (in Persian).
- Dehshiri, M. M. and Goodarzi, M. (2016) Taxonomic notes on *Hedysarum* sect. *Crinifera* (Fabaceae) in Iran, with the description of a new species. Annales Botanici Fennici 53(1-2): 21-26.
- Ghahreman, A. (1975-2006) Flora of Iran. vols. 1-25. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Ghahreman, A. (1990-1994) Plant systematic: Cormophytes of Iran. vols. 1-4. Iran University Press, Tehran (in Persian).
- Ghahreman, A. (1994) Basic botany. vols. 1-2. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- Ghahreman, A. and Attar, F. (1998) Biodiversity of plant species in Iran. vol. 1. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- IUCN (2001) IUCN red list categories and criteria: version 3.1. IUCN species survival commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Jafari, A. (1989) Gita Shenasi-ye-Iran: mountains of Iran. vol. 1. Gita Shenasi, Tehran (in Persian).
- Jalili, A. and Jamzad, Z. (1999) Red data book of Iran, a preliminary survey of endemic, rare and endangered plant species in Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.
- Judaki, H., (2013) Khargushan Mountain, Lorestan. Kouh 18(71): 10-11.
- Léonard, J. (1991-1992) Contribution à l'étude de la flore et de la végétation des déserts d'Iran, Fascicule 10: Etude de la végétation, analyse phytosociologique et phytochorologique des groupements végétaux. vols. 1-2. Meise, Bulletin of the Jardin Botanique National de Belgique.
- Maassoumi, A. A. (1986-2011) The genus *Astragalus* in Iran. vols. 1-5. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Mehrnia, M. and Ramak, P. (2014) Floristic investigation of Noujian Watershed (Lorestan province). Iranian Journal of Plant Biology 6(20): 113-136 (in Persian).
- Mesdaghi, M. (2001) Vegetation description and analysis. Mashhad Jehad Daneshgahi Press, Mashhad (in Persian).
- Moghadam, M. (2001) Attributive and statistically ecology of plant vegetation. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- Mozaffarian, V. (2005) Plant classification. vols. 1-2. Amir Kabir, Tehran (in Persian).
- N.G.O. (2000) The Gazetteer of mountains in the I.R. of Iran. vol. 2. National Geographical Organization, Tehran (in Persian).
- Noroozi, J. Akhani, H. and Breckle, S. W. (2008) Biodiversity and phytogeography of the alpine flora of Iran. Biodiversity Conservation 17: 493-521.
- Parsa, A. (1978) Flora of Iran. vol. 1. Offset Press Inc., Tehran.

- Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Larendon, Oxford.
- Rechinger, K. H. (Ed.) (1963-2015) Flora Iranica. vols. 1-181. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz.
- Roques, K. G., O'Connor, T. G. and Watkinson, A. R. (2001) Dynamics of shrub encroachment in an African savannah: relative influences of fire, herbivory, rainfall and density dependence. *Journal of Applied Ecology* 38(2): 268-280.
- Sharifi, J., Jalili, A., Gasimov, S., Naqinezhad, A. and Azimi Motem, F. (2012) Study on floristic, life form and plant chorology of wetlands in northern and eastern slopes of Sabalan mountains. *Taxonomy and Biosystematics* 4(10): 41-52 (in Persian).
- Takhtajan, A. (1986) Floristic regions of the world. University of California Press, Berkley.
- Townsend, C. C. and Guest, E. (1960-1985) Flora of Iraq. vols. 1-9. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad.
- Yarahmadi, Z., Lari Yazdi, H. and Chehregani, A. (2009) Biodiversity plant study of the Zalian mountain ranges in east of Borujerd, Lorestan, Iran. *Biology Journal (Islamic Azad University, Garmsar Branch)* 4(2): 27-43 (in Persian).
- Zohary, M. (1973) Geobotanical Foundation of Middle-East. vols. 1-2. Department of Botany, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
- Zohary, M. and Feinbrun-Dothan, N. (1966-1986) Flora Palaestina. vols. 1-4. The Jerusalem Academic Press, Israel.

پیوست ۱- فهرست تیره‌ها و گونه‌های شناسایی شده در کوه خرگوشان و همچنین ناحیه رویشی، شکل زیستی، وضعیت حفاظتی و پراکنش آنها، $VU = 1$ (آسیب‌پذیر)، $LR = 2$ (گیاهان با تهدید کمتر)، $DD = 3$ (اطلاعات اندکی از آنها وجود دارد)، * و ** به ترتیب گونه‌های بومزاد و نادر موجود در منطقه مورد مطالعه. ES: اروپا-سیبری، IT: ایرانی-تورانی، M: مدیترانه‌ای، SS: صحراء-سندي، PL: چند ناحیه‌ای (بیش از سه ناحیه)، Cosm: جهان‌وطن، Th: تروفیت، Ch: کامفیت، He: همی کریپتوفت، Cr: کریپتوفت، Ph: فازوفیت.

	تаксون	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی
Pteridophyta			
Adiantaceae			
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Cr	Cosm	
<i>Cheilanthes fragrans</i> (L.f.) Sw.	Cr	IT-M-ES	
Woodsiaceae			
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cr	Cosm	
Pinophyta			
Ephedraceae			
<i>Ephedra ciliata</i> Fisch. & C.A.Mey.	Ph	IT-SS	
Magnoliophyta			
Magnoliopsida			
Anacardiaceae			
<i>Pistacia atlantica</i> Desf.	Ph	IT-M	
Apiaceae			
<i>Bunium luristanicum</i> Rech.f. ^{3,*}	Cr	IT	
<i>Bunium rectangulum</i> H.Wolff	Cr	IT	
<i>Bupleurum gerardii</i> All.	Th	IT	
<i>Chaerophyllum macropodum</i> Boiss.	He	IT	
<i>Ferula behboudiana</i> (Rech.f. & Esfand.) D.F.Chamb. ^{3,*}	He	IT	
<i>Haussknechtia elymaitica</i> Boiss. ^{3**}	He	IT	
<i>Korshinskia assyriaca</i> (Freyen & Bornm.) Pimenov & Kluykov	Cr	IT	
<i>Malabaila porphyrodiscus</i> Stapf & Wettst. ex Stapf. ^{2,*}	He	IT	
<i>Physocaulis nodosus</i> W.D.J.Koch	Th	IT-M-ES	
<i>Pimpinella barbata</i> Boiss.	Th	IT-SS	
<i>Pimpinella eriocarpa</i> Banks & Sol.	Th	IT	
<i>Prangos acaulis</i> (DC.) Bornm.	He	IT	
<i>Prangos uloptera</i> DC.	He	IT	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Th	IT-ES	
<i>Smyrniopsis aucheri</i> Boiss.	He	IT	
<i>Torilis leptophylla</i> Rchb.f.	Th	IT-ES	
<i>Zosima absinthifolia</i> Link	He	IT	
Apocynaceae			
<i>Nerium oleander</i> L.	Ph	IT	
Asteraceae			
<i>Aegopordon berardoioides</i> Boiss.	He	IT	
<i>Cephalorrhynchus microcephalus</i> (DC.) Schchian	Cr	IT	
<i>Cnicus benedictus</i> L.	Th	IT-M	
<i>Crupina crupinastrum</i> Vis.	Th	IT-M	
<i>Echinops ritrodes</i> Bunge	He	IT	
<i>Garhadiolus angulosus</i> Jaub. & Spach	Th	IT	
<i>Garhadiolus papposus</i> Boiss. & Buhse	Th	IT	
<i>Gundelia tournefortii</i> L.	He	IT	
<i>Lactuca glaucifolia</i> Boiss.	Th	IT	
<i>Lasiopogon muscoides</i> DC.	Th	IT	
<i>Pulicaria arabica</i> Cass.	Ch	IT	
<i>Psychrogeton persicus</i> (Boiss.) Grierson	He	IT	
<i>Rhagadiolus stellatus</i> Gaertn.	Th	IT-M	
<i>Scorzonera flaccida</i> Rech.f.	Cr	IT	
<i>Scorzonera luristanica</i> Rech.f. ^{3,*}	Cr	IT	

پراکنش جغرافيايي	شكل زيشي	تاكسون
IT	He	<i>Scorzonera radicosa</i> Boiss.
IT-M-SS	Th	<i>Senecio glaucus</i> L.
IT	He	<i>Serratula cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.
IT-M	Cr	<i>Steptorhamphus tuberosus</i> (L.) Grossh.
IT	He	<i>Taraxacum montanum</i> DC.
IT	He	<i>Tragopogon caricifolius</i> Boiss. ^{2,*}
IT	He	<i>Tragopogon montanus</i> S.A.Nikitin
		Berberidaceae
IT	Cr	<i>Bongardia chrysogonum</i> Boiss.
		Boraginaceae
IT	He	<i>Mattiastrum luristanicum</i> (Nábělek) Riedl ^{3,*}
IT	Th	<i>Myosotis refracta</i> Boiss.
IT	He	<i>Onosma asperima</i> Bornm. ^{2,*}
IT	He	<i>Onosma elwendicum</i> Wetst.
IT	He	<i>Solenanthus circinatus</i> Ledeb.
		Brassicaceae
IT	Th	<i>Alyssum szovitsianum</i> Fisch. & C.A.Mey.
IT-M-ES	Th	<i>Biscutella didyma</i> L.
IT-ES	Th	<i>Erophila verna</i> (L.) DC.
IT-ES	Th	<i>Erysimum repandum</i> L.
IT-ES	He	<i>Fibigia macrocarpa</i> Boiss.
IT	Th	<i>Isatis raphanifolia</i> Boiss. ^{2,*}
IT	He	<i>Lepidium persicum</i> Boiss.
IT-M-SS	Th	<i>Malcolmia africana</i> (L.) W.T.Aiton
IT	Th	<i>Malcolmia behboudiana</i> Rech.f. & Esfand.
IT-M-SS	Th	<i>Matthiola longipetala</i> (Vent.) DC.
IT-M-ES	Th	<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.
IT	Th	<i>Sameraria stylophora</i> Boiss.
IT-ES	Th	<i>Sisymbrium irio</i> L.
IT	Th	<i>Sisymbrium septulatum</i> DC.
IT-M	Th	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.
		Campanulaceae
IT	Th	<i>Campanula ceciliae</i> Rech.f. & Schiman-Czeika
IT	Th	<i>Campanula erinus</i> L.
IT-M-ES	Th	<i>Legousia falcata</i> Fritsch
		Clusiaceae
IT	He	<i>Hypericum hirtellum</i> Boiss.
IT	He	<i>Hypericum scabrum</i> L.
		Capparaceae
IT-M-SS	Ch	<i>Capparis spinosa</i> L.
IT-M	Th	<i>Cleome iberica</i> DC.
		Caryophyllaceae
IT	Ch	<i>Acanthophyllum microcephalum</i> Boiss.
IT-M	Th	<i>Cerastium dichotomum</i> L.
IT	He	<i>Dianthus crossopetalus</i> Fenzl ex Boiss.
IT	He	<i>Gypsophila polyclada</i> Fenzl ex Boiss.
IT	Th	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.
IT	Th	<i>Minuartia meyeri</i> Bornm.
IT-M-SS	Th	<i>Minuartia picta</i> Bornm.
IT	Th	<i>Silene austroiranica</i> Rech.f., Aellen & Esfand.
IT	He	<i>Silene chlorifolia</i> Sm.
PL	Th	<i>Silene conoidea</i> L.
IT-ES-SS	Th	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.
IT	He	<i>Silene farsistanica</i> Melzh. ^{3,*}
IT	He	<i>Silene propinqua</i> Schischk.

پراکنش جغرافیایی	شكل زیستی	تаксون
PL	Th	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
IT	Th	Chenopodiaceae
		<i>Atriplex aucheri</i> Moq.
IT	He	Crassulaceae
	Cr	<i>Rosularia elymaitica</i> A.Berger ^{2,*}
		<i>Umbilicus tropaeolifolius</i> Boiss.
IT	Th	Dipsacaceae
		<i>Scabiosa palaestina</i> L.
IT	He	Euphorbiaceae
	He	<i>Euphorbia condylocarpa</i> M.Bieb.
	He	<i>Euphorbia denticulata</i> Lam.
IT-M-ES	Th	<i>Euphorbia peplus</i> L.
IT	Ch	Fabaceae
	Th	<i>Astragalus campylanthus</i> Boiss. ^{2,*}
	Th	<i>Astragalus campylorhynchus</i> Fisch. & C.A.Mey.
	Th	<i>Astragalus crispocarpus</i> Nábělek
	He	<i>Astragalus curvirostris</i> Boiss.
	Ch	<i>Astragalus dactylocarpus</i> Boiss.
	Ph	<i>Astragalus fasciculifolius</i> Boiss. subsp. <i>fasciculifolius</i> ^{2,*}
	Ch	<i>Astragalus gossypinus</i> Fisch.
	He	<i>Astragalus ibicinus</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss. ^{2,*}
	Ch	<i>Astragalus lurorum</i> Bornm. ^{1,*;**}
	He	<i>Astragalus ovinus</i> Boiss.
	Ch	<i>Astragalus rhodosemius</i> Boiss. & Hausskn. ^{2,*}
	He	<i>Astragalus siliquosus</i> Boiss.
	He	<i>Astragalus vanillae</i> Boiss. ^{2,*}
IT-M	Th	<i>Coronilla scorpioides</i> W.D.J.Koch
IT-M-ES	Cr	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
IT	He	<i>Hedysarum gypsophilum</i> Dehshiri ^{3,*}
IT-M-SS	Th	<i>Hymenocarpus circinnatus</i> (L.) Savi
PL	Th	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.
IT-M	Th	<i>Onobrychis crista-galli</i> Lam.
IT-SS	He	<i>Onobrychis lunata</i> Boiss. ^{2,*}
IT	He	<i>Onobrychis melanotricha</i> Boiss. ^{2,*}
IT-ES-SS	Th	<i>Pisum sativum</i> L.
IT-ES	He	<i>Trifolium repens</i> L.
IT	Th	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
IT	Th	<i>Trigonella filipes</i> Boiss.
IT-M-ES	Th	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>
IT-ES	Th	<i>Vicia variabilis</i> Freyn & Sint. ex Freyn
IT	Ph	Fagaceae
IT	He	<i>Quercus brantii</i> Lindl.
IT	He	Gentianaceae
		<i>Gentiana olivieri</i> Griseb.
IT	Cr	Geraniaceae
		<i>Biebersteinia multifida</i> DC.
IT-SS	Th	Illecebraceae
		<i>Pteranthus dichotomus</i> Forssk.
IT	Ch	Lamiaceae
IT	Th	<i>Ajuga chamaecistus</i> Ging. ex Benth. subsp. <i>chamaecistus</i> ^{2,*}
IT	Th	<i>Lamium persepolitanum</i> (Boiss.) Jamzad ^{2,*}
IT	Ch	<i>Micromeria persica</i> Boiss.
IT-M	He	<i>Nepeta kotschy</i> Boiss. ^{2,*}
IT	Th	<i>Nepeta petraea</i> Benth.
IT	He	<i>Phlomis caucasica</i> Rech. f.

پراکنش جغرافيايي	شكل زيشتي	تاكسون
IT	He	<i>Phlomis lurestanica</i> Jamzad ^{3,*}
IT	He	<i>Phlomis olivieri</i> Benth.
IT	He	<i>Salvia bracteata</i> Banks & Sol.
IT	He	<i>Salvia limbata</i> C.A.Mey.
IT	He	<i>Salvia multicaulis</i> Vahl
IT	He	<i>Salvia persepolitana</i> Boiss. ^{2,*}
IT	He	<i>Salvia reuteriana</i> Boiss.
IT	He	<i>Salvia spinosa</i> L.
IT	He	<i>Stachys inflata</i> Benth.
IT-M	He	<i>Teucrium polium</i> L.
		Lythraceae
PL	Ph	<i>Punica granatum</i> L.
		Malvaceae
IT	He	<i>Alcea koelzii</i> I.Riedl ^{3,*}
		Moraceae
IT	Ph	<i>Ficus rupestris</i> (Hausskn. ex Boiss.) Azizian
IT	Ph	<i>Morus nigra</i> L.
		Oleaceae
IT	Ph	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>persica</i> (Boiss.) Azadi var. <i>persica</i> ^{2,*}
IT	Ph	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>syriaca</i> (Boiss.) Yalt. var. <i>pilosa</i> Azadi ^{2,*}
		Papaveraceae
IT	Cr	<i>Corydalis verticillaris</i> DC.
IT	Th	<i>Papaver dubium</i> L.
		Plantaginaceae
PL	Th	<i>Plantago psyllium</i> L.
		Plumbaginaceae
IT	Ch	<i>Acantholimon blakelockii</i> Mobayen
		Polygalaceae
IT-M	Th	<i>Polygala monspeliaca</i> L.
		Polygonaceae
IT	Cr	<i>Rheum ribes</i> L.
		Primulaceae
IT	He	<i>Dionysia gaubae</i> Bornm. ^{1,*,**}
		Ranunculaceae
IT	Ph	<i>Clematis orientalis</i> L.
IT-M-ES	Th	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
IT-M	Cr	<i>Thalictrum isopyroides</i> C. A.Mey.
		Resedaceae
IT-M-ES	He	<i>Reseda lutea</i> L.
		Rosaceae
IT	Ph	<i>Amygdalus arabica</i> Olivier
IT	Ph	<i>Amygdalus haussknechtii</i> C.K.Schneid. ex Bornm. ^{2,*}
IT	Ph	<i>Cerasus mahaleb</i> Mill.
IT	Ph	<i>Cerasus microcarpa</i> Boiss.
IT-M	Ph	<i>Crataegus azarolus</i> L.
IT	Ph	<i>Rubus anatolicus</i> Focke
PL	He	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
		Rubiaceae
IT-M	Th	<i>Callipeltis cucularia</i> (L.) DC.
IT	He	<i>Gallonia bruguieri</i> A.Rich. ex DC.
IT-M-ES	Th	<i>Galium aparine</i> L.
IT-M	Th	<i>Galium nigricans</i> Boiss.
IT-M	Th	<i>Galium setaceum</i> Lam.
IT-ES	Th	<i>Galium tricornutum</i> Dandy
		Scrophulariaceae

پراکنش جغرافیایی	شكل زیستی	تаксون
IT	He	<i>Bungea trifida</i> C.A.Mey.
IT-M	Th	<i>Linaria chalepensis</i> (L.) Mill.
IT	He	<i>Linaria fastigiata</i> Chav.
IT-M	Th	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel
IT	He	<i>Scrophularia nervosa</i> Benth.
IT	He	<i>Veronica fragilis</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss. ^{2,*}
IT-M-ES	Cr	Urticaceae <i>Parietaria judaica</i> L.
IT	Th	Valerianaceae <i>Valerianella lasiocarpa</i> Steven ex Betcke
IT	Th	Violaceae <i>Viola occulta</i> Lehm.
IT-M-ES	Cr	Liliopsida
IT	Cr	Alliaceae <i>Allium affine</i> Ledeb.
IT	Cr	<i>Allium eriophyllum</i> Boiss.
IT	Cr	<i>Allium stamineum</i> Boiss.
IT	Cr	Araceae <i>Eminium intortum</i> Kuntze subsp. <i>heterophyllum</i> (Blume) Riedl
PL	Cr	Cyperaceae <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla
IT	Cr	Hyacinthaceae <i>Bellevalia glauca</i> Kunth
IT	Cr	<i>Dipeadi unicolor</i> Baker
IT-M-ES	Cr	<i>Muscaria comosum</i> (L.) Mill.
IT-ES	Cr	<i>Muscaria neglectum</i> Guss. ex Ten.
IT	Cr	<i>Ornithogalum persicum</i> Hausskn. ex Bornm.
IT	Cr	Iridaceae <i>Gladiolus atroviolaceus</i> Boiss.
IT	Cr	<i>Gladiolus kotschyanus</i> Boiss.
IT	Cr	Liliaceae <i>Fritillaria assyriaca</i> Baker
IT-ES	Cr	<i>Gagea dubia</i> Terracc.
IT	Cr	<i>Gagea gageoides</i> (Zucc.) Vved.
IT	Cr	<i>Gagea stipitata</i> Merckl. ex Bunge
IT	Cr	<i>Tulipa humilis</i> Herb.
IT	Cr	<i>Tulipa montana</i> Lindl. var. <i>montana</i> ^{3,*}
IT	Cr	<i>Tulipa stylosa</i> Fisch. ex Fisch. & C.A.Mey.
IT	Cr	Orchidaceae <i>Epipactis veratrifolia</i> Boiss. & Hohen.
IT	Cr	<i>Orchis anatolica</i> Boiss.
IT-M	Th	Poaceae <i>Aegilops triuncialis</i> L.
IT	He	<i>Agropyron tauri</i> Boiss. & Balansa
IT-ES	Th	<i>Avena clauda</i> Durieu
IT	Th	<i>Bromus danthoniae</i> Trin. ex C.A.Mey.
IT-M-ES	Th	<i>Bromus sterilis</i> L.
IT-M	Th	<i>Hordeum spontaneum</i> K.Koch
IT-M-ES	Th	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin
IT-M	Cr	<i>Melica persica</i> Kunth
IT-M-ES	He	<i>Stipa lagascae</i> Roem. & Schult.
IT	Th	<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski

Archive of SID

Floristic study of Khargushan Mountain, Lorestan province

Mohammad Mehdi Dehshiri *

Department of Biology, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran

Abstract

The aim of this research was plant identification, introduction to the flora, determination of life forms and geographical distribution in Khargushan Mountain. This Mountain, with 6000 hectares, situated on the east of Poldokhtar and south-west of Khorramabad. The maximum altitude of this mountain is thought 2329 m. Plant specimens were collected from different parts of the area during two growing seasons 2013-2014. The plant biological spectrum of the area was plotted by means of life forms results. The position of the area within Iran's phytogeography classification was studied based on geographical distribution data and references. From 211 identified species in the studied area, 3 Pteridophytes, 1 Gymnosperm, 176 dicotyledons and 31 monocotyledons were presented. These species belong to 50 families and 150 genera. The important families are Fabaceae, Asteraceae, Apiaceae and Lamiaceae with 12.79%, 10.42%, 8.05% and 7.58%, respectively. Life forms of the plant species include Therophytes 36.49%, Hemicryptophytes 31.28%, Cryptophytes 18.96%, Phanerophytes 8.06%, and Chamaephytes 5.21%. 138 species (65.4%) were endemics of Irano-Turanian region; 32 species of them were endemics of Iran which among them, distribution of 4 species (*Astragalus lurorum*, *Dionysia gaubae*, *Hedysarum gypsophilum* and *Phlomis lorestanica*) limited to Lorestan province.

Key words: Flora, Plant geography, Life form, Chorotype, Khargushan Mountain

* dehshiri2005@yahoo.com

Copyright©2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0>), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.