

Study of flora, life form and chorology of plant Species in Zarivar Region of Marivan, Kurdistan

Mohammad Aref Tabad¹, Nastaran Jalilian^{2*} and Hosein Maroofi³

¹Department of Medicinal Plants ACECR, Kermanshah, Iran

²Forests and Rangelands Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran

³Forests and Rangelands Research Department, Kordestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Kordestan, Iran
n.jalilian@areeo.ac.ir

Abstract

Zarivar region, with about 12,000 km² area, is located in the west of Iran, neighbouring the Marivan city. This region has a rich floral diversity due to some ecological factors such as: the average annual precipitation (about 997 mm/year), influence of the mediterranean water masses and situation within Zagros mountain. The purpose of this study was to introduce floristic list, life forms and chorology of species of Zarivar region. Plant specimens were collected during years 2014-2016. Totally, 590 plant species belonging to 355 genera and 81 families were determined. Among the studied plants, 472 dicots and 116 monocots and two pteridophytes were recognized. The largest family was Compositae with 46 genera and 72 species, and the largest genus was Trifolium (Papilionaceae) with 10 species. Hemicryptophytes were the dominant life form and comprised 40% of the flora. From chorological point of view, the largest proportion of the flora belonged to the Iran-Turanian elements (38%). Among the 590 species of flora this region 160 species are medicinal plants, 43 species endangered plants and 50 species endemic in Iran.

Key words: vegetation, Zagros, Zarivar, Chorotype, Endangered plants

بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه زریوار، مریوان، کردستان

محمدعارف تبد^۱، نسترن جلیلیان^{۲*}، حسین معروفی^۳

^۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه گیاهان دارویی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

^۲ بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

^۳ بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کردستان، ایران

چکیده

منطقه زریوار با مساحت ۱۲۰۰۰ کیلومترمربع در ۳ کیلومتری شمال غربی شهرستان مریوان در استان کردستان واقع شده است. این منطقه با متوسط بارش سالانه ۹۸۰ میلی‌متر، بهره‌مندی از جریان‌های مرطوب مدیترانه‌ای و استقرار در دامنه رشته‌کوه‌های زاگرس پوشش گیاهی متنوعی دارد. در پژوهش حاضر، نمونه‌های گیاهی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ جمع‌آوری و شناسایی شدند و فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه بررسی شد. در مجموع ۵۹۰ گونه متعلق به ۳۵۵ جنس و ۸۱ تیره گیاهی شناسایی شدند که از این تعداد، ۴۷۲ گونه دولپه، ۱۱۶ گونه تک‌لپه و ۲ گونه نهانزاد آوندی هستند. تیره کاسنی (Asteraceae) با ۴۶ جنس و ۷۲ گونه بزرگ‌ترین تیره و جنس شبدر (Trifolium) با ۱۰ گونه بزرگ‌ترین جنس گیاهی منطقه مطالعه شده هستند. در بین گیاهان منطقه، همی‌کریپتوفت‌ها با ۴۲ درصد فراوان‌ترین شکل زیستی منطقه را تشکیل می‌دهند. از لحاظ پراکنش جغرافیایی، بیشترین گونه‌ها (۳۸) درصد) به عناصر ایرانی - تورانی تعلق دارند. از ۵۹۰ گونه گیاهی فلور منطقه ۱۶۰ گونه دارویی، ۵۰ گونه انحصاری ایران و ۴۳ گونه در معرض خطر هستند.

واژه‌های کلیدی: پوشش گیاهی، زاگرس، زریوار، پراکنش جغرافیایی، گیاهان در حال انقراض

مقدمه

تعیین قابلیت‌های رویشی منطقه، امکان افزایش تراکم گونه‌های منطقه، شناسایی گونه‌های مقاوم، مهاجم و در حال انقراض، کمک به تعیین پوشش گیاهی کشور، امکان دست‌یابی به گونه‌یا گونه‌های جدید گیاهی و شناسایی عوامل مخرب رستنی‌های منطقه را نام برد (Ejtehadi et al., 2009).

مطالعات فلوریستیک پایه مطالعات مختلفی نظری بوم‌شناسی، جنگل‌داری، کشاورزی، گیاهان دارویی و ... هستند. شناسایی و معرفی رستنی‌های هر منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد که از جمله می‌توان امکان دسترسی به گونه گیاهی خاص در مکان و زمان معین،

* n.jalilian@arereo.ac.ir

Copyright©2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/>), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

اتنوبوتاني اين منطقه، ۵۶ گونه دارويي را شناسايي و معرفى کردنده که تيره Lamiaceae با ۱۲ گونه و تيره Asteraceae با ۱۱ گونه بيشترین غنای گونه‌های را داشتند. با وجود ويژگی‌های ارزشمند و منحصر به فرد اين منطقه، پيشينه پژوهش‌های علمی درباره آن چنان زیاد نیست و تاکنون تحقيق علمی جامعی در اين اکوسیستم انجام نشده است و شناسنامه یا لیست پذیرفتی از گونه‌های گیاهی آن موجود نیست. انزواي جغرافيايی و بکربودن موضوعي اين پدیده طبیعی، مشکلات دسترسي، نبود امکانات، قراردادشتن آن در منطقه مرزی حساس که در دهه‌های گذشته همواره تنش داشته است از جمله عواملی هستند که دامنه تحقیقات علمی درباره منطقه زريوار را محدود کرده‌اند. از اين رو در اين تحقيق برای تعیین ارزش اکولوژيکی و حفاظتی اين ذخیره گاه غنی ژنتيکي تا حد امکان مجموعه گونه‌های گیاهی متعلق به اين منطقه شناسايي و كورولوژي، ريخت‌شناسي و ... اين گونه‌های ارزشمند برای توصيف و معرفی بيشتر بررسی شدند.


منطقه مطالعه شده

حوضه آبخيز زريوار با مساحت حدود ۱۲۰۰۰ کيلومتر مربع در ۳ کيلومetri شمال‌غربی شهرستان مریوان واقع شده است (شکل ۱). حداقل ارتفاع اين حوضه ۱۲۶۱ متر و حداکثر ۲۲۴۷ متر از سطح دریا است و در بین طول جغرافيايی ۴۶ درجه و ۶ دقيقه تا ۴۶ درجه و ۱۰ دقيقه شرقی و عرض جغرافيايی ۳۵ درجه و ۳۱ دقيقه تا ۳۵ درجه و ۳۵ دقيقه شمالی قرار دارد. اين منطقه از دو اکوسیستم آبی شامل درياچه زريوار و خشکی شامل دامنه‌های جنگلی و ارتفاعات اطراف درياچه تشکيل شده است.

کوه‌های زاگرس از شمال‌غرب تا جنوب‌غرب ايران گسترش دارند و با جذب کردن رطوبت ابرهای باران‌زا از نواحی غربی با مبدأ دریاچه مدیترانه شرایط لازم را برای استقرار و گسترش بسياری از گونه‌های گیاهی فراهم کرده‌اند. جنگل‌های زاگرس به لحاظ وسعت، مسایل زیست‌محیطی، توسعه منابع آبی و حفاظت خاک اهمیت ویژه‌ای دارند (Pourbabaei *et al.*, 2012). گیاه‌شناسان بسياری فلور غنی و متنوع زاگرس را مطالعه کرده‌اند؛ اما هنوز پوشش گیاهی بسياری از مناطق آن کمتر بررسی شده که يكی از اين مناطق، زريوار است.

منطقه زريوار به علت وجود منابع رطوبتی همچون درياچه زريوار، بارش سالانه زياد، بهره‌مندی از جريان‌های مرطوب مدیترانه‌ای و استقرار در دامنه رشته کوه‌های زاگرس پوشش گیاهی غنی و متنوعی دارد. درياچه زريوار، يكی از منحصر به فردترین درياچه‌های آب شرين جهان، در مرکز منطقه زريوار واقع شده است. اين درياچه کوهستانی که پناهگاه حيات وحش شناخته شده است تنوع زیستی زيادي دارد و زیستگاه ویژه‌ای برای بسياری از گونه‌های گیاهی و جانوری محسوب می‌شود. تنوع گونه‌های گیاهی در حاشیه درياچه به سبب تنوع اکوسیستمی آن زياد است و فرم‌های رویشي مختلفی را می‌توان در آن مشاهده کرد (Tabad and Jalilian., 2015).


در پژوهشی که درباره تنوع زیستی حاشیه درياچه انجام شده است، ۲۵۷ گونه گیاهی متعلق به ۵۳ تيره و ۲۵ جنس معرفی شده‌اند و تيره‌های Asteraceae با ۱۸۳ گونه و Poaceae با ۲۹ گونه بيشترین تعداد گونه را به خود اختصاص داده‌اند (Khorasani *et al.*, 2014). همچنین Jalilian و Tabad (2015) در بررسی



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی منطقه زریوار در ایران و استان کردستان

ارتفاعات یادشده به صورت تپه‌های نیمه‌مرتفع با پوشش مرتعی در نزدیک‌ترین فاصله به دریاچه هستند و در پشت آن‌ها، ارتفاعات با پوشش جنگلی قرار گرفته‌اند. ارتفاعات شرقی و غربی دریاچه، حوضه آبریز دریاچه را تشکیل می‌دهند. ارتفاعات شمالی دریاچه کوه «بوده یاس» است و دریاچه از شرق و غرب به ارتفاعات «بی‌شوان»، «گزسانی» و «میراجی» محدود می‌شود (شکل ۲).


منطقه مطالعه شده دشتی است در راستای شمال‌غربی - جنوب‌شرقی که ارتفاعات (کوه‌ها) سه طرف آن را محصور کرده‌اند و در میان آن دریاچه آب شیرین زریوار قرار دارد. ضلع جنوبی دریاچه پست بوده و به اراضی دشت مریوان می‌رسد. عمدۀ مطالعات درباره حوضه آبریز دریاچه زریوار است که به‌دلیل ویژگی ساختگاهی، کوهستان‌ها و دره‌های زیبایی در شرق و غرب دارد.



شکل ۲- A. نمایی از کوه‌های مشرف به دریاچه زریوار، B. نمایی از پوشش گیاهی نواحی شمالی دریاچه زریوار

جولای (۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد) با متوسط دمای ۲۵ درجه سانتيگراد است. اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه، نيمه مرتبط و براساس روش دومارتن، بسيار مرتبط است. باد چيره اين منطقه جنوب، جنوب غرب و شمال غرب است. عمق خاک منطقه زياد، بدون شوري و (Tabad and Jalilian, 2015) اغلب از نوع خاک هاي هيドرومورف است (آبروترميك) منطقه را نشان مي دهد.

با توجه به منحنى رسم شده از اطلاعات دوره ۱۵ ساله (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶) ايستگاه هواشناسي سينوپتيك مريوان، متوسط سالانه نزولات حوضه آبريز درياچه زريوار حدود ۹۹۷ ميلي متر و ييشتر از نوع باران است. متوسط دمای سالانه اين منطقه ۱۳ درجه، متوسط كمينه دما ۵/۸ درجه و متوسط بيشينه آن ۲۰/۶ درجه سانتيگراد است. سردترین ماه سال ژانويه (۱۰ دی تا ۱۱ بهمن ماه) با متوسط دمای ۰/۳ درجه سانتيگراد و گرمترین ماه سال



شکل ۳- منحنی آبروترميك منطقه زريوار (Tabad and Jalilian., 2015)

اردیبهشت تا تیر انجام شدند.

نمونه ها براساس روش های رايچ و کليدهای شناسايي از جمله فلورا ايرانيكا (Rechinger, 1965-1965)، فلور تركيه (Davis, 1965-1985)، فلور عراق (Townsend and Guest, 1966-1985)، فلور ايران (Assadi *et al.*, 1988-2013)، رستني هاي ايران (Mobayen, 1975-1996)، رده بندی گياهی (Mozaffarian, 2005)، گونهای ايران (Maassoumi, 1986-2005) شناسايي و اسماني مؤلفان تاكسونها با نمایه بين المللی نامهای گياهی (IPNI)، يکسان سازی شد. نامگذاري فارسي گياهان نيز (2016) براساس فرهنگ نامهای گياهان ايران (Mozaffarian,

مواد و روش ها

ابتدا برای تعیین حوضه مطالعه از نقشه های توپوگرافی ۱:۶۵۰۰۰ سازمان جغرافيايي نiroهاي مسلح و تصاویر سه بعدی نرم افزار Google Earth استفاده شد و با اطلاعات افراد بومي، مسیرهاي عبور و مرور منطقه شناسايي شدند. پس از تعیین حوضه مطالعه و بررسی های اولیه، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به منطقه مراجعه و کل عرصه در فواصل زمانی مشخص (ميانگين ۱۵ روز) به روش پيمایش زمیني، يكى از روش های مرسوم مطالعات تاكسونوميک، بررسی شد. با توجه به وضعیت آب و هوایي منطقه و پوشش گياهی درختی و درختچه ای آن، ييشتر عملیات صحرایي در ماه های

۲۵ جنس و ۳۳ گونه؛ Rosaceae با ۱۳ جنس و ۲۳ گونه؛ Boraginaceae با ۱۵ جنس و ۲۱ گونه؛ Caryophyllaceae با ۹ جنس و ۲۰ گونه؛ Ranunculaceae با ۹ جنس و ۱۸ گونه؛ Cyperaceae با ۷ جنس و ۱۸ گونه و Orchidaceae با ۷ جنس و ۹ گونه (شکل ۴).

جنس‌های *Ranunculus* با ۱۰ گونه؛ *Trifolium* با ۱۰ گونه؛ *Veronica*, *Silene*, *Carex*, *Salvia*، ۸ گونه؛ *Lathyrus* و *Vicia*, *Astragalus* هر کدام با ۷ گونه؛ *Scrophularia* و *Centaurea* هر کدام با ۶ گونه؛ *Campanula*, *Bromus*, *Allium*, *Achillea*, *Polygonum*, *Papaver*, *Onosma*, *Euphorbia*, *Galium*, *Cerastium*, *Anthemis* هر کدام با ۵ گونه و *Phlomis*, *Medicago*, *Hordeum*, *Geranium*, *Verbascum* و *Tragopogon* هر کدام با ۴ گونه به ترتیب مهم‌ترین جنس‌های گیاهی منطقه از نظر غنای گونه‌ای هستند (شکل ۵).

طبقه‌بندی گیاهان براساس شکل زیستی نشان داد که همی‌کرپتوفیت‌ها با ۲۵۳ گونه (۴۲ درصد) بزرگ‌ترین گروه گیاهان را تشکیل می‌دهند و پس از آنها، به ترتیب تروفیت‌ها با ۲۰۰ گونه (۳۴ درصد)، کرپتوفیت‌ها با ۹۴ گونه (۱۶ درصد)، فانروفیت‌ها با ۳۳ گونه (۶ درصد) و کامفیت‌ها با ۱۰ گونه (۲ درصد) قرار دارند (شکل ۶).

بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه، تسلط چشمگیر عناصر ایرانی - تورانی با ۲۲۶ گونه (۳۸٪ درصد) را نشان می‌دهد و پس از آن، عناصر ایرانی - تورانی / اروپا - سیبری با ۹۲ گونه (۱۵ درصد)، چندناحیه‌ای با ۶۶ گونه (۱۱ درصد)، ایرانی - تورانی / اروپا - سیبری / مدیترانه‌ای با ۶۰ گونه (۱۰ درصد)، ایرانی - تورانی / مدیترانه‌ای با ۵۳ گونه (۸ درصد)،

(Red 1998) به دقت انجام شد. همچنین براساس کتاب (date book of Iran Jalili and Jamzad., 1999) گونه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر تعیین شدند. نمونه‌ها در هریاریوم مرکز تحقیقات و آموزش (RANK) کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه زریوار می‌شوند. تیره‌ها و جنس‌های فلور منطقه Zohary (APG IV (APG, 2016) رده‌بندی (تطیق داده شدند.

شکل زیستی گیاهان براساس سیستم Raunkiaer (۱۹۳۴) تعیین و سپس طیف زیستی ترسیم شد. پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی شناسایی شده منطقه با توجه به اطلاعات فلورهای یادشده استخراج شد. مناطق جغرافیای گیاهی هر گونه براساس دیدگاه‌های Takhtajan (۱۹۷۳) و Zohary (۱۹۸۶) تعیین و با استفاده از منابع معتبر، گیاهان دارویی نیز مشخص شدند (Mir-Heidar, 2002؛ Zargari, 1997).


نتایج

با بررسی حدود ۱۶۰۰ نمونه جمع آوری شده، ۵۹۰ گونه گیاهی متعلق به ۳۵۵ جنس و ۸۱ تیره شناسایی شدند که از این تعداد، ۲ گونه به ۲ جنس و ۲ تیره از پتربیوفیت‌ها و ۵۸۸ گونه به اسپرماتوفیت‌ها (گیاهان دانه‌دار) تعلق دارند. از تعداد کل گیاهان دانه‌دار منطقه، ۱۱۶ گونه به ۶۹ جنس و ۱۲ تیره نهاندانه تکلپه‌ای و ۴۷۲ گونه به ۲۸۴ جنس و ۷۱ تیره نهاندانه دولپه‌ای متعلق هستند (پیوست ۱). بزرگ‌ترین تیره‌های گیاهی به ترتیب عبارتند از: Asteraceae با ۴۶ جنس و ۷۲ گونه؛ Fabaceae با ۳۲ جنس و ۴۷ گونه؛ Poaceae با ۱۳ جنس و ۴۶ گونه؛ Brassicaceae با ۳۱ جنس و ۴۴ گونه؛ Apiaceae با ۲۳ جنس و ۴۲ گونه؛ Lamiaceae با


مشاهده شد که قبلاً Dinarvand (۲۰۱۲) آن را فقط از شمال ایران گزارش کرده بود (شکل ۸). از حدود ۱۸۰۰ گونه گیاهی بومزاد ایران ۲/۳ (Ghahreman and Attar, 1998)، ۴۳ گونه درصد (درصد) در منطقه زریوار یافت می‌شوند که ۷/۲ گونه گیاهی منطقه را تشکیل می‌دهند. از ۱۴۰۵ گونه‌های جاده‌ای گیاهی در این منطقه مشاهده می‌شوند و از این رو ۸/۳ درصد گونه‌های گیاهی منطقه نادر و در معرض خطر نابودی هستند. تصاویر برخی از این گونه‌ها در شکل ۸ دیده می‌شود. همچنین از مجموع ۵۹۰ گونه فلور منطقه زریوار، ۱۶۰ گونه دارویی هستند که این تعداد حدود ۲۸ درصد گیاهان منطقه را شامل می‌شود. از گونه‌های دارویی منطقه، ۵۶ گونه کاربرد محلی دارند (Tabad and Jalilian, 2015).

عناصر جهان‌وطن با ۳۸ گونه و اروپا - سیبری با ۲۸ گونه بیشترین تعداد گونه را دارند. سایر عناصر فیتوجغرافیایی با درصد اندکی در منطقه زریوار حضور دارند که به ترتیب عبارتند از: عناصر ایرانی - تورانی / اروپا - سیبری / صحراء - سندی با ۱۲ گونه؛ اروپا - سیبری / مدیترانه‌ای با ۶ گونه؛ ایرانی - تورانی / مدیترانه‌ای / صحراء - سندی با ۵ گونه و عناصر مدیترانه‌ای با ۴ گونه (شکل ۷).


در این پژوهش، گزارش و معرفی گونه جدید *Trifolium incarnatum* L. Coronopus (Tabad et al., 2015) squamatus Asch. برای نخستین بار در غرب کشور مشاهده شد که قبلاً Akhani و Joharchi (۱۹۹۵) آن را فقط از شمال و شمال‌غرب ایران گزارش کرده بودند. گونه *Utricularia australis* R. Br. (تنها جنس گوشت‌خوار ایران) نیز برای نخستین بار در غرب کشور



شکل ۴- تعداد گونه‌ها و جنس‌های غنی‌ترین تیره‌ها در پوشش گیاهی منطقه زریوار




شکل ۵- تعداد گونه‌های غنی‌ترین جنس‌ها در پوشش گیاهی منطقه زریوار



شکل ۶- نمودار شکل زیستی گیاهان منطقه زریوار بر حسب درصد





شکل ۸- تصاویر برخی گونه‌های منطقه زریوار: A. *Utricularia* .C. *Trifolium incarnatum* L. .B. *Coronopus squamatus* Asch .D. *Ophrys kurdistanica* Renz .E. *Orchis mascula* (L.) L. .F. *Helichrysum oligocephalum* DC. .F. *Helichrysum oligocephalum* DC. .E. *Ophrys kurdistanica* Renz .D. *australis* R. Br.

می‌کند. همچنین تنوع گونه‌ای این منطقه در مقایسه با سایر پژوهش‌ها نظیر شناسایی ۴۲۱ گونه گیاهی در منطقه ۳۴۰۰ هکتاری نوژیان لرستان (Mehrnia and ۱۶۹۲۰۰, Ramak, 2014)، ۴۵۱ گونه گیاهی در منطقه هکتاری خبر و روچون کرمان (Irannejad Parizi et al., 2001)، شناسایی ۲۳۱ گونه در منطقه ۳۳ هزار هکتاری مانشت و قلارنگ ایلام (Darvishnia et al., 2012) و شناسایی ۱۹۲ گونه در منطقه ۳۰ هزار هکتاری دینار کوه (Rashidnahal, 2006) نسبتاً زیاد است. یکی از دلایل مهم تنوع و غنای گونه‌ای زیاد منطقه، کوهستانی بودن بخشی از آن و در دسترس نبودن برای

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به تعداد گونه‌های گیاهی (۵۹۰ گونه) ناحیه مطالعه شده و مقایسه آن با ۸۰۰۰ گونه فلور ایران (Abasi et al., 2015) و ۲۱۱۰ گونه فلور استان کردستان (Maroofi, 2011) و در نظر گرفتن مساحت منطقه زریوار (حدود ۵۰۰۰۰ مساحت استان کردستان) نتایج نشان می‌دهند که این منطقه یکی از غنی‌ترین ذخیره گاه‌های ژنتیکی در سطح کشور است. تنوع زیاد در سطح تاکسونومیک گونه، جنس، تیره و فرم‌های رویشی ارزش‌های گوناگون این منطقه را به ویژه از جنبه حفاظت ذخیره‌های ارزشمند ژنتیکی آشکار

می توان به دلیل خوش خوراک نبودن برخی از گونه ها برای دام دانست. همچنین فراوانی تیره های Poaceae و Cyperaceae می تواند به علت وجود منبع رطوبتی (دریاچه آب شیرین زریوار) در منطقه باشد؛ گیاهان تک لپهای وابستگی خود را به محیط های مرطوب بیش از دولپهای حفظ کرده اند و بنابراین درصد زیادی را در این مناطق به خود اختصاص می دهند (Asri and Moradi, 2004).

در تحقیق حاضر، نتایج بررسی شکل زیستی گیاهان منطقه نشان داد که همی کرپتووفیت ها با ۲۵۱ گونه چیره ترین و کامفیت ها با ۸ گونه نادر ترین شکل های زیستی منطقه هستند. با توجه به اقلیم مرطوب و سرد و کوهستانی بودن منطقه، حضور زیاد همی کرپتووفیت ها دور از ذهن نیست. از گیاهانی که در نواحی کوهستانی منطقه و در دامنه ارتفاع ۱۶۰۰ تا ۲۲۰۰ متری مشاهده می شوند می توان به گونه های *Thymus*, *Silene*, *Eremurus spectabilis transcaucasicus*, *Aethionema*, *Campanula stevneii aucheriana*, *Helichrysum*, *Onosma elwendicum fimbriatum*, *Prangos*, *Smyrnium cordifolium oligocephalum* و *Ferula haussknechtii* و *ferulacea* اشاره کرد. به عقیده Archibold (۱۹۹۵) درصد زیاد گیاهان همی کرپتووفیت، اقلیم سرد و کوهستانی را نشان می دهد؛ در زمستان جوانه رویشی همی کرپتووفیت ها در سطح خاک و بین برگ ها قرار می گیرد و مقاومت زیادی به شرایط دمایی سرد از خود نشان می دهد. تروفیت ها از لحاظ فراوانی در منطقه مطالعه شده در رتبه دوم قرار دارند. حضور فراوان تروفیت ها را می توان در بخش پایین دست منطقه مانند سواحل، دشت ها و اطراف روستاهای حاشیه دریاچه مشاهده کرد زیرا

چرای دام است و از دیگر دلایل می توان به وجود منابع رطوبتی همچون دریاچه زریوار، بارش سالانه زیاد، بهره مندی از جریان های مرطوب مدیترانه ای، وجود رودخانه های فصلی و چشم ه سارهای فراوان در منطقه اشاره کرد.

تیره های Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Rosaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Boraginaceae و Cyperaceae مهم ترین تیره های گیاهی منطقه هستند که در مجموع ۷۹۷ درصد کل گونه ها را شامل می شوند. این تیره ها در مطالعات Ahmadi و همکاران (۲۰۱۳) در مناطق جنگلی غرب کردستان، Hassani و همکاران (۲۰۱۴) در منطقه سرشیو مریوان، Mozaffariam و Sanandaji (۲۰۱۰) در منطقه Saral استان کردستان، Jalilian و همکاران (۲۰۱۴) در منطقه کوه بهار آب در رشته کوه زاگرس، Shirmardi و همکاران (۲۰۱۴) در منطقه قصری کوهزنگ در استان چهارمحال و بختیاری، Dolatkhahi و همکاران (۲۰۱۲) در منطقه حفاظت شده ارزن پریشان در استان فارس و Darvishnia و همکاران (۲۰۱۲) در منطقه مانشت و قلارنگ، ایلام نیز مهم ترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه معرفی شده اند. شاید بتوان مقاوم بودن گونه های مختلف تیره Asteraceae به شرایط محیطی مختلف و تخریب برخی از نقاط منطقه (به دلیل چرای دام) را دلیل فراوانی گونه های این تیره Agheli و Ghahremaninejad دانست. به عقیده (۲۰۰۹) هنگامی که درصد تخریب پوشش گیاهی ناحیه ای زیاد شود، برخی تیره های گیاهی نظیر تیره Asteraceae بیشتر در فلور منطقه حضور می یابند. گسترش گونه های مختلف تیره Fabaceae را نیز

ناحیه ایرانی - تورانی متعلق است. منطقه مطالعه شده در محدوده‌ای قرار دارد که از نظر ژئوباتانیکی با دیدگاه‌های متفاوت اما وجوده یکسان طبقه‌بندی شده است. Sabeti (۱۹۷۶) پوشش گیاهی این منطقه را جزء اجتماعات گیاهی با منشأ ایرانی - تورانی معرفی کرده است ولی جنگل‌های آن را از نوع نیمه‌مرطوب و نیمه‌خشک و قلمرو رویشی آن را از دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه‌های البرز تا ارتفاعات و رشته‌کوه‌های زاگرس می‌داند. Ghorbanli (۲۰۰۲) نیز منطقه مطالعه شده را جزئی از بخش کردستان - زاگرس از رویش‌های ایرانی - تورانی معرفی کرده است و قلمرو رویشی این بخش را شامل کوه‌های زاگرس در استان فارس، زاگرس و آذربایجان ذکر و اضافه می‌کند این بخش حاصل‌خیزترین منطقه ایرانی - تورانی در ایران است.

براساس نتایج، بیش از نیمی از گونه‌های گیاهی شناسایی شده پراکنش دو یا چندناحیه‌ای دارند. این امر از طرفی نشان‌دهنده همپوشانی چند ناحیه جغرافیایی گیاهی در این منطقه و از طرف دیگر ناشی از وجود مکان‌های مرطوب و مناسب برای این عناصر و نیز فعالیت‌های انسانی است که باعث ورود و استقرار گیاهانی با ویژگی‌های مشابه علف‌های هرز در برخی مناطق شده است (Naqinezhad et al., 2010). از نظر وجود پراکنش دو یا چندناحیه‌ای، منطقه پژوهش شده وضعیت تقریباً مشابهی با منطقه سرشیو مریوان دارد (Hassani et al., 2014).

از بین جنس‌های شناسایی شده منطقه، جنس چندساله (*Trifolium* L.) با ۱۰ گونه (۷ گونه یکساله و ۳ گونه چندساله) بیشترین درصد حضور را دارد. به عقیده Taylor و همکاران (۱۹۸۰) عموماً گونه‌های یکساله این جنس خودگشن و خاص آب و هوای مدیترانه‌ای

عواملی همچون کشاورزی، فشار ناشی از چرای بی‌رویه دام‌ها، احداث جاده و مکان‌های تفرجگاهی سبب شده‌اند که بسیاری از گونه‌های حساس به عوامل نامساعد محیطی نابود شوند و فرصت برای افزایش گیاهان یکساله و مهاجم ایجاد شود. حضور درصد چشمگیری از گیاهان کریپتوفتیت بیان کننده زیاد بودن عمق خاک و فرسایش نسبتاً اندک خاک (Ghahremaninejad et al., 2011) بودن غنای گیاهان چوبی در منطقه باعث شده است که فانروفیت‌ها با ۶ درصد سهم چشمگیری از طیف زیستی منطقه را به خود اختصاص دهند و این نظر در رتبه چهارم قرار گیرند. حضور نسبتاً درخور توجه فانروفیت‌ها، وجود رطوبت کافی و مناسب منطقه برای رویش‌های جنگلی را نشان می‌دهد. کمترین سهم گونه‌های گیاهی منطقه به شکل زیستی کامفیت‌ها با ۲ درصد تعلق دارد. نتایج مطالعه شکل زیستی منطقه (Khorasani et al., 2014) و نتایج مطالعه شکل زیستی آرایه‌های منطقه سرشیو مریوان در نزدیکی منطقه مطالعه شده (Hasani, 2014) دارد با این تفاوت که تروفیت‌ها شکل زیستی چیره در مطالعات یادشده هستند و دلیل آن به چرای بی‌رویه، تخریب جنگل و جاده‌سازی نسبت داده شده است. فراوانی ژئوفیت‌ها مانند تیره‌های Liliaceae و Amaryllidaceae را می‌توان ناشی از سازگاری این گیاهان به چرانشدن توسط دام به علت قرارگیری جوانه‌های انتهایی آن‌ها در زیر خاک دانست (Roques et al., 2001).

براساس اطلاعات جمع‌آوری شده، بیشترین درصد عناصر رویشی شناسایی شده در منطقه زریوار به ناحیه ایرانی - تورانی تعلق دارند و در نتیجه این منطقه به

و *Veronica macrostachya* از گونه‌های گیاهی هستند که فقط در نواحی جنگلی (سایه درختان) منطقه می‌رویند. گونه‌های *Vicia sativa*, *Vicia assyriaca*, *Cnicus benedictus* و *Onopordum carduchorum* را می‌توان به صورت پراکنده در مناطق بدون پوشش درختی و یا در نواحی جنگلی تخریب شده به ویژه در دامنه‌های غربی دریاچه مشاهده کرد.

در منطقه، دو گونه نیمه‌انگلی موخور (*Loranthus europaeus*) و دارواش (*Viscum album*) به فراوانی روی درختان گلابی (*Pyrus syriaca*), بلوط ایرانی (*Amygdalus communis*), بادام (*Quercus brantii*) و زالزالک (*Crataegus pseudoheterophylla*) یافت می‌شوند و تعیین میزان تراکم آنها برای جلوگیری از گسترش خسارت این گونه‌ها ضروری و دارای اهمیت ویژه‌ای است.

عناصر گیاهی ویژه‌ای با دامنه انتشار بسیار محدود در شکاف نواحی صخره‌ای و سنگلاخی استقرار یافته‌اند؛ گونه‌هایی مانند *Ziziphora capitata* در اراضی سنگلاخی و *Aethionema arabicum* گونه‌های *Potentilla pannosa* در درز و *Sedum umbilicaria*, *Arabis rosularia*, *Calochroum sempervivum* فقط در درز و *Legousia falcata* و *caucasica* شکاف صخره‌ها می‌رویند.

جامعه گیاهی نی (*Phragmites australis*) از چیره‌ترین اجتماعات گیاهی پایابی است که همچون کمربندی تمامی سواحل دریاچه را در بر می‌گیرد. علیرغم چیرگی وسعت نیزارها می‌توان اغلب شکل‌های زیستی هیدروفیت‌ها را در دریاچه زریوار مشاهده کرد. گونه‌های *Batrachium sphaerospermum*

هستند ولی گونه‌های چندساله آن عمدتاً دگرگشن هستند و خاص آب و هوای معینی نیستند.

طبق نتایج، ۳۶ گونه درختی و درختچه‌ای در منطقه وجود دارند که غنای زیاد منطقه زریوار را از لحاظ تنوع و میزان گونه‌های چوبی نشان می‌دهند. به عقیده Zohary (۱۹۶۳)، بلوط ایرانی (*Quercus brantii*) عنصر اصلی جنگل‌های زاگرس، یکی از عناصر رویشی اصلی ایرانی - تورانی و تیپ چیره جنگل‌های بلوط در حوضه زریوار است که دامنه‌ها و ارتفاعات شرقی و غربی مشرف به دریاچه را پوشانده است. بادام رواندزی (*Ficus Amygdalus carduchorum*)، انجیر وحشی (*Amygdalus monspessulanum*), کیکم شیرازی (*Acer rupestris*)، پرورد (L. subsp. *cinerascens*) زالزالک ایروانی (*Crataegus pseudoheterophylla*)، محلب (*Cerasus mahaleb*)، زالزالک زرد (*Crataegus aronia*) و بارانک شیرخشت (*Cotoneaster nummularius*) و بارانک ایرانی (*Sorbus persica*) از دیگر عناصر رویشی درختی و درختچه‌ای ایرانی - تورانی هستند که به طور پراکنده در کنار گونه‌های بلوط جنگل‌های این منطقه قرار دارند. در سال‌های اخیر فعالیت‌های مخرب انسانی از قبیل بوته‌کنی و تبدیل جنگل‌ها به اراضی کشاورزی، سرشاخه‌زنی درختان برای تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دام‌ها، قطع بی‌رویه درختان برای تولید زغال و آتش‌سوزی‌های پی‌درپی به تابودی و تبدیل بخش‌های وسیعی از جنگل‌های این منطقه به درخت‌زارهای پراکنده و آسیب‌دیده منجر شده است.

گونه‌های *Fritillaria Symphytum kurdicum*, *Astragalus piranshahricus*, *straussii*, *Corydalis integra*, *Scrophularia amplexicaulis*

vulgaris در طبقه آسيب‌پذير (VU) قرار دارند و اطلاعات درباره ۱۷ گونه کافی نیست (DD). براساس نتایج، بيشترین گونه‌های آسيب‌پذير منطقه به تیره Orchidaceae تعلق دارند. گونه‌های از گروه *Orchis muscula* و *Dactylorhiza umbrosa* اركيده‌های خاکروی نواحی معتدله هستند که در برخی نواحی ايران شامل استان‌های كردستان، كرمانشاه، لرستان، آذربایجان غربی، تهران، خراسان و كهگیلویه و بویراحمد به صورت خودرو می‌رويند (Shahsavari, 2008). اين گیاهان سالانه يك غده تولید می‌کنند که جايگزين غده قدیمی می‌شود و غده کهنه یا قدیمی از بين می‌رود؛ اين تک‌غده‌ها تنها روش تکثیر اين گونه‌ها در زیستگاه طبیعی آن‌ها هستند. همچنین اين گونه‌ها در سطح جهان زیستگاه‌های محدودی دارند و به گونه‌های نادر تبدیل شده‌اند. متأسفانه تکثیر اندک، قیمت زياد و وجود تقاضای علاقمندان در بازار موجب برداشت گسترده و بیش از حد آن‌ها از طبیعت شده و اين مسئله در کثار تخریب بحرانی رویشگاه‌ها براثر فعالیت‌های انسان به ناپدید شدن اركيده‌ها از برخی نواحی طبیعی منجر شده است. از اين نظر اركيده‌ها از تیره‌های گیاهی بسیار آسيب‌پذير و در دنيا از جمله گونه‌های در معرض خطر انقراض محسوب می‌شوند (Pridgon, 1996؛ Moradi et al., 2016).

علي رغم غنای گونه‌ای زياد و ارزش‌های زیست محیطی منطقه زريوار، مسئلان ذيربط تاکنون هیچ اقدام حفاظتی در اين منطقه انجام نداده‌اند و بدیهی است که تا اقدامات حفاظتی شايسته و مؤثری برای حفظ اين اکوسیستم ارزشمند انجام نشود، اقدام دیگری نتیجه بخش نخواهد بود. در اين راستا تحقق هريک از پیشنهادات زير می‌تواند تا حد زیادي به ادامه حيات و

Polygonum *Myriophyllum* *spicatum* *Najas marina* *amphibium* از گونه‌های غوطه‌ور در آب هستند که در حد فاصل نیزارها و پهنه آبی دریاچه و در تماس با مزارع کشاورزی در قسمت‌های جنوبی، شرقی و جنوب‌شرقی مشاهده می‌شوند. از دیگر گونه‌های آبزی موجود در دریاچه می‌توان به گونه‌های برگ‌شناور مانند *Nymphaea alba* و *Hydrocharis morsus-ranae* اشاره کرد؛ بيشترین محل تجمع آن‌ها حد فاصل نوار عريض نيزارها و قسمت‌های جنوبی دریاچه و در تماس با اراضی کشاورزی و سواحل شيب‌دار شرقی دریاچه است که تأسیسات تفرجگاهی روی آن احداث شده‌اند. در اين منطقه، ۵۰ گونه آسيب‌پذير و در معرض انقراض وجود دارند که هر روز به علت شدت تخریبی که انسان و دام اعمال می‌کند در معرض خطر انقراض بيشتری قرار می‌گيرند. *Gurgin Karajji* و همکاران (۲۰۱۴) تعداد گونه‌های در معرض خطر منطقه سارال کردستان را ۲۵ گونه و *Hassani* و همکاران (۲۰۱۴) تعداد گونه‌های در معرض خطر منطقه سريشيو مريوان را ۳ گونه گزارش کرده‌اند. مقاييسه تعداد گونه‌های آسيب‌پذير و در خطر منطقه زريوار با مناطق هم‌جوار نشان می‌دهد که به دليل بهره‌برداری‌های غيراصولی و نبود حفاظت کافي، ميزان تخریب گونه‌های گیاهی اين منطقه بيشتر است. همان‌طور که در جدول ۱ اشاره شد از ۵۰ گونه در خطر انقراض منطقه، ۲۴ گونه در طبقه *Dactylorhiza* و ۹ گونه *Orchis* *Ophrys kurdistanica umbrosa* *Astragalus* *Orchis palustris mascula* *As.* *As. cyclophyllon carduchorum* *Lysimachia* و *Lathyrus hirsutus piranshahricus*

ذخیره گاههای زیست کره (توسعه، پشتیبانی و حفاظت) مسلماً پیگیری برای انتخاب این دریاچه با عنوان ذخیره گاه زیست کره از طریق سازمان حفاظت محیط زیست می تواند تا حد زیادی در حفظ و حمایت آن نقش داشته باشد.

سپاسگزاری

نگارندگان از آقایان مهندس آیت بهزادی و مهندس اهون تبد برای همراهی در عملیات میدانی و جناب آقای دکتر مصطفی نعمتی پیکانی و سرکار خانم مهندس سمیرا زنگیشه برای همکاری در شناسایی نمونه های گیاهی صمیمانه تشکر و قدردانی می کنند.

حفظ گونه های ارزشمند این تالاب کمک کند. کنوانسیون بین المللی تالاب ها در سال ۱۹۷۹ در شهرستان رامسر منعقد شد و دریاچه زریوار تا حد زیادی با معیارهای تأیید شده کنوانسیون درباره شرایط بین المللی بودن تالاب مطابقت دارد. از این رو، شایسته است مسئولین و به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست با تمرکز روی ویژگی های منحصر به فرد دریاچه زریوار، تمام تلاش خود را برای ثبت کردن این تالاب با عنوان تالاب بین المللی به کار گیرند. همچنین با توجه به ارتباط نزدیک این دریاچه با معیشت روستاهای حاشیه آن، اهمیت اکوتوریسمی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری دریاچه و با در نظر گرفتن سه نقش محوری

منابع

- Abasi, S., Zare, H., Hosseini, S. H. and Pilehvar, B. (2015) Study on flora, vegetation structure and chorology of plants in some parts of protected area of Oshtorankooch, Lorestan province. Journal of Environmental Science and Technology 17 (1): 125-134 (in Persian).
- Ahmadi, F., Mansory, F., Maroofi, H. and Karimi, K. (2013) Study of flora, life form and chorotypes of the forest area of West Kurdistan (Iran). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 2 (9): 11-18.
- Akhani, H. and Joharchi, M. (1995) New and interesting records for the flora of Iran. Willdenowia 25: 261-266.
- APG IV. (2016) An update of the angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181(1): 1-20.
- Archibold, O. W. (1995) Ecology of world vegetation. Chapman and Hall, London.
- Assadi, M. (Ed.) (1988-2013) Flora of Iran. vols. 1-74. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Asri, Y. and Moradi, A. (2004) Floristic and phytosociological studies of Amirkelayeh Lagoon. Journal of Agricultural Science and Natural Resource 11: 171-179.
- Darvishnia, H., Dehghani Kazemi, M., Forghani, A. H. and Kavyani fard, A. A. (2012) Study and introducing of flora of protected of Manesht and Qalarang in Ilam province. Taxonomy and Biosystematics 4 (11): 47-59 (in Persian).
- Davis, P. H. (Ed.) (1965-1985) Flora of Turkey. vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Dinarvand, M. (2012) A taxonomic revision of *Utricularia* (Lentibulariaceae) for aqua flora of Iran. Iranian Journal of Botany 18 (2): 191-195.
- Dolatkhahi, M., Asri, Y. and Dolatkhahi, A. (2012) Floristic study of Arjan-Parishan protected area in Fars province. Taxonomy and Biosystematics 3 (9): 31-46 (in Persian).

- Ejtehadi, H., Sepehri, A. and Akafi, H. (2009) Methods of measuring biodiversity. Ferdowsi Mashhad University, Mashhad (in Persian).
- Gahreman, A. and Attar, F. (1998) Biodiversity of plant species in Iran. vol. 1. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- Gahremaninejad, F. and Agheli, S. (2009) Floristic study of Kiasar National Park, Iran. Taxonomy and Biosystematics 1: 47-62 (in Persian).
- Gahremaninejad, F., Naqinezhad, A. R., Bahari, S. H. and Esmaeili, R. (2011) A contribution to flora, life form and distribution of plants in two protected lowland forests, Semeskandeh and Dasht-e Naz, Mazandaran, N. Iran. Taxonomy and Biosystematics 3 (7): 53-70.
- Ghorbanli, M. (2002) Phytogeography. Samt Press, Tehran (in Persian).
- Gurgin Karaji M., Karami, P. and Marofii, H. (2014) Introduction to the flora, life forms and chorology of Saral of Kurdistan (Case study sub catchment Farhadabad). Journal of plant researches (Iranian Journal of Biology) 26 (4): 510-525 (in Persian).
- Hassani, S. M., Yazdanshenas., H., Nazarpoorfard, K., Bassiri, R. and PurRezaee, J. (2014) Study of physiognomy and origin of plant species in Sarshiv area of Marivan, Iran. Journal of Rangeland Science 4: 270-276.
- IPNI, The International Plant Names Index. Retrieved from <http://www.ipni.org>. On: 3 December 2016.
- Irannajad Parizi, M. H., Sanei Shariat Panahi, M., Zobeiri, M. V. and Marvi Mohajer, M. R. (2001) A floristic and phytogeographical investigation of khabr national park and rouchun as wildlife refuge. Iranian Journal of Natural Resources 54 (2): 111-130.
- Jalili, A. and Jamzad, Z. (1999) Red Data Book of Iran, Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran.
- Jalilian, N., Sheikhi, A. and Dehshiri, M. M. (2014) A floristic study in Bahar-ab Kuh area in Zagros mountains (in the border of Kermanshah and Ilam provinces, Iran). Taxonomy and Biosystematics 6 (18): 65-76 (in Persian).
- Khorasani, N., Riazi, B. and Aliehiae, A. (2014) Investigating the diversity of plant species around Zarivar Lake in Marivan. Iranian Journal of Natural Resources 67 (1): 53-64 (in Persian).
- Maroofi, H. (2011) The final report of the research project "Preparation of the flora of Kurdistan province". Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Maassoumi, A. A. (1986-2005) The genus *Astragalus* in Iran. vols. 1-4. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Mehrnia, M. and Ramak, P. (2014) Floristic investigation of Noujian Watershed (Lorestan province). Iranian Journal of Plant Biology 6 (20):113-136.
- Mir-Heidar, H. (2002) Plant Learning, Usage of plants in prevention and treatment of disease. Daftare-Nashre- Farhange-Islami, Tehran (in Persian).
- Mobayen, S. (1975-1996) Flora of Iran: vascular plants. vols. 1-4. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- Moradi, Sh., Dianati-daylami, Sh., Vahdati, K. and Arab, M. (2016) Effect of medium, explants and BA on somatic embryogenesis induction in tow Iranian native orchids. Journal of Plant production Research 22 (4): 119-132 (in Persian).
- Mozaffarian, V. (1998) A dictionary of Iranian plant names. Farhang Moaser Publication, Tehran (in Persian).

- Mozaffarian, V. (2005) Plant classification. Vols. 1-2. Amir kabir Publications, Tehran (in Persian).
- Naqinezhad, A. R., Hosseini, S., Rajamand, M. A. and Saeidi Mehrvarz, Sh. (2010) A floristic study on Mazibon and Sibon protected forests, Ramsar, across the altitudinal gradient (300-2300 m). *Taxonomy and Biosystematics* 2(5): 93-114 (in Persian).
- Pourbabaei, H., Zandi Navgaran, Sh. and Adel, M. N. (2012) Spatial pattern of three Oak species in Chenare forest of Marivan, Kordestan. *Iranian Journal of Natural Resources* 65 (3): 329-339 (in Persian).
- Pridgon, A. M. (1996) Orchids status survey and conservation action plan. IUCN Cambridge. UK.
- Rashidnahal, M. (2006) Study and introducing of flora and plant life form of the protected area of dinarkooch in Ilam. MSc thesis, Islamic Azad University of Borujerd, Borujerd, Iran (in Persian).
- Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Larendon, Oxford.
- Rechinger, K. H. (Ed.) (1965-1998) Flora Iranica. Vols. 1-178. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz.
- Roques, K. G., O'Connor, T. G. and Watkinson, A. R. (2001) Dynamics of shrub encroachment in an African savannah: relative influences of fire, herbivory, rainfall and density dependence. *Journal of Applied Ecology* 38(2): 268-280.
- Sabeti, H. (1976) Forests, trees and shrubs of Iran. Ministry of Agriculture and Natural Resources of Iran, Tehran (in Persian).
- Sanandaji, S. and Mozaffarian, V. (2010) Studies of flora in Saral area: Kurdistan, Iran. *Taxonomy and Biosystematics* 2 (4): 59-84 (in Persian).
- Shahsavari, A. (2008) Flora of Iran. Part 57: Orchidaceae. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (In Persian).
- Shirmardi, H. A., Heydari, G., Gholami, Mozaffarian, V. and Tahmassebi, P. (2014) A study of flora in rangelands of Gheissari Koohrang region in Chaharmahal and Bakhtiari province. *Taxonomy and Biosystematics* 6(18): 87-106 (in Persian).
- Tabad, M. A. and Jalilian, N. (2015) Ethnobotanical study of medicinal plants in Zarivar Region (Marivan), Iran. *Journal of Medicinal Plants* 2(54): 55-75 (in Persian).
- Tabad, M. A., Nemati, M. and Jalilian, N. (2015) *Trifolium incarnatum* L. (Papilionaceae), a new record for the flora of Iran. *The Iranian Journal of Botany* 21(2): 126-128.
- Takhtajan, A. (1986) Floristic regions of the world. University of California Press, Berkley.
- Taylor, N. L., Quarles, R. F. and Anderson, M. K. (1980) Methods of overcoming inter-specific barriers in *Trifolium*. *Euphytica* 29: 441-450.
- Townsend, C. C. and Guest, E. (Eds.) (1966-1985) Flora of Iraq. vols. 1-9. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad.
- Zargari, A. (1997) Medicinal plants. Tehran University Press. Tehran (in Persian).
- Zohary, M. (1973) Geobotanical foundation of Middle-East. vols. 1-2. Department of Botany, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

پيوست ۱: فهرست کامل گونه‌های گیاهی جمع آوری شده از منطقه زریوار به همراه شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و وضعیت حفاظت گونه‌ها؛ نشانه‌های اختصاری: Th (تروفیت)، He (همی کریپتوفت)، Cr (کارنوفیت)، Ph (فالنوفیت)، Ch (کامفیت)، IT (ایرانی - تورانی)، ES (اروپا - سیری)، M (مدیترانه‌ای)، Cosm (جهان‌وطن)، PI (چندناحیه‌ای)، SS (صحراء-سندي)، LR (کمتر در خطر)، VU: (آسیب‌پذیر)، DD (بدون اطلاعات)، ** (گونه‌های گیاهی بومزاد) و * (گونه‌های دارویی)

تاكson	اسم فارسي	شكل زيستي	پراکنش	وضعیت حفاظت جغرافیایی
Acanthaceae				
<i>Acanthus dioscoridis</i> L.	پاي خرس	He	IT	
Aceraceae				
<i>Acer monspessulanum</i> L. subsp. <i>cinerascens</i> (Boiss.) Yaltrik	کيکم شيرازى	Ph	IT	DD
Alismataceae				
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	قاشقواش سرنيزه‌اي	He	Cosm	
Amaranthaceae				
<i>Amaranthus albus</i> L.	تاج خروس سفيد	Th	IT, ES	
* <i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	تاج خروس گسترده	Th	IT, ES	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	تاج خروس	Th	IT	
* <i>Chenopodium album</i> L.	سلمه تره	Th	Cosm	
* <i>Chenopodium botrys</i> L.	سلمک اورشليمي	Th	Cosm	
Amaryllidaceae				
<i>Allium convallarioides</i> Grossh.	پياز موگاهاي	Cr	IT, M	
<i>Allium dictyoprasum</i> Ledeb.	---	Cr		
<i>Allium eriophyllum</i> Boiss.	پياز برگ كركي	Cr	IT, M	
<i>Allium rubellum</i> M.Bieb.	پياز صورتى	Cr	IT, ES, M	
<i>Allium ubipetrense</i> R.M.Fritsch	---	Cr	IT	
* <i>Narcissus tazetta</i> L. subsp. <i>tazetta</i>	نرگس	Cr	PI	
<i>Sternbergia clusiana</i> Ker Gawl. ex Schult. (Ker. - Gawl.) Spreng.	جامزرين كورش	Cr	IT, M, SS	
** <i>Ungernia flava</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	گرمينه زرد	Cr	IT	
Anacardiaceae				
* <i>Pistacia atlantica</i> Desf. subsp. <i>Kurdica</i> (Zohary) Rech. f.	بنه كرستانى	Ph	IT	
<i>Rhus coriaria</i> L.	سماق	Ph	IT, ES, M	
Apiaceae (Umbelliferae)				
* <i>Anthriscus nemorosa</i> Spreng.	جعفرى وحشى	He	IT, ES, M	
<i>Bunium cylindricum</i> Grossh.	زيره استوانه‌اي	Cr	IT	
<i>Bunium elegans</i> Freyn	زيره زينا	Cr	IT	
<i>Bunium paucifolium</i> DC.	زيره هرز زراعي	Cr	IT	
<i>Chaerophyllum macropodum</i> Boiss.	جعفرى فرنگى كوهستانى	He	IT	
* <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Ball	هویج خودروی كبر	Cr	IT, ES	
<i>Eryngium billardieri</i> F. Delaroche	زول آبي	He	IT, ES, M	

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
<i>Eryngium pyramidale</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	زول مخروطی	He	IT	DD
* <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	غازیاغی	He	IT, ES, M	
<i>Ferula haussknechtii</i> H.Wolff ex Rech.f.	کمای ساورزی	He	IT	
** <i>Ferula macrocolea</i> Boiss.	کمای مرتفع	He	IT	LR
<i>Grammosciadium platycarpum</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	شوید کوهی	He	IT	
* <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch. C.A.Mey. & Avé-Lall.	گلپر	He	IT, ES, M	
<i>Johrenia aromatica</i> Rech. f.	---	He	IT, M	
<i>Lisaea heterocarpa</i> Boiss.	---	Th	IT	
<i>Lisaea strigosa</i> (Banks & Soland.) Eig.	---	Th	IT, M	
<i>Malabaila sekakul</i> Boiss.	شقاقل صحرایی	He	IT	
* <i>Oenanthe fistulosa</i> L.	آب‌چکان لوله‌ای	Cr	IT, ES, M	
<i>Opopanax hispidus</i> Griseb.	---	Cr	IT, ES, M	
** <i>Opsicarpium insignis</i> Mozaff.	---	He	IT	
<i>Physocaulis nodosus</i> W.D.J.Koch	ساق گره‌ای	Th	IT, ES	
<i>Pimpinella affinis</i> Ledeb.	ترتیزک باغی	He	IT	
<i>Pimpinella anthriscoides</i> Boiss.	جعفری کوهی جویاری	He	IT	
<i>Pimpinella kotschyana</i> Boiss.	جعفری کوهی کردستانی	He	IT, ES	
<i>Prangos ferulacea</i> Lindl.	جاشير	He	IT, M	
<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol.	شانه و نوس ستاره‌ای	Th	IT, M	
<i>Smyrnopsis aucheri</i> Boiss.	پیکل	He	IT	
<i>Smyrnium cordifolium</i> Boiss	آندول	He	IT	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	ماستونک	Th	IT, ES	
<i>Torilis leptophylla</i> Rchb.f.	ماستونک نازک برگ	Th	IT, ES	
** <i>Trigonosciadium brachytaenium</i> (Boiss.) Alava	گلپرک	He	IT	LR
<i>Turgenia latifolia</i> Hoffm.	گیس چسبک	Th	IT, M	
Araceae				
<i>Arum conophalloides</i> Kotschy ex Schott	شیپوری سبز	Cr	IT	
<i>Lemna gibba</i> L.	عدسک قوزدار	He	Cosm	
Aristolochiaceae				
* <i>Aristolochia bottae</i> Jaub. & Spach	زراآند	He	IT	
Asparagaceae				
<i>Bellevalia glauca</i> Kunth.	تمشکین برگ آبی	Cr	IT	
<i>Bellevalia longistyla</i> (Miscz.) Grossh.	تمشکین ارسی	Cr	IT	
<i>Bellevalia olivieri</i> (Baker) Wendelbo	تمشکین دجله‌ای	Cr	IT	
<i>Muscari caucasicum</i> Baker	کلاغک قفقازی	Cr	IT	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافيايي	وضعيت حفاظت
<i>Muscaris longipes</i> Boiss.	کلاگك پابلند	Cr	IT	
<i>Muscaris neglectum</i> Guss. ex Ten.	کلاگك	Cr	IT	
<i>Puschkinia scilloides</i> Adams	نجم آبي سان	Cr	IT	
<i>Scilla persica</i> Hausskn.	نجم آبي	Cr	IT	
Asphodelaceae				
** <i>Eremurus spectabilis</i> Ledeb.	سريش تماشايي بختياري	Cr	IT	
Asteraceae (Compositae)				
<i>Achillea biebersteinii</i> Afanasiev	بومادران زرد	He	IT, ES	
<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	بومادران زاگرسى	He	IT, ES, M	
* <i>Achillea millefolium</i> L.	بومادران هزاربرگ	He	IT	
<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit.	بومادران موبين	He	Pl	
** <i>Achillea talagonica</i> Boiss. var. <i>oxylepis</i> (Boiss. & Hausskn.) Hub.- Mor.	بومادران طالقاني	He	IT	LR
** <i>Anthemis altissima</i> L.	بابونه رفع	Th	IT, ES, SS	DD
<i>Anthemis haussknechtii</i> Boiss. & Reut.	بابونه زاگرسى	Th	IT	
<i>Anthemis hyalina</i> DC.	بابونه شفاف	Th	IT	
* <i>Anthemis tinctoria</i> L.	بابونه زرد	He	IT, ES, M	
* <i>Arctium lappa</i> Kalm	بابا آدم	He	Pl	
* <i>Bellis perennis</i> L.	ميناچ چمنى	He	IT, ES	
* <i>Bidens tripartita</i> L.	دو دندان	Th	Cosm	
<i>Carduus arabicus</i> Jacq.	تاتاري عربي	Th	ES, M	
<i>Carthamus dentatus</i> Vahl	گلرنگ دندانه دار	Th	IT	
* <i>Carthamus oxyacantha</i> M.Bieb.	گلرنگ زرد	Th	IT, ES, SS	
* <i>Carthamus lanatus</i> L.	گلرنگ مقدس	Th	IT	
<i>Centaurea aggregata</i> Fisch & C. A. Mey.	گل گندم انبوه	He	IT	
* <i>Centaurea behen</i> L.	گل گندم طلابي	He	IT	
** <i>Centaurea amadanensis</i> Sch.Bip.	گل گندم همداني	He	IT	DD
<i>Centaurea iberica</i> Trevir. ex Spreng.	گل گندم چمن زار	Th	IT, ES	
<i>Centaurea nemecii</i> Náblek	گل گندم سنتنجي	He	IT	
* <i>Centaurea solstitialis</i> L.	گل گندم زرد	He	ES, M	
** <i>Cephalorrhynchus microcephalus</i> DC. Schichian	کاهو منقاري که کوچك	Cr	IT	
<i>Cephalorrhynchus rechingerianus</i> Tuisl	کاهو منقاري که کوچك	Cr	IT	
<i>Chardinia orientalis</i> (L.) Kuntze	---	Th	IT	
<i>Chondrilla juncea</i> L.	قدرون	He	IT	
* <i>Cichorium intybus</i> L.	کاسني	He	ES, M	
<i>Cirsium hygrophilum</i> Boiss.	کنگر توچالي	He	IT	
* <i>Cnicus benedictus</i> L.	خار مقدس	Th	IT, ES, M	

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
** <i>Cousinia concinna</i> Boiss. & Hausskn.	هزارخار باشکوه	He	IT	DD
<i>Crepis alpina</i> L.	ریش قوش کوهسری	Th	IT, ES, M	
<i>Crepis kotschyana</i> Boiss.	ریش قوش یکساله	Th	IT	
<i>Crepis sancta</i> (L.) Babc.	ریش قوش	Th	IT, M	
<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Vis.	سیاه فندق	He	IT, M	
<i>Cyanus depressus</i> (M.Bieb.) Soják	---	Th	Pl	
<i>Cymbolaena griffithii</i> (A.Gray) Wagenitz	---	Th	IT, ES, M	
<i>Echinops orientalis</i> Trautv	شکر تیغال شرقی	He	IT	
* <i>Eclipta prostrata</i> L.	مستور خوابیده	Th	Cosm	
<i>Erigeron acris</i> L.	پر بهار تلخ	He	Pl	LR
<i>Filago arvensis</i> L.	----	Th	IT, ES, M	
<i>Garhadiolus angulosus</i> Jaub. & Spach	----	Th	IT, ES	
* <i>Gundelia tournefortii</i> L.	کنگر خوراکی	He	IT	
** <i>Helichrysum athanaton</i> Georgiadou & Rech. f.	گل بی مرگ ساورزی	He	IT	DD
** <i>Helichrysum oligocephalum</i> DC.	گل بی مرگ کم کپه	He	IT, ES	LR
<i>Inula britannica</i> L.	مصطفای بریتانیایی	He	IT, ES	
* <i>Inula helenium</i> L.	مصطفای	He	ES	
* <i>Lapsana communis</i> L.	گل خورشیدی	Th	IT, ES	
<i>Lactuca scarioloides</i> Boiss.	کاهوی دنایی	Th	IT	
<i>Notobasis syriaca</i> Cass.	بادآورد	Th	Pl	
<i>Onopordum carduchorum</i> Bornm. & Beauverd	خارپنہ شاهوی	He	IT	
* <i>Onopordum leptolepis</i> DC.	خارپنہ برگ نازک	He	IT	
<i>Picnomon acarna</i> Cass	زردخار	Th	IT, M	
<i>Picris strigosa</i> ort. ex Rchb.	تلخک	He	IT	
<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak	گاو چاق کن	Ch	IT	
<i>Scorzonera lanata</i> Schrank	شنگ اسی پشمalo	Cr	IT	
<i>Scorzonera phaeopappa</i> Boiss.	شنگ اسی کاکل قهوه‌ای	Cr	IT	
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.	قادص بهار	Th	IT, ES, M	
* <i>Senecio vulgaris</i> L.	پیر گیاه	Th	IT, ES, M	
* <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	خار مریم	He	Pl	
* <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	شیر تیغک	He	IT, M	
<i>Tanacetum kotschyti</i> (Boiss.) Grierson	مینای کوهسری	He	IT	
<i>Tanacetum polyccephalum</i> Sch.Bip. subsp. <i>heterophyllum</i> (Boiss.) Podlech	مینای پر کپه ناجور برگ	He	IT	
<i>Taraxacum montanum</i> DC.	گل قادر کوهی	He	IT	
<i>Tragopogon bupthalmoides</i> Boiss.	شنگ ایرانی	He	IT, ES, M	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافيايي	وضعيت حفاظت
* <i>Tragopogon graminifolius</i> DC.	شنگ	He	IT	
<i>Tragopogon pterocarpus</i> DC.	شنگ میوه بالدار	He	IT, ES, M	
<i>Tragopogon vaginatus</i> Ownbey & Rech.f.	شنگ غلافدار	He	IT, ES	
* <i>Tripleurospermum disciforme</i> Sch.Bip.	بابونه کاذب	Th	IT	
<i>Tripleurospermum microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	بابونه کاذب کپه ريز	Th	IT	
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt	شير تلخک	Th	Pl	
* <i>Xanthium strumarium</i> L.	زردینه	Th	IT	
** <i>Zoegea leptaurea</i> L. subsp. <i>mianensis</i> (Boiss.) Rech. f.	خورشید صح	Th	IT	LR
Berberidaceae				
* <i>Berberis integerrima</i> Bunge	زرشک زرافشاني	Ph	IT	
<i>Bongardia chrysogonum</i> Boiss.	علف کبکي	Cr	IT	
Biebersteiniaceae				
<i>Biebersteinia multifida</i> DC.	آدمك	Cr	IT	
Boraginaceae				
* <i>Anchusa italicica</i> Retz.	گل گاوزبان بدل	He	IT, ES	
<i>Asperugo procumbens</i> L.	علف چسبك	Th	Pl	
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	---	Th	Pl	
<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I.M.Johnst.	---	Th	IT, ES	
<i>Cerinthe minor</i> L.	عسلی	He	ES	
* <i>Echium italicum</i> L.	گل گاوزبان ایتالیایی	He	IT, M	
* <i>Heliotropium europaeum</i> L.	آفتاب پرست اروپایی	He	IT, M	
<i>Heliotropium noeannum</i> Boiss.	---	Th	IT	
<i>Huynhia pulchra</i> (Willd. ex Roemer & Schultes) Greuter & Burdet	---	He	IT	
<i>Lappula sessiliflora</i> (Boiss.) Gurke	خار لنگري اصفهاني	Th	IT	
* <i>Lithospermum officinale</i> L.	سنگ دانه	He	IT, ES	
<i>Myosotis lithospermifolia</i> Hornem.	فراموش مکن کوهستانی	He	ES	
<i>Nonea pulla</i> DC.	چشم گربه ای سیاه	He	IT, ES	
<i>Onosma dichroantha</i> Boiss.	زنگوله ای رنگین	He	IT	
<i>Onosma elwendica</i> Wettst. ex Stapf	زنگوله ای الوندی	He	IT	
** <i>Onosma kilouyensis</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss	زنگوله ای کهگيلويه ای	He	IT	LR
<i>Onosma microcarpa</i> DC.	زنگوله ای زرد	He	IT	
<i>Onosma sericea</i> Willd.	زنگوله ای کرک ابريشمي	He	IT	
<i>Rindera lanata</i> Bunge	---	He	IT	
<i>Solenanthus circinatus</i> Ledeb.	گل عقربي	He	IT	
<i>Symphytum kurdicum</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	هماور کردي	He	IT	

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
Brassicaceae				
<i>Aethionema arabicum</i> (L.) Andrz. ex DC.	آتشین عربی	He	IT	
<i>Aethionema fimbriatum</i> Boiss.	آتشین شرابه‌ای	He	IT	
<i>Aethionema grandiflorum</i> Boiss. & Hohen.	آتشین	He	IT	
* <i>Alliaria petiolata</i> (M. B.) Cavara & Grande	علف سیر	He	ES	
** <i>Alyssum bracteatum</i> Boiss.	قدومه برگدار	He	IT	LR
<i>Alyssum staphii</i> Vierh.	قدومه شیرازی	Th	IT	
<i>Alyssum strigosum</i> [Soland.]	قدومه گل‌دیز	Th	IT	
<i>Arabis caucasica</i> Wild.	رشاد قفقازی	He	IT, M	
<i>Aubrieta parviflora</i> Boiss.	سنگ فرش	He	IT	
<i>Barbarea minor</i> K. Koch	ترتیزک جویباری کوچک	He	IT, ES	
<i>Barbarea plantaginea</i> DC.	ترتیزک جویباری	He	IT	
** <i>Brossardia papyracea</i> Boiss.	---	He	IT	LR
<i>Buchingera axillaris</i> Boiss. & Hohen.	---	Th	IT	LR
* <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	کیسه کشیش	Th	Cosm	
<i>Cardamine uliginosa</i> M.Bieb.	ترتیزک باتلاقی	He	IT, M	
* <i>Cardaria chaleensis</i> Hand.-Mazz.	ازمک	He	Pl	
<i>Clypeola jonthlaspi</i> L.	خردل سپری	Th	IT, ES, M	
<i>Clypeola lappacea</i> Boiss.	خردل سپری قلابی	Th	IT	
* <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	خاکشیر ایرانی	Th	IT, ES, M	
** <i>Erysimum kurdicum</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	خاکشیر تلخ کردی	He	IT	
* <i>Erysimum repandum</i> L.	خاکشیر تلخ موج	Th	IT, ES	
<i>Euclidium syriacum</i> (L.) W.T.Aiton	سرگنجشکی	Th	IT	
<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	---	He	IT, ES, M	
<i>Fibigia macrocarpa</i> Boiss.	---	He	IT	
<i>Fibigia multicaulis</i> (Boiss. & Hohen.) Boiss.	---	He	IT	
** <i>Graellsia saxifragifolia</i> Boiss	صخره‌وری	He	IT	
** <i>Hesperis kurdica</i> F.Dvořák & Hadač	شببوی ایرانی کردی	He	IT	
<i>Hesperis odorata</i> F.Dvořák	شببوی ایرانی معطر	He	IT	
<i>Isatis stenophylla</i> Bornm. & Gauba	وسمه برگباریک	Th	IT	
* <i>Lepidium latifolium</i> L.	ترتیزک برگ‌پهن	He	IT, ES, M	
<i>Malcolmia africana</i> (L.) W.T.Aiton	شببوی صحراوی	Th	Pl	
* <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton	علف چشم	He	Pl	
<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	آجیل مزرعه	Th	IT, ES, M	
<i>Parlatoria cakiloides</i> Boiss.	---	Th	IT, ES	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافيايي	وضعيت حفاظت
** <i>Parlatoria rostrata</i> Boiss. & Hohen.	---	Th	IT	LR
<i>Rorippa amphibia</i> Besser.	تربيزك زرد	He	ES	
** <i>Sameraria stylophora</i> Boiss.	ساماري چهاربال	Th	IT	LR
* <i>Sinapis arvensis</i> L.	خردل بري	Th	IT, ES, M	
* <i>Sisymbrium irio</i> L.	خاکشیر لندي	Th	Pl	
* <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	خاکشیر طبي	Th	ES	
<i>Thlaspi kotschyanum</i> Boiss. & Hohen.	کيسه چوپان البرزى	Th	IT	
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	کيسه چوپان ساقه محصور	Th	Pl	
Butomaceae				
<i>Butomus umbellatus</i> L.	هزار نبي	Cr	Pl	
Campanulaceae				
<i>Campanula beauverdiana</i> Fomin	گل استakanى تک گل	He	IT, ES	
<i>Ayneuma cichoriiforme</i> Bornm.	گل چاک كاسني شكل	He	M	
<i>Campanula ceciliae</i> Chitt.	گل استakanى بلوطستانى	Th	IT	
<i>Campanula flaccidula</i> Vatke	گل استakanى افتان	Th	IT	
<i>Campanula involucrata</i> Aucher ex A.DC.	گل استakanى برگدار	He	IT	
<i>Campanula sclerotricha</i> Boiss.	گل استakanى کرک زبر	He	IT, M	
<i>Legousia falcata</i> Fritsch	آينه و نوس هلالى	Th	Pl	
<i>Mindium laevigatum</i> (Vent.) Rech.f. & Schiman-Czeika	گل شکافته	He	IT, ES	
Caprifoliaceae				
<i>Cephalaria syriaca</i> Schard.	سر شکافته	Th	M	
<i>Lonicera nummulariifolia</i> Jaub. & Spach	پلاخور برگدار	Ph	IT, M	
<i>Pterocephalus plumosus</i> Coul.	سرپال يك ساله	He	IT, M	
<i>Scabiosa palaestina</i> L.	طوسك زاگرسى	Th	IT, ES	
<i>Scabiosa leucocallis</i> Patzak	طوسك کنگلومرايى	Th	IT, ES	
<i>Valeriana alliariifolia</i> Adams	والرين جنگلى	He	IT	DD
<i>Valerianella dactylophylla</i> Boiss. & Hohen.	شيرينك پنجه اي	Th	IT, M	
<i>Valerianella tuberculata</i> Boiss.	شيرينك زگيلدار	Th	IT	
<i>Valerianella vesicaria</i> Moench	شيرينك متورم	Th	IT, ES	
Caryophyllaceae				
<i>Cerastium dichotomum</i> L.	دانه مرغ دوشاخه اي	Th	IT, M	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	دانه مرغ گوش موش	Th	IT, M	
<i>Cerastium inflatum</i> Link	دانه مرغ متورم	Th	IT, ES, M	
<i>Cerastium perfoliatum</i> L.	دانه مرغ ساقه محصور	Th	Cosm	
<i>Dianthus strictus</i> Sm.	میخک افراشته منقوط	He	IT	
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	---	Th	Pl	
<i>Mesostemma kotschyanum</i> (Fenzl in Boiss.) Vved.	گندمکي کوهى	He	IT, ES	

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
<i>Minuartia hamata</i> Mattf.	مرواریدی اسپانیایی	He	IT, ES	
<i>Silene ampullata</i> Boiss.	سیلن حبابی	He	IT	
<i>Silene aucheriana</i> Boiss.	سیلن ایرانی	Ch	IT	
<i>Silene chlorifolia</i> Sm.	سیلن سبزینه‌ای	He	IT	
<i>Silene commelinifolia</i> Boiss. var. <i>ovatifolia</i> Melzh.	سیلن دربنده	He	IT	
<i>Silene coniflora</i> Nees ex Ott.	سیلن گل مخروطی	Th	IT, M	
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	سیلن سفید	He	IT	
<i>Silene longipetala</i> Vent.	سیلن زاگرسی	He	IT, M	
* <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	دانه‌ناری	Th	COSm	
**.* <i>Vaccaria grandiflora</i> Jaub. & Spach	صابونک	Th	Pl	
<i>Vaccaria liniflora</i> Bornm.	صابونک گل باریک	Th	IT, ES, M	
* <i>Vaccaria pyramidata</i> Medik.	صابونک	Th	IT	
<i>Velezia rigida</i> L.	---	Th	IT, ES, SS	
Ceratophyllaceae				
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	علف‌شاخی غوطه‌ور	Cr	Cosm	
Cistaceae				
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.	گل آفتابی اروپایی	Th	IT, M	
Colchicaceae				
<i>Colchicum kotschyi</i> Boiss.	گل حسرت سفید	Cr	IT	
<i>Colchicum szovitsii</i> Fisch. & C. A. Mey.	گل حسرت برفی	Cr	IT	
Convolvulaceae				
* <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	پیچک جنگلی پرچینی	He	Cosm	
* <i>Convolvulus arvensis</i> L.	پیچک صحرایی	He	Pl	
<i>Convolvulus betonicifolius</i> Mil.	پیچک برگ پیکانی	He	IT, ES, M	
* <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl	سنس تک‌دانه	Th	IT, ES, M	
Cornaceae				
<i>Cornus australis</i> C. A. Mey.	سیاه‌ال	Ph	IT, ES	
Crassulaceae				
<i>Rosularia sempervivum</i> A. Berger	ناز طوقه‌ای دائمی	He	IT, ES, SS	
** <i>Sedum callichroum</i> Boiss.	ناز زیبا	Th	IT	DD
<i>Umbilicus intermedius</i> Boiss.	ناف و نوس	Cr	IT, M, SS	
Cucurbitaceae				
* <i>Bryonia aspera</i> Steven	فاشرای زبر	Cr	IT	
* <i>Bryonia multiflora</i> Boiss. & Heldr.	فاشرا	Cr	IT	
Cyperaceae				
<i>Bolboschoenus glaucus</i> (Lam.) S.G.Sm	---	He	IT, ES	
<i>Bolboschoenus maritimus</i> L. Palla	ترک	Cr	Cosm	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافياي	وضعيت حفاظت
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	جگن	He	ES	
<i>Carex diluta</i> M.Bieb.	"	Cr	IT	
<i>Carex divisa</i> Huds.	"	He	Cosm	
<i>Carex divulsa</i> Stokes	"	He	Pl	
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	"	He	IT, ES	
<i>Carex kurdica</i> Kuk	"	He	IT	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	"	He	ES	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	نياره	He	Pl	
<i>Cyperus fuscus</i> L.	---	Th	Cosm	
<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	---	Cr	IT	
* <i>Cyperus longus</i> L.	---	He	Pl	
<i>Eleocharis mitracarpa</i> Steud.	---	He	ES	
<i>Eleocharis palustris</i> R.Br. subsp. <i>iranica</i> Kukkonen	---	He	IT	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem & Schult subsp. <i>palustris</i>	---	He	IT, ES, M	
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	پيزر نوک دار	He	Cosm	
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják subsp. <i>australis</i> (Murr.) Soják	پيزر	He	IT	
Datiscaceae				
* <i>Datisca cannabina</i> L.	شه شاهدانه	He	IT, ES	
Dioscoreaceae				
* <i>Tamus communis</i> L.	تميس	Cr	IT, ES	
Elaeagnaceae				
* <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	سنجد	Ph	IT, ES	
Equisetaceae				
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	دم اسب صحرائي	Cr	Pl	
Euphorbiaceae				
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) A.Juss.	رنگينك	Th	Pl	
<i>Euphorbia aleppica</i> L.	فرفيون سورى	Th	IT, M	
** <i>Euphorbia cheiradenia</i> Boiss. & Hohen.	فرفيون خوشاهي	He	IT	
<i>Euphorbia condylocarpa</i> M. Bieb.	فرفيون ساقه آغوش	He	IT, ES	
<i>Euphorbia denticulata</i> Lam.	فرفيون دندانه دار	He	IT	
<i>Euphorbia macrocarpa</i> Boiss. & Buhse.	رامسرى فرفيون	He	IT	
Fabaceae				
* <i>Alhagi persarum</i> Boiss. & Buhse	ترنجبين	He	IT	
** <i>Astragalus carduchorum</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss	گون	Ch	IT	VU
** <i>Astragalus caryolobus</i> Bunge	"	He	IT	
** <i>Astragalus cyclophyllon</i> Beck	"	He	IT	VU
** <i>Astragalus hymenocalyx</i> Boiss.	"	He	IT	LR
<i>Astragalus michauxianus</i> Boiss.	"	He	IT	
** <i>Astragalus piranshahricus</i> Maassoumi & Podlech	"	He	IT	VU

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
** <i>Astragalus tortuosus</i> DC.	"	He	IT	
<i>Coronilla scorpioides</i> W. D. J. Koch	یونجه باغی عقری	Th	IT, ES, SS	
<i>Coronilla varia</i> L.	یونجه باغی	He	IT, ES	
* <i>Lathyrus aphaca</i> L.	خلر بی برگ	Th	IT, ES	
<i>Lathyrus cicera</i> L.	خلر نخودی	Th	Pl	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	خلر کرکی	Th	ES	VU
<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.	خلر راست	Th	IT, ES	
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	خلر چمنی	Th	IT, ES, M	DD
* <i>Lathyrus sativus</i> L.	خلر	Th	IT, ES, M	
<i>Lathyrus vinealis</i> Boiss. & Noe	خلر تاکستانی	Th	IT	LR
* <i>Lens culinaris</i> Medik.	عدس	Th	IT	
* <i>Lotus corniculatus</i> L.	یونجه پاکلاغی	He	Pl	
<i>Lotus gebelia</i> Vent.	یونجه زرد	He	IT	
<i>Medicago lupulina</i> L.	یونجه سیاه	He	IT, ES	
<i>Medicago polymorpha</i> L.	یونجه خاردار	Th	IT, ES, M	
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	یونجه سخت	Th	IT, ES	LR
* <i>Medicago sativa</i> L.	یونجه	He	Pl	
* <i>Melilotus officinalis</i> Pall.	اکلیل الملک	He	Pl	
<i>Onobrychis megataphros</i> Boiss.	اسپرس سوری	He	IT, M	DD
* <i>Ononis leiosperma</i> Boiss.	خار خر	He	IT	
* <i>Pisum sativum</i> L.	نخود فرنگی	Th	IT	
<i>Trifolium arvense</i> L.	شبدر خودرویی	Th	IT, ES	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	شبدر زرد	Th	M	
<i>Trifolium dasyurum</i> C. Presl	شبدر طناز	Th	IT, ES, M	
<i>Trifolium hybridum</i> L.	شبدر دورگ	He	M	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	—	Th	ES	UV
<i>Trifolium pilulare</i> Boiss.	شبدر توپی	Th	IT	LR
* <i>Trifolium pratense</i> L.	شبدر قرمز	He	IT, ES, M	
<i>Trifolium purpureum</i> Loisel.	شبدر ارغوانی	Th	Pl	
<i>Trifolium repens</i> L.	شبدر سفید	He	Pl	
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	شبدر	Th	IT, ES, M	
<i>Trigonella crassipes</i> Boiss.	شنبلیله ساقه ضخیم	Th	IT	DD
<i>Trigonella monantha</i> C. A. Mey..	شنبلیله تک گل	Th	IT	
<i>Vicia assyriaca</i> Boiss.	ماشک مریوانی	Th	IT	LR
<i>Vicia cracca</i> L.	ماشک کلاغی	He	IT, ES	
<i>Vicia michauxii</i> Spreng.	ماشک سوری	Th	IT	
<i>Vicia mollis</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	ماشک نرم	Th	IT	LR

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافيايي	وضعيت حفاظت
<i>Vicia narbonensis</i> L.	ماشك برگ پهن	Th	IT, M	
<i>Vicia sativa</i> L.	ماشك	Th	Pl	
<i>Vicia variabilis</i> Freyn & Sint. ex Freyn	ماشك متوع	He	IT	
Fagaceae				
<i>Quercus brantii</i> Lindl.	بلوط ايراني	Ph	IT	
* <i>Quercus infectoria</i> Oliv.	دارمازو	Ph	IT	
* <i>Quercus libani</i> Oliv.	يول	Ph	IT	
Gentianaceae				
* <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	قطوريون زيبا	Th	IT, ES	
<i>Gentiana olivieri</i> Griseb.	گل سپاس	Cr	IT	
Geraniaceae				
* <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L Her. ex Aiton	نوک لکلکي دراز	Th	IT	
<i>Geranium dissectum</i> L.	سوزن چوپان پاره پاره	Th	IT, ES	
* <i>Geranium robertianum</i> L.	سوزن چوپان قرمز	Th	IT	
* <i>Geranium rotundifolium</i> L.	سوزن چوپان برگ دايره اي	Th	IT, ES, M	
<i>Geranium tuberosum</i> L.	سوزن چوپان غده دار	Cr	IT	
Haloragaceae				
* <i>Myriophyllum spicatum</i> L	پرطاوسی سنبله اي	Cr	Cosm	
Hydrocharitaceae				
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	تحت قورباخه	Cr	ES, M	
<i>Najas marina</i> L.	تيزك	Th	Cosm	
Hypericaceae (Guttiferae)				
* <i>Hypericum perforatum</i> L.	گل راعي	He	Pl	
<i>Hypericum scabrum</i> L.	گل راعي ديهمي	He	IT	
<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	گل راعي فردار	Ch	IT, M	
Iridaceae				
<i>Crocus biflorus</i> Mill.	زعفران دو گل	Cr	IT-ES	
<i>Crocus pallasii</i> Goldb. subsp. <i>haussknechtii</i> (Boiss. & Reut. ex Maw) B.Mathew	---	Cr	IT	
<i>Gladiolus atroviolaceus</i> Boiss.	گلابiol سياه	Cr	IT, M	
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	گلابiol ايتاليبي	Cr	IT, ES, M	
<i>Gladiolus kotschyuanus</i> Boiss.	گلابiol چمن زار	Cr	IT	
<i>Gynandriris sisyrinchium</i> Parl.	زنبق سا	Cr	IT, ES	
** <i>Iris reticulata</i> M.Bieb.	زنبق مشبك	Cr	IT	
Ixioliriaceae				
<i>Ixiolirion tataricum</i> Schult.f.	خيار ك	Cr	IT, ES, M	
Juglandaceae				
* <i>Juglans regia</i> L.	گردو	Ph	Pl	
Juncaceae				
<i>Juncus bufonius</i> L.	سازوی وزغی	Th	Cosm	

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
<i>Juncus inflexus</i> L.	سازوی شلاقی	He	IT, ES	
Lamiaceae				
* <i>Acinos graveolens</i> Link	آویشنک	Th	IT, ES, M	
**، * <i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>kurdica</i> P. H. Davis	فراسیون آسای کردی	He	IT, ES	
* <i>Clinopodium vulgare</i> L.	ربانک	He	IT, ES	
<i>Eremostachys labiosiformis</i> (Popov) Knorring	سنبل بیابانی ترکمنستانی	He	IT	
<i>Eremostachys laevigata</i> Bunge	سنبل بیابانی رفیع	He	IT	
<i>Lalemantia peltata</i> (L.) Fisch. & C. A. Mey.	---	Th	IT	
* <i>Lamium album</i> L.	گزنه سفید	He	IT, ES	
* <i>Lamium amplexicaule</i> L.	گزنه سای ساقه آغوش	Th	ES	
* <i>Lycopus europaeus</i> L.	فراسیون آبی	Cr	Pl	
<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq.	فراسیون کوهستانی	He	IT, ES, SS	
<i>Marrubium cuneatum</i> [Soland.]	فراسیون حلبي	He	IT, ES, M	
* <i>Melissa officinalis</i> L.	وارنگک یو	He	IT	
* <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds	پونه	He	Pl	
** <i>Micromeria persica</i> Boiss.	گل ریز ایرانی	He	IT	
* <i>Nepeta cataria</i> L.	پونه سای گربه‌ای	He	IT, ES, SS	
<i>Nepeta macrosiphon</i> Boiss.	پونه سای لوله بلند	He	IT	
<i>Nepeta petraea</i> Benth.	---	Th	IT	
* <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>gracile</i> (K. Koch) Letsw.	بخارایی مرزنگوش	Ch	IT, ES	
<i>Phlomis anisodonta</i> Boiss.	گوشبره کوهستانی	He	IT, ES	
<i>Phlomis herba -venti</i> L. subsp <i>pungens</i> (Willd.) Maire ex DeFillipps	گوشبره بنفش نیش دار	He	IT	
<i>Phlomis lanceolata</i> Boiss.	گوشبره سرنبزه‌ای	He	IT	
<i>Phlomis Olivieri</i> Benth.	گوشبره	He	IT	
* <i>Prunella vulgaris</i> L.	نعماع چمنی	He	IT, ES	
* <i>Salvia aethiopsis</i> L.	مریم گلی پشممالو	He	IT	
<i>Salvia bracteata</i> Banks & Sol.	مریم گلی برگ‌دادار	He	IT, M	
<i>Salvia indica</i> L.	مریم گلی هندی	He	IT, M	
<i>Salvia nemorosa</i> L.	مریم گلی مزرعه روی	He	IT, ES	
<i>Salvia palaestina</i> Benth.	مریم گلی فلسطینی	He	IT, M, SS	
** <i>Salvia reuteriana</i> Boiss	مریم گلی اصفهانی	He	IT, ES, SS	
<i>Salvia verticillata</i> L.	مریم گلی بنفش	He	IT, ES, SS	
<i>Scutellaria condensata</i> Rech. f.	بسقابی سفید	He	IT	
* <i>Scutellaria galericulata</i> L.	بسقابی معمولی	He	Pl	
* <i>Scutellaria pinnatifida</i> A. Ham. subsp. <i>pichleri</i> (Stapf) Rech. f.	بسقابی سنبله‌ای همدانی	He	IT	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافياي	وضعيت حفاظت
<i>Stachys annua</i> L.	سبله‌اي	He	IT, ES	
<i>Stachys spectabilis</i> Choisy ex. DC.	سبله‌اي تماشاي	He	IT, ES	
* <i>Teucrium polium</i> L.	مريم نخودي همداني	He	IT, M	
* <i>Teucrium scordioides</i> Schreb.	مريم نخودي باتلاقى	He	ES	
* <i>Thymus transcaucasicus</i> Ronniger	آوشن تقليسي	He	IT, ES	
<i>Ziziphora capitata</i> L.	كاكتوي سرسان شرقى	Th	IT	
Lentibulariaceae				
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	پشه‌گير	Th	ES	
Liliaceae				
<i>Fritillaria straussii</i> Bornm.	لله واژگون	Cr	IT	
* <i>Fritillaria imperialis</i> L.	لله واژگون	Cr	IT	
<i>Gagea gageoides</i> (Zucc.) Vved.	نجم طلابي معمولي	Cr	IT	
<i>Gagea reticulata</i> Schult.f.	نجم طلابي مشبك	Cr	IT	
<i>Ornithogalum cuspidatum</i> Bertol	شيرمنغ نيشدار	Cr	IT	
<i>Ornithogalum oligophyllum</i> E. D. Clarke	شيرمنغ کمبرگ	Cr	IT, M	
<i>Ornithogalum orthophyllum</i> Ten.	شيرمنغ برگ راست	Cr	IT, M	
** <i>Tulipa systola</i> Stapf	لله آتشين	Cr	IT	
Loranthaceae				
* <i>Loranthus europaeus</i> Jacq.	موخور	Ph	IT, ES	
Lythraceae				
<i>Ammannia verticillata</i> Lam.	---	Th	Pl	
* <i>Lythrum salicaria</i> L.	---	He	Cosm	
<i>Lythrum trbracteatum</i> Salzm. ex Sprengel	خونقام فرانسوی	Th	Pl	DD
Malvaceae				
* <i>Alcea kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	ختمي كردي	He	IT, ES, M	
* <i>Althaea officinalis</i> L.	ختمي	He	Pl	LR
* <i>Hibiscus trionum</i> L.	گل يك ساعته	Th	Pl	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	پنيرك معمولي	He	Pl	
* <i>Malva sylvestris</i> L.	پنيرك قرمز	Th	IT	
Moraceae				
* <i>Ficus carica</i> L.	انجير خوراکي	Th	IT, ES, M	
<i>Ficus rupestris</i> (Hausskn. ex Boiss.) Azizian	---	Th	IT	
* <i>Morus alba</i> L.	توت سفيد	Th	IT, ES, SS	
Nymphaeace				
* <i>Nymphaea alba</i> L.	نيلوفر آبي سفيد	He	Pl	
Oleaceae				
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.subsp. <i>syriaca</i> (Boiss.) Yalt.	زبان گنجشک	Ph	IT	
Onagraceae				
* <i>Epilobium hirsutum</i> L.	يد علفي كركي	He	IT, ES, M	

تاسون	اسم فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
<i>Epilobium roseum</i> Schreb. subsp. <i>subsessile</i> (Boiss.) P.H.Raven	بید علفی قرمز	Cr	IT, ES	
Orchidaceae				
<i>Cephalanthera kurdica</i> Bornm. & Kraenzl.	گلسر کردی	Cr	IT, M	LR
<i>Comperia comperiana</i> (Steven) Asch. & Graebn.	سه لوبي	Cr	IT	LR
<i>Dactylorhiza umbrosa</i> (Kar. & Kir.) Neveski var. <i>longibracteata</i> Renz.	غده انگشتی باللاقی	Cr	ES	VU
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	خربقی	Cr	ES	
<i>Epipactis palustris</i> Crantz	خربقی باللاقی	Cr	ES	DD
<i>Himantoglossum affine</i> Schlechter.	زبان دراز	Cr	IT, ES, M	
** <i>Ophrys kurdistanica</i> Renz	ابرویی کردستانی	Cr	ES	VU
* <i>Orchis mascula</i> (L.) L.	ثلب نر	Cr	ES	VU
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	ثلب باللاقی	Cr	ES	VU
Orobanchaceae				
<i>Orobanche aegyptiaca</i> Pers.	گونه‌ای گل جالیز	Th	ES	
<i>Parentucellia flaviflora</i> (Boiss.) Nevski	---	Th	Pl	
<i>Phelipanche schultzii</i> Pomel	گونه‌ای گل جالیز	Th	ES, M	
<i>Rhynchocorys elephas</i> (L.) Griseb.	سرفیلی	He	IT	
Oxalidaceae				
* <i>Oxalis corniculata</i> L.	شبدر ترشک	Th	IT, ES, M	
Papaveraceae				
<i>Coronopus squamatus</i> Asch.	ترتیز ک خوک	Th	ES	
<i>Corydalis integra</i> Barbey & Major	---	Cr	IT, ES	
** <i>Corydalis verticillaris</i> DC.	بهار ک فراهم	Cr	IT	
* <i>Fumaria asepala</i> Boiss.	شاهتره	Th	IT	
* <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	شاهتره	Th	Cosm	LR
* <i>Papaver argemone</i> L.	خشخاش کمرنگ	Th	IT, ES	
<i>Papaver dubium</i> L.	خشخاش هرز	Th	IT, ES, M	
<i>Papaver fugax</i> Poiret	خشخاش ریزان	He	IT	
<i>Papaver glaucum</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	خشخاش ترکیه‌ای	Th	IT, M, SS	
<i>Papaver macrostomum</i> Boiss. & A.Huet	خشخاش پرچم درشت	Th	IT, ES, SS	
Plantaginaceae				
<i>Chaenorhinum calycinum</i> (Banks & Sol.) P.H.Davis	---	Th	IT, M	
* <i>Plantago lanceolata</i> L.	بارهنگ سرنیزه‌ای	He	IT, ES, M	
* <i>Plantago major</i> L.	بارهنگ	He	Cosm	
* <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	سیزاب ایرانی	He	Cosm	
<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	سیزاب آناغالیسی	Th	Pl	
<i>Veronica bozakmanii</i> M. A. Fisch.	سیزاب آناتولی	Th	IT	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافيايي	وضعيت حفاظت
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	سيزاب كرندي	Th	IT, ES, M	
<i>Veronica macrostachya</i> Vahl subsp. <i>schizostegia</i> (Bornm.) M. A. Fisch.	سيزاب دلاهوي	He	IT	
<i>Veronica orientalis</i> Mill.	سيزاب شرقى	He	IT, ES	
<i>Veronica persica</i> Poir.	سيزاب	Th	IT, ES	
Plumbaginaceae				
** <i>Acantholimon wendelboi</i> Rech. f. & Schiman-Czeika	كلاه ميرحسن خوانسارى	Ch	IT	DD
Poaceae (Gramineae)				
<i>Aegilops triuncialis</i> L.	گندم نيار سهلايه	Th	IT, M	
<i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv	چمن گندمی ميانى	Cr	ES, M	
<i>Alopecurus australis</i> Ovcz.	دم روپاهي کوهسرى	He	IT	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	دم روپاهي موشى	Th	Pl	
* <i>Arundo donax</i> L.	قمبش	He	Pl	
<i>Avena eriantha</i> Durieu	يولاف پشمالي	Th	IT, Es	
<i>Avena fatua</i> L	يولاف پوج	Th	IT	
<i>Avena ludoviciana</i> Durieu	يولاف ايراني	Th	IT, M	
<i>Boissiera squarrosa</i> (Banks & Sol.) Eig	----	Th	Pl	
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	جارو پنجه اي	He	IT, ES, M	
<i>Briza minor</i> L.	لرزان چمن	Th	ES,M	
<i>Bromus danthoniae</i> Trin. ex C.A.Mey.	جارو علفي هرز	Th	IT	
<i>Bromus lanceolatus</i> Roth	جارو علفي سر نيزه اي	Th	Pl	
<i>Bromus scoparius</i> L.	جارو علفي بي برگ	Th	Pl	
<i>Bromus sterilis</i> L.	جارو علفي نازا	Th	IT, M	
<i>Bromus tectorum</i> L.	جارو علفي بامي	Th	Cosm	
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler	علف نى	He	ES	
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	علف جويبار	He	Pl	
<i>Crypsis alopecuroides</i> Guss. ex Schult.	نهان سنبل دشتى	Th	Pl	
* <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	مرغ	He	Pl	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	علف باغ	He	Pl	
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	سوروف برنجى	Th	Pl	
<i>Eremopya persica</i> (Trin.) Roshev.	----	Th	IT, M	
<i>Glyceria plicata</i> Fr.	شكريين چين دار	He	IT, ES	
<i>Heteranthelium piliferum</i> Hochst. ex Jaub. & Spach	دگر گل گندمی	Th	IT, M, SS	
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	جو پيازدار	Cr	IT, M	
<i>Hordeum geniculatum</i> All.	جو زانودار	Th	Cosm	
<i>Hordeum leporinum</i> Link	جو موشك	Th	Cosm	
<i>Hordeum marinum</i> Huds	جو ساحلى	Th	Pl	

وضعیت حافظت	پراکنش جغرافیایی	شکل زیستی	اسم فارسی	قاکسون
	Pl	He	چچم پایدار	<i>Lolium perenne</i> L.
	Pl	Th	دم رو باهک	<i>Lophochloa phleoides</i> (Vill.) Rchb.
	IT, M	Th	ارزنک آسیای صغیر	<i>Milium pedicellare</i> (Bornm.) Roshev. ex Melderis
	Cosm	Th	ارزنک بهاره	<i>Milium vernale</i> M. Bieb.
	IT, ES, M	Th	دم گربه‌ای انگلکیسی	<i>Phleum ciliatum</i> Pourr.
	Cosm	Cr	نی	* <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud. var. <i>stenocephalus</i> (Boiss.) Jain & Doli Das
	IT, ES, M	He	چمن پیازک‌دار	<i>Poa bulbosa</i> L.
	IT, M	He	چمن مرتعی	<i>Poa pratensis</i> L. (GCI)
	Pl	He	چمن معمولی	<i>Poa trivialis</i> L.
	Cosm	Th	شاو دم	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.
	IT	He	ریش سنبل	<i>Psathyrostachys fragilis</i> (Boiss.) Nevski
	IT, ES, M	Th	---	<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P. Beauv.
	IT	He	چایر	* <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
	IT	Th	گیسو چمن	<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski
	Cosm	Th	دم رو باهک	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel
	IT, M	Th	دم رو باهک جندقی	<i>Vulpia persica</i> (Boiss. & Buhse) V.I.Krecz. & Bobr.
	IT	Th	موین چمن	<i>Zingeria trichopoda</i> (Boiss.) P. Smirn.
Polygonaceae				
	IT	He	هفت‌بند کوهستانی	<i>Polygonum alpestre</i> C. A. Mey.
	Cosm	Th	هفت‌بند دوزیست	* <i>Polygonum amphibium</i> L.
	IT	Th	علف هفت‌بند	* <i>Polygonum aviculare</i> L.
	Cosm	Th	---	<i>Polygopon monspeliensis</i> (L.) Desf.
	IT, ES	Cr	هفت‌بند هلوبی	* <i>Polygonum persicaria</i> L.
	IT	Cr	ریواس	* <i>Rheum ribes</i> L.
	Cosm	He	ترشک مواج	* <i>Rumex crispus</i> L.
	IT, ES	Cr	ترشک غده‌دار	<i>Rumex tuberosus</i> L.
Portulacaceae				
	Cosm	Th	خرفه	* <i>Portulaca oleracea</i> L.
Primulaceae				
	Cosm	Th	آناغالیس	* <i>Anagallis arvensis</i> L.
	Pl	He	علف بیدی	* <i>Lysimachia vulgaris</i> L.
	VU			
Ranunculaceae				
	IT, ES, M	Th	چشم خروس تابستانه	* <i>Adonis aestivalis</i> L.
	Pl	Th	چشم خروس آتشین	* <i>Adonis flammea</i> Jacq.
	IT	Cr	آنمون	<i>Anemone biflora</i> DC.
	IT, M	Cr	آنمون تاجدار	<i>Anemone coronaria</i> L.

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش	وضعيت جغرافيايي	حظايت
<i>Batrachium sphaerospermum</i> (Boiss. & C.I.Blanche) Iranshahr	آلله آبي	He	IT, ES		
<i>Ceratocephala falcatus</i> (L.) Pers.	گل آفتاب رو	Th	IT, ES, M		
<i>Consolida oliveriana</i> (DC.) Schrödinger	زبان درقای بغدادی	Th	IT		
** <i>Delphinium lanigerum</i> Boiss.	زبان پس قنای پشمalo	He	IT		DD
<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	گل بهار	Cr	IT, ES		
* <i>Ficaria kochii</i> (Ledeb.) Iranshahr & Rech. f.	---	Cr	IT		
* <i>Ranunculus arvensis</i> L.	آلله	Th	IT, ES, M		
<i>Ranunculus asiaticus</i> L.	آلله قرمز	He	IT, M		
<i>Ranunculus aucheri</i> Bioss.	آلله اصفهاني	Cr	IT		
<i>Ranunculus constantinopolitanus</i> d'Urv.	آلله پشمalo	He	ES, IT		
* <i>Ranunculus muricatus</i> L.	آلله سنگ پاي	Th	IT, ES		
<i>Ranunculus oxyspermus</i> Willd.	آلله دانه ريز	He	IT, M		
* <i>Ranunculus repens</i> L.	آلله رونده	Cr	IT, ES, M		
<i>Ranunculus sericeus</i> Banks & Sol	آلله	Th	IT		
Rosaceae					
* <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	غافت	He	IT, ES		
<i>Amygdalus carduchorum</i> Bornm.	بادام رواندزي	Ph	IT		LR
* <i>Amygdalus communis</i> L.	بادام تلخ، بادام شيرين	Ph	IT		
* <i>Cerasus mahaleb</i> Mill.	محلب	Ph	ES		
<i>Cerasus microcarpa</i> Boiss.	آبلالوي دانه ريز	Ph	ES		
<i>Cerasus pseudoprostrata</i> Pojark.	آبلالوي پاکوتاه	Ph	IT		
<i>Cotoneaster nummularius</i> Fisch. & C.A.Mey.	شير خشت	Ph	IT		
<i>Crataegus aronia</i> (Willd.) Bosc	زالزالك زرد	Ph	IT		
<i>Crataegus pseudoheterophylla</i> Pojark.	زالزالك ايرواني	Ph	IT		
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	به جنگلی	Ph	ES		
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	علف مبارك سايه پسند	He	IT, ES		
* <i>Geum urbanum</i> L.	علف مبارك	He	IT, ES		
<i>Potentilla kurdica</i> Boiss. & Hohen.	بنجه برگ کردي	He	IT		
<i>Potentilla pannosa</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	بنجه برگ نمدي	He	IT		
* <i>Potentilla reptans</i> L.	بنجه برگ رونده	He	IT, ES		
<i>Pyrus syriaca</i> Boiss.	امروز	Ph	IT, ES, M		
* <i>Rosa canina</i> L.	نسترن وحشى	Ph	IT, ES, M		
* <i>Rosa damascena</i> Mill.	گل محمدى	Ph	Cosm		
* <i>Rosa foetida</i> Herrm.	نسترن زرد	Ph	IT, M		
* <i>Rubus caesius</i> L.	تمشك كبود	Ch	IT, ES		

تاسیسات	نام فارسی	شکل زیستی	پراکنش جغرافیایی	وضعیت حفاظت
<i>Rubus sanctus</i> Schreb.	تمشک	Ph	IT, ES	
* <i>Sanguisorba lasiocarpa</i> Hand.-Mazz.	توت روباهی بهبهانی	He	IT, ES, M	
<i>Sorbus persica</i> Hedl.	بارانک ایرانی	Ph	IT	
Rubiaceae				
<i>Asperula arvensis</i> L.	زبرینه رایج	Th	IT, ES, M	
<i>Callipeltis cucullaria</i> (L.) DC.	زیبا سپر	Th	IT, M	
<i>Crucianella gilanica</i> Trin. subsp. <i>carduchorum</i> Ehrend. & Schönb.-Tem.	صلیبیک	He	IT	
<i>Cruciata taurica</i> (Pall.) Ehrend. subsp. <i>persica</i> (DC.) Ehrend.	صلیبی کوهستانی	Ch	IT, M	
* <i>Galium aparine</i> L.	بی‌تی راخ	Th	IT, ES, M	
<i>Galium mite</i> Boiss. & Hohen.	شیر پنیر	He	IT	
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	شیر پنیر سه‌شاخی	Th	IT, ES, SS	
* <i>Galium verum</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> Ehrend.	شیر پنیر	He	Pl	
Rutaceae				
<i>Haplophyllum acutifolium</i> G. Don	سدابی	He	IT, ES	
Salicaceae				
* <i>Populus alba</i> L.	سپیدار	Ph	Pl	
<i>Populus euphratica</i> Oliv.	پدہ	Ph	Pl	
* <i>Salix alba</i> L.	بید سفید	Ph	IT, ES	
* <i>Salix triandra</i> L.	بید بادامی	Ph	IT, ES	
Santalaceae				
* <i>Viscum album</i> L.	دارواش	Ph	IT, ES	
Scrophulariaceae				
<i>Scrophularia amplexicaulis</i> Benth.	گل میمونی ساقه‌آغوش	He	IT, ES	
<i>Scrophularia crenophila</i> Boiss.	گل میمونی بهاردوست	He	IT	
** <i>Scrophularia nervosa</i> Benth.	گل میمونی رگه‌دار	He	IT	
<i>Scrophularia orientalis</i> L.	گل میمونی شرقی	He	IT, Es	DD
<i>Scrophularia pruinosa</i> Boiss.	گل میمونی مومنی	He	IT, ES	
* <i>Scrophularia striata</i> Boiss.	گل میمونی سازویی	He	IT	
<i>Verbascum alceoides</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.	گل ماہور ختمی سا	He	IT	
** <i>Verbascum pseudodigitalis</i> Nábělek	گل ماہور گل انگشتانه‌ای	He	IT	
<i>Verbascum sinuatum</i> L.	گل ماہور مواج	He	IT, ES	
* <i>Verbascum songaricum</i> Schrenk	گل ماہور خراسانی	He	IT	
Solanaceae				
** <i>Hyoscyamus arachnoideus</i> Pojark.	بذرالبنج تارعنکبوتنی	Th	IT	
<i>Hyoscyamus kurdicus</i> Bornm.	بذرالبنج کردی	He	IT, ES	

تاكسون	اسم فارسي	شكل زينتي	پراکنش جغرافياي	وضعيت حفاظت
* <i>Solanum nigrum</i> L.	تاج ريزى	Th	Cosm	
Tamaricaceae				
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	گز پرشاخه	Ph	Pl	
Thelypteridaceae				
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	سرخس یاتلاقى	Cr	ES	
Typhaceae				
<i>Typha angustifolia</i> L.	لوبي	He	Cosm	
* <i>Typha latifolia</i> L.	تونك	Cr	Pl	
<i>Sparganium erectum</i> L.	نی توبى	Cr	IT	
<i>Sparganium neglectum</i> Beeby.	نی خاردار	Cr	IT, ES	
Ulmaceae				
* <i>Ulmus minor</i> Mill.	اوجا	Ph	IT, ES	
Urticaceae				
* <i>Urtica dioica</i> L.	گزنه دوپایه	He	IT, M	
Verbenaceae				
* <i>Verbena officinalis</i> L.	شاهپسند	He	Pl	
Violaceae				
* <i>Viola odorata</i> L.	بنفسه معطر	Cr	IT, ES	LR
Zygophyllaceae				
* <i>Tribulus terrestris</i> L.	خارخشک	He	Cosm	