

بررسی اثر کوتاه‌مدت خاک‌ورزی و کاربرد کود گاوی بر روی جمعیت جانوران خاک تحت کشت ذرت

جبار مرادی^{*}، حسینعلی بهرامی، محمد حسین سدری و حسین بشارتی

دانشآموخته کارشناسی ارشد خاک‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ Moradi.jabbar@yahoo.com

دانشیار گروه خاک‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ Bahramih@modares.ac.ir

مربي پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان؛ Sdri_mh@yahoo.com

دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب؛ besharati1350@yahoo.com

چکیده

خاک‌ورزی از مهمترین اجزاء سیستم‌های مدیریت خاک در راستای کشاورزی پایدار محسوب می‌شود که جمعیت و تنوع جانداران خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین علت اطلاع داشتن از اثرات کوتاه و دراز مدت خاک‌ورزی بر روی جانداران خاک به انتخاب سیستم‌های مناسب‌تر مدیریتی کمک می‌کند. در این راستا آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی گریزه واقع در سنتنگ از فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور همان سال به اجرا درآمد و اثرات سه سیستم خاک-ورزی (ستنی (CT)، حداقل (MT) و بی‌خاک‌ورزی (NT)، سه سطح کود گاوی (۰ و ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار) طی سه دوره نمونه‌برداری روی تغییرات جمعیتی کرم‌های خاکی (نماینده گروه ماکروفون)، گنه‌ها و پادمان (نماینده گان گروه مزوفون)، و نماتدها (نماینده گروه میکروفون) خاک مورد بررسی قرار گرفتند. وزن مخصوص ظاهری خاک در همان نقاط نمونه‌برداری از کرم‌های خاکی، گنه‌ها و پادمان، و نماتدها اندازه گیری شد. گیاه مورد استفاده برای کشت رقم ذرت SC704 بود. در کوتاه‌مدت تفاوت معنی‌داری بین اثر تیمارها بر روی وزن مخصوص ظاهری در خاکی با بافت لوم شنی مشاهده نشد. خاک‌ورزی بر روی جمعیت گروه‌های میکروفون و مزو فون تأثیر معنی‌داری نداشت اما بر روی جمعیت ماکروفون (کرم خاکی) اثر معنی‌دار آن مشاهده شد. از طرفی بین خاک‌ورزی و سیستم بی‌خاک‌ورزی تفاوت معنی‌داری در زیستوده ذرت وجود داشت اما بین خاک‌ورزی سنتی و خاک‌ورزی حداقل تفاوت معنی‌دار نبود. کود گاوی اثر معنی‌دار مثبتی بر جمعیت نماتدهای خاک و زیستوده ذرت داشت. به طور کلی با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که سیستم مدیریتی خاک‌ورزی حداقل و کاربرد حداقل ۴۰ تن بر هکتار کود گاوی از جنبه‌های زراعی و بیولوژی در شرایط اقلیمی و خاکی مشابه، مطلوب هستند.

واژه‌های کلیدی: کرم‌خاکی، گنه‌ها و پادمان، نماتدها، خاک‌ورزی و کود گاوی

مقدمه

آفت کش، کودهای آلی و سایر افزودنی‌ها به خاک، از خاک‌ورزی کمک گرفته می‌شود. اگر شرایط بهینه خاک این گونه توصیف شود که هوا، آب و عناصر غذائی کافی در دسترس ریشه گیاه باشد، خاک‌ورزی چنین شرایطی را

مدیریت خاک از اجزاء اصلی کشاورزی پایدار و خاک‌ورزی از ضروری‌ترین بخش‌های این مدیریت محسوب می‌شود. قرن‌هاست که جهت تأمین بستر مناسب بذر، کتلر علف‌های هرز و آمیختن کود،

^{*} نویسنده مسئول، آدرس: سنتنگ، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه نریمان، پلاک ۱۵، کد پستی ۶۴۵۷۳-۶۶۱۴۸

* دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۹ و پذیرش: خرداد ۱۳۹۰

بقاوی گیاهی در سطح و یا نزدیک سطح خاک بعد از خاکورزی حفاظتی سبب تبخیر و تعرق کمتر و نگهداری بیشتر آب در لایه بالائی (۱۰-۰ سانتی متری) خاک می شود (ارشد و همکاران، ۱۹۹۹؛ مصدقی و همکاران، ۲۰۰۸؛ کاوالیری و همکاران، ۲۰۰۸؛ سو و همکاران، ۲۰۰۸؛ شارات و همکاران، ۲۰۰۶a و ۲۰۰۶b^۵).

تحقیقات متعددی بر این نکته تأکید کرده‌اند که فرایش کمتری در مزارع با خاکورزی حداقل، مشاهده شده است. بقاوی گیاهی و شخم بدون برگ‌داندن خاک، سطح خاک را در مقابل فرایش ذرات و کاهش حاصل-خیزی حفاظت می‌کنند (دهان و همکاران، ۲۰۰۸؛ راسموسن، ۱۹۹۹)^۶.

برخی تحقیقات نشان داده است که بی خاکورزی می‌تواند منجر به تراکم بیشتر خاک شود که می‌تواند اثرات مخربی روی ساختمان خاک و سطح محصول گیاهان زراعی داشته باشد (کاوالیری و همکاران، ۲۰۰۸). اگرچه بعضی دیگر دریافت‌هاند که تیمارهای خاک-ورزی سطح محصول گیاهان زراعی مورد مطالعه‌شان را به صورت معنی‌دار تحت تأثیر قرار نداده است (مارتینز و همکاران، ۲۰۰۸؛ شیرانی و همکاران، ۲۰۰۲؛ گومز و همکاران، ۱۹۹۹؛ ووگلر و همکاران، ۲۰۰۸)^۷.

تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک در حین و بعد از خاکورزی امری بدینه است زیرا تغییر در وزن مخصوص ظاهری، آب خاک و میزان ماده آلی خاک به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجودات خاک‌زی را تحت تأثیر قرار داده و همان طور که در همه متون امرتبه با بیولوژی خاک تأکید شده است به دلیل اینکه موجودات خاک‌زی^۸ در چرخه عناصر و تجزیه مواد آلی دارای نقشی بسیار کلیدی هستند، تغییرات جمعیتی و تغییرات ترکیب جمعیتی آنها در اثر خاکورزی اگر به صورت نامطلوب روی دهد بر کارکردهای^۹ خاک (همانند چرخه عناصر، تجزیه مواد آلی و غیره) اثر نامطلوبی می‌گذارد. از طرفی براساس جنبه‌های اقتصادی و اکولوژیکی موجود در کشاورزی پایدار به نظر می‌رسد که بررسی سیستم‌های خاکورزی امری ضروری است (حسنجاک و همکاران، ۲۰۰۲)^{۱۰}. پاسخ به این پرسش که

فراهم می‌آورد. این عامل خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک را متأثر نموده و نهایتاً منجر به رشد بهینه گیاه می‌شود. کاربرد افزودنی‌های آلی (کودهای سبز، بقاوی گیاهی، کودهای دائمی و غیره) بر خصوصیات خاک (همچون حاصلخیزی و یا پایداری خاکدانه‌ها و غیره) تأثیرگذار می‌باشد.

تفاوت آشکار وزن مخصوص ظاهری در بین سیستم‌های خاکورزی سنتی و بی خاکورزی و یا خاک-ورزی‌های حفاظتی (خاکورزی‌هایی با حداقل شخم و افزایش بقاوی گیاهی در سطح خاک) مovid این نکته است که در سیستم‌های خاکورزی حفاظتی یا بی خاکورزی وزن مخصوص ظاهری در عمق بین ۰ تا ۳۰ سانتی‌متری بیشتر از خاکورزی سنتی بوده و بیشتر از عمق ذکر شده تفاوت معنی‌داری بین آنها مشاهده نشده است (دهان و همکاران، ۲۰۰۸؛ الدر و لال، ۲۰۰۸؛ گی و واندنبیگارت، ۲۰۰۶؛ سینگ و مالھی، ۲۰۰۶؛ مکوی و همکاران، ۲۰۰۲؛ ۲۰۰۶^۱). بعضی تحقیقات نشان داده است که در کوتاه-مدت، تقریباً تفاوتی بین خاکورزی‌های سنتی و حفاظتی وجود ندارد (مانیارد، ۲۰۰۷؛ شیرانی و همکاران، ۲۰۰۲؛ ووگلر و همکاران، ۲۰۰۸؛ مارتینز و همکاران، ۲۰۰۸^۲). علاوه بر آن در برخی تحقیقات بیش از شش سال اثرات خاکورزی مورد بررسی قرار گرفته اما تفاوت معنی‌داری در مورد وزن مخصوص ظاهری در سیستم‌های خاکورزی متفاوت مشاهده نشده است (سو و همکاران، ۲۰۰۸؛ ارشد و همکاران، ۱۹۹۹)^۳ که نکته جالب توجه در این تحقیقات بافت درشت خاک آن سیستم‌ها بوده است. بررسی‌های خو و مرمود^۴ (۲۰۰۱) نشان داد که همه این تغییرات دارای تفاوت‌های معنی‌داری در بعد زمانی می‌باشند و وزن مخصوص ظاهری خاک بعد از اعمال خاکورزی تحت دوره‌های خشک و مرطوب شدن، اثر قطرات باران و فروریختن خاکدانه‌ها (به دلیل افزایش تراکم) تمایل به زیاد شدن دارد.

خاکورزی شدید و متراکم، ماده آلی خاک را کاهش داده و منجر به کاهش حاصل‌خیزی خاک می‌شود. بی خاکورزی و خاکورزی حفاظتی، آب بیشتری را تحت شرایط غیراشباع در خود نگه می‌دارد که دلیل آن درصد حجمی بالاتر خلل و فرج خیلی ریز در این سیستم‌هاست.

^۱. D'Haene *et al.*, 2008; Elder and Lal, 2008; Kay and Vandenberghaag, 2002; Singh and Malhi, 2006; McVay *et al.*, 2006

^۲. Maynard, 2007; Shirani *et al.*, 2002; Vogler *et al.*, 2008; Martinez *et al.*, 2008

^۳. So *et al.*, 2008; Arshad *et al.*, 1999

^۴. Xu & Mermoud, 2001

⁵. Arshad *et al.*, 1999; Mosaddeghi *et al.*, 2008; Cavalieri *et al.*, 2008; So *et al.*, 2008; Sharratt *et al.*, 2006a and b

⁶. D'Haene *et al.*, 2008; Rasmussen, 1999

⁷. Martinez *et al.*, 2008; Shirani *et al.*, 2002; Gómez *et al.*, 1999; Vogler *et al.*, 2008

⁸. soil organisms

⁹. Function

¹⁰. Husnjak *et al.*, 2002

بین ردیف‌ها جهت کنترل علف هرز شخم دوره‌ای انجام می‌شده است. بافت خاک در زمین مورد نظر لومشنی تا ۱۱۵۰ متر مربع بود که به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوك کامل تصادفی سازماندهی و در قالب سه تیمار اصلی، سه تیمار فرعی، سه تکرار و سه دوره نمونه برداری انجام شد. هر پلات فرعی ۲۰ متر مربع مساحت داشت.

تیمارها شامل سه نوع سیستم خاک‌ورزی ستی (شخم برگ‌دان+دیسک)، حداقل (دیسک)، و بی‌خاک-ورزی به عنوان تیمارهای اصلی و سه سطح کود گاوی ۰، ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار به عنوان تیمارهای فرعی بودند. رقم ذرت مورد استفاده در این طرح ذرت SC704 بود.

آماده‌سازی زمین و کاشت گیاه

در اواسط اردیبهشت کود دامی در سطوح مشخص در کرت‌های فرعی که به صورت تصادفی تعیین شده بودند توزیع شد و سپس تیمارهای خاک‌ورزی در پلات‌های اصلی اعمال شد و نهایتاً کشت بذر ذرت علوفه‌ای با فاصله ردیفی ۶۰ سانتی‌متری و بین‌ردیفی ۲۰ سانتی‌متری انجام گرفت.

نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌های زراعی

در هر سه مرحله نمونه‌برداری [قبل از اعمال تیمار (مرحله اول)، یکماه بعد از اعمال تیمار (مرحله دوم) و پس از برداشت محصول (مرحله سوم)] وزن-مخصوص ظاهری و رطوبت خاک در همان نقاط برداشت نمونه‌های بیولوژیکی، اندازه‌گیری شد. در هر کرت فرعی دو محل نمونه‌برداری به صورت تصادفی انتخاب، جمعیت کرم خاکی (به عنوان نماینده ماکروفون خاک) در حجم مکعبی به ابعاد $25*25*25$ سانتی‌متر به روش شمارش دستی انجام گرفته و از همان محل نمونه‌های مرکب لازم جهت استخراج و شمارش کنه و پادمان (به عنوان نماینده مزوфон خاک) به روش قیف برلیز (جهت شمارش تعداد مزوфон، وزن مشخصی از خاک روی قیف برلیز^۵ ریخته می‌شود و پس از حدود ۴ روز، مزوфон‌ها جمع آوری شده در محلول فرمالین 5% شمارش می‌گردد)، و نماتدها (به عنوان نماینده میکروفون خاک) به روش سانتریفیوژ (جهت شمارش نماتدها مقدار مشخصی خاک (۱۰۰ گرم) را در لوله سانتریفیوژ ریخته و پس از افزودن مقداری آب به مدت ۴ دقیقه در rpm ۳۰۰۰ سانتریفیوژ می‌گردد. سپس محلول روئی دور ریخته می‌شود. بر روی رسوب ته لوله سانتریفیوژ محلول ساکارز (1 lb/Lit) ریخته و به مدت ۲ دقیقه در rpm ۳۰۰۰ سانتریفیوژ شده و

این تغییرات چه موقع و بر روی چه بخشی از اکوسیستم خاکی اثرگذار هستند امری ضروری است. همین ضرورت، دانش عمیق‌تر در مورد جانوران خاک، خصوصیات خاک و محیط اطراف آنها را برای تعیین تصمیمات مناسب و بهتر مدیریتی (برای افزایش جمعیت جانوران مطلوب خاک‌زی و یا جلوگیری از کاهش جمعیت و از بین رفتن آنها) ایجاب می‌نماید (چان و بارسیا، ۲۰۰۷).^۱

به طور کلی واکنش جانوران خاک در برابر خاک‌ورزی متفاوت است. خاک‌ورزی می‌تواند جمعیت، تنوع و فعالیت جانوران خاک‌زی را تحت تأثیر قرار دهد (کلادیوکو، ۲۰۰۱).^۲ عموماً تراکم خاک در اثر رفت و آمد ادوات منجر به کاهش تعداد ماکروفون خاک شده و به علاوه مقاومت بالای خاک بعد از تراکم می‌تواند از جایه‌جایی، تغذیه و درنتیجه بقای ماکروفون جلوگیری به عمل آورد. تنوع و ترکیب جانوران خاک و مخصوصاً کرم‌های خاکی تحت تأثیر خاک‌ورزی شدیداً تغییر می‌کند و اثرات نامطلوب خاک‌ورزی متراکم برروی پادمان و کرم‌های خاکی مورد بررسی قرار گرفته و ثبت شده است (امرلینگ، ۲۰۰۱).^۳

بنابراین نمی‌توان از اثرات متقابل جانوران خاک به عنوان بخشی از اکوسیستم و محیط اطراف صرف نظر کرد. در اغلب بررسی‌های پیشین محققین اثرات خاک‌ورزی را بر روی گروه مشخصی از جانوران خاک مورد بررسی قرار داده‌اند (بلاک‌شاو و همکاران، ۲۰۰۷؛ چان و بارکیا، ۲۰۰۷؛ لارسن و همکاران، ۲۰۰۴؛ رادفورد و همکاران، ۲۰۰۱)^۴ و کمتر به بررسی همه گروه‌های جانوری (از بعد اندازه) و واکنش آنها در برابر خاک‌ورزی، در یک زمان و یک مکان، پرداخته‌اند. این پرسش که آیا می‌توان تغییرات احتمالی جمعیتی را در کوتاه مدت به صورت یک الگوی قابل تفسیر ارائه کرد بی‌جواب می‌باشد. این تحقیق تلاش دارد برای این پرسش جواب مناسبی ارائه دهد.

مواد و روش‌ها

محل اجرا و تیمارهای آزمایشی

آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی گریزه، واقع در شهرستان سنتنج از فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷ به اجرا درآمد. محل انتخاب شده برای اجراء آزمایش به مدت ۱۴ سال به صورت باغ مورد استفاده قرار گرفته و فقط در

¹. han and Barchia, 2007

². Kladivko, 2001

³. Emmerling, 2001

⁴. Blackshaw *et al.*, 2007; Chan and Barchia, 2007; Larsen *et al.*, 2004; Radford *et al.*, 2001

⁵. Berless-Tulgren

تعداد آنها در مرحله سوم قرار داشته است. بالاترین تعداد کرم‌خاکی در مرحله سوم، در تیمار خاک‌ورزی حداقل و با کود‌گاوی ۲۰ و ۴۰ تن بر هکتار مشاهده شد.

تجزیه واریانس خصوصیات اندازه‌گیری شده ذرت (جدول ۴) نشان می‌دهد که اثر متقابلی بین تیمارهای خاک‌ورزی و کود‌گاوی وجود نداشته ولی به طور کلی خاک‌ورزی بر روی ارتفاع اولین بلال، ارتفاع بوته و زیستوده ذرت؛ و کود‌گاوی بر روی ارتفاع اولین بلال و زیستوده ذرت دارای اثرات معنی‌دار بوده‌اند.

در مقایسه میانگین (جدول ۵) مشاهده شد که ارتفاع اولین بلال در خاک‌ورزی ستی به طور معنی‌داری کمتر از دو خاک‌ورزی دیگر است. در بین تیمارهای خاک‌ورزی بیشترین میزان ارتفاع بوته در خاک‌ورزی حداقل بوده. زیستوده ذرت در دو خاک‌ورزی ستی و حداقل تفاوت معنی‌داری نداشت ولی در هردوی آنها به صورت معنی‌داری بیشتر از زیستوده ذرت در تیمار بی‌خاک‌ورزی بود.

براساس جدول ۶، ارتفاع بلال و زیستوده ذرت در کاربرد ۴۰ تن بر هکتار کود‌گاوی به طور معنی‌داری بیشتر بود و تفاوت معنی‌داری بین اثر کاربرد ۰ و ۲۰ تن بر هکتار کود‌گاوی بر روی خصوصیات ذرت مشاهده نشد.

بحث

اثرات خاک‌ورزی بر روی جانوران خاک

براساس نتایج به دست آمده مشخص است که در دوره کوتاه مدت اعمال خاک‌ورزی، برخلاف جانوران ماکرو خاک (کرم‌های خاکی)، میکروفون و مزوفون خاک (به ترتیب نمادهای، و کنه‌ها و پادمان) واکنشی به تیمارهای خاک‌ورزی نشان ندادند که می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر اندازه جانوران خاک در میزان زمان مورد نیاز برای اثربازی آنها از عملیات خاک‌ورزی باشد. همچنین عدم تغییر در جمعیت مزوفون و میکروفون خاک ممکن است مربوط به بافت درشت خاک باشد چراکه این نوع بافت هم چنانکه میرانصاری مهابادی (۱۳۸۴)^۲ ذکر می‌کند، تا حدی در برابر اثرات نامطلوب به هم خوردنگی ناشی از خاک‌ورزی مقاومت می‌کند. همین امر سبب شده است تا تغییری در جمعیت گروههای مذکور مشاهده نگردد. براساس جدول ۴ برای جمعیت کرم‌های خاکی در خاک‌ورزی ها ترتیب حداقل-ستی-بی‌خاک‌ورزی، را می‌توان مشاهده کرد. براساس این نتایج مشخص است که جمعیت کرم‌خاکی تحت تأثیر خاک‌ورزی قرار گرفته است. از طرفی عدم مخلوط شدن ماده آلی با خاک ممکن است از دلائل کمتر

محلول روئی در زیر میکروسکوپ بررسی و شمارش انجام می‌گردد، برداشته شد و در کیسه‌های درسته به آزمایشگاه جهت استخراج سریع نمونه‌ها منتقل شد (پیج، ۱۹۸۶، کلوت، ۱۹۸۶).^۱ پس از رسیدن بلال‌ها به ۷۵٪ حالت خمیری خود، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال و زیستوده ذرت در هریک از پلاتها اندازه‌گیری شد.

تجزیه و تحلیل

داده‌های بیولوژیکی، فیزیکی خاک و خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای جمع‌آوری شده، با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت مقایسه اثرات خاک‌ورزی، کود دامی و دوره‌های نمونه‌برداری بر روی خصوصیات بیولوژیکی مورد نظر و جهت مقایسه اثرات خاک‌ورزی و کود دامی بر روی دوره‌های زراعی تجزیه واریانس داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت و از آزمون LSD با $P \leq 0.05$ جهت تفکیک میانگین‌ها کمک گرفته شد.

نتایج

تجزیه واریانس خصوصیات بیولوژیکی و فیزیکی در جدول شماره ۱، نشان‌دهنده اثرات معنی‌دار کود‌گاوی روی جمعیت نمادهای، اثر معنی‌دار زمان نمونه‌برداری روی همه خصوصیات و اثر متقابل سه گانه معنی‌دار نمایندگاری، خاک‌ورزی و کود‌گاوی بر روی جمعیت کرم خاکی، می‌باشد.

با توجه به مقایسه میانگین موجود در جدول ۲، وزن مخصوص ظاهری اندازه‌گیری شده در مرحله اول نمونه‌برداری (قبل از اعمال تیمار) به صورت معنی‌داری بیشتر از دو مرحله نمونه‌برداری بعدی بود. جمعیت کنه‌ها در مرحله سوم به طور معنی‌داری از مراحل اول و دوم بیشتر بود. جمعیت پادمان در دوره اول نمونه‌برداری به طور معنی‌داری بالاتر از دو دوره دیگر به دست آمد، این جمعیت به صورت قابل توجهی در دوره دوم نمونه‌برداری کاهش پیدا کرد و به مرور زمان مجدداً در دوره سوم نمونه‌برداری افزایش پیدا کرد (گرچه معنی‌دار نبود). تغییر جمعیتی نمادهای دارای روندی کاهشی بود و در دور سوم نمونه‌برداری در حداقل خود قرار داشت.

با توجه به جدول ۳ می‌توان دریافت که جمعیت نمادهای در تیمار ۴۰ تن بر هکتار کود گاوی حداقل بوده ولی تفاوتی در جمعیت آنها بین تیمارهای کاربرد ۰ و ۲۰ تن بر هکتار کود گاوی مشاهده نشده است.

براساس مقایسه میانگین جدول ۷ مشخص است که؛ کمترین تعداد کرم‌های خاکی در مرحله دوم و بیشترین

². Miransari mahabadi, 2005

1. Klute, 1986; Page, 1986

مطلوبی لازم است حداقل ۴۰ تن بر هکتار کودگاوی استفاده شود.

به طور کلی با توجه به نتایج خداشناس و همکاران (۱۳۸۷)^۲ به نظر می‌رسد که جمعیت نماتدها در این منطقه کم می‌باشد که می‌تواند از خصوصیات این منطقه و یا این نوع خاک‌ها در نظر گرفته شود، از طرفی براساس اظهار نظر خداشناس و همکاران (۱۳۸۷) اندازه گیری جمعیتی در عمق ۰-۲۵ سانتی‌متری خاک خود عاملی برای کاهش جمعیت اندازه گیری شده در واحد وزن یا سطح می‌باشد چراکه تمرکز جمعیتی در خاک سطحی (۰-۱۰ سانتی‌متر) بیشتر است.

اثر خاک‌ورزی بر روی ارتفاع بلال، ارتفاع بوته و زیتده ذرت

براساس مقایسه میانگین (جدول ۵)، کمترین میزان ارتفاع اولین بلال و ارتفاع بوته تحت تیمار خاک‌ورزی سنتی مشاهده شد؛ در تیمار خاک‌ورزی حداقل ارتفاع اولین بلال، ارتفاع بوته و زیتده ذرت بالا بود، بی‌خاک‌ورزی هم منجر به ارتفاع بالای بلال و مقادیر کم ارتفاع بوته و زیتده ذرت گشت. این امر به ممکن است به این دلیل باشد که خاک‌ورزی حداقل در مقایسه با بی‌خاک‌ورزی بستر مناسبی برای رشد بذر تهیه می‌کند و به‌هم‌خوردگی نامطلوب و برگردانه شدن خاک را در سیستم خاک‌ورزی سنتی ندارد. بنابراین داده‌ها نشان می‌دهند که خاک‌ورزی حداقل به دلیل مخلوط کردن مواد آلی در لایه سطحی خاک و علاوه براین زیتده بالای ذرت (که تفاوت معنی‌داری با مقدار آن در خاک‌ورزی سنتی نداشت) و نهایتاً در مقایسه با سیستم خاک‌ورزی سنتی، منجر به سیستم خاکی پایدارتر و اقتصادی‌تری از دید زراعی می‌شود. این برتری برای سیستم بی‌خاک‌ورزی مشاهده نشد.

اثر کودگاوی بر روی ارتفاع بلال، ارتفاع بوته و زیتده ذرت

کودگاوی فقط بر روی ارتفاع بلال و زیتده ذرت اثر معنی‌دار داشت. نتایج مقایسه میانگین (جدول ۶) نشان می‌دهد که تفاوتی بین اثر کاربرد ۰ و ۲۰ تن بر هکتار کودگاوی بر روی خصوصیات ذرت وجود نداشته است، اما کاربرد ۴۰ تن بر هکتار آنها را تحت تأثیر قرار داده، بنابراین واضح است که در این بخش هم همانند اثرات مطلوب بیولوژیکی (همانند آنچه برای نماتدها اشاره شد) نیاز به استفاده از میزانی بیش از حد کمینه کودگاوی برای اثربخش بودن وجود دارد.

بعدن جمعیتی کرم خاکی در تیمار بی‌خاک‌ورزی نسبت به خاک‌ورزی حداقل باشد و در نقطه مقابل نتایج یحیی آبادی و اسدی (۱۳۸۵)^۱ است که در تحقیق خود وجود بقایای گیاهی بر سطح خاک و کاهش دستخوردگی خاک در تیمارهای بدون شخم را مهتمrin عوامل افزایش جمعیت کرم‌های خاکی ذکر نموده‌اند. نظر نویسنده بر این است که بررسی گروههای کرم خاکی در سطوح اپیجیک، اندوجیک و آنسیک در رفع این تضادها و تفسیر مناسب‌تر نتایج در تحقیقات بعدی برای محققین کمک شایانی خواهد بود.

به طور کلی به نظر می‌رسد که به‌دلیل رطوبت پایین خاک در هنگام خاک‌ورزی (بخصوص در هنگام برگردانه شدن خاک در خاک‌ورزی سنتی)، و درپی آن به خاطر عدم حضور کرم‌های خاکی در ۲۵ سانتی‌متری بالائی خاک، خاک‌ورزی اثر مستقیمی بر روی کرم خاکی نداشته (یعنی صدمات فیزیکی یا همان اثرات مستفیم روی کرم‌های خاکی) اما برگرداندن خاک در خاک‌ورزی سنتی کانال‌های کرم خاکی را تخریب و تاحدودی زیستگاه آنها را تحت تأثیر قرار داد. در مقابل در تیمار خاک‌ورزی حداقل به‌خاطر مخلوط شدن کودگاوی در لایه سطحی خاک و سست شدن خاک سطحی برای رشد مناسب ریشه‌های ذرت، بدون برگرداندن خاک، کانال‌های کرم خاکی کمتر تخریب شدند. به همین علت، شرایط مناسب‌تر در تیمارهای خاک‌ورزی حداقل منجر به جمعیت‌های بالاتر کرم خاکی در تیمارهای خاک‌ورزی حداقل با کاربرد ۲۰ و ۴۰ تن بر هکتار کودگاوی شده‌است.

اثرات کودگاوی بر روی جانوران خاک

در این بررسی تنها اثر معنی‌دار کودگاوی بر روی جمعیت نماتدها مشاهده شد که دلیل آن را می‌توان اثر غیر مستقیم کودگاوی به عنوان منبع غذائی و اثرات آن بر افزایش رطوبت و افزایش خلل و فرج ریز به‌دلیل بهبود ساختمان خاک دانست که برای نماتدها مطلوب به شمار می‌آیند. براساس مقایسه میانگین (جدول ۳) مشاهده می‌شود که تفاوتی بین اثر کاربرد ۲۰ تن در هکتار و عدم کاربرد کود گاوی (۰ تن در هکتار) بر روی جمعیت نماتدها وجود ندارد. این امر نشان می‌دهد که جهت داشتن اثر معنی‌دار مواد آلی بر روی جمعیت جانوران خاک لازم است که مواد آلی را از یک میزانی (حد کمینه) بیشتر استفاده کرد، همچنانکه در این تحقیق نتایج نشان داد در این شرایط (خاکی و اقلیمی) برای رسیدن به چنان اثرات

². Khodashenas *et al.*, 2008

1. Yahya Abadi and Asadi, 2005

مدیریتی مناسب‌تر و پایدارتری می‌باشد. برای بررسی‌های آتی محققین توصیه می‌شود گروه‌های جانوری در سطوح پایین‌تر گروه‌بندی (گروه بندی اکولوژیکی یا بیولوژیکی) و انواع دیگر کودهای آلبی مورد بررسی قرار گیرد.

سپاسگزاری

این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی گریزه سنندج و با مساعدت‌های بسیاری از کارکنان آن ایستگاه بخصوص آقای مهندس فرهاد کرمی و خانم مهندس شیرین یغموری انجام شده است که به این وسیله از زحمات همه عزیزان سپاسگزاری می‌گردد.

به طور کلی با توجه به آنکه سیستم خاکورزی حداقل مورد استفاده در این تحقیق اثر مخربی روی ماکروفنون خاک نداشته بلکه در مواردی (کرم‌های خاکی) اثر مطلوب آن مشاهده شده است؛ و از طرفی میزان زیست‌دراز نداشته است و در نتیجه با هزینه کمتر سوخت و ماشین‌آلات به همان سطح محصول می‌توان رسید؛ و با توجه به این امر که در سیستم خاکورزی حداقل (در مقایسه با خاکورزی سنتی)، خاک برگردانده نمی‌شود و بقایا با سطح خاک مخلوط می‌گردد، لذا سیستم خاکورزی حداقل در شرایط مشابه از نظر اقلیم و خاک سیستم

جدول ۱- تجزیه واریانس جرم مخصوص ظاهری، رطوبت وزنی، کرم خاکی، کنه‌ها، پادمان و نماتدها

نماتدها	پادمان	کنه‌ها	کرم خاکی	رجوبت وزنی	جرم مخصوص ظاهری	درجہ آزادی	منابع تغییر
۸۷۹۷/۶*	۴۰/۱۸ ^{ns}	۶۴/۹۱ ^{ns}	۲۴/۸۴*	۴/۲۴۴ ^{ns}	۰/۰۲۷ ^{ns}	۲	تکرار ^۱
۱۲۳۶/۹ ^{ns}	۲۲/۱ ^{ns}	۱۰۰/۶۲ ^{ns}	۳/۱۱ ^{ns}	۰/۰۳۲ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۲	خاکورزی (T)
۸۳۳۵/۴۵*	۳۷/۲ ^{ns}	۳۸۱/۲ ^{ns}	۱/۳۷ ^{ns}	۰/۵۶۱ ^{ns}	۰/۰۰۱ ^{ns}	۲	کود گاوی (CM)
۱۱۷۳/۲۱ ^{ns}	۱۵/۳۵ ^{ns}	۲۸/۹۲ ^{ns}	۲/۸۰ ^{ns}	۲/۳۲۱ ^{ns}	۰/۰۰۱ ^{ns}	۴	T*CM
۱۵۳۷۸/۴۸**	۱۵۶/۲۹**	۱۲۸۱/۴۷**	۲۵/۲۶**	۱۲/۲۴۴*	۰/۰۳۰**	۲	زمان (S)
۳۵۱۹/۹۴ ^{ns}	۳۹/۴۵ ^{ns}	۵۲/۴۶ ^{ns}	۴/۰۵*	۱/۰۹۱ ^{ns}	۰/۰۱۲ ^{ns}	۴	S*T
۱۰/۷۷ ^{ns}	۱۰/۴۷ ^{ns}	۱۴۶/۱ ^{ns}	۰/۷۰ ^{ns}	۳/۰۳۷ ^{ns}	۰/۰۰۱ ^{ns}	۴	S*CM
۴۳۳۱ ^{ns}	۷/۸۵ ^{ns}	۴۴/۸۶ ^{ns}	۴/۲۰*	۴/۱۳۷ ^{ns}	۰/۰۰۴ ^{ns}	۸	S*T*CM
۴/۹۷	۰/۰۱۸	۰/۳	۰/۱۲	۲/۶۵	۰/۰۰۶	۳۲	خطای آزمایش
۲۴/۰۷	۱۲/۸۴	۱۴/۸۳	۲۸/۹۷	۱۴/۴۷	۵/۸۰		ضریب تغییرات

^{ns}: غیر معنی دار

* و **: معنی دار به ترتیب در سطح ۵ و ۱ درصد

^۱: تجزیه واریانس برای (S*T, r(t*cm) و t*r) در جدول آورده نشده است

جدول ۲- نتایج مقایسه میانگین زمان بر روی جرم مخصوص ظاهری، رطوبت وزنی، جمعیت کنه‌ها، پادمان و نماتدها

نماتدها (N/100 gr dry soil)	پادمان (N/1Kg soil)	کنه‌ها (N/1Kg soil)	رجوبت وزنی (%)	جرم مخصوص ظاهری (gr/cm ³)	دوره نمونه برداری
۱۰/۹/۸۸a	۷/۷۷a	۵/۲۱b	۱۰/۶۱b	۱/۵۱a	قبل از اعمال تیمار (BT1)
۱۰/۳/۴۱a	۲/۹۷b	۷/۹۸b	۱۱/۱۴ab	۱/۳۲b	بعد از اعمال تیمار (AT1)
۶۵/۷b	۵/۶۶ab	۱۸/۲۸a	۱۱/۹۵a	۱/۳۳b	پس از برداشت (AH1)

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح ۵٪ دارای تفاوت معنی دار نمی‌باشند.

جدول ۳- نتایج مقایسه میانگین اثر سطوح کود گاوی بر روی حمیت نمادها

نامادها	کود گاوی (Ton/ha)	(N/100 gr dry soil)
.	.	۸۰/۵b
۲۰		۸۵/۳B
۴۰		۱۱۳/۱A

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح ۵٪ دارای تفاوت معنی دار نمی باشند.

جدول ۴- تجزیه واریانس ارتفاع اولین بال، ارتفاع بوته و زیستوده ذرت

منابع تغییر	درجه آزادی	ارتفاع اولین بال (cm)	ارتفاع بوته (cm)	زیستوده ذرت (Kg/m ²)
تکرار	۲	۳۶۳/۹**	۸۲۰/۳**	۰/۰۵ ns
خاکورزی (T)	۲	۹۵/۳*	۵۷۳/۶**	۱/۸۹**
کود گاوی (CM)	۲	۲۰۰/۷*	۵۲۵/۶	۴/۵۷*
T*CM	۴	۶۷/۱ ns	۲۹۹/۸ ns	۲/۳۸ ns
خطای آزمایش	۱۰	۳۸/۲۲	۳۴۰/۹۷	۰/۷۴
ضریب تغییرات		۵/۵۶	۷/۳۷	۱۵/۳۹

ns: غیر معنی دار

* و **: معنی دار به ترتیب در سطح ۵ و ۱ درصد

جدول ۵- نتایج مقایسه میانگین اثرات سطوح خاک ورزی بر روی ارتفاع بال، ارتفاع بوته و زیستوده ذرت

خاکورزی	ارتفاع اولین بال (cm)	ارتفاع بوته (cm)	زیستوده ذرت (Kg/m ²)
سنگی	۱۷۰/۶b	۲۵۱/۷b	۶/۰a
حدائق	۱۱۲/۰a	۲۵۷/۸a	۵/۷a
بی خاکورزی	۱۱۴/۰a	۲۴۲/۰c	۵/۱b

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح ۵٪ دارای

تفاوت معنی دار نمی باشند.

جدول ۶- نتایج مقایسه میانگین اثرات سطوح کود گاوی بر روی ارتفاع بال و زیستوده ذرت

کود گاوی (ton/ha)	ارتفاع اولین بال (cm)	زیستوده ذرت (kg/m ²)
.	۱۰۸/۸b	۵/۳b
۲۰	۱۰۸/۲b	۵/۰b
۴۰	۱۱۶/۷a	۶/۴a

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون LSD در

سطح ۵٪ دارای تفاوت معنی دار نمی باشند.

جدول ۷- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح دوره نمونه برداری، خاک‌ورزی و کود گاوی
بر روی جمعیت کرم‌های خاکی

کرم خاکی (N/0.0156m ³)	کود گاوی (Ton/ha)	خاک‌ورزی	دوره نمونه برداری
\def	.		
\def	۲۰	ستنی	
\def	۴۰		
۱/۶۷bcd	.		
./۳۳cef	۲۰	حداقل	قبل از اعمال (BT1) تیمار
۱/۳۳bcde	۴۰		
./۳۳cef	.		
۳/۶۷a	۲۰	بی خاک‌ورزی	
./۶۷cdef	۴۰		
./۵۰.def	.		
./۳۳def	۲۰	ستنی	
./۳۳def	۴۰		
./۳۳def	.		
./۱۷ef	۲۰	حداقل	بعد از اعمال تیمار (AT1)
./۶۷cdef	۴۰		
./.f	.		
./.f	۲۰	بی خاک‌ورزی	
./۱۷ef	۴۰		
./۸۳cdef	.		
۳/۸۳a	۲۰	ستنی	
۲/۶۷abc	۴۰		
۳/۰۰ab	.		
۳/۸۳a	۲۰	حداقل	پس از برداشت (AH1)
۴/۱۷a	۴۰		
۳/۰۰a	.		
۱/۳۳bcde	۲۰	بی خاک‌ورزی	
./۳۳def	۴۰		

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح ۵٪ دارای

تفاوت معنی دار نمی باشند.

فهرست منابع:

- Arshad, M. A., A. J. Franzlubbers, and R. H. Azooz. 1999. Components of surface soil structure under conventional and no tillage in northwestern Canada. Soil Till. Res. 53, 41-47.
- Blackshaw, R. P., S. E. Donvan, S. Hazarike, R. Bol, and E. White. 2007. Earthworm responses to long term agricultural management practices : spatial relationships with soil properties. Eur. J. Soil Biol. 43, S171-S175.
- Cavalieri, K. M. V., A. P. da Silva, C. A. Tormena, T. P. Leão, A. R. Dexter, and I. Håkansson. 2009. Long term effects of no tillage on dynamic soil physical properties in a Rhodic Ferrasol in Paraná, Brazil. Soil Till. Res. 103, 158-164.

4. Chan, K. Y., and Barchia, I. 2007. Soil compaction controls the abundance, biomass and distribution of earthworms in a single dairy farm in south-eastern Australia. *Soil Till. Res.* 94, 75-82.
5. D'Haene, K., J. Vermang, W. M. Cornelis, B. L. M. Leroy, W. Schiettecatte, S. D. Neve, D. Gabriels, and G. Hofman. 2008. Reduced tillage effects on physical properties of silt loam soils growing root crops. *Soil Till. Res.* 99, 279-290.
6. Elder, J. W., and R. Lal. 2008. Tillage effects on physical properties of agricultural organic soils of north central Ohio. *Soil Till. Res.* 98, 208-210.
7. Emmerling, C. 2001. Response of earthworm communities to different types of soil tillage. *Appl. Soil Ecol.* 17, 91-96.
8. Gómez, J. A., J. V. Giráldez, M. Pastor, and E. Fereres. 1999. Effects of tillage method on soil physical properties, infiltration and yield in an olive orchard. *Soil Till. Res.* 52, 167-175.
9. Husnjak, S., Filipovic, D., and Kosutic, S. 2002. Influence of different tillage systems on soil physical properties and crop yield. *Rostlinna Vyroba.* 48, (6), 249–254.
10. Kay, B. D., and A. J. VandenBygaart. 2002. Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter. *Soil Till. Res.* 66, 107-118.
11. Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghadam, P., Lakzian, A., 2008. Effect of Agricultural Practices on Soil Nematodes and Bacteria in the Winter Wheat Fields of Khorasan Province, Iran. *Environmental sciences.* Vol.5. 3, 53 -64.
12. Kladivko, E. J. 2001. Tillage systems and soil ecology. *Soil Till. Res.* 61, 61-76.
13. Klute, A. (1986). Methods of soil analysis, Part 1. 2nd edn. Wisconsin, U.S.A.
14. Larsen, T., P. Shjonning, and J. Axelsen. 2004. The impact of soil compaction on euedaphic collembolan. *Appl. Soil Ecol.* 26, 273-281.
15. Maynard, J. L. J., K. J. Umiker, and S. O. Guy. 2007. Earthworm dynamics and soil physical properties in the first three years of no till management. *Soil Till. Res.* 94, 338-345.
16. McVay, K. A., J. A. Budde, K. Fabrizzi, M. M. Mikha, C. W. Rice, A. J. Schlegel, D. E. Peterson, D. W. Sweeney, and C. Thompson. 2006. Management effects on soil physical properties in long term tillage studies in Kansas. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 70, 434–438.
17. Miransari mahabadi, M. R. 2005. Using Arbuscular Mycorrhiza to Reduce the Stressful Effects of Soil Compaction on the Growth and Nutrient Uptake in Wheat and Corn. PhD thesis, agriculture faculty, Tarbiat Modares University.
18. Mosaddeghi, M. R., A. A. Mahboubi, and A. Safadoust. 2009. Short term effects of tillage and manure on some soil physical properties and maize root growth in a sandy loam soil in western Iran. *Soil Till. Res.* 104, 173-179.
19. Page, A. L. (1986). Methods of soil analysis, part 2. 2nd edn. Wisconsin, U.S.A.
20. Radford, B. J., A. C., Wilson-rummenie, G. B., Simpson, K. L., Bell, and M. A. Ferguso. 2001. Compacted soil affects soil macrofauna populations in a semi-arid environment in central Queensland. *Soil Biol. Biochem.* 33, 1869-1872.
21. Rasmussen, K. J. 1999. Impact of ploughless soil tillage on yield and soil quality: a Scandinavian review. *Soil Till. Res.* 53, 3-14.
22. Sharratt, B., M. Zhang, and S. Sparrow. 2006. Twenty years of conservation tillage research in subarctic Alaska I. Impact on soil strength, aggregation, roughness, and residue cover. *Soil Till. Res.* 91, 75-81.
23. Shirani, H., M. A. Hajabbasi, M. Afyuni, and A. Hemmat. 2002. Effects of farmyard manure and tillage systems on soil physical properties and corn yield in central Iran. *Soil Till. Res.* 68, 101-108.

24. Singh, B., and S.S. Malhi. 2006. Response of soil physical properties to tillage and residue management on two soils in a cool temperature environment. *Soil Till. Res.* 85, 143-153.
25. So, H. B., A. Grabski, and P. Desborough. 2009. The impact of 14 years of conventional and no till cultivation on physical properties and crop yields of a loam soil at Grafton NSW, Australia. *Soil Till. Res.* 104, 180-184.
26. Xu, D., and A. Mermoud. 2001. Topsoil properties as affected by tillage practices in North China. *Soil Till. Res.* 60, 11-19.
27. Yahya Abadi, M., and Asadi, A., 2005. The effects of different tillage systems and plant residue on soil earthworm population. 4th conger of agricultural plant, Tabriz, Iran.

Archive of SID