

## کاربرد کمپوست پيله بادام زمينى در بستر كشت و تأثير آن بر ويژگى‌هاى فيزيكي و شيميايى خاک

جلال اميدى<sup>1</sup>، عبدالله حاتم‌زاده و على محبوب خمامى

كارشناس ارشد باغبانى، دانشكده كشاورزى، دانشگاه گيلان، رشت، ايران؛ jalalomidi58@yahoo.com

استاد گروه علوم باغبانى، دانشكده كشاورزى، دانشگاه گيلان، رشت، ايران؛ hatamzadeh@guilan.ac.ir

عضو هيات علمى گروه تحقيقات آب و خاک، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى گيلان، AREEO، رشت، ايران؛

Mahboub48@yahoo.com

دريافت: 98/12/12 و پذيرش: 99/7/15

### چكیده

پيله بادام زمينى به عنوان ضايعات بجا مانده از كشت بادام زمينى، حجم قابل توجهى دارد كه كمپوست آن مى‌تواند به عنوان منبعى قابل دسترس از عناصر غذايى در بستر كشت گياهان زينتى به كار رود. اين تحقيق براى بررسى مصرف كمپوست پيله بادام زمينى در بستر كشت خاكي (خاك زراعى) و بدون خاك (پيت - پرليت به نسبت 1:2) و تأثير آن بر ويژگى‌هاى فيزيكي و شيميايى خاک در ايستگاه تحقيقات گل و گياهان زينتى لاهيجان در سال 1396 به اجرا در آمد. تيمارهاى شاهد شامل خاك زراعى و بستر پيت - پرليت به نسبت 1:2 بود و كمپوست پيله بادام زمينى توليد شده در مقادير (صفر، 25، 50، 75 و 100) درصد حجمى به جاي خاك زراعى و پيت در بستر 1:2 پيت - پرليت جايگزين شد. اين تحقيق، به صورت آزمون فاكوريل با دو فاكور (نوع بستر كشت و سطوح كمپوست) بر پايه طرح بلوك‌هاى كامل تصادفى و در سه تكرار و با استفاده از گياه مدل تحقيقاتى بنفشه (*Viola spp.*) انجام شد. در پايان آزمون شاخص‌هاى رشد و عناصر غذايى گياه، خصوصيات فيزيكي بستر شامل تخلخل كل، تخلخل تهويه‌اى، ظرفيت آبى و جرم مخصوص ظاهرى و از خصوصيات شيميايى نيز مقادير عناصر غذايى بسترهاى كشت مانند Ca, N, P, K, Fe, Zn, Mn, Cu و همچنين pH و EC اندازه‌گيرى شدند. در بستر بدون خاك، کاربرد 50 درصد كمپوست پيله بادام زمينى (1 پيت + 1 پرليت + 1 كمپوست) و در بستر خاكي، کاربرد 75 درصد كمپوست پيله بادام زمينى بهترين نتايج را براى گياه مدل تحقيقاتى نشان دادند. به نظر مى‌رسد كمپوست پيله بادام زمينى با کاهش نسبت C/N، درصد تخلخل بالا و عرضه بهتر عناصر غذايى در اين دو بستر نتايج بهتري داشت. بنابر اين، كمپوست پيله بادام زمينى مى‌تواند براى جايگزينى پيت گران قيمت و همچنين بهبود خصوصيات خاك زراعى در بستر كشت اين گياه زينتى استفاده شود.

واژه‌هاى كليدى: پسماندهاى كشاورزى، پيت، پرليت، تخلخل خاك

<sup>1</sup>نويسنده مسئول، آدرس: رشت، دانشگاه گيلان، دانشكده كشاورزى، گروه علوم باغبانى

## مقدمه

بستر کشت مناسب علاوه برداشتن خصوصیات مطلوب فیزیکی - شیمیایی و بیولوژیکی، باید در دسترس، نسبتاً ارزان، پایدار و به اندازه کافی سبک باشد تا کار با آن راحت‌تر و حمل و نقل آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. نیاز به تأمین منظم بسترهای کشت همگن که قابلیت حمایت از رشد مناسب گیاهان را داشته باشد افزایش یافته است. زمانی که خاک به عنوان بستر کشت گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد به دلیل مشکلاتی که خاک با کیفیت ثابت دارد، مسائل فیزیکی شدید و نامطلوب را فراهم می‌کند، بنابراین پرورش دهندگان ناچار به استفاده از بسترهایی هستند که دارای ویژگی بسترهای بدون خاک باشند.

بسترهای کشت ممکن است از مواد مختلفی هدف مشخصات فیزیکی و تغذیه‌ای بهینه تهیه شوند ولی مواد آلی مناسب جهت بستر گران بوده و تهیه آن‌ها مشکل است، با این حال نیاز مبرم وجود دارد که مواد جایگزین پیت، که از آن به عنوان یک ماده آلی عمومی استفاده می‌شود، انتخاب شوند به صورتی که بتوان بطور موفقیت - آمیزی از آن‌ها استفاده کرد (بیتو و همکاران، 2005). بهره‌برداری شدید و استفاده بیش از حد از پیت منجر به کاهش عمق چمنزارهای عمیق می‌شود (70-160 سانتی - متر) که نه تنها موجب از بین رفتن پوشش گیاهی ارزشمند این مناطق گردیده، بلکه با فراهم آوردن شرایط زهکشی آب از اراضی مجاور، پوشش گیاهی عرصه‌های بهره‌برداری نشده را نیز متأثر می‌سازد. امکان احیاء و بازسازی این عرصه‌ها (عرصه‌های مورد بهره‌برداری شده خاک پیت) به وضعیت اولیه و یا حتی نزدیک به آن به دلیل برداشت لایه خاک پیت میسر و مقدور نمی‌باشد. امکان باز تولیدی خاک پیت در مکان‌های بهره‌برداری شده به دلیل فرآیند پیچیده و شرایط ویژه تشکیل آن حتی در پروسه زمانی طولانی مدت، دور از تصور می‌باشد. این عوامل موجب شده تا محققین دنیا به فکر بسترهایی با کیفیت مناسب و قیمت پایین باشند، از این رو استفاده از مواد با کیفیت بالا و قیمت ارزان‌تر به جای پیت مورد توجه قرار گرفته است (کرومفلز و همکاران، 2000).

سطح زیر کشت بادام زمینی در ایران در حدود 3218 هکتار است که 2718 هکتار آن در استان گیلان قرار دارد. برداشت غلاف در استان گیلان حدود 1980 - 3500 کیلوگرم غلاف در هکتار و میزان تولید 89327/6 تن می‌باشد (بی‌نام، 1388). وجود ضایعات پيله بادام زمینی به ازای هر کیلوگرم عملکرد این محصول بین 35 تا 40 درصد متغیر بوده که با پیش‌بینی تولید 9682/6 تن غلاف

پسماند یکی از بارزترین معضلات جوامع انسانی بوده که در صورت عدم کنترل، اثرات سوء بهداشتی و زیست‌محیطی بسیاری به دنبال خواهد داشت. به دلیل امکانات بالقوه فراوان و تولید قابل ملاحظه انواع محصولات کشاورزی در کشور، سالیانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی با هزینه زیاد تولید می‌شود که متأسفانه بخش قابل توجهی از آن به شکل غیراصولی و به دور از ملاحظات زیست‌محیطی در محیط رها، سوزانده و یا دفن می‌گردد. با به کار بردن روش‌های مناسب مدیریتی در جهت بازیافت پسماندهای کشاورزی، ضمن افزایش بهره‌وری، ضایعات کشاورزی کاهش می‌یابد و از جنبه دیگر گامی مهم در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست برداشته می‌شود (جی‌یوس‌کویانی و همکاران، 1995). دفن ضایعات کشاورزی و زباله عملی پرهزینه است، به طوری که هزینه آن به ازای هر تن، در ایالات مختلف آمریکا بین 11-17 دلار برآورد شده است (گوپتا، 2003). امروزه مشکل تولید ضایعات از صنایع مختلف، از مسائل حاد در دنیا به شمار می‌رود. جدا کردن ضایعات آلی به منظور تولید محصولات مفید، روشی پایدار در مدیریت این ضایعات می‌باشد. کمپوست یک کود آلی حاصل از تغییر و تبدیل انواع پسماندهای گیاهی و حیوانی در نتیجه فعالیت گروه‌های مختلف ریزجانداران بوده و یک کود بیولوژیک محسوب می‌شود (جهانی و همکاران، 1390).

کمپوست نمودن، پایدارترین و اقتصادی‌ترین گزینه برای مدیریت مواد زائد آلی می‌باشد. پروسه تبدیل زباله‌های آلی به کود آلی، تکنیکی در جهت کاهش مشکلات زیست‌محیطی، افزایش حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی و کاهش توسعه مکان‌های جدید برای دفن می‌باشد (خرازی و همکاران، 1393).

تخمین زده شده که در ایران به طور متوسط در هر سال حدود 100 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و باغی تولید می‌شود، که از این مقدار حدود 20 تا 30 درصد یعنی معادل 20 تا 30 میلیون تن تبدیل به ضایعات و پسماند می‌شود که فرآوری مجدد این ضایعات و پسماندها می‌تواند سبب برگشت آن‌ها به چرخه اقتصاد کشور شود. با برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، می‌شود مقادیر انبوهی از این ضایعات و پسماندهای مراحل مختلف را که زیان جبران‌ناپذیری به کشاورزان و اقتصاد کشور وارد می‌کند به ارزش افزوده تبدیل کرد (اخگر و همکاران، 2019).

ضایعات این محصول در ایران حدود 3388/91 تا 3873/04 تن برآورد می‌شود (بی‌نام، 1389).

علاوه بر تولید داخلی بادم زمینی، میزان قابل توجهی واردات این محصول نیز وجود دارد. پوسته‌ی بادم زمینی در گذشته به صورت مخلوط با خاک‌های معدنی در بسترهای برخی از گیاهان به کار برده می‌شد (صداقت حور و همکاران، 1389). پوسته‌ی بادم زمینی ساختمان فیبری قابل توجهی دارد که سبب افزایش خلل و فرج زیاد در خاک می‌شود. ساختمان الیافی پوسته بادم زمینی دارای عمر نسبتاً کوتاهی در مخلوط بستر بوده و در حضور کود و آب سریع تجزیه می‌شوند. با این حال می‌توانند برای دوره رشدی 6 تا 12 هفته‌ای مناسب باشند و برای دوره‌های طولانی کشت نیاز به ضد عفونی با بخار آب و یا مواد شیمیایی به منظور برطرف نمودن نماتد دارند (دنيس و همکاران، 2003). کمپوست‌های آلی مانند کمپوست آزولا می‌تواند به جای بسترهای گران قیمت و وارداتی در ترکیب بستر گیاهان زینتی استفاده شود. در واقع با استفاده از کمپوست آزولا که آزولای آن یکی از مشکلات زیست-محیطی تالاب‌ها، به خصوص تالاب انزلی می‌باشد هم می‌توان مشکل آلودگی تالاب‌ها را کاهش داد و هم استفاده از مواد گران قیمت و وارداتی مانند پیت را در بستر گیاهان زینتی محدود کرده و در نهایت هزینه‌های تولید را کاهش داد (امیدی و همکاران، 1397). کاربرد کودهای آلی مانند کمپوست کود گاوی و لجن فاضلاب در خاک‌های سنگین می‌تواند دانه‌بندی، تخلخل، نفوذپذیری و تهویه را بهبود بخشد و در خاک‌های شنی به نگهداری آب و مواد غذایی کمک نماید (آبوشارر، 1996).

با افزایش آگاهی از خطرات زیست‌محیطی ضایعات به علاوه نیازی که به دفن بهداشتی یا بازیافت آن‌ها وجود دارد و همچنین به منظور کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر مثل پیت، استفاده بیشتر از بیوسالیدهای کمپوست شده در کشاورزی توصیه شده است (پاپافیتیو و همکاران، 2005). ترویج و توصیه کاربرد کودهای آلی مانند کمپوست کاه و کلش، کمپوست آزولا، کمپوست کود دامی و ورمی کمپوست می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در جهت کاهش معضلات ناشی از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و حفظ منابع تجدیدناپذیر از آلودگی، بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش فراهمی و جذب عناصر غذایی، بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصولات کشاورزی و در نتیجه دستیابی به محصول سالم و ارگانیک مورد توجه خاص قرار گرفته و به پایداری زیست‌بوم‌های کشاورزی و سلامت مصرف‌کننده کمک قابل توجهی نماید

(شهدی کومله، 1398). با توجه به اهداف پژوهش تصمیم به بررسی کاربرد کمپوست پيله بادم زمینی در بستر کشت و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک گرفته شد. اهداف پژوهش عبارتند از: اصلاح بستر کشت خاکی و بدون خاک گیاه بنفشه در فضای آزاد، کاهش مصرف پیت در بسترهای کشت و استفاده از ضایعات کشاورزی و حل معضل زیست‌محیطی آن‌ها.

### مواد و روش‌ها

به منظور ارزیابی کاربرد کمپوست پيله بادم زمینی در بستر کشت و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، کمپوست پيله بادم زمینی و محلول غذایی تهیه شد. نشاهای گیاه بنفشه از گلخانه‌ای واقع در شهرستان رودسر خریداری گردید. این نشاهای از لحاظ ارتفاع و تعداد برگ یکسان بودند. گیاهان بنفشه تهیه شده به ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان انتقال داده شدند. پيله بادم زمینی از کارخانه بادم پوست‌کنی واقع در شهرستان آستانه اشرفیه تهیه شد. سپس پيله‌های بادم زمینی در اندازه‌های 4-2 سانتی‌متر خرد شده و مرطوب شدند. پس از مرطوب شدن در جعبه‌های چوبی با ابعاد 1×1×1 متر مکعب که دارای منافذی برای تأمین اکسیژن و مهیا نمودن شرایط هوازی و فعالیت میکروارگانیسم‌ها بود، ریخته شدند. به ازای هر متر مکعب پيله بادم زمینی مقدار 1/5 کیلوگرم کود اوره به عنوان تسریع‌کننده اضافه شد. استفاده از کود اوره، به منظور سرعت بخشیدن تجزیه کمپوست صورت گرفت. روی جعبه‌های چوبی نیز با پلاستیک پوشانده شد تا توده کمپوست در معرض نزولات جوی قرار نگیرد و رطوبت و دمای توده کمپوست تحت کنترل باشد. برای کنترل دما و تأمین اکسیژن و تسریع در تخمیر، هوادهی به صورت دستی هر سه روز یکبار در محفظه‌ی تولید کمپوست صورت می‌گرفت. با توجه به اینکه رطوبت مواد آلی در حال کمپوست شدن باید حدود 50-60 درصد باشد، هر وقت که کمبود آب احساس گردید آبیاری روی توده صورت گرفت. دمای کمپوست هم هفته‌ای دو بار در عمق 35 سانتی‌متری اندازه‌گیری شد. فرآیند تولید کمپوست چهار ماه به طول انجامید (امیدی و عبدالمحمدی، 1398). جدول 1 خصوصیات شیمیایی پيله بادم زمینی قبل و بعد از کمپوست شدن و همچنین پیت مصرفی در بستر و جدول 2 تیمارهای به کار رفته در کشت گیاه بنفشه را نشان می‌دهد.

جدول 1- خصوصيات شيميايي پيله بادام زمينی قبل و بعد از کمپوست شدن و پيت مصرفی در بستر كاشت

ردیف	خصوصيات شيميايي	پيله بادام زمينی قبل از کمپوست شدن	پيله بادام زمينی بعد از کمپوست شدن	پيت
1	نيتروژن کل (%)	0/87	2/76	0/63
2	فسفر کل (%)	1/87	0/67	0/03
3	پتاسيم کل (%)	1/19	1/48	0/03
4	کربن آلی (%)	30/00	27/10	55/70
5	نسبت C/N	34/50	9/80	88/50
6	pH (5:1)	5/89	5/06	4/62
7	EC (ds/m)	1/38	4/30	0/32

جدول 2- تیمارهای به کار رفته در كشت گیاه بنفشه

تیمار	درصد کمپوست پيله بادام زمينی	مشخصات تیمارها
1	0%	2 پيت + 1 پرليت + 0 کمپوست پيله بادام زمينی (شاهد)
2	25%	1/5 پيت + 1 پرليت + 0/5 کمپوست پيله بادام زمينی
3	50%	1 پيت + 1 پرليت + 1 کمپوست پيله بادام زمينی
4	75%	0/5 پيت + 1 پرليت + 1/5 کمپوست پيله بادام زمينی
5	100%	0 پيت + 1 پرليت + 2 کمپوست پيله بادام زمينی
6	0%	100% خاک زراعی + 0% کمپوست پيله بادام زمينی (شاهد)
7	25%	75% خاک زراعی + 25% کمپوست پيله بادام زمينی
8	50%	50% خاک زراعی + 50% کمپوست پيله بادام زمينی
9	75%	25% خاک زراعی + 75% کمپوست پيله بادام زمينی
10	100%	0% خاک زراعی + 100% کمپوست پيله بادام زمينی

### بسترهای استفاده شده در آزمایش

پيت شد و پرليت در تمامی پنج تیمار بستر بدون خاک به صورت حجمی و با حجم ثابت 1 به کار رفت (جدول 2). این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای آزاد ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان با مشخصات جغرافیایی °37 و °11 و °44 شمالی و °50 و °01 و °03 جنوبی در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت.

پس از تهیه بسترها با نسبت‌های معین مطابق طرح آزمایشی، اقدام به كشت نشاء بنفشه گردید. نشاهای بنفشه از جعبه‌های نشایی به گلدان‌هایی با طول، عرض و ارتفاع 40 سانتی‌متر انتقال داده شد. به این ترتیب که ابتدا پس از تهیه بستر، نشاهای بنفشه از جعبه‌های نشایی خارج و ریشه‌ها با آب شسته شد تا از بستر قبلی خود کاملاً جدا شود. سپس به ازای هر گلدان با بستر جدید، چهار گیاه كشت شد تا دوره رشد پنج ماهه گیاه طی شود. از کود پودری امكس به‌منظور تهیه محلول غذایی جهت تغذیه‌ی کلیه تیمارها استفاده شد (جدول 3). به این منظور مقدار 5/4 گرم از کود پودری امكس را در 10/8 لیتر آب حل کرده و هر هفت روز یک‌بار به ازای هر گلدان 200 سی‌سی محلول غذایی داده شد (چن و همکاران، 1988).

پيت از شرکت کیکيلا فنلاند و به صورت آماده خریداری شد. از پرليت با قطر 1 تا 2 میلی‌متر شرکت کاسپین پرليت در این آزمایش استفاده شد. بستر پایه آزمایش به صورت پيت و پرليت به نسبت 1:2 و خاک زراعی گلکاران تولیدکننده منطقه به صورت 100 درصد حجمی (60 درصد خاک بافت متوسط + 20 درصد کود دامی + 10 درصد خاکبرگ + 10 درصد ماسه) در نظر گرفته و تهیه شد. به منظور ارزیابی کاربرد کمپوست پيله بادام زمينی در بستر كشت و تأثير آن بر ويژگي های فيزيكي و شيميايي خاک، کمپوست پيله بادام زمينی تولید شده در دو بستر جداگانه خاکی (خاک گلکاران تولید کننده منطقه) و بدون خاک (پيت - پرليت با نسبت 2-1) مورد آزمون قرار گرفت. کمپوست پيله بادام زمينی تولید شده، پس از عبور از الک 20 میلی‌متری در بستر خاکی به جای خاک زراعی (در مقادیر صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) و همچنین در بستر بدون خاک به جای پيت (در مقادیر صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) جایگزین شدند. لازم به ذکر است مقادیر صفر درصد کمپوست پيله بادام زمينی در هر دو بستر بدون خاک و بستر خاکی به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در بستر بدون خاک با نسبت 1:2 پيت و پرليت، کمپوست پيله بادام زمينی جایگزین

جدول 3- خصوصیات شیمیایی کود پودری امکس

عناصر میکرو (میلی گرم / کیلوگرم)			عناصر ماکرو (درصد)					
مولیبدن	منگنز	روی	آهن	گوگرد	پتاسیم	فسفر	نیتروژن	آمونیم
14	42	14	70	0/4	18	18	7/8	5/1

### اندازه‌گیری شاخص‌های رشد گیاه

#### وزن تر و خشک ریشه

پس از خارج کردن ریشه گیاهان از گلدان، ریشه‌ها با آب شسته شده و وزن‌تر آن‌ها اندازه‌گیری شد. سپس به مدت 48 ساعت در آون در حرارت 75 درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند تا کاملاً خشک شده و وزن خشک آن‌ها نیز اندازه‌گیری شد.

#### وزن تر و خشک اندام هوایی

پس از بیرون آوردن گیاهان از گلدان و شستن ریشه‌های آن‌ها، گیاه را از محل طوقه بریده و وزن‌تر اندام هوایی اندازه‌گیری شد. سپس گیاهان به مدت 48 ساعت در آون در حرارت 75 درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند تا خشک شوند. سپس وزن خشک آن‌ها اندازه‌گیری شد.

#### عصاره‌گیری از گیاه

برای استخراج عناصر غذایی، 0/3 گرم از نمونه‌های خشک شده در آون، به کمک قیف مخصوص توزین، و به بالن ژورنه 50 میلی‌لیتری منتقل شد. در مرحله‌ی بعد 2/3 میلی‌لیتر از مخلوط اسیدها (اسید سولفوریک و اسید سالیسیلیک) را اضافه کرده و با دقت تکان داده تا تمامی مواد گیاهی خیس شود. مخلوط یک شب به حال خود قرار داده شد. در روز بعد نمونه‌ها را به مدت یک ساعت در دمای 180 درجه سانتی‌گراد حرارت داده و بعد از خنک شدن به آن 5 قطره آب اکسیژنه اضافه نموده و بالن‌ها دوباره روی اجاق قرار داده شد و حرارت را به 280 درجه سانتی‌گراد افزایش داده تا آب تبخیر شده و بخار سفید ظاهر شود. این عمل تا بی‌رنگ شدن نمونه‌ها ادامه یافت. سپس نمونه‌ها را از روی اجاق برداشته و بعد از خنک شدن 10 میلی‌لیتر آب اضافه نموده و تکان داده تا بیشتر مواد رسوب شده حل شود. سپس به حجم 100 میلی‌لیتر رسانده و بعد از به هم زدن صاف شد (کالرا، 1998).

#### اندازه‌گیری عناصر در گیاه

##### عناصر کلسیم، آهن و روی

از عصاره تهیه شده برای اندازه‌گیری عناصر کلسیم، آهن و روی گیاه به وسیله دستگاه جذب اتمی استفاده شد (کالرا، 1998).

### پتاسیم

از عصاره تهیه شده برای اندازه‌گیری پتاسیم استفاده شد و توسط نشر شعله‌ای یا فلایم‌فتومتر مدل jenway اندازه‌گیری شد (کالرا، 1998).

### فسفر

برای اندازه‌گیری فسفر گیاه، در مرحله اول محلول آمونیوم مولبیدات و انادات تهیه شد. و در مرحله دوم 5 میلی‌لیتر از عصاره تهیه شده را به بالن ژورنه 25 میلی‌لیتری منتقل و سپس 5 میلی‌لیتر از محلول آمونیوم مولبیدات و انادات به آن اضافه و با آب مقطر به حجم 25 میلی‌لیتر رسانده شد. میزان جذب نور زرد تشکیل شده، به وسیله اسپکتروفتومتر مدل Apel-PD-303UV در طول موج 480 نانومتر خوانده شد و با استفاده از منحنی کالیبراسیون (حاصل از محلول‌های استاندارد) تهیه شده، میزان فسفر محاسبه شد (کالرا، 1998).

### ازت

ازت کل گیاه به روش تیتراسیون بعد از تقطیر توسط سیستم کج‌لدال انجام شد (گوس، 1995). میزان 5 میلی‌لیتر از عصاره تهیه شده را پی‌پت کرده و به بالن تقطیر منتقل کرده و به آن میزان 2 میلی‌لیتر از محلول هیدروکسید سدیم اضافه شد. و سپس عمل تقطیر در اپتی‌مم زمان بدست آمده انجام داده شد.

#### اندازه‌گیری عناصر غذایی بسترهای کشت

به منظور اندازه‌گیری ازت کل در بستر کشت از روش کج‌لدال و از دستگاه کجل تک (گوس، 1995) و به منظور اندازه‌گیری فسفر و عناصر میکرو در بسترهای کشت از روش پیچ و همکاران (1982) استفاده شد. فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Apel-PD-303UV در طول موج 880 نانومتر قرائت شد. عناصر کلسیم، آهن، روی، مس و منگنز نیز با دستگاه جذب اتمی مدل Analyst 700 قرائت شدند. پتاسیم توسط دستگاه فلیم‌فتومتر مدل jenway خوانده شد (کالرا، 1998).

#### اندازه‌گیری pH و EC بستر کشت

اندازه‌گیری pH و EC در بسترهای کشت به روش وردانک و گابریلز (1992) انجام شد. بر طبق این روش برای اندازه‌گیری pH در بسترهای کشت، مقدار 400 سانتی‌متر مکعب از بستر کشت به نسبت حجمی 1

$$WHC = \left( \frac{(W_{wsp} - W_p) \times 100}{V_p} \right) \text{ ظرفیت آبی}$$

وزن خشک بسترکشت و ظرف =  $W_{dsp}$

وزن خشک ظرف =  $W_p$

حجم ظرف =  $V_p$

حجم آب زهکشی شده =  $V_{wd}$

وزن تر بسترکشت و ظرف =  $W_{wsp}$

اندازه‌گیری خصوصیات شیمیایی بستر در آزمایشگاه نوین سنجش گیل واقع در شهرستان آستانه آشفیه و خصوصیات فیزیکی بستر در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان انجام شد.

### نتایج و بحث

تأثیر جایگزینی کمپوست پيله بادام زمینی بر شاخص‌های رشد گیاه

وزن خشک و وزن تر ریشه

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 4 نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اثر متقابل سطوح کمپوست و نوع بستر بر وزن خشک و وزن تر ریشه است (در سطح احتمال 1 درصد). در بستر بدون خاک، کاربرد 50 درصد کمپوست (1 پیت + 1 پرلیت + 1 کمپوست پيله بادام-زمینی) بیشترین وزن خشک ریشه به مقدار 2/37 گرم و وزن تر ریشه را با وزن 10/82 گرم نشان داد که نسبت به شاهد تفاوت معنی‌داری داشتند. در بستر خاکی، کاربرد 75 درصد کمپوست پيله بادام‌زمینی بیشترین وزن خشک ریشه را به میزان 1/02 گرم و وزن تر ریشه را به میزان 7/00 گرم نشان داد که نسبت به شاهد تفاوت معنی‌داری ندارند. بنابراین جایگزینی کمپوست پيله بادام‌زمینی در بستر بدون خاک نسبت به بستر خاکی تأثیر بهتری بر شاخص وزن خشک و وزن تر ریشه نشان می‌دهد (شکل 1 و 2).

وزن خشک و وزن تر اندام هوایی

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 4 نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اثر متقابل سطوح کمپوست و نوع بستر بر وزن خشک و وزن تر اندام هوایی است (در سطح احتمال 1 درصد). در بستر بدون خاک، کاربرد 50 درصد کمپوست (1 پیت + 1 پرلیت + 1 کمپوست پيله بادام‌زمینی) بیشترین وزن خشک اندام هوایی را به مقدار 8/91 گرم نشان داد که نسبت به شاهد تفاوت معنی‌دار دارد اما مقدار وزن تر اندام هوایی را به میزان 35/18 گرم نشان داد که نسبت به شاهد تفاوت معنی‌داری ندارد. در بستر خاکی نیز کاربرد 75 درصد کمپوست پيله بادام‌زمینی بیشترین وزن خشک اندام هوایی را به میزان 6/95 گرم نشان داد که تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد دارد در حالی که وزن تر را به میزان 28/22 گرم نشان داد که تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد ندارد (شکل 3 و 4).

به 5 (یعنی 1 قسمت بستر به 5 قسمت آب مقطر) در ارلن مایر مخلوط شد. سپس نمونه‌ها به مدت 25 دقیقه روی شیکر قرار داده شدند و در انتها با استفاده از کاغذ صافی عصاره‌گیری انجام شد. به منظور اندازه‌گیری EC در بسترهای کشت از عصاره اشباع بسترها با آب در مکش 10 سانتی‌متر استفاده شد. اندازه‌گیری pH توسط دستگاه pH متر مدل elmetron و EC توسط دستگاه jenway انجام شد.

اندازه‌گیری کربن آلی بستر کشت

برای اندازه‌گیری کربن آلی از روش والکی-بلاک (1934) استفاده شد.


تعیین خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت به روش فونتنو

در این روش از ظروف با حجم مشخص که تحمل دمای 105 درجه (به مدت حداقل 48 ساعت در آون) را دارند استفاده می‌شود. با توجه به روش فونتنو (1996) ظروف آلومینیومی انتخاب شده و با ریختن آب در داخل ظروف و تعیین حجم آب، حجم داخلی ظروف اندازه‌گیری شد. بعد از تعیین حجم داخلی ظروف، تعداد 8 سوراخ به قطر 5 میلی‌متر در ته ظروف ایجاد شد. برای تعیین خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت، پارچه نایلونی در کف ظروف قرار داده شده تا از عبور مواد بستری از سوراخ‌های کف جلوگیری نماید. پس از پر کردن ظروف از بستر کشت، ظروف به آرامی از ارتفاع 10 سانتی‌متر بر سطح میز زده شده، و افت بستر داخل ظرف با افزودن مواد بستری اصلاح شد. این عمل 4 بار انجام شد تا تراکم معینی در بسترها حاصل شده و فضای خالی بدون بستر حذف شود. در مرحله بعدی سوراخ‌های ته ظروف با استفاده از برجسب نایلونی آب بندی شده و بستر به آرامی و در طی زمان 15 دقیقه با ریختن آب به داخل ظرف، به مرحله اشباع رسید. بعد از این مرحله برجسب نایلونی زیر ظروف کنده شده و ظرف روی قیفی که روی پایه نگه‌دارنده قرار گرفته، گذاشته شده و آب خروجی به مدت 60 دقیقه در داخل استوانه مدرج جمع‌آوری و ثبت شد (حجم آب زهکش شده). بستر مرطوب توزین شده (وزن مرطوب)، سپس ظروف حاوی بستر کشت به مدت 48 ساعت در دمای 105 درجه سانتی‌گراد در آون قرار داده شد، که با توزین آن وزن خشک به دست آمد. از قرار دادن داده‌های حاصل در معادلات، مقادیر جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتی‌متر مکعب)، تخلخل کل (درصد)، تخلخل تهویه‌ای (درصد) و ظرفیت آبی بسترها (درصد) محاسبه شد.


$$Bd = \left( \frac{W_{dsp} - W_p}{V_p} \right) \text{ جرم مخصوص ظاهری}$$

$$AFP = \left( \frac{V_{wd} \times 100}{V_p} \right) \text{ تخلخل تهویه‌ای}$$

$$TP = AFP + CC \text{ تخلخل کل}$$



شکل 1 و 2- اثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام‌زمینی بر وزن خشک و وزن تر ریشه



شکل 3 و 4- اثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام‌زمینی بر وزن خشک و وزن تر اندام هوایی

### تأثیر جایگزینی کمپوست پيله بادام زمینی بر غلظت عناصر غذایی در گیاه

نمودارهای شماره 5 تا 10 نشان داد که ترکیب عناصر غذایی گیاه بنفشه دارای اختلاف معنی‌دار در غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، کلسیم و روی در بین تیمارها بود. اما در عناصر پتاسیم و آهن اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد. چنین روندی توسط پرز- موریسیا و همکاران (2006) نیز گزارش شده است. آن‌ها با اضافه نمودن نسبت‌های 0، 15، 30 و 50 درصد کمپوست لجن فاضلاب به صورت حجمی به جای پیت، در بستر کشت کلم بروکلی افزایش معنی‌دار اغلب عناصر را نسبت به شاهد گزارش نمودند که در عین حال غلظت عناصر در گیاه دارای اختلاف معنی‌دار در بین تیمارها بود. میانگین غلظت عناصر غذایی به دست آمده در گیاه بنفشه، معرف مطلوب بودن محدوده عناصر غذایی برای رشد آن بود (محبوب خمایی، 1386). در عین حال به نظر می‌رسد که اختلاف در رشد گیاه نمی‌تواند نتیجه مستقیمی از کمبود و یا زیادی عناصر غذایی در گیاه باشد. با توجه به اثر سطوح کمپوست پيله بادام زمینی در بستر کشت بر عناصر غذایی مشاهده شد که تیمارهای مختلف در بستر کشت نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند. به نظر می‌رسد که بخشی از آثار کمپوست پيله بادام زمینی در نتیجه وجود مواد هیومیکی باشد، چنانکه چن و همکاران (1988) نیز اعلام کردند که بخشی از اثر کمپوست بر رشد فیکوس بنجامین می‌تواند به دلیل نقش مشابه تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاه باشد.

### نیتروژن

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 5 نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اثر متقابل سطوح کمپوست و نوع بستر در سطح احتمال 5 درصد است. با توجه به شکل شماره 5 در بستر بدون خاک، جایگزینی سطوح کمپوست پيله بادام زمینی باعث کاهش مقادیر نیتروژن نسبت به شاهد می‌شود. کاربرد 25 و 75 درصد کمپوست پيله بادام زمینی بیشترین نیتروژن را به میزان 1/78 و 1/59 درصد نشان دادند که نسبت به شاهد با مقدار 1/36 درصد تفاوت معنی‌داری دارند. بنابراین، جایگزینی کمپوست پيله بادام زمینی در بستر خاکی نسبت به بستر بدون خاک تأثیر بهتری در جذب نیتروژن در گیاه بنفشه دارد.

### فسفر

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 5 نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اثر نوع بستر در سطح احتمال 1 درصد است. با توجه به شکل شماره 6 در بستر بدون خاک، کاربرد 25 درصد کمپوست (1/5 پیت + 1 پرلیت + 0/5 کمپوست پيله بادام زمینی)، 50 درصد کمپوست (1 پیت + 1 پرلیت + 1 کمپوست پيله بادام زمینی) و 100 درصد کمپوست (0 پیت + 1 پرلیت + 2 کمپوست پيله بادام زمینی) بیشترین فسفر را به میزان 0/90 درصد نشان دادند که نسبت به شاهد با مقدار 0/80 درصد تفاوت معنی‌داری دارند. در بستر خاکی، کاربرد 25 درصد و 100 درصد کمپوست پيله بادام زمینی بیشترین فسفر را به میزان 0/83 درصد نشان دادند که نسبت به شاهد با مقدار 0/80 درصد تفاوت معنی‌داری ندارند. بنابراین، جایگزینی کمپوست پيله بادام زمینی در بستر بدون خاک نسبت به بستر خاکی تأثیر بهتری در جذب فسفر در گیاه بنفشه دارد.

### پتاسیم

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 5 نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اثر سطوح کمپوست در سطح احتمال 1 درصد و نوع بستر در سطح احتمال 5 درصد است. با توجه به شکل شماره 7 در بستر بدون خاک، کاربرد 25 درصد کمپوست (1/5 پیت + 1 پرلیت + 0/5 کمپوست پيله بادام زمینی) بیشترین پتاسیم را به میزان 3/30 درصد نشان داد که نسبت به شاهد با مقدار 3/07 درصد تفاوت معنی‌داری ندارد. در بستر خاکی، نیز کاربرد 25 درصد کمپوست پيله بادام زمینی بیشترین میزان فسفر را به میزان 3/20 درصد نشان می‌دهد که نسبت به شاهد با مقدار 3/01 درصد تفاوت معنی‌داری ندارد.

### کلسیم

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 5 نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اثر نوع بستر در سطح احتمال 1 درصد است. با توجه به شکل شماره 8 در بستر بدون خاک، میزان کلسیم در تیمارها با افزایش سطوح کمپوست کاهش معنی‌دار نسبت به شاهد نشان داد. در بستر خاکی، کاربرد 75 درصد کمپوست پيله بادام زمینی بیشترین کلسیم را به میزان 1/98 درصد نشان داد که نسبت به شاهد با مقدار 1/42 درصد تفاوت معنی‌داری دارد. بنابراین، جایگزینی کمپوست پيله بادام زمینی در بستر خاکی نسبت به بستر بدون خاک، تأثیر بهتری در جذب کلسیم در گیاه بنفشه دارد.




است. با توجه به شکل شماره 10 در بستر بدون خاک، کاربرد 25 درصد کمپوست (1/5 پیت + 1 پرلیت + 0/5 کمپوست پیله بادام زمینی) بیشترین روی را به میزان 33/47 میلی‌گرم بر کیلوگرم نشان می‌دهد که نسبت به شاهد با مقدار 26/02 میلی‌گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی‌داری دارد. در بستر خاکی، کاربرد 25 و 50 و 100 درصد سطوح کمپوست پیله بادام زمینی بیشترین روی را به میزان 32/33 و 38/76 و 32/49 میلی‌گرم بر کیلوگرم نشان دادند که نسبت به شاهد با مقدار 25/63 میلی‌گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی‌داری دارند. اما مقایسه بین تیمار دوم بستر بدون خاک با تیمارهای دوم، سوم و پنجم بستر خاکی نشان می‌دهد که این تیمارها تفاوت معنی‌داری نسبت به هم ندارند.

#### آهن


نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 5 نشان دهنده معنی‌دار بودن اثر نوع بستر و سطوح کمپوست در سطح احتمال 1 درصد است. با توجه به شکل شماره 9 در بستر بدون خاک، با افزایش سطوح کمپوست، میزان آهن در تیمارها نسبت به شاهد کاهش نشان می‌دهد که این کاهش معنی‌دار نیست. اما در بستر خاکی افزایش سطوح کمپوست باعث کاهش معنی‌دار میزان آهن در تیمارها نسبت به شاهد می‌شود.

#### روی


نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 5 نشان دهنده معنی‌دار بودن اثر سطوح کمپوست در سطح احتمال 1 درصد و نوع بستر در سطح احتمال 5 درصد




شکل 5- اثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام زمینی بر غلظت نیتروژن گیاه




شکل 6- اثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام زمینی بر غلظت فسفر گیاه




شكل 7- اثر بستر و سطوح كمپوست پيله بادام زميني بر غلظت پتاسيم گياه



شكل 8- اثر بستر و سطوح كمپوست پيله بادام زميني بر غلظت كلسيم گياه



شكل 9- اثر بستر و سطوح كمپوست پيله بادام زميني بر غلظت آهن گياه



شکل 10- اثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام زمینی بر غلظت روی گیاه

جدول 4- تجزیه واریانس شاخص‌های رشد گیاه

وزن تر اندام هوایی	وزن خشک اندام هوایی	وزن تر ریشه	وزن خشک ریشه	درجه آزادی	منابع تغییرات
78/13*	91/36 ns	12/39**	0/182**	2	بلوک
165/95**	11/05**	22/23**	1/76**	4	سطوح کمپوست
13/49 ns	40/31**	10/58*	1/35**	1	نوع بستر
70/16**	15/74**	40/57**	1/58**	4	اثر متقابل
18/40	0/55	2/38	0/035	18	خطای آزمایش
19/04	13/65	29/10	20/13	---	ضریب تغییرات

ns ، \* ، \*\* به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد، 5 درصد و عدم معنی‌داری

جدول 5- تجزیه واریانس غلظت عناصر غذایی در گیاه

عناصر ماکرو		عناصر میکرو				درجه آزادی	منابع تغییرات
نیترژن	فسفر	پتاسیم	کلسیم	آهن	روی		
0/0017 ns	0/00001 ns	0/014 ns	0/116 ns	59/92 ns	131/15**	2	بلوک
0/034 ns	0/0005 ns	0/161**	0/121 ns	1176/71**	77/93**	4	سطوح کمپوست
0/016 ns	0/0002**	0/130*	1/07**	5750/42**	64/18*	1	نوع بستر
0/50*	0/00002 ns	0/014 ns	0/109 ns	524/94 ns	20/36 ns	4	اثر متقابل
0/013	0/00002	0/035	0/073	260/48	14/65	18	خطای آزمایش
7/66	5/46	6/18	18/58	5/93	12/53	---	ضریب تغییرات

ns ، \* ، \*\* به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد، 5 درصد و عدم معنی‌داری

### خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت

بدون خاک مربوط به شاهد (2 پیت + 1 پرلیت + 0 کمپوست) با 2/43 درصد و در بستر خاکی، 0/45 درصد با کاربرد 75 درصد کمپوست مشاهده شد. در پژوهشی مقدار نیترژن کل نسبت به دو کود آلی دیگر مانند ورمی‌کمپوست و کود دامی کمتر بود. چون کود کمپوست قبل از افزوده شدن به بستر، مراحل مقدماتی تجزیه را در زمان کمپوست کردن طی کرده

میزان نیترژن با جایگزینی کمپوست پیله بادام زمینی در بستر خاکی نسبت به شاهد افزایش یافت. اما میزان نیترژن در بستر بدون خاک، نسبت به شاهد کاهش نشان داد که با نظر گریگاتی و همکاران (2007) تفاوت داشت. آن‌ها افزایش میزان نیترژن را با اضافه نمودن کمپوست کود دامی در جایگزینی با پیت، در بستر کشت گلدانی گزارش نمودند. بیشترین میزان نیترژن در بستر

بیشترین میزان پتاسیم در بستر بدون خاک 637/45 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در بستر خاکی 127/49 میلی‌گرم بر کیلوگرم با کاربرد 75 درصد کمپوست مشاهده شد. بیشترین میزان کلسیم در بستر بدون خاک 33/6 میلی‌گرم بر لیتر و در بستر خاکی 12/8 میلی‌گرم بر لیتر با کاربرد 75 درصد کمپوست بود. pH بسترهای کشت بدون خاک در محدوده بهینه برای پرورش گیاهان قرار داشت. به طوری که مطابق نظر ابد و همکاران (2001) pH مناسب برای رشد مطلوب، 5/3 تا 6/5 تعیین شده است. اما میزان pH در بستر خاکی، به غیر از کاربرد 100 درصد کمپوست که 6/08 بود در بقیه تیمارها بالاتر از حد مطلوب برای پرورش گیاهان زینتی قرار داشت. برخی عوامل مطلوب از نظر زیبایی مثل اندازه و ظاهر گیاه از جمله معیارهای مهم در تعیین حد شوری برای تحمل گیاهان است. بیشترین میزان EC در بستر بدون خاک 1/168 ds/m با جایگزینی 25 درصد کمپوست و در 100 درصد کمپوست بستر خاکی 1/575 ds/m مشاهده شد. مقدار EC در بستر کشت بدون خاک و خاکی به غیر از موارد ذکر شده، کمتر از محدوده مناسب برای گیاهان (1-3 ds/m) قرار داشت (علیزاده، 1378). با افزایش سطوح کمپوست پيله بادام‌زمینی میزان کربن آلی، در بستر بدون خاک روند کاهشی، و در بستر خاکی روند افزایشی نشان داد. مقادیر عناصر میکرو (آهن، روی و منگنز) در بستر بدون خاک و خاکی با جایگزینی سطوح کمپوست، نسبت به شاهد افزایش یافت (جدول 6 و 7).

استفاده از ضایعات آلی در بسترهای کشت، غلظت و جذب کل عناصر روی-مس-آهن و منگنز (اندازه‌گیری شده به وسیله دستگاه جذب اتمی) را در گیاه افزایش داده که نشان‌دهنده امکان استفاده از ضایعات آلی در تأمین عناصر کم‌مصرف کاتیونی برای گیاه است (زیبایی و همکاران، 1396).

است، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نیتروژن قابل معدنی شدن پیش از اضافه شدن به بستر معدنی شده است. لذا نیتروژن آلی باقی‌مانده در کمپوست پس از افزوده شدن به بستر با سرعت کمتری معدنی می‌شود، اگر چه نسبت کربن به نیتروژن کود کمپوست کمتر از ورمی-کمپوست و کود دامی است، ولی ترکیبات آلی پایدارتر و مقاوم‌تر آلی که نیتروژن را در برگرفته است مانع از آزاد شدن سریع نیتروژن می‌گردد (توریس و همکاران، 2001).

میزان فسفر در بستر بدون خاک با افزایش جایگزینی کمپوست کاهش یافت که با نتایج گریگاتی و همکاران (2007) مطابقت داشت. پرز مورسیا و همکاران (2006) نیز کاهش میزان فسفر را در بسترهای حاوی کمپوست ضایعات سبز و لجن فاضلاب با افزایش جایگزینی نسبت به شاهد گزارش نمودند.

اما در بستر خاکی با افزایش سطوح کمپوست پيله بادام زمینی، میزان فسفر افزایش یافت. بیشترین میزان فسفر در بستر بدون خاک 564/33 میلی‌گرم بر کیلوگرم مربوط به شاهد و در بستر خاکی با کاربرد 50 درصد کمپوست 4/89 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. به نظر می‌رسد در بستر بدون خاک، با تجزیه بیشتر کمپوست در مقادیر بالاتر جایگزینی، فعالیت میکروارگانیسم‌ها به طور موقت باعث تبدیل فسفر آلی به معدنی شده و فسفر از قابلیت دسترسی گیاه خارج شده باشد. مقدار قابل توجه پتاسیم در کمپوست پيله بادام زمینی نسبت به پیت، در بستر بدون خاک با افزایش درصد جایگزینی به جای پیت افزایش یافت که با نظر محمدی ترکاشوند و همکاران (1393) مطابقت داشت. در پژوهش آن‌ها میزان فسفر و پتاسیم با افزایش جایگزینی کمپوست‌های آلی (ضایعات چای، آزولا، زباله شهری) افزایش یافت. در بستر خاکی نیز افزایش پتاسیم با افزایش جایگزینی سطوح کمپوست پيله بادام زمینی مشاهده شد.

جدول 6- تجزیه شیمیایی بسترهای کشت بدون خاک

Cu	Mn	Zn	Fe	K	P	O.C	N	Ca	EC	pH	مشخصات	ردیف
mg/kg					%		mg/L	dS/m				
9/19	160/49	7/68	421/68	278/88	564/33	28/86	2/43	26/88	0/979	5/84	2 پیت + 1 پرلیت + 0 کمپوست (شاهد)	1
10/81	208/46	9/14	709/53	418/33	482/01	25/35	2/13	29/12	1/168	5/85	1/5 پیت + 1 پرلیت + 0/5 کمپوست	2
7/42	233/46	9/95	808/00	398/41	427/13	18/33	1/54	29/12	0/87	5/99	1 پیت + 1 پرلیت + 1 کمپوست	3
7/27	269/06	14/19	825/14	637/45	405/79	19/11	1/61	33/6	0/843	6/19	0/5 پیت + 1 پرلیت + 1/5 کمپوست	4
12/98	274/52	9/54	794/86	338/65	177/13	10/92	0/92	24/64	0/365	6/48	0 پیت + 1 پرلیت + 2 کمپوست	5

جدول 7- تجزیه شیمیایی بسترهای کشت خاکی

Cu	Mn	Zn	Fe	K	P	O.C	N	Ca	EC	pH	مشخصات	ردیف
mg/kg					%		mg/L	dS/m				
1/48	10/14	0/07	4/32	63/75	1/60	2/90	0	8/00	0/127	8/20	100% خاک زراعی + 0% کمپوست (شاهد)	1
0/81	10/47	0/13	5/09	79/68	2/94	1/17	0/10	10/40	0/156	8/16	75% خاک زراعی + 25% کمپوست	2
0/76	10/36	0/08	5/29	111/55	4/89	3/67	0/31	11/2	0/206	7/95	50% خاک زراعی + 50% کمپوست	3
0/90	14/47	0/08	5/18	127/49	4/40	5/38	0/45	12/8	0/303	7/88	25% خاک زراعی + 75% کمپوست	4
23/89	392/08	35/96	871/63	1135/46	552/13	28/86	2/43	33/6	1/575	6/08	0% خاک زراعی + 100% کمپوست	5*

\* غلظت عناصر غذایی ردیف‌های 1-4 به صورت قابل استفاده و در ردیف 5 به صورت کل اندازه‌گیری شد.

خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت

جرم مخصوص ظاهری در بسترهای کشت با اضافه شدن مقدار کمپوست پيله بادام زمینی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. جایاسینگ و همکاران (2010) با افزایش حجمی کمپوست کود دامی در جایگزینی با خاک‌دانه‌های دست‌ساز، کاهش جرم مخصوص ظاهری را گزارش نمودند. به نظر می‌رسد بافت سلولزی پيله بادام زمینی و اندازه ذرات در این کمپوست، با ایجاد تخلخل بالا باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری نسبت به تیمار شاهد می‌شود. بیشترین میزان تخلخل کل بستر بدون خاک 72/19 درصد و بستر خاکی 80/51 درصد در کاربرد 100 درصد کمپوست و کمترین میزان تخلخل در تیمار شاهد بستر بدون خاک 36/43 درصد و خاکی 41/99 درصد مشاهده شد که مربوط به تأثیر کمپوست پيله بادام زمینی بر جرم مخصوص ظاهری بستر کشت است. به طوری که با افزایش نسبت حجمی کمپوست، میزان جرم مخصوص ظاهری بستر کشت کاهش یافت که متعاقباً میزان تخلخل نیز افزایش یافت. درصد ظرفیت آبی در بسترهای کشت کمتر از محدوده ایده‌آل برای کشت گیاهان بود. طبق نظر ناپی و باربریس (1993) درصد ظرفیت آبی بسترهای کشت ایده آل 55 تا 85 درصد می‌باشد. بیشترین میزان ظرفیت آبی در بستر بدون خاک با کاربرد 100 درصد کمپوست 18/35 درصد و در بستر خاکی با 75 درصد کمپوست 44/29 درصد مشاهده شد.

کمترین ظرفیت آبی در بستر بدون خاک با کاربرد 25 درصد کمپوست 14/54 درصد و در بستر خاکی با جایگزینی 100 درصد کمپوست 26/04 درصد مشاهده شد. با افزایش نسبت کمپوست پيله بادام زمینی به علت افزایش تخلخل و افزایش حجم هوا، حجم آب قابل نگه‌داری در بسترها کاهش یافت و نیاز به تناوب آبیاری در بسترهای کشت بدون خاک و خاکی، به خصوص بسترهای حاوی 100 درصد کمپوست را افزایش داد. با افزایش مقدار کمپوست پيله بادام زمینی در بسترهای کشت، میزان تخلخل تهویه‌ای افزایش یافت. بیشترین میزان تخلخل تهویه‌ای بستر بدون خاک 53/84 درصد و بستر خاکی 68/95 درصد با کاربرد 100 درصد کمپوست و کمترین میزان تخلخل تهویه‌ای بستر بدون خاک 21/65 درصد و بستر خاکی 3/86 درصد نیز در تیمار شاهد مشاهده شد. مطابق نظر ابد و همکاران (2001) مقدار ایده‌آل تخلخل تهویه‌ای در بسترهای کشت برای پرورش گیاهان زیتنی بین 20-30 درصد می‌باشد. در اثر جایگزینی سطوح مختلف کمپوست پيله بادام زمینی با پیت و خاک زراعی در بسترهای کشت، میزان جرم مخصوص ظاهری کاهش یافته که در نتیجه آن میزان تخلخل افزایش می‌یابد. کاهش شدید جرم مخصوص ظاهری موجب تهویه زیاد و کاهش آب قابل دسترس می‌شود (جدول 8 و 9).

جدول 8- خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت بدون خاک

تیمار	مشخصات	جرم مخصوص ظاهری (گرم / سانتی‌متر مکعب)	تخلخل کل (درصد)	ظرفیت آبی (درصد)	تخلخل تهویه‌ای (درصد)
1	2 پیت + 1 پرلیت + 0 کمپوست	0/64	36/43	14/78	21/65
2	1/5 پیت + 1 پرلیت + 0/5 کمپوست	0/53	40/76	14/54	26/22
3	1 پیت + 1 پرلیت + 1 کمپوست	0/48	53/86	15/95	37/91
4	0/5 پیت + 1 پرلیت + 1/5 کمپوست	0/43	60/31	15/65	44/66
5	0 پیت + 1 پرلیت + 2 کمپوست	0/32	72/19	18/35	53/84

جدول 9- خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت خاکی

تیمار	مشخصات	جرم مخصوص ظاهری (گرم / سانتی‌متر مکعب)	تخلخل کل (درصد)	ظرفیت آبی (درصد)	تخلخل تهویه‌ای (درصد)
1	100% خاک زراعی + 0% کمپوست	1/34	41/99	38/13	3/86
2	75% خاک زراعی + 25% کمپوست	1/17	43/78	38/86	5/28
3	50% خاک زراعی + 50% کمپوست	0/86	55/63	43/00	10/99
4	25% خاک زراعی + 75% کمپوست	0/55	69/78	44/29	18/71
5	100% خاک زراعی + 0% کمپوست	0/10	80/51	26/04	68/95

## نتیجه‌گیری

قابل نگهداری شد. از این رو کمپوست پيله بادام زمینی با وجود افزایش برخی اثرات مفید همچون pH مناسب در بستر بدون خاک و نسبت C/N مناسب، به صورت یک عامل محدود کننده عمل می‌کند. بنابراین نمی‌توان از بستر حاوی 100 درصد کمپوست پيله بادام زمینی به عنوان جایگزین پیت و خاک زراعی برای کشت گیاه بنفشه نام برد. به علت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب کاربرد 50 درصد کمپوست پيله بادام زمینی در بستر بدون خاک و 75 درصد کمپوست پيله بادام زمینی در بستر خاکی، این بسترها می‌توانند جایگزین مناسبی برای پیت، با توجه به گران بودن و وارداتی بودن آن و نیز خاک زراعی در جهت بهبود خصوصیات آن به شمار آیند. اما وجود EC پایین‌تر از حد بهینه (1-3 ds/m) در اکثر تیمارهای حاوی کمپوست پيله بادام زمینی در بسترهای کشت بدون خاک و خاکی، و pH بالاتر از حد مطلوب پرورش گیاهان (5/3 - 6/5) در بستر کشت خاکی، از جمله مواردی است که در زمان استفاده از کمپوست پيله بادام زمینی در بستر کشت گیاهان باید مورد توجه قرار گیرد.

پيله بادام زمینی به‌عنوان ضایعات به جا مانده از کشت بادام زمینی، حجم قابل توجهی دارد که کمپوست آن می‌تواند در بستر کشت گیاهان زبیتی استفاده شود. کمپوست پيله بادام زمینی با کاهش نسبت نیتروژن/کربن، درصد تخلخل بالا و عرضه بهتر عناصر غذایی، اثر بیشتری را بر شاخص‌های رشد در گیاهان مدل تحقیقاتی مانند بنفشه و دراسنا نشان داده است. بنابراین، کمپوست پيله بادام زمینی می‌تواند در ترکیب بستری این گیاهان برای جایگزینی پیت گران‌قیمت به میزان 15 تا 40 درصد حجمی در دراسنا (محمدی ترکاشوند و همکاران، 1393) و 50 درصد حجمی در بنفشه (امیدی و عبدالمحمدی، 1398) استفاده شود. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش سطوح کمپوست پيله بادام زمینی در بستر کشت بدون خاک و خاکی، منجر به بهبود شاخص‌های رشد گیاه بنفشه شد. در بستر کشت بدون خاک، جایگزینی 50 درصد کمپوست پيله بادام زمینی و در بستر خاکی کاربرد 75 درصد کمپوست پيله بادام زمینی اثر بهتری بر رشد گیاه بنفشه داشتند. بافت سلولزی پيله بادام زمینی و اندازه ذرات در این کمپوست با ایجاد تخلخل بالاتر از حد بهینه، باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری و کاهش آب

## فهرست منابع:

1. امیدی، ج. عبدالمحمدی، س. بخشی‌پور، م و م، شیخ‌پور. 1397. امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (*Pedilanthus tithymaloides* L.). فصلنامه علمی و پژوهشی بیولوژی کاربردی. 8 (32): 13-20.
2. امیدی، ج. و س، عبدالمحمدی. 1398. تهیه کمپوست از ضایعات بادام زمینی. مجله ترویجی مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی، جلد 1، شماره 1: 10-6.
3. بی‌نام. 1388. آمار و اطلاعات محصولات زراعی. انتشارات مدیریت زراعت، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.
4. بی‌نام. 1389. آمار و اطلاعات محصولات زراعی. انتشارات مدیریت زراعت، مدیریت جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه.
5. جهانی، م.، بشارتی، ح. و گلچین، ا. 1390. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست‌های غنی شده بر درصد ظهور گیاهچه و وزن خشک بوته ذرت هیبرید سینگل کراس. مجله پژوهش‌های خاک (علوم خاک و آب). 25 (1): 38-33.
6. خرازی، س. م.، یونسی، ح. و عابدینی طریقه، ج. 1393. تأثیر ترکیب ضایعات ذرت با کود گاوی و کارتن بر کیفیت ورمی‌کمپوست تولید شده با *Eisenia fetida* (پژوهش و سازندگی). 1 (103): 189-179.
7. زیبایی، ز.، قاسمی فسایی، ر.، استوار، پ. 1396. بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوسته برنج بر رشد و ترکیبات شیمیایی گیاه لوبیا در یک خاک آهکی آلوده به لجن فاضلاب. نشریه محیط‌زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 70 (4): 869-880.

8. شهدی کومله، ع. 1398. مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک. نشریه مدیریت اراضی. جلد 7 شماره 2: 165-143.
9. صداقت حور، ش. م. زرچینی، س. مجیدی و س. رضایی. 1389. نقش و کاربرد کمپوست‌ها برای نیل به اهداف کشاورزی پایدار و ارگانیک. مجموعه مقالات همایش ملی کشاورزی در ایران 1404، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
10. علیزاده، ا. 1378. رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات آستان قدس رضوی، 355 صفحه.
11. محبوب خمایی، ع. 1386. تغذیه گیاهان زینتی. انتشارات حق شناس رشت، جلد اول، 219 صفحه.
12. محمدی ترکشوند، ع.، علیدوست، م.، و محبوب خمایی، ع. 1393. اثرات کمپوست پيله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی در اسنا. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 28 (1): 42-34.
13. محمدی ترکشوند، ع.، دلجوی توحیدی، ط.، هاشم‌آبادی، د.، کاویانی، ب. 1393. اثر بسترهای مختلف کشت و روش کوددهی بر خصوصیات رشد و عملکرد گل مینا چمنی. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای، سال پنجم، شماره 20: 109-95.
14. Abad, M., P. Noguera and S. Bures. 2001. National inventory of organic wastes for use as growing media for ornamental potted plant production: case study in Spain. *Bioresource Technology*, 77:197-200.
15. Abusharer, T. M. 1996. Modification of hydraulic properties of a semiarid soil in relation to seasonal application of sewage sludge and electrolyte producing compounds. *Soil Technolgy*, 9: 1-13.
16. Akhgar, S. M. Omid, J. Abdolmohammadi, S. Nematipour, V. 2019. Study of Agricultural Waste Processing for Different Uses (Case Study of Tea Waste) *American Journal of Plant Biology*, 2019; 4(2): 12-15.
17. Benito, M., Masaguer, A., De Antonio, R., Moliner, A. 2005. Use of pruning waste compost as a component in soilless growing media. *Bioresource Technology*, 96: 597-603.
18. Chen, Y., Y. Inbar and Y. Harda. 1988. Composted agricultural wastes as potting media for ornamental plants. *Soil Science*, 145 (4): 298-303.
19. Dennis, B., J. Chen J. Richard and C. Kelly. 2003. Original publication date Cultural Guidelines for Commercial Production of *Dracaena*. University of Florida. Visit the EDIS Web site at <http://edis.ifas.ufl.edu>.
20. Fonteno, W.C. 1996. Growing media: Types and Physical/Chemical Properties. In D.W. Reed (Ed) *Water, Media, and Nutrition of Greenhouse Crops*. Ball Publications, Batavia, IL. pp. 93-122.
21. Gayasinghe. G.Y., I.D. Liyana and Y. ArachchiTokashiki. 2010. Evaluation of containerized substrates developed from cattle manure compost and synthetic aggregates for ornamental plant production as a peat alternative. *Resources Conservation and Recycling*, 54: 1412-1418.
22. Giusquiani, P. L., M. Pagliai, D. Businelli and A. Benetti. 1995. Urban waste compost effect on physical, chemical and biological soil properties. *Journal of Environmental Quality*, 24:172-184.
23. Goos, R.J. 1995. A laboratory exercise to demonstrate nitrogen mineralization and immobilization, *Journal of natural resources and life sciences education (USA)*, 24: 68-70.
24. Grigatti, M., M.E. Giorgoni, L. Cavani and C. Ciavatta. 2007. Factor analysis in the study of the nutritional status of *philodendron* cultivated in compost-based media. *Scientia Horticulturae*, 112: 448-455.
25. Gupta, P. K. 2003. *A handbook of soil, Fertilizers and Manure*. 2nd ed. Agrobios (India), P:313-329.
26. Kalra, Y.P. 1998. *Handbook of Reference Methods for Plant Analysis*. crc press. pp. 219.



27. Krumholz. L. A., Wilsonand. S. B., and Stoffella. P. J. 2000. Use of compost as a media amendment for containerized production of perennial cat whiskers. SNA Research Conference, 45: 69-72.
28. Nappi. P and R. Barberis. 1993. Compost as growing medium: chemical, physical and biological aspects. *Acta Horticulturae*, 342: 249-256.
29. Page, A.L., R.H. Miller and D.R. Keeney. 1982. *Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and microbiological properties*. American society of Agronomy, Inc. Soil Science of America, Inc. Madison, Wisconsin, USA.
30. Papafotiou. M., Phsyhalou. M., Kargas. G., Chatzipavlidis. I., Chronopoulos. J. 2005. Olive-maill waste compost as growth medium component for the production of poinsettia. *Horticultural Sciences*, 102:167-175.
31. Perez-Murcia M.D., Moral R., Moreno-Caselles J., Perez-Espinosa A., and Paredes C. 2006. Use of composted sewage sludge in growth media for broccoli. *Bioresource Technology*, 97: 123–130.
32. Thuries, L., M. Pansu, C. Feller, J. C. Herrmann and J.C. Remy. 2001. Kinetics of added organic matter decomposition in a Mediterranean sandy soil. *Soil Biology and Biochemistry*. 33: 997- 1010.
33. Verdonck, O and R. Gabriels. 1992. I.Reference method for the determination of physical properties of plant substrates. II.Reference method for the determination of chemical properties of plant substrates. *Acta Horticulturae*. 302:169-179.
34. Walkley, A. and I. A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and proposed modification of the chromic acid titration method. *Journal of Soil Science*, 37: 29-37.

## Use of Peanut Shell Compost in Growth Media and Its Effect on the Physical and Chemical Properties of Soil

**J. Omid<sup>1</sup>, A. Hatamzadeh, and A. Mahboub Khomami**

MSc. Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran;

E-mail: jalalomidi58@yahoo.com

Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran;

E-mail: hatamzadeh@guilan.ac.ir

Faculty Member of Soil and Water Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources

Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran; E-mail: Mahboub48@yahoo.com

Received: March, 2020 and Accepted: October, 2020

### Abstract

Peanut shell as a residual waste from peanut cultivation has a considerable volume and its compost can be used as an available source of nutrient elements for different plants. This study was carried out to investigate the use of peanut shell compost in field soil and soilless (peat-perlite ratio 2: 1) media and its effect on soil physical and chemical properties in Lahijan Ornamental Flower and Plant Research Station, in 2017. Control treatments consisted of field soil and peat-perlite (2:1) bedding, while peanut shell compost was used in values of 0, 25%, 50%, 75%, and 100% (by volume) to replace field soil and peat (2:1) in peat-perlite bedding. This study was conducted as a factorial experiment with two variables (type of media and compost levels) based on randomized complete block design with three replications using violet research model plant (*Viola spp.*). At the end of the experiment, physical properties of the substrates including total porosity, air fill porosity, water capacity, bulk density, and nutrients content of the substrates including Ca, N, OC, P, K, Fe, Zn, Mn, Cu, and also pH and EC were measured. In soilless culture, application of 50% peanut compost (1 peat+1 perlite+1 compost), and in soil media, application of 75% peanut compost showed the best results for the research model plant. Peanut shell compost appears to have better results by reducing C/N ratios and increasing porosity and nutrient supply in these two substrates. Thus, peanut shell compost can be used to replace the expensive peats as well as improving soil properties for cultivation of this ornamental plant.

**Keywords:** Agricultural waste, Peat, Perlite, Soil porosity

<sup>1</sup> Corresponding author: Department of Horticulture, Faculty of Agricultural, Guilan University