

هیرسوتیسم پیش از یائسگی در شمال ایران: علل و یافته‌های بالینی همراه

هدف: هیرسوتیسم به معنای افزایش موهای انتهایی (terminal) با الگوی مردانه در نواحی از بدن خانم‌ها شامل لب بالا، گونه‌ها، چانه، قسمت مرکزی سینه، پستان‌ها، قسمت پایین شکم و ران می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی سبب‌شناختی هیرسوتیسم و یافته‌های بالینی همراه آن در خانم‌های غیربیائسه می‌باشد.

روش اجرا: در این مطالعه که به روش مقطعی انجام شد، ۱۸۰ خانم مبتلا به هیرسوتیسم که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به درمانگاه پوست شهرستان ساری مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اخذ شرح حال دقیق و معاینه‌ی فیزیکی، سونوگرافی لگنی برای بررسی تخدمان‌ها و بررسی‌های آزمایشگاهی شامل اندازه‌گیری تستوسترون تام (total) و آزاد خون، پرولاکتین، دی‌هیدروآپی‌اندروسترون‌سولفات، FSH، LH و ۱۷-هیدروکسی پروژسترون صحبتگاهی در همه‌ی بیماران انجام شد.

یافته‌ها: علل ایجاد هیرسوتیسم شامل ایدیوپاتیک (۱۱٪/۵۱ موارد)، سندرم تخدمان پلی‌کیستیک (۷٪/۳۷ موارد)، هیرپرولاکتینی (۴٪/۴۰)، هیرپلازی آدرنال (۸٪/۳) و مصرف دارو (۸٪/۲) بودند. هیرسوتیسم در ۹۳ بیمار خفیف (۶٪/۵۱)، ۷۸ بیمار متوسط (۳٪/۴۳) و در ۹ بیمار شدید بود. سابقه‌ی خانوادگی هیرسوتیسم در ۱۰۰ بیمار وجود داشت. یافته‌های بالینی همراه با هیرسوتیسم شامل آکنه (۳٪/۵۸)، چاقی (۵٪/۵۵)، اختلال در عادت ماهانه (۸٪/۳۸)، آلوپسی آنдрؤژنیک (۷٪/۱۷) و آکانتوزیس نیگریکانس (۴٪/۸) بود.

نتیجه‌گیری: هیرسوتیسم ایدیوپاتیک و سندرم تخدمان پلی‌کیستیک شایع‌ترین علل هیرسوتیسم در زنان بودند. همچنین چاقی نقش مؤثری در بروز هیرسوتیسم داشت.

کلیدواژه‌ها: هیرسوتیسم، چاقی، آکنه

دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

پوست و زیبایی؛ بهار ۱۳۹۵، دوره‌ی ۷ (۱): ۳۷-۳۱

دکتر قاسم رحمت پور رکنی^۱

دکتر عادله بهار^۲

دکتر مهناز شریفیان^۳

دکتر سیدناصر عمامدی چاشمی^۴

دکتر امیرحسین کیانزاد^۵

دکتر محمد رئیسیان^۵

۱. گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. گروه آسیب شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

۴. گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۵. دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

نویسنده‌ی مسئول:

دکتر سیدناصر عمامدی چاشمی
تهران، خیابان وحدت اسلامی، میدان وحدت اسلامی، بیمارستان رازی، گروه پوست

پست الکترونیک:
naseremad@yahoo.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

ران می‌باشد. با اینکه هیرسوتیسم می‌تواند با هیرپرولاکتینی همراه باشد، نیمی از زنان مبتلا، دارای سطوح طبیعی آندرؤژن هستند^۶. هیرسوتیسم به‌دلیل افزایش سطح آندرؤژن‌ها یا افزایش حساسیت گیرنده‌ی آندرؤژن‌ها در سطح فولیکول مو ایجاد می‌شود.^۷ از علل اصلی هیرسوتیسم می‌توان به مواردی از قبلی سندرم تخدمان پلی‌کیستیک، ایدیوپاتیک، هیرپلازی آدرنال، تومورهای مترشحه‌ی آندرؤژن،

مقدمه

افزایش موهای زائد در افراد به دو نوع کلی هیرپرولاکتوز و هیرسوتیسم تقسیم می‌شوند. هیرپرولاکتوزیس به افزایش موهای با قطر نازک (کرکی) گفته می‌شود اما هیرسوتیسم به معنای افزایش موهای انتهایی (terminal) با الگوی مردانه در نواحی حساس به آندرؤژن در خانم‌ها شامل لب بالا، گونه‌ها، چانه، قسمت مرکزی سینه، پستان‌ها، قسمت پایین شکم و

مورد مصاحبه و معاینه‌ی بالینی قرار گرفتند و اطلاعاتی مانند سن، سابقه‌ی اختلال عادت ماهانه، وسعت بیماری، محل شروع ضایعات، سابقه‌ی خانوادگی هیرسوتیسم، سابقه‌ی مصرف دارو و همچنین شرح حالی دقیقی از نظر سایر علائم هیپرآندروژنیسم، گالاکتوره، اختلال عملکرد تیروئید، سندروم کوشینگ و آکرومگالی گرفته شد. بیماران با استفاده از مقیاس Ferriman-Gallwey مورد بررسی قرار گرفتند و شدت بیماری ثبت گردید. در مرحله‌ی بعد کلیه‌ی افراد شرکت‌کننده در مطالعه تحت آزمایشات هورمونی شامل سنجش تستوسترون تام (total) و آزاد خون، پرولاتکتین، دی‌هیدروواپی آندروسترون‌سولفات، FSH، LH و ۱۷-هیدروکسی پروژسترون قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان باردار، شیرده و بیمارانی که امتیاز Ferriman-Gallwey زیر ۸ داشتند، از مطالعه خارج شدند. همچنین در صورتی که بیمار ۲ معیار از ۳ معیار زیر را داشت تشخیص سندروم تخمدان پلی‌کیستیک برای او مطرح شد:

- هیپرآندروژنیسم بالینی (آکنه، هیرسوتیسم و آلوپسی آندروژنیک) یا بیوشیمیابی (افزایش سطح آندروژن‌های خون)
 - اختلال در عادت ماهانه (کمتر از ۹ دوره در سال یا فواصل عادات ماهیانه‌ی بیشتر از ۴۰ روز)
 - وجود تخمدان پلی‌کیستیک در سونوگرافی لگنی (بیشتر از ۱۲ فولیکول با اندازه‌ی ۲ تا ۹ میلی‌متر و با حجم تخمدان بیشتر از ۱۰ میلی‌متر).
- در صورتی که بیمار عادت ماهانه‌ی منظم (دوره عادت ماهانه بین ۲۱ تا ۳۵ روز با تغییرات کمتر از ۴ روز) داشت، سایر علائم و نشانه‌های هیپرآندروژنیسم نداشت، سابقه‌ی مصرف داروهای با خواص آندروژنی (دانازول، تستوسترون، والپریوئیک اسید، استروئیدهای آنabolیک مثل دی‌هیدروواپی‌آندروسترون، استازولامید، کورتیکواستروئیدها، فنتوتیازین‌ها و پروژستین‌های با خواص آندروژنیک نداشت) و از نظر

ایاتروژنیک و پرولاتکتینوما اشاره نمود.

شیوع هیرسوتیسم در جوامع شرقی، به ویژه در میان آسیایی‌ها در مقایسه با جوامع غربی بیشتر است. شیوع هیرسوتیسم براساس موارد معاینه شده از ۱/۲٪ تا ۱/۸٪ گزارش شده است. در این زمینه در ایالات متحده‌ی آمریكا در بین ۳۶۹ زن مورد بررسی، شیوع هیرسوتیسم بین زنان سفید پوست ۵٪ بود که از لحاظ آماری با زنان سیاهپوست با شیوع هیرسوتیسم ۷/۱٪ تفاوتی وجود نداشت.^۳

در مطالعه‌ی مورد – شاهدی نائینی و همکاران متوسط سن افراد 28 ± 26 سال بود. تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر سن و قد وجود نداشت. با این حال، شاخص توده‌ی بدن (Body Mass Index [BMI]) و وزن در گروه مورد به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد بود ($P < 0.001$).^۴

با توجه به شیوع بالای هیرسوتیسم و نقش عوامل محیطی و جغرافیایی و همچنین سبب‌شناصی (etiology) متفاوت آن در جوامع مختلف ما تصمیم گرفتیم مطالعه‌ی حاضر را جهت بررسی سبب‌شناصی هیرسوتیسم در منطقه‌ی شمال کشور انجام دهیم.

روش اجرا

این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که روی بیماران مبتلا به بیماری هیرسوتیسم مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا ساری از تیر ماه سال ۱۳۹۲ الی تیر ماه ۱۳۹۴ انجام شد. طی انجام مطالعه ۱۸۰ خانم مبتلا به هیرسوتیسم وارد مطالعه شدند و پس از انتخاب بیماران، مراحل انجام مطالعه و هدف از انجام آن برای هر یک از شرکت‌کنندگان توضیح داده شد. پس از آگاه‌سازی و اطمینان از رضایت افراد از شرکت در مطالعه از ایشان رضایت‌نامه‌ی کتبی در شرایط اختیار کامل اخذ گردید. قد و وزن بیماران یادداشت شد و BMI بیمار محاسبه گردید. سپس شرکت‌کنندگان توسط مجریان طرح،

۱۶۲,۵ \pm ۷,۶ بود و اختلاف آماری معنی‌داری بین قد و شدت هیرسوتیسم وجود نداشت ($P=0,9$). هم‌چنین ۷۴ بیمار (۴۱,۱٪) BMI طبیعی و ۱۰۶ بیمار (۵۸,۹٪) BMI بالاتر از ۲۵ کیلوگرم/متر مربع داشتند که تفاوت معنی‌دار آماری بین BMI و هیرسوتیسم مشاهده شد ($P=0,01$). جدول ۱ فراوانی و درصد فراوانی توزیع شاخص توده‌ی بدنی را آورده است.

از نظر سبب‌شناسی، ۹۲ نفر (۵۱,۱٪) هیرسوتیسم ایدیوپاتیک، ۶۸ نفر (۳۷,۷٪) سندروم تخمدان پلی‌کیستیک، ۸ نفر (۴,۴٪) افزایش پرولاکتین، ۷ نفر (۳,۸٪) هیپرپلازی آدرنال و ۵ نفر (۲,۸٪) مصرف دارو داشتند. هم‌چنین از نظر شدت هیرسوتیسم براساس امتیاز Ferriman-Gallwey، ۹۳ نفر (۵۱,۶٪) خفیف، ۷۸ نفر (۴۳,۳٪) متوسط و ۹ نفر (۵٪) هیرسوتیسم شدید داشتند. رابطه‌ی بین شدت هیرسوتیسم و علت آن در جدول ۲ نشان داده شده است ($P<0,001$).

آکنه در ۱۰۵ نفر (۵۸,۳٪)، چاقی و اضافه وزن در ۹۵ نفر (۵۵,۵٪)، اختلال در عادت ماهانه در ۷۰ نفر (۳۸,۸٪)، آلوپسی آندروژنیک در ۳۲ نفر (۱۷,۷٪) و آکانتوزیس نگریکانس در ۱۵ نفر (۸,۴٪) دیده شد. رابطه‌ی بین علائم و یافته‌های همراه با هیرسوتیسم نسبت به علت آن در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۲: اتیولوژی و شدت هیرسوتیسم در شرکت‌کنندگان در مطالعه

شدت				علت
شدید تعداد (%)	متوسط تعداد (%)	خفیف تعداد (%)	علت تعداد (%)	
(۵٪/۴) ۵	(۷۷/۹) ۵۳	(۳۶/۹) ۳۴	ایدیوپاتیک	
(۷۴/۴) ۳	(۲۳/۵) ۱۶	(۷۲) ۴۹	سندروم تخمدان	
-	(۵۰/۰) ۴	(۵۰) ۴	پلی‌کیستیک	
(۱/۱) ۱	(۲/۸) ۲	(۵۷/۱) ۴	پرولاکتین بالا	
-	(۶۰/۰) ۳	(۴۰) ۲	هیپرپلازی آدرنال	
(٪۵) ۹	(۴۳/۳) ۷۸	(۵۱/۶) ۹۳	صرف دارو	
مجموع				

جدول ۱: توزیع شاخص توده‌ی بدنی (BMI) در مبتلایان به هیرسوتیسم

BMI (کیلوگرم/متر مربع)	تعداد (%)
کمبود وزن	-
طبیعی	(۴۱/۱) ۷۴
اضافه‌وزن	(۵۳/۳) ۹۶
چاق	(۵/۵) ۱۰
کمتر از ۱۸	۲۵-۱۸
۳۰-۲۵	بیش از ۳۰

بررسی‌های هورمونی و سونوگرافی طبیعی بود، به عنوان هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در نظر گرفته شد.^۳ امتیاز Ferriman-Gallwey حاصل جمع رشد موهای ترمینال در ۹ قسمت بدن می‌باشد که این ۹ قسمت شامل لب بالا، چانه، قفسه‌سینه، قسمت فوقانی پشت، قسمت تحتانی پشت، قسمت فوقانی شکم، قسمت تحتانی شکم، بازوها و ران‌ها می‌باشد. بر حسب شدت موهای ترمینال در هر کدام از این نواحی نمره‌ی ۱ تا ۴ در نظر گرفته شد. در صورتی که امتیاز Ferriman-Gallwey بین ۸ تا ۱۶ قرار داشت هیرسوتیسم خفیف، ۱۷ تا ۲۴ تا ۲۶ هیرسوتیسم متوسط و بالاتر از ۲۵ هیرسوتیسم شدید طبقه‌بندی شد. سپس نتایج حاصل از آزمایشات فوق به همراه اطلاعات به دست آمده از بیماران وارد پرسش‌نامه‌ی مخصوص هر بیمار گردید و پس از آن داده‌ها وارد بانک داده‌ای مخصوص مطالعه شدند. درنهایت پس از اتمام مرحله‌ی جمع‌آوری اطلاعات و کدگذاری متغیرهای کیفی، داده‌ها با استفاده از نسخه‌ی ۱۹ نرم‌افزار (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) و با بهره‌گیری از روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌های^۴، مربع کای و دقیق Fisher توصیف و تحلیل شدند.

یافته‌ها

در مجموع ۱۸۰ بیمار با سن بین ۱۴ تا ۴۸ سال وارد مطالعه شدند. میانگین \pm انحراف معیار سن این افراد $29,2 \pm 7,5$ سال بود. محدوده‌ی قدی بیماران از ۱۵۵ تا ۱۷۶ سانتی‌متر با میانگین \pm انحراف معیار

جدول ۳: شایع ترین علائم همراه هیرسوتیسم به تفکیک علت آن در افراد شرکت کننده در مطالعه

علائم همراه	تعداد (%)	ایدیوپاتیک	سندرم تخدمان پلی کیستیک	پرولاکتین بالا	هیپرپلازی آدنال	صرف دارو (%)	تعداد (%)
آکنه	(۴۱/۲) ۴۰	(۷۸/۵) ۵۵	(۷۵/۰) ۶	(۲۸/۵) ۲	(۴۰/۰) ۲		
چاقی	(۳۶/۰) ۳۵	(۷۹/۴) ۵۴	(۳۷/۶) ۳	(۲۸/۵) ۲	(۲۰/۰) ۱		
اختلال در عادت ماهانه	—	(۸۷/۱) ۶۱	(۶۲/۵) ۵	(۱۴/۲) ۱	(۶۰/۰) ۳		
آلپسی آندروژنیک	(۲۰/۶) ۲۰	(۱۶/۱) ۱۱	(۱۴/۲) ۱	(۱۴/۲) ۱	(۱۴/۰)		
آکانتوزیس نیگریکانس	(۱۰/۸) ۱۰	(۵/۷) ۴	—	—	(۱۴/۲) ۱		

بیشتر بود. همچنین شایع ترین علامت همراه با هیرسوتیسم در بیماران در مطالعه‌ی حاضر آکنه بود که در ۵۸٪ افراد دیده شد. سایر علائم شامل چاقی، اختلال در عادت ماهانه، آلپسی آندروژنیک و آکانتوزیس نیگریکانس بودند. در مطالعه‌ی Panidis و همکاران، مبتلایان به هیرسوتیسم از زنان بدون هیرسوتیسم جوان‌تر بوده و BMI بالاتری داشتند. در آن مطالعه فراوانی بیماران مبتلا به هیرسوتیسم به تدریج با بالارفتن سن کاهش یافته و در زنان با وزن طبیعی، پایین‌تر از زنان با اضافه وزن و چاق بود.^۸ همچنین در مطالعه‌ی نائینی و همکاران که زنان مبتلا به هیرسوتیسم را با زنان سالم مقایسه کرده بودند، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر سن و قد وجود نداشت. با این حال، شاخص توده‌ی بدن و وزن در گروه هیرسوتیسم به طور معنی‌داری بالاتر از گروه افراد سالم بود.^۹ در مطالعه‌ی Samara و همکاران نیز شیوع هیرسوتیسم در دختران چاق نسبت به جمعیت عمومی بیش‌تر بود.^{۱۰} در افراد چاق افزایش تولید آندروژن، افزایش تبدیل استروژن به آندروژن در بافت‌های محیطی، کاهش گلوبین متصل‌شونده به هورمون جنسی (sex hormone binding globulin [SHBG]) و درنتیجه افزایش تستوسترون آزاد وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد هیرسوتیسم و اختلالات عادت ماهانه داشته باشد. در مطالعات نیز ثابت شده است که ارتباط معنی‌داری بین هیرسوتیسم با BMI وجود دارد. به همین دلیل استفاده از رژیم‌های کم

در ۷ نفر (۳/۸٪) از بیماران مورد بررسی، افزایش سطح دی‌هیدروآپی‌آندرостرون‌سولفات، در ۲۰ نفر (۱۱/۱٪) افزایش تستوسترون خون (۱۴ نفر تستوسترون تام و ۶ نفر تستوسترون آزاد بالا داشتند)، در ۸ نفر (۴/۴٪) افزایش سطح پرولاکتین و در ۴ نفر (۰/۲٪) افزایش سطح FSH هورمون مشاهده شد. هورمون LH و ۱۷ - هیدروکسی پرورژن در همه‌ی بیماران طبیعی بود. ۱۰۰ نفر از بیماران سابقه‌ی خانوادگی هیرسوتیسم داشتند که این میزان در گروه هیرسوتیسم ایدیوپاتیک ۷۱/۲٪ و سندرم تخدمان پلی کیستیک ۴۰/۰٪ بود.

بحث

هیرسوتیسم درنتیجه‌ی فعل و انفعالات بین سطح آندروژن و حساسیت فولیکول مو به آندروژن به وجود می‌آید. بسیاری از زنان با سطوح آندروژن دو برابر یا بیش‌تر نسبت به میزان طبیعی، مبتلا به هیرسوتیسم هستند.^{۱۱} براساس معیارهای Ferriman-Gallwey نمره‌ی هیرسوتیسم بیشتر از ۱۵ باشد، احتمال ارگانیکبودن آن بیشتر است.^{۱۲} در مجموع ۱۸۰ بیمار با سن ۱۴ تا ۴۸ سال وارد مطالعه شدند که ارتباط معنی‌داری بین سن و شدت هیرسوتیسم وجود نداشت. محدوده‌ی قدری بیماران ۱۵۵ تا ۱۷۶ سانتی‌متر بود که بین قد و شدت هیرسوتیسم هم اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت، اما میزان هیرسوتیسم به شکل معنی‌داری در افرادی که BMI بیشتری داشتند،

می‌شود.^۱ در معاينه‌ی فيزيكى علاوه‌بر تعیین شدت هيرسوتيسم باید به سایر علائم همراه مثل سبوره، آکنه، آلوپسی آندروژنتیک، نحوه‌ی توزيع عضلات و چربی بدن، اندازه‌ی كليتوريس و گالاكتوره توجه کرد. سابقه‌ی مصرف دارو نيز مهم است، داروهای با خواص آندروژنتیک می‌توانند باعث هيرسوتيسم شوند.^{۱۲} در مطالعه‌ی حاضر ۵ نفر از بيماران سابقه‌ی مصرف طولاني مدت (بيشتر از ۶ ماه) داروهای با خواص آندروژنتیک داشتند که ۳ نفر از آن‌ها استرويد آنابوليک، ۱ نفر والپريويك اسيد و ۱ نفر پرفنازين مصرف می‌کرد.

در ۳/۸٪ از بيماران مورد بررسی، افزایش سطح دی‌هيدواپی آندروسترون سولفات، در ۱۱/۱٪ افزایش تستوسترون خون، در ۴/۴٪ افزایش سطح پرولاكتین، و در ۲/۲٪ افزایش سطح FSH دیده شد. سطوح هورمون LH و ۱۷- هيدواپکسی پروژسترون در همه‌ی بيماران طبيعي بود. در مطالعه‌ی Panidis و همکاران، هيرسوتيسم در افرادي که سطوح بالاي سرمي تستوسترون، ۴-۴ آندروستنديون و دی‌هيدواپی آندروسترون سولفات داشتند، بيشتر بود.^۸

براساس يافته‌های اين پژوهش می‌توان نتيجه گرفت که مشابه مطالعات ديگر، سندروم تخمدان پلی‌كيسنیک و هيرسوتيسم ايدئوپاتيک شایع‌ترین علل هيرسوتيسم می‌باشند. همچنان چاقی نقش مؤثری در بروز هيرسوتيسم دارد، لذا توصيه می‌شود انجام آزمایشات و بررسی‌های بيشتر جهت درمان افرادي که دارای هيرسوتيسم خفيف همراه با دوره‌های عادت هماهنگی منظم داشته و در شرح حال علائمی از سایر اختلالات را ندارند، ضرورت ندارد.

کالری و کاهش وزن در درمان بيمارانی که به علت هيرسوتيسم يا اختلال عادت ماهانه همراه با چاقی مراجعه می‌کنند به عنوان اولین روش درمانی توصيه می‌شود.^۲

در مطالعه‌ی اكبری شایع‌ترین يافته‌های بالينی همراه با هيرسوتيسم شامل آکنه، اختلال در عادت ماهانه و آلوپسی آندروژنتیک بودند که مشابه مطالعه ما بود.^۹ در پژوهش Somasundaram و همکاران، شیوع هيرسوتيسم در میان جمعیت مورد مطالعه نسبتاً بالا و به میزان ۵/۵٪ بود و اختلالات عادت ماهانه در ۳/۵٪ افراد مشاهده شد.^{۱۰} وضعیت عادت ماهانه بيماريک مسئله مهم ديگر است. اختلال در عادت ماهانه به صورت طولاني مدت بيشتر به نفع تشخيص سندروم تخمدان پلی‌كيسنیک و عدم اختلال در عادت ماهانه به نفع تشخيص هيرسوتيسم ايدئوپاتيک است. علاوه‌بر اين در شرح حال باید به مواردي مثل سابقه‌ی حاملگی، زمينه‌ی فاميلي و نژادی نيز توجه کرد.^{۱۱}

ازنظر سبب‌شناسي هيرسوتيسم، شایع‌ترین عوامل در مطالعه‌ی حاضر هيرسوتيسم ايدئوپاتيک و سندروم تخمدان پلی‌كيسنیک بودند. همچنان ازنظر شدت هيرسوتيسم براساس امتياز Ferriman-Gallwey ۹/۵٪ شرکت‌کنندگان هيرسوتيسم خفيف يا متوسط داشتند. در مطالعه‌ی اكبری شایع‌ترین علت هيرسوتيسم سندروم تخمدان پلی‌كيسنیک و به‌دبال آن هيرسوتيسم ايدئوپاتيک و پرولاكتينوما بودند که مشابه مطالعه‌ی ما بود.^{۱۰}

همچنان هيرسوتيسم اياتروژنيک که در آن سطوح آندروژن طبيعي است، عامل ۴٪ تا ۷٪ موارد هيرسوتيسم می‌باشد و با رد سایر علل تشخيص داده

References

- Habif TP. Clinical dermatology: a color guide to diagnosis and therapy. 5th Ed. New York. Mosby Elsevier; 2010.
- Camacho-Martinez F. Hypertrichosis and hirsutism. In: Bolognia J, Jorizzo JL, Rapini RP (eds.). Dermatology. New York. Mosby: Elsevier Inc. 2008:1007-18.

3. Sharma N, Mahajan V, Jindal R. Hirsutism: clinico-investigative profile of 50 Indian patients. Indian J Dermatol 2008;53:111-4.
4. Naeini F, Najafian J, Jazebi N. Hirsutism and body mass index in a representative sample of Iranian people. ARYA Atherosclerosis Journal. 2012;8:43-5.
5. Samara-Boustani D, Colmenares A, Elie C, et al. High prevalence of hirsutism and menstrual disorders in obese adolescent girls and adolescent girls with type 1 diabetes mellitus despite different hormonal profiles. Eur J Endocrinol 2012;166:307-16.
6. Peña A, Dabadghao P. Controversies of the assessment and management of polycystic ovary syndrome in adolescents. Int J Pediatr Endocrinol 2015; (Suppl 1):O19.
7. Fattah N, Darwish Y. Is there a role for insulin resistance in non-obese patients with idiopathic hirsutism? Br J Dermatol 2009;160:1011-5.
8. Panidis D, Tziomalos K, Papadakis E, et al. The clinical significance and primary determinants of hirsutism in patients with polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol 2013;168:871-7.
9. Akbari D, Hosseinpour N. [Etiological diagnosis of hirsutism in premenopausal Iranian women]. Dermatology and Cosmetic. 2010;1:119-24. [Persian]
10. Somasundaram N, Fernando D, Kamaladasa S, Amarawardena W. Prevalence and patterns of hirsutism among Sri Lankan females. Sri Lanka Journal of Diabetes Endocrinology and Metabolism 2015;5:51-5.
11. Martin K, Chang R, Ehrmann D, et al. Evaluation and treatment of hirsutism in premenopausal women: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metabol 2008;93:1105-20.
12. James WD, Berger T, Elston D. Andrews' diseases of the skin: clinical dermatology: New York. Elsevier Health Sciences; 2015.

Hirsutism in premenopausal women in Northern Iran: Etiology and associated clinical findings

Ghasem Rahmatpour Rokni, MD¹
 Adele Bahar, MD²
 Mahnaz Sharifian, MD³
 Seyed Naser Emadi Chashmi, MD⁴
 Amir Hosein Kianezhad, MD⁵
 Mohammad Raisian, MD⁵

1. Department of Dermatology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2. Department of Internal Medicine, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3. Department Pathology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4. Department of Dermatology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5. School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

Background and Aim: Hirsutism is defined as the presence of terminal hairs in androgen dependent areas like upper lip, cheeks, chin, breasts, lower area of abdomen and thigh in women. The aim of this study was to determine the etiologic factors and clinical features of hirsutism in premenopausal women.

Methods: In this cross-sectional study, 180 premenopausal women with hirsutism who were admitted at a referral dermatologic clinic in a 1-year period were investigated. After taking full medical history and performing physical examinations, a transabdominal ultrasonography of the ovaries, and laboratory evaluation including early morning total and free serum testosterone, prolactin, dehydroepiandrosterone sulfate, FSH, LH and 17-hydroxyprogesterone in all patients were performed.

Results: The most common causes of hirsutism were idiopathic (51.1%), polycystic ovarian syndrome (37.7%), hyperprolactinemia (4.4%), adrenal hyperplasia (3.8%), and drug-induced (2.8%). Hirsutism was mild in 93 (51.6%) patients, moderate in 78 (43.3%) patients and severe in 9 (5%) patients. Family history of hirsutism was present in 100 patients. Clinical conditions associated with hirsutism were: acne (58.3%), obesity (55.5%), menstrual irregularity (38.8%), androgenic alopecia (17.7%) and acanthosis negricans (8.4%).

Conclusion: Idiopathic hirsutism and polycystic ovary syndrome were the most common causes of the hirsutism in premenopausal women. Obesity also had a significant role in hirsutism occurrence.

Keywords: hirsutism, polycystic ovary syndrome, acne

Received: Feb 23, 2016 Accepted: Apr 12, 2016

Dermatology and Cosmetic 2016; 7 (1): 31-37

Corresponding Author:
 Seyed Naser Emadi Chashmi, MD

Department of Dermatology, Razi Hospital, Vahdat-e-Eslami Square, Vahdat-e-Eslami St., Tehran
 Email: naseremad@yahoo.com

Conflict of interest: None to declare