

پژوهش‌های چینه نگاری و رسوب شناسی

سال بیست و هشتم، شماره پیاپی ۴۷، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۱/۲۰ تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۱۸

صفحه ۹۷-۱۰۴

## شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران

جهانبخش دانشیان، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه خوارزمی<sup>\*</sup>  
کامیار یونسی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی  
سید علی معلمی، استادیار گروه زمین‌شناسی پژوهشگاه صنعت نفت

### چکیده


سازند سروک در تنگ چnarباشی با ۷۱۲ متر ضخامت، شامل میکروفونایی از روزن بران پلانکتونی آلبین تا سنومانین می‌باشد. بررسی روزن بران مرز آلبین – سنومانین در این برش نشان می‌دهد که زون زیستی *Rotalipora* حذف شده است. *Paracostellagerina libyca appeninica* شاخص مرز آلبین – سنومانین است و از آنجایی که همراه با این گونه، هیچ گونه شاخص آلبین نیست اولین ظهور این گونه منطبق بر شروع سنومانین در این مطالعه است. گونه‌های کلیدی: سازند سروک، مرز آلبین – سنومانین، زاگرس، تنگ چnarباشی و ازههای *Favosella voloshinae*, *Paracostellagerina libyca*.

## مقدمه

وایند (Wynd 1965) بر اساس روزن بران پلانکتونی و بتونیکی، جلبک‌ها و رادیولرها، زون‌های زیستی شماره ۲۰ تا ۲۹ را برای آن در نظر گرفت که البته این زون‌های زیستی چندان قادر به دادن سن دقیق نیستند. آدامز و همکاران (Adames et al. 1967) نیز با مطالعه صرفاً الیگوسترینیدهای گروه بنگستان (سازندهای سروک، ایلام Calcisphaerula و سورگاه) در لرستان زیر گونه جدید *innominata lata* را معرفی نمودند و یک زون زیستی (شامل دو زیرزون) بر مبنای آنها در لرستان معرفی کردند، که البته این زون زیستی چندان دقیق نبوده است. اله بخش غیاثوند (1۳۸۵) با مطالعه چینه‌نگاری زیستی گروه بنگستان در میادین نفتی سرکان و ماله کوه، سن آلین پسین – تورونین را برای سازند سروک پیشنهاد نمود.

**راه‌های دسترسی به برش مورد مطالعه**  
برش مورد مطالعه به مختصات  $36^{\circ} 25' 33''$  طول شرقی و  $45^{\circ} 46' 06''$  عرض شمالی در جنوب روستای چنارباشی در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان ایلام و در پایانه شمالی تاقدیس کبیرکوه واقع شده است (شکل ۱). برای دسترسی به برش مورد نظر باید از جاده‌ای خاکی که توسط شرکت نفت از روستای چنارباشی احداث شده (حدود ۲ کیلومتر) استفاده نمود.

یکی از مهمترین حوضه‌های نفتی دنیا، زاگرس است. واحدهای سنگی زاگرس عمدها حاوی ذخایر هیدروکربنی بوده که یکی از مهمترین آنها گروه بنگستان شامل سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام پس از سازند آسماری است. سازند سروک در این گروه نقش سنگ مخزنی کربناته را بازی می‌کند و شامل دو رخساره نریتیک در فارس و خوزستان و رخساره پلاژیک در لرستان است. (آقاباتی ۱۳۸۵؛ مطیعی ۱۳۷۲ (James & Wynd 1965 ; Adames et al. 1967) در تنگ چنارباشی مشکل از ۷۱۲ متر تناوب سنگ آهک رسی، سنگ آهک، سنگ آهک گلوکونیتی و شیل آهکی است که با سیمای مقاوم و صخره ساز روی تناوب شیل و سنگ آهک سازند گرو و از بالا به سنگ آهک‌های زودفرسا با سیمای پست سازند سورگاه ختم می‌شود. مرز آلین – سنومانین در این مطالعه حاوی روزن بران پلانکتونی متنوعی است که امکان ارائه زون‌های زیستی قابل مقایسه با منابع معتبر جهانی را فراهم می‌کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی زیست چینه نگاری مرز آلین – سنومانین در برش چنارباشی همراه با ارائه شواهد جدید مشاهده شده برای اولین بار از ایران است. شناسایی و نام‌گذاری سازند سروک و پیشنهاد سن آلین پسین تا تورونین پیشین برای این سازند به سال ۱۹۶۵ بر می‌گردد (James & Wynd 1965).



شکل ۱- راه‌های دسترسی به برش چنارباشی و وضعیت زمین‌شناسی برش مورد مطالعه ( نقشه زمین‌شناسی برگرفته از Macleod & Roohi 1970 با کمی تغییرات).

### *Ticinella roberti, Ticinella madecassiana* مشخص

می‌شود (شکل ۲). با انقراض گونه‌های ذکر شده گونه Paracostellagerina libyca ظاهر شده که برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. اهمیت زیست چینه‌نگاری *Paracostellagerina libyca* از آنجا مشخص می‌شود که این گونه از بخش‌های بالایی زیست زون *Rotalipora appeninica* مربوط به اوخر آلبین ظاهر شده و تا ابتدای زیست زون *Rotalipora globotruncanoides* (پانصد هزار سال پس از شروع سنومانین) گسترش دارد (Georgescu & Huber 2006 ; Petrizzo & Huber 2006) که با توجه به عدم وجود زیست زون *Rotalipora appeninica* در این مطالعه، می‌توان اولین ظهرور *Paracostellagerina libyca* را شروع سنومانین دانست و از طرفی در این مطالعه گونه ذکر شده با روزن بران شاخص آلبین دیده نشده است. از طرفی عدم وجود *Rotalipora globotruncanoides*

### روش مطالعه

با توجه به این که هدف از مطالعه بررسی مرز آلبین - سنومانین در سازند سروک است از این رو در برش چنارباشی ۵۶ مقطع نازک مد نظر قرار گرفته، که موقعیت این نمونه‌ها در ۳۱۰ متر میانی سازند سروک قرار دارند. در این تحقیق شناسایی روزن بران پلانکتونی و انطباق زون‌های زیستی آنها بر اساس منابع معتبری مثل: (Premoli Silva & Verga 2004 ; Sliter 1999 ; Caron 1985 ; Postuma 1971; Robaszynski & Caron 1995 ; Loeblich & Tappan 1988 , Georgescu & Huber 2006 ; Huber & Leckie 2011) انجام شد.

### بحث

- روزن بران پلانکتون مرز آلبین-سنومانین در برش چنارباشی در برش چنار باشی طبقات آلبین بالایی با *Microhedbergella rischi*, روزن بران پلانکتونی *Rotalipora ticinensis*, *Rotalipora subticinensis*,

(Longoria & Gamper ۱۹۷۷) مکزیک گزارش نیز شده است.

## ۲- زیست چینه نگاری مرز آلبین-سنومانین در برش چنارباشی

مطالعه مرز آلبین - سنومانین در برش مورد مطالعه منجر به شناسایی زون/ زیرزون‌های زیستی زیر شد :  
**Rotalipora subticinensis Subzone (340-433 m.)**

(Postuma 1971) نویسنده: پوستوما

نوع زیرزون زیستی: بخشی Partial Range Zone تعريف: اولین ظهور *Rotalipora subticinensis* تا اولین ظهور *Rotalipora tictinensis*

سن: آلبین پسین

نوع لیتولوژی در برگیرنده: سنگ آهک رسی فونای پلانکتونی موجود(شکل ۲) :

*Ticinella roberti*, *Ticinella madecassiana*, *Muricohedbergella planispira*, *Muricohedbergella delrioensis*, *Microhedbergella rischi*, *Clavihedbergella simplex*, *Favusella washitensis*, *Globigerinelloides caseyi*, *Globigerinelloides ultramicra*, *Praglobotruncana stephani*, *Globigerinelloides bentonensis*, *Rotalipora suticinensis*, *Rotalipora tictinensis*

این زون با زون زیستی interval اسلیتر (Sliter 1999) مطابقت کامل دارد و با کمی اختلاف سن با مورد ارائه شده در Robaszynski و کارن (Robaszynski & Caron 1995) روبرو بازینسکی و کارن (Caron 1985) در بالا مطابقت قابل انطباق است. همچنین با زون‌های زیستی *Rotalipora* در پائین و *Bticinella breggensi* در سوم انتهای زون زیستی *Rotalipora subticinensis* دارد. با تقریباً دو سوم انتهای زون زیستی *Rotalipora* و تقریباً دو سوم ابتدای زون زیستی *subticinensis*

همراه با *Paracostellagerina libyca* را می‌توان به ناسازگاری جایگاه زیستی<sup>۱</sup> این دو با هم دانست.

*Rotalipora globotruncanoides* مربوط به مورفوتابیپ (Hart 1980). طبق نظر پتریزو و همکاران (*Paracostellagerina libyca* (Petrizzo et al. 2008)) مربوط به اعماق کم و سطح زی (surface dweller) است. لازم به ذکر است که جنس متسب به این گونه (Loeblich & Tappan 1988) مطابق لوئیلیش و تپان (Loeblich & Tappan 1988) بوده تا اینکه *Costellagerina* (Georgescu & Huber 2006) با دلایل زیر جنس *Paracostellagerina* را معرفی نمودند:

۱- بین انفراض *Costellagerina libyca* و اولین ظهور *Costellagerina bulbosa* حدود ۱۳ میلیون سال زمان است و در این محدوده زمانی گونه دارای کاسته آرایش نصف النهاری وجود ندارد.

۲- دارای آرایش نامتقاضان پوسته‌ای (کاسته در سطح پیچشی موازی حاشیه و در سطح دهانی به صورت نصف النهاری است) و دهانه نافی تا خارج نافی است که این ویژگی‌ها آن را از *Costellagerina* جدا می‌کند.

همچنین در این مطالعه *Favusella voloshinae* از طبقات ابتدای سنومانین زیرین برش تنگ چنارباشی برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود (شکل ۲). گونه فوق با پوسته تروکواسپایرال بلند و شامل ۲/۵ دور پیچش بوده و در برگیرنده حجراتی گلبلوی تا نیمه گلبلوی است و در آخر حالتی نیمه هلالی به خود می‌گیرند. پوستیول‌ها به صورت پراکنده دیده می‌شوند. در این گونه ناف بسیار عمیق و باریک است. و بواسطه *F.washitensis* داشتن آن و محور پیچش بلند از گونه *subticinensis* قابل تفکیک است. این گونه از طبقات آلبین بالایی شمال

چیزی حدود ۲ میلیون سال پایانی آلبین به صورت انقطاع رسوبرگذاری است (Sliter 1999)؛ و با توجه به نبود گونه *Rotalipora globotruncanoides* که مطابق اگ و همکاران (Ogg et al. 2008) نشانه شروع سنومانین است و نبود زون *Rotalipora appeninica* می‌توان این گونه تصور نمود که مرز آلبین به سنومانین در تنگ چنارباشی بایستی ناپیوسته باشد.

#### **Paracostellagerina libyca zone (455 – 595 m.) – ۴**

نویسنده: معرفی شده برای اولین بار از این مطالعه نوع زون زیستی: توتال زون تعریف: تمام گسترش چینه‌شناسی گونه نام برده شده لیتلولژی: سنگ آهک رسی، سنگ آهک گلوکونیتی و سنگ آهک سن: اوائل سنومانین پیشین فونای پلانکتونی موجود:

*Paracostellagerina libyca*, *Muricohedbergella planispira*, *Muricohedbergella delrioensis*, *Clavihedbergella simplex*, *Favusella washitensis*, *Favusella voloshinae*, *Globigerinelloides caseyi*, *Globigerinelloides ultramicra*, *Praglobotruncana stephani*, *Globigerinelloides bentonensis*

این زیست زون محلی منطبق بر ابتدای زیست زون (Georgescu & Huber 2006 ; Perizzo 2006) است. این زون زیستی با ابتدای زون زیستی (*Rotalipora globotruncanoides*) (Sliter 1999) اسلیتر (*Rotalipora brotzeni*) و کارن (*Rotalipora* و ابتدای Caron 1985) و کارن (*Planomalina buxtorfi*) (Postuma 1971) مطابقت دارد (شکل ۳).


*Biticinella breggiensis* و تقریبا سه چهارم پوستوما (Postuma 1971) منطبق است (شکل ۳).

#### ***Rotalipora tictinensis Zone(433 – 455m.)***

نویسنده: دالبیز (Dalbiez 1955) نوع زیرزون زیستی: ایتروال زون. تعریف: اولین ظهور *Rotalipora tictinensis* تا اولین ظهور *Rotalipora appeninica*

سن: آلبین پسین نوع لیتلولژی در برگیرنده: سنگ آهک رسی و سنگ آهک و میان لایه سنگ آهک پیریتی. نکته: در این مطالعه، با توجه به این که اولین ظهور *Rotalipora appeninica* پس از اولین ظهور *Rotalipora tictinensis* رخ نداده (شکل ۲) نمی‌توان این زون زیستی را در این مطالعه عیناً معرفی نمود ولی از آنجا که مرز زیرین آن وجود داشته می‌توان در این مطالعه مرز بالایی را آخرین ظهور *Microhedbergella rischi* دانست چرا که پس از این آخرین ظهور این گونه ظهور کرده که با توجه با توضیحات ابتدای این مقاله نشانه شروع سنومانین است. این زون زیستی با زون زیستی *Rotalipora tictinensis* کارن (Caron 1985) و رو بازینسکی و کارن (Robaszynski & Caron 1995) تطابق دارد. با بیش از نیمی از زون زیستی (*Rotalipora appeninica*) (Sliter 1999) و بخش‌های انتهایی زون زیستی (*Postuma 1971*) پوستوما (*Biticinella breggiensis*) قابل مقایسه است (شکل ۳).

با توجه به توضیحاتی که در خصوص نبود قسمت‌های بالایی زون *Rotalipora tictinensis* و نبود کامل زون داده شد می‌توان ذکر نمود که *Rotalipora appeninica*



شکل ۲- گسترش چینه شناسی روزن بران پلانکتونیک مرز آلبین - سنو مانین در سازند سروک در برش چنار باشی - سن مطلق از (Ogg et al. 2008) بر اساس ظهور یا انفراض روزن بران پلانکتونی است.

Age	This study	Sliter (1999)	Robaszynski & Caron(1995)	Caron (1985)	Postuma (1971)
Early Cenomanian 99.6	<i>Pa.libyca</i>	<i>R.brotzeni</i>	<i>R.globotruncanoides</i>	<i>R.brotzeni</i>	<i>R.appeninica</i>
	<i>R.ticinensis</i>	<i>R.appeninica</i>	<i>R.ticinensis</i>	<i>R.ticinensis</i>	<i>P.buxtorfi</i>
Late Albian	<i>Bi.breggiensis</i>	<i>Bi.breggiensis</i>	<i>R.subticinensis</i>	<i>R.subticinensis</i>	<i>Bi.breggiensis</i>
	<i>R.subticinensis</i>	<i>R.subticinensis</i>		<i>R.subticinensis</i>	

شکل ۳- انطباق زون‌های زیستی مرز آلبین - سنومانین در برش تنگ چnar باشی با سایر زون‌های زیستی

#### نتیجه‌گیری

با بررسی گسترش چینه‌شناسی روزن بران پلانکتونیک مرز آلبین - سنومانین در سازند سروک دو گونه *Paracostellageina libyca*, *Favosella voloshinae* برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. با توجه به انقراض گونه‌های *Rotalipora ticinensis*, *Rotalipora subticinensis*, *Microhedbergella rischi*, *Ticinella roberti*, *Ticinella madecassiana* پایان می‌پذیرد. از آنجایی که همراه با فرم شاخص آلبین وجود ندارد پس ظهور این گونه معادل شروع سنومانین در این مطالعه است.

#### تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان بر خود لازم می‌بینند از پروفسور پرمولی سیلووا از دانشگاه میلان و دکتر برایان هیوبر از دانشگاه

۳- ردی بندی اولین گونه‌های دیده شده در ایران از این مطالعه:

Superfamily: ROTALIACEA Sigal 1958  
Family: HEDBERGELLIDAE Loeblich & Tappan 1961  
Subfamily: HEDBERGELLINAE Loeblich & Tappan 1961  
Genus: *Paracostellagerina* Georgescu & Huber 2006  
Species: *Paracostellagerina libyca* (Barr)  
شاخص مرز آلبین - سنومانین بوده و در این مطالعه سندی برای شروع سنومانین است.

Family: FAVUSELLIDAE Longoria 1974  
Genus: *Favusella* Michael 1973  
Species: *Favusella voloshinae* Longoria & Gamper 1977

دارای گسترش جهانی از آلبین تا سنومانین است و هم در آلبین و هم در سنومانین این مطالعه حاضر هستند.

- 11- Longoria, J.F. and M. A., Gamper, 1977, Albian planktonic foraminifera from the Sabina Basin of Northern Mexico: Journal pf Foraminiferal Reaserch , v.7, no.3, p. 208.
- 12- Macleod, J.H., and M., Roohi, 1970, Kuh - e - Varzarin, Geological Compilation map, scale 1:100000.NIOC.
- 13- Ogg, J.G ., G., Ogg, M.F., Gredesstein, 2008, The Concise Geologic Time Scale, Cambridge University Press.
- 14- Petrizzo M.R., and B.T., Huber, 2006, Biostratigraphy and taxonomy of Late Albian planktonic foraminifera from ODP Leg 171B (western North Atlantic Ocean). Journal of Foraminiferal Research, v. 36, no.2, p.166-190.
- 15- Petrizzo, M. R., B. T., Huber, P. A. Wilson, and K. G. MacLeod, 2008, Late Albian paleoceanography of the western subtropical North Atlantic, Paleoceanography, v. 23, PA1213, doi:10.1029/2007PA001517
- 16- Postuma , J.A. ,1971, Manual of Planktonic Foraminifera, Elsevier. 420.
- 17- Premoli Silva, I., and D., Verga, 2004, Practical manuel of Cretaceous planktonic foraminifera. International School on Planktonic Foraminifera, 3° Course: Cretaceous. In: Verga, D & Rettori, R.(Eds.): Universites of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, Perugia-Italy.p.283.
- 18- Robaszynski, F. and M., Caron, 1995, Foraminifères planctoniques du crétacé : commentaire du la zonation Europe-Méditerranée: Bulletin de la Societe Geologiquede France, v.166. p. 681 – 692.
- 19- Sliter, W., 1999, Cretaceous Planktonic Foraminiferal biostratigraphy of the Calera limestone, northern California, USA: Journal of Foraminifera Reaserch. v. 29 , no. 4 , p.318 – 339.
- 20- Wynd, J. G., 1965, Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement area . Iooc, Report no . 1082 (unpub.).

اسمیتسون واشنگتن بابت ارسال مقالات و کمک در شناسایی برخی نمونه‌ها تشکر نمایند.

#### منابع

- 1 - آقا نباتی، س.ع..، ۱۳۸۵، زمین شناسی ایران: سازمان زمین شناسی کشور.
- 2 - اله بخش گ، غیاثوند، ۱۳۸۲، بیواستراتیگرافی و تطابق چینه ای گروه بنگستان درمیادین نفتی سرکان و ماله کوه، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت معلم .
- 3 - مطیعی، ۵، ۱۳۷۲، زمین شناسی ایران ، چینه شناسی زاگرس : سازمان زمین شناسی کشور.
- 4- Adams, T.D., M., Khalili, and A.K., Said, 1967, Stratigraphic significance of some oligosteginid assemblages from Lurestan Province, northwest Iran: Micropaleontology, v.13, p.55-67.
- 5-Caron , M., 1985, Cretaceous Planktonic Foraminifera. In :Bolli,H.M., Saunders, J.B.,PERCH- Nielsen, K.(Eds.). Plankton Stratigraphy , Cambridge University Press.
- 6-James, G.A. and .J. D., Wynd 1965, Stratigrapahic nomenclature of Iranian oil Consortium Agreement area American Assosiaation of Petroleum Geologists Bul.
- 7-Georgescu, M.D and Huber, B.T.,2006, *Paracostellagerina* Nov. Gen., a Meridionally Costellate Planktonic foraminiferal genus of the middle Cretaceous (latest Albian – Earliest Cenomanian): Journal of Foraminiferal Research, v.36 , p.363-373.
- 8-Hart, M.B.,1980, A water depth model for the evolution of the planktonic Foraminiferida. Nature v. 286, p.252–254.
- 9-Huber, B.T., and R.M., Leckie, 2011, Planktonic foraminiferal species turnover across deep sea Aptian/Albian boundary sections: Journal of Foraminiferal Research, v. 41 , no.1 , p.53-95.
- 10- Loeblich J.R., and H., Tappan, 1988, Foraminiferal Genera and their classification. Van Nostrat Pub. v. 1,2.