



دانشگاه شهروردی و تحقیق‌های علمی

مجله پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل
جلد نوزدهم، شماره دوم، ۱۳۹۱
<http://jwsc.gau.ac.ir>

گزارش کوتاه علمی

بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (*Acer Velutinum*)

*مرضیه فلاحتنیا^۱ و علی رفیقی^۲

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

^۲استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۰/۲۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۰/۷/۹

چکیده

در این پژوهش اثر فاصله کاشت بر روی خصوصیات فرم تنه درخت مانند مخروطشدگی، برومنمرکزی، درصد بیضوی شدگی و همچنین مقادیر ارتفاع، رویش قطری و رویه زمینی درختان بررسی شد. به این منظور از هر تیمار شامل فاصله‌های کاشت درختان افرا پلت به ابعاد $1 \times 1 \times 1 / 5 \times 1 / 5$ و $2 \times 2 \times 2$ متر اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت کلاته گرگان) قطع گردید و اثر متغیرهای بالا بر روی آنها مطالعه شد. نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش فاصله کاشت میزان رویش قطری سالانه درختان مربوط به فاصله کاشت 2×2 متر و کمترین مقدار آن مربوط به فاصله کاشت 1×1 متر بود. گرچه افزایش فاصله کاشت ارتفاع درختان، مخروطشدگی، معایب برومنمرکزی و بیضوی شدن تنه را افزایش داد ولی اختلاف معنی‌داری را پدید نیاورد.

واژه‌های کلیدی: فاصله کاشت، رویش قطری سالانه، مخروطشدگی، برومنمرکزی، بیضوی شدگی و رویه زمینی

*مسئول مکاتبه: marzi_9545@yahoo.com

مقدمه

فاصله کاشت بر فرم و شکل درختان تأثیر می‌گذارد و بسته به نوع مصرف و کاربردی که از جنگل متصور است می‌توان فواصل درختان را طوری تنظیم نمود که درختان به شکل استوانه کامل تا شکل مخروطی تغییر شکل دهند. تنظیم فاصله کاشت به منظور دست‌یابی به محصول بیشتر محسن و معایبی دارد که در این پژوهش به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد. جورجنسن (۱۹۶۷) تأثیر فاصله کاشت را بر روحی رشد و توسعه گونه‌های سوزنی برگ بررسی کرد و بیان نمود افزایش ارتفاع با افزایش تراکم رویشگاه در محدوده معینی از فاصله کاشت صورت گرفته و در خارج از این محدوده ارتباط ضعیفی بین تراکم رویشگاه و ارتفاع درختان وجود دارد. ماقنین (۱۹۹۸) در بررسی اثر تراکم رویشگاه و تنك نمودن بر روی عیب بیضوی شدن بیان نمود مقادیر این عیب بدون توجه به تراکم رویشگاه و تنك نمودن از ۲-۹ درصد متفاوت بوده که در سطوح ارتفاعی بالایی درخت کاهش می‌یابد. ودزیک (۲۰۰۱) با بررسی اثر تراکم رویشگاه بر میزان رشد درختان بیان کرد که با کاهش تراکم رویشگاه و افزایش فاصله کاشت، رقابت درختان برای نور، آب و غذا در رویشگاه کاهش یافته و سبب افزایش میزان رویش درختان می‌شود. پونچس (۲۰۰۴) بیان داشت با افزایش فاصله کاشت بر وسعت تاج درخت افزوده می‌شود که به توبه خود سبب افزایش کاهش قطری و درصد گره‌ها و اندازه آن‌ها خواهد شد. لاسر (۲۰۰۵) بیان نمود فاصله کاشت تأثیر عمده‌ای بر روی خصوصیات تنه و سایر خواص ذاتی کاج رادیاتا مانند مقاومت‌ها دارد. کشکولی و همکاران (۲۰۰۷) روش‌های درجه‌بندی و اندازه‌گیری الوار و تنه را بر روی گونه‌های مختلف بررسی کردند و دریافتند که معایب برومنمرکزی و بیضوی شدگی بیشتر تحت تأثیر نامتقارنی تاج پوشش و رویش غیریکنواخت کامبیوم در جهات مختلف می‌باشد. افهامی و همکاران (۲۰۰۸) اثر فاصله کاشت و گیاه همرا (یونجه) را بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه صنوبر بررسی کردند و دریافتند که با افزایش فاصله کاشت میزان رویش قطری سالانه درختان، معایب مخروط‌شدنی، برومنمرکزی و بیضوی شدگی افزایش می‌یابد. در این پژوهش سعی بر آن بود اثر فاصله کاشت بر روی خواص کاربردی چوب بررسی شده و با توجه به نتایج به دست آمده فاصله کاشت مناسب برای داشتن بیشتر تولید و با در نظر گرفتن کیفیت چوب، برای مصارف مختلف در جنگل دست کاشت موردنظر توصیه گردد.

مواد و روش‌ها

در این پژوهش، از درختان افرا پلت کاشته شده در پارسل ۱۱ جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (جنگل شصت کلاته) جهت بررسی اثر فاصله کاشت بر رویش سالانه

و کیفیت تنه درخت استفاده شد. نهال این درختان در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در ۳ تیمار با ۴ تکرار و در مجموع ۱۲ پلات با ابعاد 25×25 متر در اسفندماه ۱۳۷۴ کاشته شد. این تیمارها شامل فاصله کاشتهای درختان افرا پلت با ابعاد 1×1 متر، $1/5 \times 1/5$ متر و 2×2 متر بود. در این پژوهش برای هر تیمار، چهار درخت قطع گردید و برای مطالعه اثر فاصله کاشت بر میزان رویش قطری سالانه، ارتفاع، رویه زمینی و همچنین ویژگی‌های فرم تنه درخت شامل درصد بیضوی شدن تنه درخت، برومندگری و مقدار کاهش قطری در ۵۰ درصد ابتدایی طول درخت اندازه‌گیری شد. پس از قطع درختان، ارتفاع هر کدام از آن‌ها با تقریب 0.01 متر از ارتفاع برابر سینه درختان تهیه گردید و پس از صیقلی رویش، دیسک‌هایی به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر از ارتفاع برابر سینه درختان تهیه گردید و پس از نمودن مقاطع عرضی آن‌ها، میزان رویش سالانه قطری در دو سمتی که بیشترین و کمترین میزان رویش را داشتند با استفاده از یک کولیس دیجیتالی اندازه‌گیری شد. رویه زمینی نیز با توجه به مشخص بودن تعداد درختان و فواصل کاشت، براساس قطر میانگین محاسبه گردید (رابطه ۱).

$$BA = \frac{\pi}{4} D^2 N \quad (1)$$

که در آن، BA : رویه زمینی، D : میانگین قطر درختان و N : تعداد درختان در هکتار. برای محاسبه درصد بیضوی شدن تنه از دیسک‌های تهیه شده از ارتفاع برابر سینه درخت استفاده شد و کمترین قطر و بیشترین قطر در مقطع عرضی اندازه‌گیری شده و با کمک (رابطه ۲) درصد بیضوی شدگی در مقطع عرضی و ارتفاع برابر سینه اندازه‌گیری شد.

$$R\% = \frac{D - d}{d} \times 100 \quad (2)$$

که در آن، D : قطر بزرگ، d : قطر کوچک و $R\%$: درصد بیضوی شدن تنه درخت. برای اندازه‌گیری مقدار برومندگری نسبت شعاع بزرگ به شعاع کوچک اندازه‌گیری شد. برای تعیین میزان کاهش قطر در محدوده ۵۰ درصد ارتفاع درخت، میانگین قطر درختان قطع شده در محل کنده و در ۵۰ درصد ارتفاع درخت اندازه‌گیری شد و سپس میزان کاهش قطری به افزایش طول محاسبه گردید.

برای محاسبات آماری در این پژوهش از نرم‌افزارهای Excel ۲۰۰۳ و Spss ۱۷ استفاده شد و پس از اجرای آزمون تجزیه واریانس از آزمون دانکن برای گروه‌بندی و مقایسه میانگین‌ها استفاده گردید.

نتایج

جدول ۱ نشان‌دهنده میانگین مقادیر رویش قطربی سالانه درختان، رویه زمینی بر مبنای قطر درخت، ارتفاع درختان، کاهش قطری در ۵۰ درصد ارتفاع درختان، درصد بیضوی شدگی و مقادیر بروونمرکزی در ارتفاع برابر سینه درختان در فواصل کاشت مختلف می‌باشد. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود با افزایش فاصله کاشت بر مقدار رویش قطربی سالانه افزوده شد و نتایج آزمون تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری را در سطح اعتماد ۹۵ درصد بین میانگین مقادیر رویش قطربی سالانه درختان با فواصل کاشت مختلف نشان داد که مطابق گروه‌بندی آزمون دانکن میانگین مقادیر این متغیر در سه گروه متفاوت طبقه‌بندی شد ولی نتایج آزمون تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری را در سطح اعتماد ۹۵ درصد بین میانگین مقادیر سایر فاکتورهای اندازه‌گیری شده نشان نداد.

جدول ۲ - میانگین مقادیر رویش قطربی سالانه (میلی‌متر)، رویه زمینی بر مبنای قطر درخت، ارتفاع درختان، کاهش قطری در ۵۰ درصد ارتفاع درختان، درصد بیضوی شدگی و مقادیر بروونمرکزی در ارتفاع برابر سینه درختان.

		فاصله کاشت		
		۱×۱ (متر)	۱/۵×۱/۵ (متر)	۲×۲ (متر)
رویش قطربی سالانه (میلی‌متر)		۳/۲۵	۴/۳	۵/۴
انحراف معیار		۱/۱	۱/۳	۱/۴
گروه‌بندی در سطح اعتماد ۹۵ درصد	c		b	a
رویه زمینی (مترومیع در هکتار)		۵۷/۸	۶۱/۶۵	۷۳/۴۹
انحراف معیار		۱۶/۸	۱۸/۹۵	۲۳/۶
گروه‌بندی در سطح اعتماد ۹۵ درصد	a		a	a
ارتفاع درختان (متر)		۱۳/۸	۱۵/۴	۱۵/۹
انحراف معیار		۱/۷	۰/۷	۱
گروه‌بندی در سطح اعتماد ۹۵ درصد	a		a	a
کاهش قطری در ۵۰ درصد ارتفاع درختان (سانتی‌متر / متر)		۰/۴۲	۰/۴۳	۰/۵۲
انحراف معیار		۰/۰۶	۰/۰۹	۰/۰۸
گروه‌بندی در سطح اعتماد ۹۵ درصد	a		a	a
عیب بیضوی شدگی در حد برابر سینه (درصد)		۸/۰۳	۸/۱۲	۱۰/۲۳
انحراف معیار		۳/۵	۴/۹۵	۴/۴۴
گروه‌بندی در سطح اعتماد ۹۵ درصد	a		a	a
برونمرکزی بر مبنای شعاع بزرگ		۱/۲	۱/۲	۱/۲
انحراف معیار		۰/۱۴	۰/۱۳	۰/۰۸
گروه‌بندی در سطح اعتماد درصد	a		a	a

بحث و نتیجه‌گیری

همان طور که ملاحظه شد با افزایش فاصله کاشت، میزان رویش قطری سالانه گونه افرا پلت افزایش یافت که این یافته با نتایج ودزیک (۲۰۰۱) مطابقت دارد. جورجنسن (۱۹۶۷) بیان نمود افزایش ارتفاع با افزایش تراکم رویشگاه در محدوده معینی از فاصله کاشت صورت گرفته و در خارج از این محدوده ارتباط ضعیفی بین تراکم رویشگاه و ارتفاع درختان وجود دارد، بنابراین به نظر می‌رسد کم بودن فواصل کاشت در این پژوهش علت وجود اثر مستقیم بین تراکم رویشگاه و ارتفاع درختان بوده باشد. رویه زمینی که معیار مهمی در میزان تولید چوب می‌باشد در این پژوهش با افزایش فاصله کاشت تا حدودی افزایش یافت. در واقع افزایش میزان رویش با افزایش فاصله کاشت جبران‌کننده کاهش درختان در واحد سطح نبود. ماتکین (۱۹۹۸) بیان نمود در رویشگاه‌هایی با تراکم بسیار بالا، افزایش فاصله بین درختان به وسیله تنک نمودن، سبب افزایش رویه زمینی در سال‌های بعد خواهد شد. در حالی که در رویشگاه‌هایی با رویه زمینی کمتر از ۱۵ مترمربع در هکتار، تنک نمودن و افزایش بیش از حد فاصله کاشت تأثیر منفی بر مقدار آن خواهد داشت. کاهش قطر، به ویژه در ۵۰ درصد ابتدایی ارتفاع درخت عامل مؤثری بر بازدهی محصول در تولید روکش و تخته‌لایه از گرده بینه می‌باشد، به طوری که با افزایش کاهش قطر، که بیانگر مقدار مخروط‌شدنگی تنه می‌باشد، از مقدار بازدهی محصول کاسته می‌شود. در این مطالعه اگرچه اختلاف معنی‌داری بین فاصله کاشت و مقدار مخروط‌شدنگی مشاهده نشد، اما با افزایش فاصله کاشت بر میزان مخروط‌شدنگی افزوده شد. معايب برون‌مرکزی و بیضوی‌شدنگی بر بازدهی تولید محصول نهایی از گرده بینه و کیفیت چوب مؤثر می‌باشند. این معايب بیش تر تحت تأثیر نامتقارنی تاج پوشش و رویش غیریکنواخت کامبیوم در جهات مختلف می‌باشند (کشکولی و همکاران، ۲۰۰۷). با توجه به نتایج این پژوهش مشاهده می‌شود که اگرچه افزایش فاصله کاشت تا حد مشخص اثرات مثبتی بر روی میزان رویش قطری و ارتفاع و نیز افزایش رویه زمینی درختان افرا پلت دارد ولی افزایش بیش از حد فاصله کاشت و نگرش‌های اقتصادی به منظور تولید محصول بیش تر به ویژه با هدف تولید چوب‌های کم‌قطر صنعتی در دوره‌های بهره‌برداری کوتاه‌مدت (۸-۱۰) ساله برای مصرف در صنعت خمیر کاغذ، برای کاهش میزان رویش سالانه، کاهش رویه زمینی و افزایش عیوب گرده بینه مفید نمی‌باشد. در پایان توصیه می‌شود برای تولید چوب‌های قطور برای صنایع روکش‌گیری و چوب‌بری، ابتدا درختان با فاصله کاشت کم کشت شوند و سپس همراه با رشد درختان و توسعه تاج پوشش آنها، اقدام به عملیات روشن‌سازی و تنک کردن شود که با این روش از معايب چوب و میزان جوان چوب تنه درختان کاسته شده و بر میزان رویش سالانه افزوده می‌گردد.

منابع

- 1.Efhami, D., Asadi, F., Karimi, A. and Pourtahmasi, K. 2008. The effect of initial spacing and interplanting crop (alfalfa) on bole from and annual growth of *populus nigra betulifolia*. The 1st Iranian conference on supplying row materials and development of wood and paper industries.
- 2.Jorgensen, J.J. 1967. The influence of spacing on the growth and development of coniferous plantations. Int. rev. for. Res. 2: 43-94.
- 3.kashkouli, B., Amiri, A., Parsapazhouh, S. and Parsapazhouh, D. 2007. Methods of grading and measuring of lumbers and boles. Ilaf Publishment: 383p.
- 4.Lasserre, J.P., Mason, E.G. and Watt, M.S. 2005. The effects of genotype and spacing on *pinus radiate* [D. Don] core wood stiffness in an 11-year old experiment. Forest ecology and management, 205: 375-383.
- 5.Mäkinen, H. 1998. Effect of thinning and natural variation in bole roundness in *Scots Pine* (*Pinus sylvestris*). Forest Ecology and Management, 107: 231-239.
- 6.Punches, J. 2004. Tree growth, forest management, and their implication for wood quality, a Pacific Northwest extension publication, 80p.
- 7-Wodzicki, T.J. 2001. Natural factors affecting wood structure. Wood SCI tech. 35: 5.



J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 19 (2), 2012
<http://jwsc.gau.ac.ir>

The effect of initial spacing on bole form and annual growth of (*Acer velutinum*)

*M. Fallahnia¹ and A. Rafighi²

¹M.Sc. Student, Faculty of Wood and Paper Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, ²Assistant Prof., Faculty of Wood and Paper Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Received: 2010/01/10; Accepted: 2011/10/01

Abstract

This study was conducted to investigate the effect of planting space on specifications of trunk form in terms of tapering, eccentricity, elliptical stem well as height and diametric growth and basal area of *Acer velutinum*. For this purpose from each treatment including planting space of 1×1, 1.5×1.5 and 2×2 meters, four trees from Shastkalateh training forest, Gorgan Iran, were cut and above mentioned factors were determined. The results showed that with increase in planting space, annual diameter growth were significantly increased. Maximum and minimum basal area was related to planting space of 2×2 and 1×1 m², respectively. However, with increase of planting space, tapering, eccentricity and elliptical trunk were increased, but the difference was not considerable.

Keywords: Planting space, Annual growth, Tapering, Eccentricity, Elliptical stem, Basal area, *Acer Velutinum*

* Corresponding Author; Email: marzi_9545@yahoo.com