



دانشگاه گوارزی و منابع گیاهی

مجله پژوهش‌های تولید گیاهی

جلد بیستم، شماره اول، ۱۳۹۲

<http://jopp.gau.ac.ir>

نقش تیمارهای هورمونی در باززایی گیاهان کامل از ریز نمونه‌های گیاه جاشیر در شرایط درون شیشه‌ای

زهرا ضیائی فرد^۱، * منیژه میان‌آبادی^۲ و مهناز اقدسی^۲

^۱ کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان،

آستادیاران گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گلستان

تاریخ دریافت: ۹۱/۳/۸؛ تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۱۶

چکیده

جاشیر (*Prangos ferulacea*) یک گیاه پایا و معطر از خانواده چتریان است که در بعضی از مناطق ایران به صورت وحشی رشد می‌کند. هیچ گزارشی در مورد باززایی این گیاه در شرایط درون شیشه‌ای وجود ندارد. در این مطالعه، اثر هورمون‌های 2,4-D، کینتین، نفتالن استیک اسید و بنزیل آمینو پورین روی باززایی ساقه و تولید گیاه کامل از قطعات جداگشت ریشه‌چه، محور زیر لپه، محل اتصال محور زیر لپه به ریشه‌چه (یقه) و برگ لپه‌ای دانه‌رست‌های جاشیر در یک طرح کاملاً تصادفی با ۲۰ تیمار هورمونی و ۳ تکرار در هر تیمار انجام شد. بهترین نتایج ساقه‌زایی مربوط به قطعات جداگشت یقه تحت تیمارهای ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D همراه با ۱ میلی‌گرم در لیتر کینتین و ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D همراه با ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر کینتین (۶۷ درصد در هر تیمار) بود. ساقه‌های باززایی شده، در محیط کشت MS پایه فاقد هورمون ریشه‌زایی نمودند.

واژه‌های کلیدی: *Prangos ferulacea*، ساقه نوپدید درون شیشه‌ای، محیط پایه، 2,4-D، کینتین.

* مسئول مکاتبه: m.mianabadi@gu.ac.ir

مقدمه

گیاه جاشیر با نام علمی *Prangos ferulacea* متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) است. جنس جاشیر ۳۰ گونه دارد که در ایران ۱۶ گونه آن از رویشگاه‌های تهران، آذربایجان، شیراز، مازندران، اراک، کردستان، همدان، سمنان، لرستان و اصفهان جمع‌آوری و شناسایی شده است (حسنی و شامزادی؛ ۲۰۰۷). *P. ferulacea* گیاهی بوته‌ای، پایا و یک پایه است. این گیاه بسیار مقوی و با ارزش می‌باشد و وجه تسمیه آن به کیفیت بالای غذایی آن در مقایسه با شیر اشاره دارد. اسانس جاشیر دارای متابولیت‌های ثانویه‌ای است که به‌طور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و به‌عنوان ترکیباتی با خاصیت ضد میکروبی مورد استفاده قرار می‌گیرد (امیری، ۲۰۰۵). در شرق آناتولی از جاشیر به‌عنوان ماده غذایی استفاده می‌شود (کورو و همکاران، ۲۰۰۷) و در بعضی از مناطق، سرشاخه‌های آن به‌عنوان سبزی خوراکی مصرف می‌گردند.

قرن‌های متمادی است که در ترکیه جاشیر را به‌دلیل عطر و طعم آن به‌صورت سنتی برای تولید پنیر به‌کار می‌برند (دورماز و همکاران، ۲۰۰۶). در قفقاز از برگ آن در تهیه سالاد و درمان بعضی از اختلالات گوارشی (کورو و همکاران، ۲۰۰۷). در ترکیه در درمان زخم‌های روده‌ای و توقف خونریزی‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صربستان و نواحی اطراف آن، از ریشه گیاه برای تهیه مواد درمان‌کننده زخم‌های روده‌ای و به‌خصوص هموروئید استفاده می‌شود (دجان و همکاران، ۲۰۰۴). در طب سنتی ایران، ترکیه، هند و مناطق مختلف قفقاز و آسیای مرکزی عصاره ریشه و میوه این گیاه برای درمان اختلالات معده، التیام سوختگی و توقف خونریزی استفاده می‌گردد (رضوی و حاجی‌بلند، ۲۰۰۹؛ تادا و همکاران، ۲۰۰۲). این گیاه ادرار آور و بازکننده مجاری ادراری است و برای درمان بیماری‌های کلیوی بکار برده می‌شود. از کوبیده برگ و عصاره آن برای درمان درد و از عصاره ریشه آن برای تهیه مواد آرایشی و همچنین به‌عنوان مسکن استفاده می‌شود (کوزنتسوا و همکاران، ۱۹۶۶). یکی از ترکیبات شناخته شده فلاونوئیدی در این گیاه کوئرستین ۳-O- گلیکوزید است که ویژگی‌های آنتی‌هیستامینی، ضد التهابی و ضد سرطان‌زایی را نشان می‌دهد. ضمن این‌که ممکن است به کاهش علائم خستگی، افسردگی، اضطراب، امراض کرونر و سرطان کمک کند (رضوی و همکاران، ۲۰۰۹). در بسیاری از مناطق ایران جاشیر یکی از گیاهان مهم در تهیه علفه زمستانی دام‌ها محسوب

می‌شود و مردم آن را برای تغذیه دام بهتر از یونجه می‌دانند (سفیدکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ رضوی و حاجی‌بلند، ۲۰۰۹). به‌علت تغییر شرایط محیطی در دهه‌های گذشته و برداشت بیش از حد گیاهان وحشی از مزارع بومی به‌وسیله گیاه‌شناسان و کشاورزان و همچنین شرایط بد اقلیمی (خشکسالی) باعث گردیده است تا جمعیت گیاه وحشی به‌سرعت رو به کاهش رود. لذا، جهت پیشگیری از فقدان گیاهان بومی در آینده، کشت و تکثیر آن‌ها به‌صورت زراعی ضروری می‌باشد (رضوی و حاجی‌بلند، ۲۰۰۹). طبیعتاً تکنیک کشت بافت نیز در این راستا می‌تواند کمک مؤثری باشد. کشت بافت ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی است و از این طریق می‌توان به تکثیر گیاهان مختلف یک‌دست از لحاظ ژنتیکی از جمله گیاهان دارویی، زینتی و غیره به شکل عاری از آفت اقدام نمود (احسان‌پور و امینی، ۲۰۰۲). کشت ریز نمونه‌های دمبرگ، دمبرگچه و برگچه *Thapsia garganica* روی محیط کشت دارای ۲ میلی‌گرم در لیتر کیتین و محیط دارای ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر نفتالن استیک اسید (NAA) و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین، بعد از ۴ هفته قادر به باززایی مستقیم شاخه (بدون تولید کالوس) بودند. شاخه‌های تولید شده در محیط دارای ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر نفتالن استیک اسید و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین، پس از ۴ هفته در محیط مشابه کالوس‌زایی نمودند و کالوس‌ها سپس شاخه‌زایی داشتند (نوکاندا و همکاران، ۲۰۰۵). در زیره سبز^۱ بهترین پاسخ شاخه‌زایی روی قطعات میان‌گرهی ساقه در محیط کشت موراشیگ و اسکوک (MS) دارای ۲/۵ میکرومول بنزیل آدنین مشاهده شد (آزا و همکاران، ۲۰۰۱). در گیاه رازیانه^۲، ریز نمونه‌های هیپوکوتیل در محیط کشت دارای ۰/۸۸ میکرومولار 2,4-D و محیط دارای ۲/۶ میکرومولار NAA و ۲/۳ میکرومولار کیتین ۱۰۰ درصد، کالوس ایجاد کرد. کالوس‌های رشد یافته در محیط دارای نفتالن استیک اسید و کیتین، بعد از ۸ تا ۱۱ ماه شروع به شاخه‌زایی نمودند ولی کالوس‌های رشد یافته در محیط دارای 2,4-D رفتار اندام‌زایی را نشان ندادند. پس از انتقال شاخه‌های باززایی شده به محیط 1/2MS مایع فاقد هورمون، گیاه کامل باززایی شد. در این گیاه حضور BAP همراه با NAA به‌جای کیتین شاخه‌زایی را کاهش ولی کالوس‌زایی را افزایش داد (آنزیدی و همکاران، ۱۹۹۶). تاکنون هیچ گزارشی در خصوص کشت بافت گیاه جاشیر ارائه نشده است. بنابراین در این پژوهش، کالوس‌زایی، ریشه‌زایی و ساقه‌زایی ریز نمونه‌های گیاه جاشیر در شیشه و سپس باززایی گیاه کامل مورد بررسی قرار گرفت.

1- *Cuminum cyminum*
2- *Foeniculum vulgare*

مواد و روش‌ها

تهیه گیاهچه استریل و القای کالوس‌زایی: بذور گیاه *P. ferulacea* از اطراف یاسوج منطقه گرگو، طول جغرافیایی "۵۱-۴۲-۵۱° و عرض جغرافیایی "۳۲-۳۰-۵۴° شمالی و ارتفاع ۱۷۰۰-۱۴۰۰ متر از سطح دریا در تابستان ۱۳۸۸ جمع‌آوری شدند. بذور ابتدا در آب شسته شده، سپس به مدت ۵ دقیقه در اتانول ۷۰ درصد و ۱۵ دقیقه در آب ژاول ۱ درصد قرار گرفتند. سپس با آب مقطر استریل چند بار شستشو شدند.

با توجه به این‌که بذور گیاه جاشیر دارای خواب بودند، به منظور شکستن خواب بذر تیمار سرمادهی همراه با غلظت ۱۰۰ ppm محلول جیبرلیک اسید به مدت ۴۸ ساعت استفاده شد (ضیایی فرد، ۲۰۱۱) گیاهچه‌های با طول تقریبی ۷ سانتی‌متر با آب ژاول ۰/۲۵ درصد به مدت ۵ دقیقه ضدعفونی شده و چندین بار با آب مقطر استریل شستشو گردیدند.

به منظور القای کالوس‌زایی، ریز نمونه ریشه‌چه، محور زیر لپه، محل اتصال محور زیر لپه به ریشه‌چه (یقه) و برگ‌های لپه‌ای به محیط کشت MS دارای ترکیبی از غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد شامل کیتین به‌تنهایی (با غلظت‌های ۲ و ۱/۵، ۱، ۰/۵، ۰ میلی‌گرم بر لیتر)، کیتین همراه با 2,4-D (کیتین با غلظت‌های ۲ و ۱/۵، ۱، ۰/۵، ۰ میلی‌گرم بر لیتر و هر کدام دارای ۰/۵ میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D) و همچنین BAP و NAA به‌تنهایی (هر کدام در غلظت‌های ۲ و ۱/۵، ۱، ۰/۵، ۰ میلی‌گرم بر لیتر) و دو غلظت ترکیبی از BAP و NAA (۱ میلی‌گرم بر لیتر BAP به‌علاوه ۰/۸ میلی‌گرم بر لیتر NAA و غلظت ۰/۲ میلی‌گرم بر لیتر BAP به‌علاوه ۱ میلی‌گرم بر لیتر NAA) منتقل شدند. سپس پتری‌ها در اتاق رشد با شرایط ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی و دمای حدود ۲۵±۲ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. هر پتری دارای ۵ قطعه جداگشت بود و برای هر تیمار هورمونی سه بار تکرار در نظر گرفته شد. آزمایشات سه بار تکرار گردیدند. هر ۲ هفته یکبار نمونه‌ها واگشت شدند. بعد از گذشت مدت ۲۰ روز درصد کالوس‌زایی بررسی گردید.

القای ساقه و ریشه: به منظور القای ساقه و ریشه، ریز نمونه‌ها در محیط کشت MS دارای ترکیبی از غلظت‌های مختلف هورمونی که در بالا ذکر شد، قرار گرفتند. بعد از ۲۰ روز بهترین محیط جهت القای ساقه و ریشه براساس فاکتورهای اندازه‌گیری شده زیر تعیین گردید.

- درصد ساقه‌زایی در هر تیمار

- متوسط طول ساقه‌ها و ماکزیمم طول ساقه ایجاد شده در هر تیمار

با توجه به این مسئله که در هیچ‌کدام از تیمارهای هورمونی مورد استفاده در این پژوهش ریشه‌زایی صورت نگرفت، ساقه‌های باززایی شده به محیط کشت MS پایه فاقد هورمون منتقل گردیدند. سپس، ریشه‌زایی و ایجاد گیاهچه کامل مورد بررسی قرار گرفت (ولی‌زاده و کاظمی‌تبار، ۲۰۰۹).

سازگار کردن گیاهان باززایی شده: جهت انتقال گیاهچه‌های باززایی شده به خاک و سازگار کردن آن‌ها، مخلوطی از سه ماده کوکومیت-پرلیت و ماسه به نسبت ۱: ۱: ۲ به درون لیوان‌های یکبار مصرفی که در کف آن‌ها سوراخ‌هایی جهت زهکشی ایجاد شده بود، اضافه گردید. گیاهچه‌های باززایی شده از محیط کشت خارج شده و ریشه‌های آن با آب کاملاً شسته شدند. به طوری که بقایای محیط کشت از آن‌ها زدوده گردد و سپس به لیوان‌های موردنظر انتقال یافتند. برای حفظ رطوبت نسبی، لیوان‌های یکبار مصرف شفاف به صورت واژگون روی گلدان‌های دارای گیاهچه‌ها قرار گرفته و توسط پارافیلیم محکم شدند. در مرحله بعد، لیوان‌های دارای گیاهچه به اتاق رشد با دمای 25 ± 2 درجه سانتی‌گراد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی و رطوبت ۴۵ درصد منتقل گردیدند. آبیاری از ناحیه زیر لیوان‌ها و توسط محلول هوگلند انجام گرفت. به منظور سازگار شدن گیاهچه‌ها با محیط اطراف، هر روز یک سوراخ روی لیوان پوشاننده گیاهچه‌ها ایجاد می‌شد (پیرهادی، ۲۰۰۷).

تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و داده‌ها بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱ درصد و ۵ درصد مقایسه شدند. برای رسم نمودارها از نرم‌افزار Excel استفاده گردید.

نتایج

قطعات جداکشت برگ لپه‌ای حاصل از گیاهچه‌های *P. ferulacea* به هیچ یک از بررسی‌های انجام شده جهت کالوس‌زایی و ساقه‌زایی پاسخ ندادند. فقط تحت تأثیر بعضی از تیمارهای اعمال شده، اندازه آن‌ها بزرگ‌تر شد. بنابراین، در تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آن‌ها صرف نظر گردید. قطعات جداکشت محور زیر لپه و یقه نیز به تیمارهای کالوس‌زایی واکنشی نشان ندادند. قطعات جداکشت ریشه‌چه در بین تیمارهای هورمونی به کار رفته، فقط در دو غلظت ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر

2,4-D و ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر کیتین کالوسزایی را نشان دادند. کالوسزایی بعد از یک هفته با درصد بالایی آغاز شد ولی حجم کالوس‌های ایجاد شده کم بود. کالوس‌ها به رنگ کرم و شفاف بودند (شکل ۱- الف و ب). در غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D، ۹۳ درصد قطعات جداگشت ریشه‌چه و در غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر کیتین ۸۷ درصد قطعات جداگشت ریشه‌چه کالوسزایی داشتند. در این دو غلظت تفاوت معنی‌داری از نظر کالوسزایی مشاهده نشد. بعد از دو هفته، کالوس‌ها در محیط مشابه واگشت شدند ولی حتی پس از گذشت یک ماه تغییر چشمگیری در حجم آن‌ها ایجاد نشد. به دلیل نرمی بیش از حد کالوس‌ها انتقال آن‌ها به محیط‌های جدید با مشکلاتی مواجه بود و به دلیل حجم کم آن‌ها، از انجام آزمایشات بعدی روی آن‌ها صرف‌نظر شد. نتایج آنالیز واریانس دو غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D و ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر کیتین مشخص نمود که نوع قطعه جداگشت در درصد کالوسزایی تفاوت معنی‌داری در سطح ۱ درصد را نشان می‌دهد. ولی غلظت‌های مختلف هورمون و اثر متقابل غلظت هورمون و قطعه جداگشت تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۱).

بین تیمارهای هورمونی به کار رفته بعد از ۵ روز، فقط در ۴ تیمار پاسخ ساقه‌زایی مشاهده گردید. در شکل ۲- الف ساقه‌زایی قطعات جداگشت محور زیر لپه نشان داده شده است. مقایسه ساقه‌زایی قطعات جداگشت یقه با سایر قطعات جداگشت نشان داد که قطعات جداگشت یقه بیشترین درصد ساقه‌زایی (۶۷ درصد) را در غلظت‌های ۱ میلی گرم در لیتر کیتین همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D و غلظت ۱/۵ میلی گرم در لیتر کیتین همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D داشتند. قطعات جداگشت محور زیر لپه بیشترین درصد ساقه‌زایی را در غلظت ۱/۵ میلی گرم در لیتر NAA و در تیمار ۱ میلی گرم در لیتر کیتین همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D (به ترتیب ۲۷ درصد و ۲۰ درصد) نشان دادند. قطعات جداگشت ریشه‌چه فقط در تیمار ۱ میلی گرم در لیتر کیتین همراه با ۰/۵ میلی گرم در لیتر 2,4-D، ۲۷ درصد ساقه‌زایی را بروز دادند (جدول ۲). نتایج آنالیز واریانس ساقه‌زایی، مشخص نمود که غلظت‌های مختلف هورمون‌ها و نوع قطعه جداگشت در ساقه‌زایی تفاوت معنی‌دار در سطح ۱ درصد داشته‌اند. اثر متقابل قطعه جداگشت و غلظت‌های هورمونی نیز تفاوت معنی‌داری را در سطح ۱ درصد نشان دادند (جدول ۱).

در بین قطعات جداگشت مورد استفاده، قطعات یقه بیشترین میانگین طول ساقه را در غلظت‌های ۰/۸ میلی‌گرم در لیتر NAA همراه با ۱ میلی‌گرم در لیتر BAP (۱۹/۳ میلی‌متر) و غلظت‌های ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر کینتین همراه با ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D (۱۵/۴ میلی‌متر) ایجاد نمودند (جدول ۲). اما ماکزیمم طول ساقه ایجاد شده نیز مربوط به قطعات جداگشت یقه و در غلظت‌های ۰/۸ میلی‌گرم در لیتر NAA همراه با ۱ میلی‌گرم در لیتر BAP و غلظت‌های ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر کینتین همراه با ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و ۱ میلی‌گرم در لیتر کینتین همراه با ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D به ترتیب ۲۷/۳، ۱۷ و ۱۳/۶ میلی‌متر بود.

بعد از گذشت ۵ روز از انتقال ساقه‌های باززایی شده به محیط کشت MS فاقد هورمون، ساقه‌ها ریشه‌دار شدند. بعد از یک هفته واکشت انجام شد و گیاهچه‌های ایجاد شده ساقه‌های جدید هم تولید نمودند. گیاهچه‌های باززایی شده پس از انتقال به محیط خاک، در شرایط اتاق رشد با دمای حدود 25 ± 2 درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۴۵ درصد تا ۳ هفته زنده ماندند و رشد اندکی را نشان دادند (شکل ۲ ب). در پژوهش از عشایر محلی رویشگاه جاشیر نیز مشخص شده بود که این گیاهان در طبیعت در سال اول رشد محدودی دارند و ارتفاع آن‌ها به حدود بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ سانتی‌متر نمی‌رسد.


جدول ۱- تجزیه واریانس درصد کالوس‌زایی و درصد ساقه‌زایی قطعات جداگشت *P. ferulacea* پس از تبدیل داده‌ها به روش $2 \text{ArcSin} \sqrt{Y}$

منبع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات
	(درصد کالوس‌زایی)	(درصد ساقه‌زایی)	(درصد کالوس‌زایی)	(درصد ساقه‌زایی)
نوع قطعه جداگشت	۲	۱۵/۲۲**	۲	۳/۵**
غلظت هورمون	۱	۰/۰۱	۱	۱/۶۵**
نوع قطعه جداگشت × غلظت هورمون	۲	۰/۰۱	۲	۱/۳۴**
خطا	۱۱	۰/۱۵	۲۳	۰/۰۴
کل	۱۶	—	۳۴	—


** در سطح کمتر از ۱ درصد ($p < 0.01$) معنی‌دار است.

ب

الف



شکل ۱- الف و ب- تصاویر کالوس‌های ایجاد شده از قطعات جداگشت ریشه‌چه در محیط کشت MS دارای 2,4-D 0/5 mg/L همراه با کیتین 0/5 mg/L.



شکل ۲ الف- ساقه‌زایی قطعه جداگشت محور زیر لپه در تیمار هورمونی 1 mg/L کیتین همراه 2,4-D 0/5 mg/L. ب- انتقال ساقه ریشه‌دار به خاک.

جدول ۲- مقایسه ماکزیمم طول ساقه، درصد و میانگین ساقه‌زایی قطعات جداگشت یقه، محور زیر لپه و ریشه‌چه گیاه *P. ferulacea* در تیمارهای مختلف هورمونی.

ریز نمونه	تیمارهای هورمونی (mg/L)	درصد ساقه‌زایی (درصد)	میانگین طول ساقه (mm)	ماکزیمم طول ساقه (mm)
یقه	کیتین ۱+2,4-D ۰/۵	۶۷±۱۵/۶ ^a	۱۲/۰۴ ±۲/۰۴ ^b	۱۳/۶ ±۲/۷ ^{ab}
	کیتین ۱+2,4-D+۱/۵ ۰/۵	۶۷±۱۵/۶ ^a	۱۵/۴۴ ±۲/۰۴ ^a	۱۷ ±۴/۷ ^{ab}
	۱/۸ NAA+۱ BAP ۱/۵ NAA	۴۰ ±۱۶/۳ ^b . ^c	۱۹/ ۳ ±۲/۶ ^a . ^c	۲۷/ ۳ ±۴/۷ ^a . ^c
محور زیر لپه	کیتین ۱+2,4-D ۰/۵	۲۰ ±۱۳/۳ ^c	۱۲/۲۳ ±۳/۷ ^b	۱۲/۶۶ ±۲/۹ ^b
	کیتین ۱+2,4-D+۱/۵ ۰/۵	. ^d	. ^c	. ^c
	۱/۸ NAA+۱ BAP ۱/۵ NAA	. ^d ۲۷ ±۱۴/۷ ^c	. ^c ۱۱/۴۱ ±۳/۲ ^b	. ^c ۱۲ ±۴/۷ ^b
ریشه چه	کیتین ۱+2,4-D ۰/۵	۲۷ ±۱۴/۷ ^c	۱۲/۹۱ ±۳/۲ ^b	۱۳/۳ ±۲/۶ ^{ab}
	کیتین ۱+2,4-D+۱/۵ ۰/۵	. ^d	. ^c	. ^c
	۱/۸ NAA+۱ BAP ۱/۵ NAA	. ^d . ^d	. ^c . ^c	. ^c . ^c

حروف کوچک روی اعداد نشانگر تفاوت معنی‌دار در سطح ۵ درصد می‌باشند.

بحث

کالوس‌زایی قطعات جداگشت *P. ferulacea* فقط در دو غلظت ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر کیتین با ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و غلظت ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D مشاهده شد و فقط قطعات جداگشت ریشه‌چه کالوس‌زایی نمودند. (ولی زاده و کاظمی‌تبار، ۲۰۰۹) نیز گزارش کردند که بیشترین کالوس‌زایی زیره سیاه در تیمار با 2,4-D به تنهایی و یا در ترکیب با کیتین به دست آمد (ولی‌زاده و کاظمی‌تبار، ۲۰۰۹) انتخاب قطعه جداگشت مناسب، نقش مهمی در موفقیت کشت بافت دارد. شرایط فیزیولوژیکی قطعه جداگشت و میزان هورمون‌های درون‌زاد اکسین و سیتوکینین می‌تواند از عوامل مؤثر در پاسخ متفاوت نوع قطعه جداگشت به تیمار هورمونی باشد. همچنین، سطح بیان ژن‌های مؤثر در کالوس‌زایی قطعات جداگشت مختلف می‌تواند متفاوت باشد (سفیدکن و نجف‌پور نوایی، ۲۰۱۰). ساقه‌زایی در قطعات جداگشت *P. ferulacea* در ۴ تیمار هورمونی مشاهده شد. غلظت ۱ میلی‌گرم در لیتر کیتین با ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D بیشترین درصد ساقه‌زایی را نشان دادند. بیشترین درصد

ساقه‌زایی در قطعات جداگشت یقه مشاهده شد. قطعات جداگشت یقه، در محل اتصال محور زیر لپه به ریشه‌چه یک گره دارند. بنابراین، احتمالاً به دلیل وجود یک منطقه مرستمی در این ناحیه این قطعات جهت ساقه‌زایی مناسب‌تر بودند. (پنت و مندار، ۲۰۰۷). همچنین از قطعات گرهی^۱ ساقه جهت باززایی گیاه هویج استفاده نمودند (پنت و مندار، ۲۰۰۷).

بیشتر تیمارهای هورمونی به کار رفته در این پژوهش منجر به تغییر اندازه قطعات جداگشت، بدون ساقه‌زایی و کالوس‌زایی شد. از این مطلب می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً غلظت جیبرلین درون زاد بافت گیاه بالا است که منجر به بزرگ شدن ابعاد قطعات جداگشت می‌شود. نوکواندا و همکاران، (۲۰۰۵) نیز در باززایی *Thapsia garganica* تغییر اندازه قطعات جداگشت را گزارش نمودند.

قطعات جداگشت گیاه در هیچ یک از تیمارهای هورمونی مورد استفاده ریشه‌زایی نمودند. در صورتی که، ساقه‌های باززایی شده پس از انتقال به محیط کشت MS فاقد هورمون ریشه‌زایی نمودند. ولی‌زاده و کاظمی تبار (۲۰۰۹) نیز در مطالعه بر روی زیره سیاه، ساقه‌های باززایی شده را به محیط کشت MS فاقد هورمون جهت ریشه‌زایی منتقل نمودند. در بررسی‌های ابراهیمی و همکاران، (۲۰۰۳) نیز ریشه‌زایی ساقه‌های باززایی شده زیره سبز در محیط کشت MS فاقد هورمون انجام گرفت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در بعضی از گونه‌ها نقش هورمون‌های ریشه‌زای خارجی برای ریشه‌دار کردن ساقه‌های باززایی شده چندان ضروری نمی‌باشد. احتمالاً در ساقه‌های باززایی شده این گونه‌ها میزان هورمون‌های اکسینی درون زاد جهت ریشه‌زایی کافی می‌باشد.

یکی از پیچیدگی‌های کشت بافت گیاهان خانواده چتریان استقرار ضعیف آن‌ها در خاک بعد از کشت در شیشه، به دلیل آمادگی آن‌ها برای پوسیدگی‌های قارچی و زرد شدن است. همان‌گونه که گیاهچه‌های باززایی شده زیره سبز، گیاه خلال دندان (*Ammi visgana*) و *Thapsia garganica* پس از ۲ هفته انتقال به خاک زرد شدند (ماکونگا و همکاران، ۲۰۰۳؛ نوکواندا و همکاران، ۲۰۰۵؛ تافیک و نوگا، ۲۰۰۱). گیاهچه‌های باززایی شده *P. ferulacea* نیز پس از انتقال به خاک رشد مطلوبی را نشان ندادند. بنابراین، مطالعه و بررسی دقیق‌تر چگونگی سازگار نمودن گیاهان باززایی شده حاصل از کشت بافت خانواده چتریان در خاک، در پژوهش‌های بعدی ضروری به نظر می‌رسد.

منابع

1. Amiri, H. 2005. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. Medicinal Plants. 21: 36-41.
2. Anzidei, M., Vivona, L., Schiff, S. and Bennici, A. 1996. In vitro culture of *Foeniculum vulgare*: callus characteristics in relation to morphogenesis. Plant Cell Tissue. Organ Culture. 45: 263-268.
3. Azza, A., Tawfic, A.A. and Noga, G. 2001. Adventitious shoot proliferation from hypocotyl and intermodal stem explants of cumin. Plant Cell Tissue. Organ Culture. 66: 141-147.
4. Coruh, N., Sagdicoglu, C., and Ozgokco, F. 2007. Antioxidant properties of *Prangos ferylacea* (L). *Chaerophyllum macropodium* Boiss. and *Heracleum persicum* Deasf. From Apiaceae family used as food in eastern Anatolia and their inhibitory effects on glutathione- s- transferase. Food Chem. 100: 1237-1242.
5. Dejan, D., Vanja, M., Milena, V. and Nada, N. 2004. 3,5- Nonadiyne Isolated from the risom of *Cachris ferulacea* inhibits endogenous nitric oxide release by rat peritoneal macrophages. Chemistry pharmacological Bulletin. 52: 853- 854.
6. Durmaz, H., Sagun, E., Tarakci, Z. and Ozgokce, F. 2006. Antibacterial activities of *Allium vineale*, *Chaerophyllum macropodium* and *Prangos ferulacea*. Afr J. Biotechnol. 5: 1795-1798.
7. Ebrahimie, e., Habashi, A.A., Ghareyazie, B., Ghannadha, M., Mohammadi, M. 2003. A rapid and efficient method for regeneration of plantlets from embryo explant, of cumin (*Cuminum cyminum*). Plant Cell Tissue. Organ Culture. 75: 9-25.
8. Ehsanpour, A. and Amini, F. 2002. Plant Tissue and cell culture. Jahad Daneshgahi Isfahan Press, Isfahan. 11p.
9. Hasani, J. and Shamoradi, A. 2007. Autecology of *Prangos ferulacea* in kurdistan province. Iran J. Range. Desert Res. 14: 171-184.
10. Kuznetsova, G., Milova, N. and Nazerenkon, M. 1966. Antibacterial activity of some natural lactones rastitelyne resursy. Plant Cell Tissue. Organ Culture. 2: 216- 217.
11. Makunga, N.P., Jager, A.K. and Staden, J. 2003. Micropropagation of *Thapsia garganica* a medicinal plant. Plant Cell Reports. 21: 967- 973.
12. Nokwanda, P., Makunga, Anna, K., Jager. and Johannes, V.S. 2005. An improved system for the in vitro regeneration of *Thapsia garganica* via direct organogenesis– influence of auxins and cytokinins. Plant Cell Tissue. Organ Culture. 82: 271- 280.
13. Pant, B. and Manandhar, S. 2007. In vitro propagation of Carrot (*Daucus carota*) L. Sci world. 5: 51- 53.
14. Pirhadi, F. 2007. Micropropagation and Optimization of *Teucrium polium* in vitro culture. MSc Thesis. Golestan University.

15. Razavi, S.M., Hajiboland, R. 2009. Dormancy breaking and germination of *Prangos ferulacea* seed. Eur J. BioSci. 3: 78-83.
16. Razavi, S.M., Zahri, S., Zarrini, G., Nazemiyeh, H. and Mohammadi, S. 2009. Biological activity of quercetin- 3-o- glucosid, a know plant flavonoid. Bioorganic Chem. 35: 376- 378.
17. Sefidkon, F. and Najafpour Navaii, M. 2001. Chemical Composition of the oil of *Prangos uloptera* DC. J. Essential Oil Res. 13: 84-85.
18. Tada, Y., Shikishima, Y., Takaishi, Y. and Shibata, H. 2002. Coumarins and gamma pyrone derivatives from *Prangos pabularia*. Phytochem. 59: 649-654.
19. Tawfic, A.A. and Noga, G. 2001. Adventitious shoot proliferation from hypocotyls and internodal stem explants of cumin. Plant Cell Tissue. Organ Culture. 66: 141- 147.
20. Valizadeh, M. and Kazemi Tabar, S.K. 2009. Investigation of plant growth regulators effects on callus induction and shoot regeneration of *Bunium persicum* (Boiss). Agriculture Sci Technol. 11: 481- 486.
21. Ziaee Fard, Z. 2011. Micropropagation and optimization of conditions for the *in vitro* culture of two medicinally Prangos (*P. ferulacea* & *P. uloptera*) species. MSc Thesis. Golestan University.



Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources

J. of Plant Production, Vol. 20 (1), 2013

<http://jopp.gau.ac.ir>

The role of hormone treatment on complete Regeneration of Jashir (*Prangos ferulacea* Lindl) *in vitro*

Z. Ziaee Fard¹, *M. Mianabadi² and M. Aghdasi²

¹M.Sc. in Plant Physiology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Iran,

²Assistant Prof., Dept. of Biology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan,
Iran

Abstract

Prangos ferulacea (L.) Lindl (Apiaceae) is a permanent and aromatic plant grows wild in some regions of Iran. There are not any reports about plant regeneration of *P. ferulacea in vitro*. In the present study, the effect of various concentrations of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) with kinetin and naphthalene acetic acid (NAA) with Benzyl amino purine (BAP) on shoot and plant regeneration of *P. ferulacea* radicle, hypocotyl, crown, and cotyledon explants were investigated. The study was designed as a completely randomized design with 20 treatments and 3 replications. The best results of shoot regeneration was recorded case of crown explants in MS medium comprising 0.5 mg/L 2,4-D with 1mg/L Kin and 0.5 mg/L 2,4-D with 1.5 mg/L Kin treatments (67%, in each cases). The regenerated shoots were rooted on basal MS medium without any hormonal treatment.

Keywords: *Prangos ferulacea*; In vitro shoot regeneration; 2,4-D; Kinetin.

*Corresponding Author; Email: m.mianabadi@gu.ac.ir