

تنوع ژنتیکی اندوخته ساقه در ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی پس از مرحله گلدهی

امیرقلی سنجری پیرایواتلو*^۱ و امیر یزدان سیاس^۲

۱، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

۲، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات، کرج

(تاریخ دریافت: ۸۶/۶/۱۷- تاریخ تصویب: ۸۶/۱۲/۱۵)

چکیده

گندم جهت پر کردن دانه در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی، به اندوخته ساقه نیاز شدید دارد. برای شناسایی تنوع ژنتیکی در اندوخته ساقه گندم تحت تنش خشکی، تعداد ۲۰ ژنوتیپ در دو شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی و آبی طی دو سال زراعی متوالی (۸۱-۱۳۷۹) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در بین ژنوتیپ ها از نظر اندوخته ساقه در هر دو شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی و آبی تفاوت معنی داری وجود داشت. کسری رطوبت در مرحله بعد از گرده افشانی تأثیری در تعداد دانه در سنبله نداشت. میزان تجمع ماده خشک در دانه بطور قابل ملاحظه در اثر کسری رطوبت کاهش پیدا کرد. وزن ماده خشک اندام های رویشی در مرحله گرده افشانی در مقایسه با دوره پر کردن دانه در هر دو شرایط تنش خشکی و آبی کاهش یافت. اما، انتقال ماده خشک در ژنوتیپ های شماره ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ در شرایط تنش خشکی بسیار بالا بود. وزن هزار دانه در شرایط کسری آب به شدت کاهش یافت. همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه با صفات، میزان انتقال مواد فتوسنتزی (RDM)، شاخص برداشت (HI) و شاخص تحمل به خشکی (STI) نشان دادند که در انتخاب ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، بایستی بالا بودن میزان شاخص برداشت (HI)، میزان انتقال مواد فتوسنتزی (RDM) و شاخص تحمل به خشکی (STI) در شرایط تنش خشکی بعنوان معیار موثر در سلکسیون مورد توجه قرار گیرند.

واژه های کلیدی: گندم های زمستانه، تنش خشکی، ماده خشک، اندوخته ساقه، انتقال مجدد.

مقدمه

در ایران بالغ بر ۶/۹ میلیون هکتار می باشد (۱) که نزدیک به ۳۶٪ آن بصورت آبی و ۶۴٪ آن در شرایط دیم کشت می شوند. در حدود ۵۰ الی ۵۵ درصد مناطق مورد کشت گندم به وارینه های گندم زمستانه و بینابین اختصاص دارد. در مناطق نیمه خشک اقلیم سرد ایران گندم اغلب تحت شرایط دیم و تنش رطوبتی کشت می گردند. که این مناطق از نظر میزان رطوبت سالانه، فراوانی، طول دوره بارش از

زمانیکه گندم های نان (*T.aestivum* L.) در مناطق نیمه خشک دنیا و در آب و هوای مدیترانه ای در فصل بهار به مرحله پر کردن دانه وارد می شوند بارندگی کاهش یافته و میزان تبخیر از خاک افزایش پیدا می کند (۸) و در نتیجه کمبود رطوبت در مراحل رشد و نمو دانه سبب محدودیت محصول دهی گندم می شود (۹، ۱۰). سطح زیر کشت گندم

غلات در شرایط محدودیت آب در اکثر مناطق مورد کشت، به میزان ۲ الی ۳ تن در هکتار محصول تولید می‌کند در حالیکه این میزان محصول، حدود یک سوم عملکرد گندم تحت شرایط بدون تنش می‌باشد، از اینرو، پائین بودن عملکرد غلات در شرایط تنش خشکی، بیش از داشتن تفاوت عملکرد بالقوه در بین ژنوتیپ‌ها، با تفاوت وراثت‌پذیری صفت تحمل به خشکی ارتباط دارد. همچنین متوسط عملکرد گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی در اغلب محیط‌های تنش‌دار بمیزان ۴ الی ۵ تن در هکتار گزارش شده، در حالیکه بیشترین عملکرد در بین ارقام گندم بمیزان ۸ تن در هکتار می‌باشد (۳).

مطالعات زیادی به منظور ارزیابی اثرات آبیاری محدود در روی خواص کمی و کیفی ارقام گندم بهاره و زمستانه صورت گرفته که بر اساس آن اثر تنش خشکی در مراحل رشد سنبله دهی و بعد از سنبله دهی در ارقام گندم بسیار بحرانی گزارش شده است. تنش احتمالاً زمانیکه برگهای گندم پیچیده شده و گیاه بحال پژمردگی در می‌آید ظاهر می‌گردد. اثرات تنش خشکی در مرحله بین پر کردن دانه و رسیدن بسیار زیاد بوده و موجب کاهش عملکرد دانه در گندم می‌شود. زمانیکه تنش خشکی در مراحل بین گلدهی و خمیری دانه در گندم اتفاق می‌افتد عملکرد دانه را بشدت کاهش می‌دهد ولی وقوع تنش خشکی در مرحله روند رسیدگی فیزیولوژیکی فقط سبب کاهش ۱۰٪ عملکرد دانه در گندم می‌گردد. وقوع تنش خشکی ملایم در طول مراحل اولیه رشد رویشی در گندم‌های کشت شده در بهار در عملکرد دانه تأثیری نداشته است (۲). در حالیکه جنت (۱۹۹۴) در طی سه سال مطالعه متوالی نتیجه گرفت که کربن‌های ذخیره شده در ساقه گندم برای پر کردن دانه حائز اهمیت است حتی تحت شرایط ملایم کربوهیدرات‌های جاری ممکن است برای پر کردن دانه محدود باشد (۱۵). پلاوت و همکاران (۲۰۰۴) گزارش دادند که تعداد دانه در سنبله تحت تأثیر تنش خشکی بعد از گرده افشانی قرار نگرفت ولی میزان تجمع مواد خشک در دانه‌ها در هر دو رقم گندم مورد مطالعه آنان در اثر وقوع تنش خشکی در مرحله بعد از گرده افشانی بشدت کاهش یافتند و میزان انتقال ماده خشک (احتمالاً کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی)

سالی به سال دیگر متفاوت هستند (رطوبت سالانه بین ۲۸ الی ۳۰۰ میلی‌متر متغییر است)، فاکتورهای محدود کننده دیگری نیز مانند درجه حرارت پائین در فصل زمستان (حداقل مطلق درجه حرارت ۳۰- درجه سانتی‌گراد)، درجه حرارت بالا در مرحله پر کردن دانه (۳۵+ درجه سانتی‌گراد) و وجود تنش خشکی در مرحله بعد از گرده افشانی عملکرد گندم را تحت تأثیر قرار می‌دهند (۲۴).

رشد و نمو غلات به سه منبع از کربن بستگی دارند که این منابع شامل: ۱- کربوهیدرات‌های جاری که بوسیله فتوسنتز برگها و ساقه‌ها تامین می‌شوند، ۲- انتقال کربوهیدرات‌های ذخیره شده و نیتروژن (N) ترکیبات محتوی برگها و ساقه‌ها، و ۳- انتقال مکرر کربوهیدرات‌ها به سنبله و دانه‌های در حال رشد و کربوهیدرات‌های تولید شده بوسیله سنبله‌ها (۵) می‌باشند. میزان فتوسنتز جاری در مراحل بعد از گرده افشانی تحت تأثیر تنش خشکی انتهائی بشدت کاهش می‌یابد و شرکت کربوهیدرات‌های جاری را به دانه‌ها محدود می‌سازد (۱۸). تنفس پوشش گیاهی گندم در طول مرحله پر کردن دانه به سرعت افزایش می‌یابد (۱۶)، (۲۰) و فتوسنتز برگهای پرچم به تنهائی قادر به تامین کربوهیدرات‌های مورد نیاز تنفس و رشد دانه در شرایط تنش خشکی انتهائی نیستند (۲۳). بنابراین مقدار زیادی از کربوهیدرات‌های مورد استفاده برای پر کردن دانه در گندم بایستی از کربوهیدرات‌های ذخیره شده قبل از گرده افشانی تامین شده باشد (۱۵). برآورد میزان شرکت آسیمیلات‌های ذخیره شده در عملکرد دانه گندم به ژنوتیپ‌ها، شرایط آزمایش، و روش اندازه‌گیری کربوهیدرات‌های ذخیره شده ارتباط دارد. میزان ذخیره ماده خشک و شرکت آن در دانه گندم با اندازه‌گیری تغییرات ماده خشک میان گره‌ها، در بعد از مرحله گرده افشانی قابل برآورد است (۶، ۷، ۱۷، ۲۱، ۲۹) یا با تغییرات محلول آب و کربوهیدرات‌های محتوی میان گره‌های ساقه در طول مرحله پر کردن دانه برآورد می‌گردند (۴، ۱۹، ۲۹) و یا از تفاوت وزن ماده خشک پوشش گیاهی گندم در مرحله گرده افشانی و مرحله رسیدن بدون احتساب دانه اندازه‌گیری می‌شوند (۱۱)، (۱۴، ۳۱).

۷۰۶/۷ میلی‌متر آب (۴۶۶ میلی‌متر آب آبیاری + ۲۴۰/۷ میلی‌متر باران) و در شرایط تنش خشکی خشکی بعد از کرده افشانی بمیزان ۳۴۵/۷ میلی‌متر آب (۳۴۵ میلی‌متر آب آبیاری + ۰/۷ میلی‌متر باران) و در سال زراعی ۱۳۸۰-۸۱ تخت شرایط تحت شرایط بدون تنش خشکی بمیزان ۶۶۱ میلی‌متر آب (۳۹۰/۲ میلی‌متر آب آبیاری + ۲۷۰/۸ میلی‌متر باران) و در شرایط تنش خشکی بعد از کرده افشانی بمیزان ۵۴۳/۵ میلی‌متر آب (۲۷۲/۷ میلی‌متر آب آبیاری + ۲۷۰/۸ میلی‌متر باران) در طول دوران رشد و نمو استفاده نمودند (جدول ۲). بعد از قطع آبیاری در آزمایش با تنش خشکی بعد از کرده افشانی به ترتیب میزان ۱/۶ و ۴/۲ میلی‌متر بارش در طول مرحله پرکردن دانه در طی سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ اتفاق افتاد.

مجموع بارش، سال زراعی ۱۳۸۱-۱۳۸۰، بمیزان ۲۷۰/۸ میلی‌متر بود که با متوسط سالانه منطقه اردبیل مطابقت داشت (متوسط بارش دراز مدت منطقه اردبیل میزان ۲۸۰ میلی‌متر است) (جدول ۲). لیکن ۶۷/۵٪ از ۲۷۰/۸ میلی‌متر بارش قبل از مرحله Booting زمانیکه گیاهان آبیاری می شد نازل گردید، ۲۸/۲٪ آن بین مراحل Booting و سنبله رفتن، و ۴/۲٪ از بارش فوق در بین مراحل سنبله رفتن و اوایل دوره پرکردن دانه اتفاق افتاد. حداکثر مطلق و متوسط درجه حرارت در طول مرحله پرکردن دانه به ترتیب ۳۴/۴ و ۱۵/۶ درجه سانتی گراد بودند (جدول ۲). در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ مجموع بارش سالانه بمیزان ۲۴۰/۷ میلی‌متر بود که از متوسط بارش دراز مدت منطقه اردبیل کمتر بود. ۷۹/۶٪ از ۲۰۴/۷ میلی‌متر بارش سالانه سال زراعی ۸۰-۱۳۷۹ قبل از مرحله Booting زمانیکه خشکی به تیمارهای با تنش خشکی اعمال نشده بود نازل شد، ۱۸/۸٪ آن در مراحل بین Booting و سنبله رفتن و ۱/۶٪ از بارش فوق در بین مراحل سنبله رفتن و اوایل دوره پرکردن دانه اتفاق افتاد. حداکثر مطلق و متوسط درجه حرارت در طول مرحله پرکردن دانه به ترتیب ۳۲ و ۱۴/۲ درجه سانتیگراد بودند (جدول ۲). نوع خاک مزرعه آزمایشی لومی رسی بود. از اینرو، به لحاظ داشتن تفاوت بسیار زیادی در بین میزان

از اندام‌های رویشی به دانه‌ها در طول وقوع تنش خشکی در بین ارقام گندم مورد آزمایش تفاوت معنی داری را نشان داد. بطوریکه میزان انتقال ماده خشک در رقم گندم سانکا بیشتر از رقم گندم باتاویا بود. همچنین آنان نتیجه گرفتند که وزن هزار دانه و وزن دانه در سنبله با وقوع تنش خشکی در مرحله بعد از کرده افشانی بشدت کاهش یافت و این کاهش وزن در رقم گندم باتاویا بیشتر از رقم گندم سانکا بود (۲۲). هدف اصلی این بررسی مطالعه میزان تجمع ماده خشک در مراحل قبل از کرده افشانی و دوره پرکردن دانه و تنوع ژنتیکی در اندوخته ساقه ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی بعد از کرده افشانی بود

مواد و روشها

میزان انتقال ماده خشک از اندام‌های رویشی (ساقه + برگها) به دانه‌های در حال رشد، تحمل به خشکی و تعیین تفاوت‌های ژنتیکی عملکرد دانه و شاخص‌های مرتبط با عملکرد، تعداد ۲۰ ژنوتیپ گندم‌های زمستانه و بینابین (جدول ۱) تحت شرایط تنش خشکی بعد از کرده افشانی (E1) و بدون تنش خشکی (E2) در طی دو سال زراعی متوالی (۱۳۷۹-۸۱) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند.

آزمایشات مزرعه ای در ۳ آبان ماه سال ۱۳۷۹ و ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۸۰ در خاک لومی رسی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل که در بین ۳۸ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی و ۴۸ درجه و ۲۰ دقیقه شرقی و در ارتفاع ۱۳۵۰ متر از سطح دریا قرار دارد مورد کشت قرار گرفتند. آزمایش شرایط آبی (بدون تنش خشکی) تا زمان مرحله رسیدن فیزیولوژیکی آبیاری شدند ولی آبیاری در آزمایش تحت تنش خشکی بعد از کرده افشانی تا زمان رسیدن ۵۰ درصد گیاهان هر کرت آزمایشی به انتهای مرحله متورم شدن انتهای ساقه (Booting) آبیاری شدند و بعد از آن آبیاری به ترتیب در تاریخهای ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ (سال اول آزمایش) و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ (سال دوم آزمایش) قطع گردیدند. در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ ژنوتیپهای گندم مورد آزمایش تحت شرایط بدون تنش خشکی بمیزان

جدول ۱- عادت رشد و تعداد زوز تا گلدهی ژنوتیپ های گندم تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی بعد از گرده افشانی

ردیف	ژنوتیپ ها	تعداد روز تا سنبله رفتن (DHE) (از اول ماه ژانویه)			تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی (از اول ماه ژانویه)		
		عادل رشد (GH)	بدون تنش خشکی	تنش خشکی بعد از گرده افشانی	بدون تنش خشکی	تنش خشکی بعد از افشانی	تنش خشکی بعد از افشانی
۱	Shahriar	W	۱۳۷	۱۳۷	۱۹۲	۱۹۰	
۲	Toos	F	۱۳۹	۱۳۹	۱۹۳	۱۹۱	
۳	Tx62A4793-7/Cb809//Vee 'S'/3/Shi#44140Crow's'	W	۱۳۶	۱۳۶	۱۹۱	۱۹۰	
۴	1-67-122/4/1-32-1317//II-5017/Y50E/3/..	W	۱۳۸	۱۳۷	۱۹۳	۱۸۹	
۵	Alvd/5/Gds/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys	F	۱۴۰	۱۳۹	۱۹۴	۱۹۰	
۶	1-60-1//Emu's'/Tjb84/3/1-12628	W	۱۳۷	۱۳۷	۱۹۲	۱۹۲	
۷	1-66-49/1-66-44	F	۱۴۰	۱۴۰	۱۹۵	۱۹۳	
۸	Hys//Drc*2/7C/3/2*Rsh/5/1-12577	W	۱۳۷	۱۴۰	۱۹۴	۱۹۳	
۹	Icwha81-1473/5TI/4/La/3/Fr/Kad//Gd	W	۱۳۹	۱۳۷	۱۹۴	۱۹۱	
۱۰	Recital Own-3Wm-Owm	W	۱۳۷	۱۳۸	۱۹۳	۱۹۲	
۱۱	Ymh/Tob/Mcd/3/Lira (Bdme-9)	W	۱۳۹	۱۴۰	۱۹۳	۱۹۳	
۱۲	Ae.Ventricosa//T.turgidum/2*Mos..	F	۱۴۱	۱۴۰	۱۹۵	۱۹۳	
۱۳	Darunok	W	۱۴۰	۱۴۰	۱۹۵	۱۹۳	
۱۴	Nal60/Hn7//Buc/3/Falke	F	۱۳۷	۱۳۷	۱۹۴	۱۹۰	
۱۵	362.111/6/Nkt/5/Tob/Cno67//Tob/8156/..	F	۱۳۷	۱۳۷	۱۹۲	۱۸۹	
۱۶	Kinaci97 951327 Swmi2289-7m-om	W	۱۴۰	۱۳۹	۱۹۴	۱۹۳	
۱۷	Eryt 1554.90 (Donskayapoi-Uinten..	W	۱۳۹	۱۳۹	۱۹۳	۱۹۲	
۱۸	Cham4/Tam200/Del483 (960185..	S	۱۴۰	۱۴۰	۱۹۲	۱۹۳	
۱۹	494J6.LI/Roller (960040 Cm..	F	۱۳۶	۱۳۸	۱۹۲	۱۹۴	
۲۰	1-27-275/Cf/Cf1770/5/Ghods/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys	F	۱۳۶	۱۳۷	۱۹۲	۱۹۱	
	میانگین	-	۱۳۸	۱۳۸	۱۹۳	۱۹۱	

W (winter)= گندم زمستانه F (Facultative)= گندم های بینابین S (Spring)= گندم های بهاره

جدول ۲- میزان رطوبت (بارندگی + آبیاری) مورد استفاده در ژنوتیپ های زمستانه و بینابین گندم تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی در طی سال های زراعی ۸۰-۱۳۷۹ و ۸۱-۱۳۸۰

مدیریت آبیاری و رطوبت	ماه های سال زراعی ۸۱-۱۳۷۹											
	سال	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مجموع
بارندگی (mm)	۱۳۷۹-۱۳۸۰	۲۹/۲	۵۰/۴	۱۰/۴	۱۸/۰	۱۱/۴	۷/۹	۳۵/۴	۳۸/۵	۰	۳/۳	۲۰۴/۷
	۱۳۸۱-۱۳۸۰	۴۷/۷	۴۲/۲	۲۲/۱	۹/۳	۶/۷	۲۰/۲	۳۳/۶	۵۶/۸	۰/۵	۱۰/۹	۲۷۰/۸
۱۳۷۹-۱۳۸۰	میانگین	۳۸/۴	۴۶/۸	۱۶/۲	۱۳/۶	۹/۰	۱۴/۰	۳۴/۵	۴۷/۶	۰/۲	۷/۱	۲۳۷/۷
	حدافل	۶/۶	۲/۱	-۰/۹	-۲/۳	-۶/۸	-۰/۱	۴/۱	۶/۸	۶/۴	۱۰/۹	-
درجه حرارت C°	حداکثر	۱۶/۸	۹/۷	۷/۲	۷/۶	۲/۰	۱۲/۷	۱۷/۳	۲۰/۳	۲۲/۹	۲۳/۵	-
	حدافل مطلق	۰/۴	-۵/۰	-۹/۶	-۱۲/۶	-۲۷/۰	-۹/۰	-۳/۰	-۲/۰	۰/۲	۵/۴	-
۱۳۸۱-۱۳۸۰	حداکثر مطلق	۲۷/۵	۱۶/۰	۱۱/۴	۱۴/۰	۱۱/۶	۲۰/۰	۳۷/۰	۳۰/۸	۳۲/۰	۳۲/۲	-
	میانگین	۱۱/۷	۵/۹	۳/۲	۲/۶	۶/۴	۱۰/۷	۱۳/۶	۱۴/۷	۱۴/۷	۱۷/۲	-
درجه حرارت C°	حدافل	۷/۲	۲/۳	-۰/۸	-۱/۹	-۵/۴	-۰/۶	۳/۵	۳/۸	۷/۶	۱۰/۲	-
	حداکثر	۱۹/۴	۱۲/۷	۷/۰	۷/۷	۷/۱	۱۲/۹	۱۴/۱	۱۳/۴	۲۳/۶	۲۵/۲	-
۱۳۸۱-۱۳۸۰	حدافل مطلق	-۰/۸	-۱۲/۴	-۷/۸	-۱۲/۸	-۲۱/۴	-۵/۶	-۱/۶	-۰/۲	۳/۶	۶/۲	-
	حداکثر مطلق	۲۹/۶	۲۱/۴	۱۱/۸	۱۶/۶	۱۶/۲	۲۰/۴	۲۱/۰	۲۹/۰	۳۴/۴	۳۲	-
آبیاری در تیمار بدون تنش خشکی (mm)	میانگین	۱۳/۴	۷/۵	۳/۲	۲/۹	۰/۹	۶/۱	۸/۸	۸/۴	۱۵/۶	۱۷/۹	-
	۱۳۷۹-۱۳۸۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	(۳/۱۹) ۸۵	۹۰	۴۶۶/۰
۱۳۸۱-۱۳۸۰	(۷ آبان)	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷/۳	۶۲/۹	۶۵/۰	۵۵/۰	۳۹۰/۲
	(۷ آبان)	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱/۲۵)	(۲/۲۱)	(۳/۲۵)	(۴/۹)	۴۲۸/۱
آبیاری در تیمار باتنش خشکی بعد از گرده افشانی (mm)	میانگین	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸/۶۵	۱۲/۹۵	۱۴/۷۵	۰	۳۴۵/۰
	۱۳۷۹-۱۳۸۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲/۱۶) ۱۲۰	۰	۰	۳۴۵/۰
۱۳۸۱-۱۳۸۰	(۷ آبان)	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲/۲۴) ۱۱۵	۰	۰	۰	۲۷۲/۷
	(۷ آبان)	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷/۴	۶۵/۳	۰	۰	۲۷۲/۷
میانگین	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸/۷	۱۵/۱۵	۰	۰	۳۰۸/۸	

تاریخ گرده افشانی در ژنوتیپ های مورد مطالعه در این بررسی بطور متوسط به ترتیب در تاریخهای ۳۱ و ۲۸ اردیبهشت ماه سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بودند.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که در بین ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد دانه و شاخص‌های مرتبط با عملکرد در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی، در هر دو سال آزمایش تفاوت معنی‌داری وجود داشت (نتایج نشان داده نشده است). نتایج تجزیه واریانس مرکب (جدول ۳) نشان دادند که اثر سال بر روی میزان ماده خشک هر ساقه در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی، وزن ماده خشک اندام‌های رویشی (ساقه + برگ‌ها بدون سنبله) در مرحله گرده‌افشانی و رسیدن فیزیولوژیکی و تعداد دانه در سنبله در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی معنی‌داری ($P < 0.01$) بوده است اما اثر سال بر روی وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه فقط در شرایط آبی و بر روی میزان انتقال ماده خشک فقط در شرایط تنش خشکی معنی‌دار بود. همچنین نتایج نشان دادند، تفاوت معنی‌داری در بین ژنوتیپ‌های گندم در تمام صفات مورد مطالعه در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی وجود داشت (جدول ۳). اثر متقابل ژنوتیپ \times سال، به استثنای صفات تعداد دانه در سنبله در شرایط بدون تنش، میزان انتقال ماده خشک، در شرایط تنش خشکی و شاخص برداشت در هر دو شرایط بر روی بقیه صفات در هر دو شرایط معنی‌دار بود. نتایج این قسمت از بررسی با نتایج شفازاده و همکاران (۱۳۸۳) و اهدائی و همکاران (۲۰۰۶) مطابقت داشت (۸، ۲۸). معنی‌دار بودن اثرات متقابل ژنوتیپ \times سال عمدتاً بیش از رتبه‌بندی ژنوتیپ‌ها با تفاوت تغییرات میانگین ژنوتیپ‌ها در سال‌های مختلف ارتباط پیدا کرد. فقط در رتبه تعداد کمی از ژنوتیپ‌های گندم در بعضی از صفات مورد ارزیابی تحت شرایط تنش خشکی و آبی تغییرات مشاهده شد.

ژنوتیپ‌های گندم از نظر طول دوره فنولوژیکی دارای تنوع ژنتیکی بودند، بطور میانگین تعداد روز تا سنبله رفتن در شرایط تنش خشکی بعد از گرده‌افشانی مشابه شرایط آبی بود ولی بطور متوسط تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی در شرایط تنش خشکی بعد از گرده‌افشانی (۱۹۱ روز) و تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی در شرایط آبی (۱۹۳ روز) دارای تفاوت بودند (جدول ۱). نتایج این قسمت از بررسی با نتایج بلوم (۲۰۰۵) مطابقت داشت زیرا بر مبنای نتایج ارزیابی‌های ایشان ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی ۲ تا ۳ روز زودتر از شرایط آبی بودند (۳).

بارش سال اول و دوم اجرای آزمایشات درصد کاهش وزن ساقه در مرحله رسیدن به ترتیب میزان ۱۱/۵۷ و ۱/۳۱٪ در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ و ۸۱-۱۳۸۰ بودند.

زمین آزمایش در هر دو سال مورد بررسی آبی بود که به آن میزان ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره به همراه ۱۵۰ کیلوگرم کود فسفات دوامونیم در پائین قبل از کاشت داده شد و میزان یکصد کیلوگرم کود اوره در بهار در مرحله پنجه زنی در مزرعه آزمایشی استفاده گردید. هر کرت آزمایشی در ۶ خط ۵ متری بوسیله کرتی کار کوچک (Wintersteiger) بگونه‌ای که فاصله خطوط از همدیگر ۲۰ سانتی متر و فاصله بوته‌ها در روی خطوط ۳ تا ۵ سانتی متر بود بر مبنای ۴۵۰ دانه در متر مربع کشت شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار ساس (۲۷) استفاده شد. برای اندازه‌گیری میزان اندوخته ساقه و انتقال ماده خشک، تعداد ۲۰ ساقه بطور تصادفی از هر کرت آزمایشی در مراحل گرده‌افشانی و رسیدن فیزیولوژیکی انتخاب و از سطح زمین برداشت شدند. زمان‌های سنبله رفتن، گرده‌افشانی و رسیدن فیزیولوژیکی به ترتیب زمانی که در ۵۰٪ از سنبله‌های هر کرت آزمایشی، سنبله‌ها از غلاف برگ‌های پرچم بیرون آمده بودند، زمانی که ۵۰٪ بساک‌ها از سنبله‌های هر کرت آزمایشی بیرون آمده بودند و زمانی که ۵۰٪ سنبله‌های هر کرت آزمایشی رنگ سبز خودشان را از دست دادند یادداشت گردیدند.

در طول دوران رشد و نمو گیاه یادداشت‌برداری‌های لازم از صفات مورد بررسی بعمل آمدند و واریانس ساده، هر یک از صفات در هر سال بطور جداگانه محاسبه گردیدند (۳۰). تجزیه واریانس مرکب نیز جهت محاسبه اثر متقابل ژنوتیپ در سال برای هر یک از صفات مورد آزمایش انجام گردیدند. میانگین صفات ارقام و لاین‌های مورد آزمایش گندم بر اساس آزمون LSD مورد مقایسه قرار گرفتند (۳۰). برای محاسبه شاخص‌های حساسیت به تنش (SSI) از فرمول پیشنهادی فیشر و مورر (۱۹۷۸) و برای محاسبه شاخص تحمل به تنش (STI) از فرمول پیشنهادی فرناندز (۱۹۹۲) استفاده شدند (۱۲، ۱۳). میزان انتقال ماده خشک از اندوخته ساقه‌ها و برگ‌های گندم به دانه‌های در حال تشکیل، بر اساس مدل پیشنهادی اهدائی و همکاران (۲۰۰۶) مورد محاسبه قرار گرفت (۸).

جدول ۳- تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه

صفات مورد مطالعه	محیط ها	میانگین	میانگین مربعات				
			سالها	اشتباه الف	ژنوتیپ ها	ژنوتیپ×سال	
مجموع ماده خشک ساقه در مرحله گرده افشانی (میلی گرم)	E1	۱۹۷۴	۶۸۲۲۴۴۳۲/۸**	۱۳۲۱۳۷/۵	۲۸۱۹۶۶/۴**	۱۵۱۷۸۰/۸**	۳۵۸۰۰/۳
	E2	۲۰۴۲	۳۳۶۵۵۰۲۲/۹**	۴۹۶۴۸۶/۹	۳۴۹۴۳۵/۲**	۱۹۰۹۵۲/۱**	۴۵۱۱۲/۵
مجموع ماده خشک ساقه در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی (میلی گرم)	E1	۳۰۵۷	۴۰۸۶۴۴۴۸/۹**	۶۳۱۰۸۵/۴	۶۷۳۶۴۰/۷**	۳۸۴۴۷۸/۰**	۱۵۷۸۹۹/۸
	E2	۳۴۸۵	۳۳۵۳۸۶۱۵/۴**	۵۳۸۳۶۰/۶	۹۲۳۸۹۶/۴**	۳۷۸۳۹۹/۶**	۱۴۶۳۷۳/۸
وزن دانه در سنبله (میلی گرم)	E1	۱۲۳۴	۳۲۹۴۸۸۹/۳ns	۵۳۰۴۲۰/۰	۱۰۷۵۳۸/۹**	۱۲۲۴۹۵/۰**	۴۳۶۳۴/۴
	E2	۱۵۵۹	۴۴۹۱۱۳۵/۱**	۱۵۷۷۳۷/۶	۱۹۷۹۸۶/۲**	۱۰۴۳۷۲/۴**	۴۳۴۱۴/۷
تعداد دانه در سنبله	E1	۳۶	۵۳۴۱/۸**	۸۲/۶	۱۳۰/۳**	۳۵/۴**	۱۶/۸
	E2	۳۶	۸۵۹۶۷**	۴۴/۴	۸۷/۳**	ns۲۲/۲	۱۷/۴
وزن ماده خشک اندام های رویشی (ساقه +برگها و با حذف سنبله) در مرحله گرده افشانی (میلی گرم)	E1	۱۴۶۰	۴۳۵۲۰۵۹۲/۷**	۹۷۱۵۲/۳	۱۵۵۲۵۵/۲**	۱۰۵۷۱۳*	۲۶۴۷۷/۵
	E2	۱۵۳۰	۲۲۷۱۵۷۰۲/۶**	۳۸۴۲۹۰/۸	۱۸۷۰۸۷/۲**	۱۱۴۵۲۷/۵**	۳۲۷۰۲/۰
وزن ماده خشک اندام های رویشی (ساقه +برگها و با حذف سنبله) در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی (میلی گرم)	E1	۱۲۷۱	۱۳۶۷۸۸۷۶/۲*	۱۱۲۹۸۴/۳	۲۴۴۸۵۸/۸**	۸۲۵۷۹/۱*	۴۹۶۸۸/۹
	E2	۱۳۶۰	۸۷۴۷۶۷/۹**	۱۰۳۶۲۴/۴	۲۵۹۶۰۳/۷**	۱۴۲۵۸۵/۵*	۸۰۸۳۲/۷
وزن هزار دانه (میلی گرم)	E1	۳۵/۰	۳۷۹/۵۶۱ns	۱۴۸/۶۵۹	۷۱/۰۱۸**	۳۸/۲۳۸**	۱۶/۱۹۲
	E2	۴۴/۱	۱۱۹۲/۵*	۹۵/۹	۱۲۰/۵**	۲۱/۷**	۶/۹
شاخص برداشت (/)	E1	۴۰/۹	۶۴۵/۰۳۴ns	۲۵۹/۴۶۵	۷۸/۵۹۸**	۳۸/۷۹۵ns	۲۸/۷۹۴
	E2	۴۵/۱	۱۶۹/۲ns	۲۶/۲	۶۴/۱**	۳۵/۳ns	۲۳/۱
عملکرد دانه (تن درهکتار)	E1	۵/۹۸۳	۴۲/۵۳۰ns	۶/۴۸۷	۱/۶۲۳*	۱/۹۴۱**	-۰/۷۶۹
	E2	۷/۹۲۰	۰/۵۳۸ns	۱/۰۱۶	۲/۲۷۶**	۲/۲۰۱**	-۰/۶۱۲
میزان انتقال ماده خشک (گرم)	E1	۱۵۰/۸	۷۷۷۲۳/۹۳۶**	۲۸۹۰/۳۲	۱۷۴۹/۷۴۸**	۷۵۴/۲۰۲ns	۶۲۹/۵۳۶
	E2	۱۱۶/۴	۱۸۲۶۶/۸۶۸ns	۴۰۱۱/۷۲۵	۱۱۲۰/۲۹۷**	۸۱۲/۵۳۴*	۴۳۱/۶۷۱
شاخص تحمل به خشکی (STI)	-	-۰/۷۶۱	۲/۷۲۰ns	-۰/۹۱۶	-۰/۱۴۷*	-۰/۱۱۷ns	-۰/۰۷۴
شاخص حساسیت به تنش خشکی (SSI)	-	-۰/۵۵۲	-۰/۹۶۱*	-۰/۰۶۱	-۰/۰۶۱**	-۰/۰۶۹**	-۰/۰۲۲

E1= شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی، E2= شرایط آبی، *، **= به ترتیب معنی دار در سطح ۵٪ و ۱٪، ns = معنی دار نیست.


ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی بشدت کاهش یافتند. متوسط وزن دانه در سنبله در شرایط آبی و تنش خشکی به ترتیب به میزان ۱۵۵۹/۲ و ۱۲۳۳/۹ میلی گرم بود (جدول ۵). کاهش وزن دانه در سنبله در ژنوتیپ شماره ۷ خیلی شدید (وزن دانه در سنبله در شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۱۹۳۵ و ۱۳۷۸ میلی گرم در سنبله) در مقایسه با ژنوتیپ شماره ۳ که در آن کاهش وزن دانه در سنبله بسیار کم (وزن دانه در سنبله در شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۱۳۵۲ و ۱۲۴۶ میلی گرم در سنبله) بود (جدول ۵).

وزن خشک اندام های رویشی (ساقه + برگها و با حذف سنبله) در طول مرحله پر کردن دانه در هر دو شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی، (احتمالاً بعلت انتقال کربوهیدراتهای غیر ساختمانی به دانه) کاهش یافت (شکل ۱ و جدول ۵).

تنش خشکی بعد از گرده افشانی در تعداد دانه در سنبله تاثیر نداشت (جدول ۵) و میانگین تعداد دانه در سنبله در هر دو شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی و آبی مشابه بودند (۳۶/۰۹ و ۳۵/۷۷ دانه در سنبله) (جدول ۵). میزان تجمع ماده خشک در دانه تحت شرایط تنش خشکی در همه ارقام مورد مطالعه بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت (جدول ۵). اما کاهش تجمع ماده خشک در دانه ژنوتیپ شماره ۸ خیلی زیاد (وزن هزار دانه در شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۴۹/۳ و ۳۴/۳ گرم) در مقایسه با ژنوتیپ شماره ۱۷ که در آن میزان کاهش تجمع ماده خشک خیلی کم (وزن هزار دانه در شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۴۴/۳ و ۴۰/۱ گرم) بود. نتایج این بخش از بررسی با نتایج پلاوت و همکاران (۲۰۰۴) مطابقت داشت (۲۲). وزن هزار دانه و وزن دانه در سنبله تحت تنش خشکی در همه

انتخاب ژنوتیپ‌های شماره ۱۰، ۱۳ و ۲۰ مناسب بود. شاخص تحمل (TOL) ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی ولی با عملکرد پائین مانند ژنوتیپ شماره ۲ را تحت تنش خشکی بعد از گرده افشانی مورد انتخاب قرار داد (جدول ۴). این نتایج با نتایج سنجری و یزدان سپاس (۲۰۰۸) مطابقت داشت (۲۵). انتخاب بر اساس شاخص حساسیت به تنش (SSI) برای شناسایی ژنوتیپ‌های شماره ۲، ۱۴، ۱۵ و ۲۰ در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی مفید بود (جدول ۴)، از اینرو شاخص حساسیت به تنش خشکی قادر به شناسایی و جداسازی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی و با عملکرد بالا تحت شرایط آبی و تنش خشکی نبود. این نتیجه با نتایج سنجری و همکاران (۲۰۰۶) مطابقت داشت (۲۶). همچنین بر اساس شاخص تحمل به تنش (STI) ژنوتیپ‌های شماره ۱۰، ۱۳ و ۲۰ که ژنوتیپ‌های دارای عملکرد بالا و متحمل به خشکی در هر دو شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی بودند مورد شناسایی قرار داد، اما بر مبنای شاخص حساسیت به تنش (SSI) ژنوتیپ‌های شماره ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ که دارای تحمل به خشکی بسیار بالا بودند و در شرایط تنش خشکی عملکرد بالا تولید نمودند مورد شناسایی قرار گرفتند (جدول ۴ و ۵).

نتایج نشان دادند که ارقام و لاین‌های گندم مورد آزمایش از نظر صفات وزن ماده خشک هر گیاه، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، میزان تجمع ماده خشک در اندام‌های رویشی در مرحله گرده افشانی و در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه و میزان انتقال مواد خشک از اندام‌های رویشی به دانه در هر دو شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی و بدون تنش خشکی دارای تفاوت بسیار معنی داری بودند که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی در بین ارقام و لاین‌های گندم از نظر صفات فوق بوده است. کسری رطوبت در مرحله گرده افشانی تأثیری در تعداد دانه در سنبله نداشت. میزان تجمع مواد خشک در دانه‌ها بطور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر تنش خشکی مرحله گرده افشانی قرار گرفت که این قسمت از نتایج تحقیقات با نتایج بررسی‌های پلاوت و همکاران (۲۰۰۴) مطابقت داشت (۲۲). میزان تجمع ماده خشک در اندام‌های رویشی در مرحله پرکرده دانه در شرایط بدون تنش



شکل ۱- وزن خشک اندام‌های رویشی (ساقه + برگ‌ها و با حذف سنبله و ریشه) ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی

کاهش ماده خشک در اندام‌های رویشی (ساقه + برگ‌ها و با حذف سنبله) در شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب بمیزان ۱۱/۱ و ۱۲/۹٪ بود. همچنین انتقال ماده خشک از اندام‌های رویشی در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی به میزان ۲۹/۵٪، نسبت به شرایط آبی افزایش یافت (میزان انتقال ماده خشک از اندام‌های رویشی به دانه تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۱۱۶/۶ و ۱۵۰/۸ میلی گرم بود). میزان انتقال ماده خشک در ژنوتیپ‌های شماره ۹، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تحت شرایط تنش خشکی بسیار بالا بود و همچنین این ژنوتیپ‌ها دارای عملکرد بالا و متحمل به تنش خشکی بودند (جدول ۵).

متوسط عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مورد بررسی در شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۷/۹۰ و ۵/۹۸ تن در هکتار بود (جدول ۴). اما کاهش عملکرد دانه در ژنوتیپ شماره ۱۲ در مقایسه با ژنوتیپ‌های شماره ۲ و ۲۰ بسیار شدید بود (میزان عملکرد دانه رقم شماره ۱۲ در شرایط آبی و تنش خشکی به ترتیب ۷/۸۸ و ۵/۵۶ تن در هکتار و ژنوتیپ شماره ۲ و ۲۰ در شرایط آبی و تنش خشکی به ترتیب ۵/۲۴، ۵/۹۰ تن در هکتار و ۷/۸۳، ۷/۱۳ تن در هکتار بود). شاخص‌های حساسیت و تحمل به خشکی نشان دادند که ژنوتیپ‌های شماره ۱۰، ۱۳ و ۲۰ بسیار متحمل به خشکی و دارای عملکرد بالا هستند (جدول ۴). شاخص تحمل به خشکی (STI) نیز برای

جدول ۴- شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی

ژنوتیپ‌ها	عملکرد دانه تحت شرایط آبی (تن در هکتار)	عملکرد دانه تحت شرایط تنش خشکی (تن در هکتار)	شاخص تحمل (TOL)	میانگین بهره وری (MP)	شاخص حساسیت به تنش (SSI)	شاخص تحمل به تنش (STI)
1- Shahriar	۷/۴۵ c	۵/۴۵ df	۲/۰۰	۶/۴۵	۱/۱۰	۰/۶۵
2- Toos	۵/۹۰ d	۵/۲۴ f	۰/۶۶	۵/۵۷	۰/۴۵	۰/۵۰
3-Tx62A4793-Cb809Vee"s"/3/Shi#44140Crow"s"	۸/۱۴ ac	۵/۲۱ f	۲/۹۳	۶/۶۸	۱/۴۸	۰/۶۸
4- 1-67-122/4/1-32-1317//II-5017/Y50E/3/..	۷/۱۴ ac	۵/۲۵ ef	۱/۸۶	۶/۴۱	۱/۰۷	۰/۶۰
5 -Lvd/5/Gds/4/Anza/3/Pi/Nar/Hys	۸/۲۷ ab	۵/۶۲ df	۲/۷۵	۶/۹۹	۱/۳۵	۰/۷۵
6-1-60-1//Emu"s"/Tjb84/3/1-12628	۸/۲۶ ac	۶/۰۶ bf	۲/۲۰	۷/۱۶	۱/۱۰	۰/۸۰
7-1-66-49/1-66-44	۷/۹۲ ac	۵/۹۰ bf	۲/۰۲	۶/۹۱	۱/۰۵	۰/۷۵
8- Hys//Drc*2/7C/3/2*Rsh/5/1-12577	۸/۱۷ ac	۶/۲۵ae	۱/۹۲	۷/۲۱	۰/۹۷	۰/۸۲
9-ICwha81-1473/5/TI/4/La/3/Fr/Kad//Gd	۷/۶۷ bc	۵/۶۲ cf	۲/۰۵	۶/۶۴	۱/۱۰	۰/۶۹
10-Recital Own-3wm-owm	۸/۲۷ a	۶/۶۳ac	۲/۱۰	۷/۶۸	۰/۹۹	۰/۹۳
11-Ymh/Lira(Bdme-9)/Tob//Mcd/3/	۸/۲۰ ac	۶/۰۶ bf	۲/۱۴	۷/۱۶	۱/۰۷	۰/۸۰
12-E.VENTRICOSA//T.Turgidum/2*Mos	۷/۸۸ ac	۵/۵۶ df	۳/۳۲	۶/۷۲	۱/۳۱	۰/۷۰
13-Darunok	۸/۲۷ a	۶/۶۷ ab	۲/۰۵	۷/۷۰	۰/۹۷	۰/۹۳
14-Nai60/Hn7/Buc/3/Falke	۷/۵۳ bc	۶/۳۱ ad	۱/۲۲	۶/۹۲	۰/۶۷	۰/۷۶
15-362K2.111/6/Nkt/5/Tob/Cno67//Tob/8156/..	۷/۹۶bc	۶/۴۱ ad	۱/۲۶	۷/۰۴	۰/۶۸	۰/۷۹
16-Kinaci97951327SWm12289-7m-om..	۷/۵۸ bc	۶/۰۹ bf	۱/۴۹	۶/۸۴	۰/۸۱	۰/۷۳
17-ERYT1554.90(Donskapoi-Uinten..	۸/۲۲ ac	۶/۳۸ ad	۱/۸۴	۷/۳۰	۰/۹۲	۰/۸۴
18-CHAM4/TAM200/Del483(960185...	۸/۶۲ a	۵/۸۳ bf	۲/۷۹	۷/۲۲	۱/۳۳	۰/۸۱
19-494J6.LLER(960040 Cm..	۷/۹۹ ac	۵/۹۴ bf	۲/۰۵	۶/۹۷	۱/۰۶	۰/۷۶
20-1-27-6275/Cf/Cf1770/5/Ghods/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys	۷/۸۳ ac	۷/۱۳ a	۰/۷۰	۷/۴۸	۰/۳۷	۰/۸۹
Mean	۷/۹۰	۵/۹۸	۱/۹۲	۶/۹۵	۰/۹۷	۰/۷۶
LSD 5%	۰/۸۹۹۶	۱/۰۰۸				

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی داری ندارند. TOL=شاخص تحمل، MP=شاخص میانگین بهره وری، SSI = شاخص حساسیت به تنش، STI=شاخص تحمل به تنش، میزان کمتر در شاخص‌های TOL و SSI مربوط به هر یک از ژنوتیپ‌ها نشان دهنده متحمل بودن آن ژنوتیپ به تنش است. اشتباه استاندارد میانگین شاخص‌های TOL، MP، SSI و STI به ترتیب ۰/۱۳، ۰/۰۹، ۰/۰۶، ۰/۰۲ بودند.

جدول ۵- صفات مورد مطالعه ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی

ردیف	شرایط آبی				شرایط تنش خشکی				تعداد دانه در سنبله (میلی گرم)	عملکرد دانه در سنبله (میلی گرم)		
	وزن کل ماده خشک انجام‌های		وزن کل ماده خشک در هر		وزن کل ماده خشک انجام‌های		وزن کل ماده خشک در هر					
	رویشی (میلیگرم)	رسیدن	رویشی (میلیگرم)	رسیدن	رویشی (میلیگرم)	رسیدن	رویشی (میلیگرم)	رسیدن				
۱	۱۹۷۶	۳۴۲۹	۱۴۶۴	۱۳۳۹	۳۶	۱۴۹۲	۲۰۲۵	۲۹۱۲	۱۴۸۴	۱۲۷۶	۳۴	۱۰۶۵
۲	۲۰۴۵	۳۵۶۱	۱۴۹۹	۱۵۸۱	۳۵	۱۳۰۹	۲۰۶۱	۳۲۶۰	۱۵۲۶	۱۵۷۷	۳۶	۱۰۸۸
۳	۲۱۸۶	۲۹۳۶	۱۵۴۷	۱۰۵۰	۳۳	۱۳۵۲	۲۰۰۷	۳۳۵۴	۱۴۴۷	۱۴۲۳	۳۹	۱۲۴۶
۴	۲۰۹۰	۳۳۶۲	۱۵۴۵	۱۳۷۹	۳۷	۱۴۰۳	۱۹۰۳	۳۰۸۴	۱۳۹۴	۱۳۳۱	۳۸	۱۱۷۷
۵	۲۱۱۹	۳۳۱۶	۱۵۲۷	۱۰۷۵	۳۴	۱۶۵۸	۱۷۷۵	۳۷۲۸	۱۶۹۵	۱۳۳۴	۳۰	۱۰۷۰
۶	۲۴۲۳	۳۹۹۲	۱۵۵۹	۱۳۹۷	۴۶	۱۸۹۳	۲۲۳۶	۳۸۱۱	۱۶۰۲	۱۵۴۷	۴۷	۱۵۷۳
۷	۲۰۸۰	۴۰۰۷	۱۵۲۶	۱۳۵۸	۴۰	۱۹۳۵	۱۹۴۱	۳۴۷۶	۱۴۳۸	۱۵۲۸	۳۷	۱۳۷۸
۸	۲۱۲۸	۳۶۷۲	۱۶۴۷	۱۵۰۷	۳۲	۱۵۷۶	۱۹۴۴	۲۹۳۴	۱۴۹۷	۱۳۱۶	۳۳	۱۱۳۴
۹	۲۱۸۳	۴۴۰۴	۱۶۷۳	۱۹۳۹	۳۲	۱۷۷۰	۲۳۸۴	۳۳۸۹	۱۷۹۱	۱۵۶۵	۲۹	۱۲۴۹
۱۰	۱۵۷۶	۳۲۲۶	۱۲۰۱	۱۲۵۴	۴۰	۱۴۹۹	۱۸۴۲	۲۸۳۸	۱۳۸۰	۱۱۸۶	۳۹	۱۱۱۷
۱۱	۱۷۹۹	۲۹۳۴	۱۳۶۶	۱۱۶۹	۳۲	۱۲۷۸	۱۵۹۰	۲۶۶۴	۱۱۶۲	۱۱۱۲	۳۳	۱۰۷۶
۱۲	۲۳۱۱	۳۹۳۴	۱۷۳۳	۱۵۷۳	۴۳	۱۵۵۳	۲۰۹۴	۳۵۹۸	۱۵۴۸	۱۴۷۷	۴۴	۱۴۱۸
۱۳	۱۸۳۵	۳۰۴۶	۱۴۰۹	۱۱۲۶	۳۴	۱۵۴۸	۱۶۸۳	۲۸۶۳	۱۲۶۳	۱۰۸۳	۳۶	۱۲۵۴
۱۴	۲۲۱۰	۳۳۰۴	۱۶۳۳	۱۳۱۸	۳۲	۱۴۴۸	۱۹۶۴	۲۹۱۶	۱۴۱۳	۱۱۸۸	۳۱	۱۲۳۹
۱۵	۲۰۸۹	۳۶۰۹	۱۶۱۹	۱۴۳۹	۳۷	۱۵۸۰	۲۲۴۹	۲۹۸۳	۱۷۳۱	۱۳۰۱	۳۰	۱۱۶۴
۱۶	۱۷۲۷	۳۱۰۰	۱۲۴۷	۱۱۹۳	۳۴	۱۴۰۴	۱۸۰۵	۲۶۸۶	۱۳۱۹	۹۵۶/۴	۳۵	۱۲۴۲
۱۷	۱۷۸۵	۳۴۰۸	۱۳۵۰	۱۴۱۳	۳۴	۱۴۷۲	۱۷۷۲	۳۰۱۹	۱۳۵۴	۱۳۳۷	۳۱	۱۲۴۸
۱۸	۱۷۸۹	۳۳۲۸	۱۳۴۵	۱۲۶۹	۳۵	۱۵۱۳	۱۹۱۱	۲۶۲۸	۱۴۴۶	۹۱۸/۱	۳۶	۱۲۰۲
۱۹	۲۰۲۸	۳۳۸۳	۱۵۳۴	۱۲۷۷	۳۷	۱۶۲۳	۱۸۹۵	۲۷۵۸	۱۴۹۹	۱۰۲۲	۴۰	۱۲۶۴
۲۰	۲۵۵۸	۳۸۳۳	۱۹۱۱	۱۵۴۸	۳۶	۱۶۷۸	۲۳۹۷	۳۲۴۲	۱۷۲۶	۱۲۶۲	۳۶	۱۳۷۵
میانگین	۲۰۴۶/۸	۳۴۸۶/۷	۱۵۳۰/۱	۱۳۳۹/۴	۳۶/۰۹	۱۵۵۹/۲	۱۹۷۳/۹	۳۰۵۷/۱	۱۴۶۰/۷	۱۲۷۲	۳۵/۷۷	۱۲۳۳/۹
LSD 5%	۲۴۴/۲	۴۹۹/۹	۲۰۷/۹	۳۲۶/۹	۴/۸	۲۳۹/۶	۲۱۷/۶	۴۵۶/۹	۱۸۷/۱	۲۴۹/۲	۴/۷	۲۴۰/۲
تغییرات ماده خشک تحت شرایط تنش خشکی							-۳/۶	-۱۲/۳	-۴/۵	-۵/۰	۰/۰	-۲۰/۹

وزن کل ماده خشک ساقه = وزن همه میان گره های ساقه به استثنای ریشه، وزن کل ماده خشک اندام های رویشی = وزن ساقه + برگها (بدون سنبله و ریشه).

زیاد در بین ژنوتیپ‌های گندم مورد بررسی در این تحقیق می‌توان ژنوتیپ‌هایی که دارای شاخص برداشت، میزان انتقال مجدد مواد و شاخص تحمل به تنش (STI)، بالائی در شرایط تنش خشکی هستند مورد انتخاب قرار داد (جدول ۷) و پیشنهاد می‌شود صفات فوق بعنوان معیارهای موثر در سلکسیون مورد توجه قرار گیرند. رابطه منفی بین شاخص تحمل به تنش (STI) و شاخص حساسیت تنش (SSI) نشان داد که شاخص تحمل به تنش (STI) بعنوان یک معیار کارا در انتخاب ارقام متحمل به خشکی مطرح است.

خشکی در مقایسه با شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی کاهش یافت، اما میزان انتقال ماده خشک در ژنوتیپ‌های شماره ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی بسیار بالا بود (جدول ۶). وزن هزار دانه و وزن دانه در سنبله تحت تاثیر کسری رطوبت در مرحله بعد از گرده افشانی قرار گرفته و بشدت کاهش یافتند. همبستگی مثبت و معنی‌دار عملکرد دانه با صفات انتقال مجدد مواد فتوسنتزی، شاخص برداشت و شاخص تحمل به خشکی نشان دادند که برای دسترسی به ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی با توجه به وجود تنوع بسیار

جدول ۶- صفات مورد مطالعه ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی

ردیف	شرایط تنش خشکی				شرایط آبی			
	عملکرد دانه		انتقال ماده		عملکرد دانه		انتقال ماده	
	در سنبله	هر ساقه (میلی گرم)	خشک (میلی گرم)	RDM	در سنبله	ساقه (میلی گرم)	در سنبله	RDM
	(میلی گرم)	رسیدن	رسیدن	رسیدن	(میلی گرم)	رسیدن	رسیدن	رسیدن
۱	۱۰۶۵	۲۹۱۲	۲۰۲۵	+۳۹	۳۴۲۹	۱۴۹۲	۱۹۷۶	+۱۷۸
۲	۱۰۸۸	۳۲۶۰	۲۰۶۱	-۲۰۷	۳۵۶۱	۱۳۰۹	۲۰۴۵	-۱۱۱
۳	۱۲۴۶	۳۳۵۴	۲۰۰۷	+۵۰۲	۲۹۳۶	۱۳۵۲	۲۱۸۶	-۱۰۱
۴	۱۱۷۷	۳۰۸۴	۱۹۰۳	+۱۳۰	۳۳۶۲	۱۴۰۳	۲۰۹۰	-۴۰
۵	۱۰۷۰	۲۷۲۸	۱۷۷۵	+۴۶۱	۳۳۱۶	۱۶۵۸	۲۱۱۹	+۱۱۷
۶	۱۵۷۳	۳۸۱۱	۲۲۳۶	+۳۲۳	۳۹۹۲	۱۸۹۳	۲۴۳۳	-۲/۵
۷	۱۳۷۸	۳۴۷۶	۱۹۴۱	+۸/۳	۴۰۰۷	۱۹۳۵	۲۰۸۰	-۱۵۶
۸	۱۱۳۴	۲۹۳۴	۱۹۴۴	+۳۲	۳۶۷۲	۱۵۷۶	۲۱۲۸	+۱۴۴
۹	۱۲۴۹	۳۳۸۹	۲۳۸۴	-۴۵۱	۴۴۰۴	۱۷۷۰	۲۱۸۳	+۲۴۴
۱۰	۱۱۱۷	۲۸۳۸	۱۸۴۲	-۱۵۱	۳۲۲۶	۱۴۹۹	۱۵۷۶	+۱۲۱
۱۱	۱۰۷۶	۲۶۶۴	۱۵۹۰	+۱۴۳	۲۹۳۴	۱۲۷۸	۱۷۹۹	+۱/۰
۱۲	۱۴۱۸	۳۵۹۸	۲۰۹۴	+۱۲۹	۲۹۳۴	۱۷۵۳	۲۳۱۱	-۸/۵
۱۳	۱۳۵۴	۲۸۶۳	۱۶۸۳	+۳۳۷	۳۰۴۶	۱۵۴۸	۱۸۳۵	+۱۷۴
۱۴	۱۲۳۹	۲۹۱۶	۱۹۶۴	+۳۵۴	۳۳۰۴	۱۴۴۸	۲۲۱۰	+۲۸۷
۱۵	۱۱۶۴	۲۹۸۳	۲۲۴۹	+۶۰	۳۶۰۹	۱۵۸۰	۲۰۸۹	+۴۳۱
۱۶	۱۲۴۲	۲۶۸۶	۱۸۰۵	+۳۱	۳۱۰۰	۱۴۰۴	۱۷۲۷	+۳۶۱
۱۷	۱۲۴۸	۳۰۱۹	۱۷۷۲	-۱۵۰	۳۴۰۸	۱۴۷۲	۱۷۸۵	+۱/۷
۱۸	۱۲۰۲	۲۶۲۸	۱۹۱۱	+۶۴	۳۲۳۸	۱۵۱۳	۱۷۸۹	۴۸/۵
۱۹	۱۲۶۴	۲۷۵۸	۱۸۹۵	+۲۶۸	۳۲۸۳	۱۶۲۳	۲۰۲۸	+۴۰۱
۲۰	۱۳۷۵	۳۲۴۲	۲۳۹۷	+۴۰۳	۳۸۳۳	۱۶۷۸	۲۵۵۸	+۵۲۰
میانگین	۱۲۳۳/۹	۳۰۵۷/۱	۱۹۷۳/۹	+۱۱۶/۴	۳۴۸۴/۷	۱۵۵۹/۲	۲۰۴۶/۸	+۱۵۰/۸
LSD 5%	۲۴۰/۲	۴۵۶/۹	۲۱۷/۶	-	۴۳۹/۹	۲۳۹/۶	۲۴۴/۲	-
تغییرات ماده خشک تحت شرایط تنش خشکی	۲۹/۵	-۲۰/۹	-۱۲/۳	-۳/۶				

RDM=انتقال ماده خشک (میلی گرم). اشتباه استاندارد میانگین انتقال ماده خشک تحت شرایط آبی و تنش خشکی بعد از گرده افشانی به ترتیب ۴۵/۸ و ۴۴/۹ بودند.

=- نشان دهنده عدم انتقال ماده خشک از اندام‌های رویشی به دانه‌های در حال تشکیل است.

=+ انتقال ماده خشک ذخیره شده قبل از گرده افشانی از اندام‌های رویشی به دانه‌های در حال تشکیل را نشان می‌دهد.

جدول ۷- ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات مورد مطالعه گیاه گندم در محیط های با تنش خشکی بعد از گرده افشانی (E1) و آبی (E2)

خصوصیات	محیط	وزن کل ماده خشک در هر مرحله گرده افشانی (میلی گرم)	وزن کل ماده خشک در هر مرحله رسیدن (میلی گرم)	وزن دانه در هر سنبله (میلی گرم)	وزن ساقه بدون سنبله در مرحله گرده افشانی (میلی گرم)	وزن ساقه بدون سنبله در مرحله رسیدن (میلی گرم)	وزن کل ماده خشک در هر مرحله رسیدن (میلی گرم)	شاخص برداشت (%)	RDM (mg)	SSI	ST I	
عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار)	E1	۰/۰۲ ns	-۰/۲۰ ns	۰/۲۷ ns	-۰/۰۸ ns	-۰/۰۵ ns	-۰/۳۰ ns	۰/۴۶ *	۰/۳۷ ns	۰/۵۰ *	-۰/۵۰ *	۰/۸۹**
	E2	-۰/۲۶ ns	-۰/۲۲ ns	۰/۲۷ ns	۰/۰۷ ns	-۰/۲۱ ns	-۰/۴۴ ns	-۰/۴۹ *	۰/۷۷**	۰/۱۹ ns	۰/۳۰ ns	۰/۴۳ ns
وزن کل ماده خشک در هر ساقه در مرحله گرده افشانی (میلی گرم)	E1		۰/۴۶**	۰/۳۸ ns	۰/۱۳ ns	۰/۹۸**	۰/۵۸**	۰/۶۳**	-۰/۲۹ ns	۰/۲۴ ns	۰/۳۱ ns	۰/۱۹ ns
	E2		۰/۶۴**	۰/۵۳*	۰/۲۸ ns	۰/۹۸**	۰/۳۴ ns	۰/۵۶**	-۰/۱۷ ns	۰/۳۶ ns	۰/۳۶ ns	۰/۲۰ ns
وزن کل ماده خشک در هر ساقه در مرحله رسیدن (میلی گرم)	E1		۰/۶۸**	۰/۵۳*	۰/۵۸**	۰/۸۸**	۰/۹۳**	-۰/۳۵ ns	۰/۰۵ ns	۰/۴۹ *	-۰/۰۱ ns	۰/۲۶ ns
	E2		۰/۷۸**	۰/۴۱ ns	۰/۶۶**	۰/۷۳**	۰/۹۱**	-۰/۳۱ ns	۰/۵۳*	-۰/۳۹ ns	-۰/۱۷ ns	۰/۱۴ ns
وزن دانه در هر سنبله (میلی گرم)	E1		۰/۶۴**	۰/۳۱ ns	۰/۳۱ ns	۰/۳۶ ns	۰/۴۲ ns	۰/۴۲ ns	۰/۲۴ ns	-۰/۰۶ ns	-۰/۰۱ ns	۰/۲۵ ns
	E2		۰/۵۸**	۰/۵۴*	۰/۲۶ ns	۰/۴۶*	۰/۳۲ ns	۰/۵۵*	۰/۰۱ ns	۰/۱۳ ns	۰/۱۳ ns	۰/۲۲ ns
تعداد دانه در سنبله	E1		۰/۰۴ ns	۰/۲۰ ns	۰/۳۵ ns	۰/۱۵ ns	-۰/۰۶**	۰/۳۱ ns	۰/۲۲ ns	۰/۰۰ ns	۰/۰۰ ns	۰/۰۰ ns
	E2		۰/۲۴ ns	-۰/۰۹ ns	-۰/۲۰ ns	-۰/۲۴ ns	-۰/۳۵ ns	۰/۰۵ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۴ ns
وزن ساقه بدون سنبله در مرحله گرده افشانی (میلی گرم)	E1		۰/۵۷**	۰/۲۸ ns	۰/۲۸ ns	۰/۲۸ ns	۰/۲۸ ns	-۰/۳۰ ns	۰/۲۸ ns	-۰/۳۱ ns	-۰/۱۸ ns	۰/۱۵ ns
	E2		۰/۳۹ ns	۰/۵۹**	۰/۳۹ ns	۰/۳۹ ns	۰/۳۹ ns	-۰/۲۰ ns	۰/۴۰ ns	۰/۳۱ ns	-۰/۲۱ ns	۰/۱۳ ns
وزن ساقه بدون سنبله در مرحله رسیدن (میلی گرم)	E1		۰/۹۷**	۰/۶۷**	۰/۹۷**	۰/۹۷**	۰/۹۷**	-۰/۶۷**	۰/۱۰ ns	-۰/۶۱**	-۰/۰۸ ns	۰/۳۹ ns
	E2		۰/۸۸**	۰/۶۸**	۰/۶۸**	۰/۶۸**	۰/۶۸**	-۰/۶۸**	۰/۴۶**	-۰/۶۵**	-۰/۴۶**	۰/۱۸ ns
وزن کل ماده خشک در هر ساقه در مرحله رسیدن (میلی گرم)	E1		۰/۶۶**	۰/۴۲ ns	۰/۶۶**	۰/۶۶**	۰/۶۶**	-۰/۶۶**	۰/۰۰ ns	۰/۰۰ ns	۰/۰۰ ns	۰/۴۶**
	E2		۰/۶۷**	۰/۳۹ ns	۰/۳۹ ns	۰/۳۹ ns	۰/۳۹ ns	-۰/۳۹ ns	۰/۳۹ ns	-۰/۳۹ ns	-۰/۳۹ ns	۰/۳۵ ns
شاخص برداشت (%)	E1		۰/۲۷ ns	۰/۵۲*	۰/۲۷ ns	۰/۲۷ ns	۰/۲۷ ns	۰/۲۷ ns	۰/۲۷ ns	۰/۲۷ ns	۰/۲۷ ns	۰/۵۳*
	E2		۰/۰۷ ns	۰/۵۹**	۰/۰۷ ns	۰/۰۷ ns	۰/۰۷ ns	۰/۰۷ ns	۰/۰۷ ns	۰/۰۷ ns	۰/۰۷ ns	۰/۵۶**
وزن هزار دانه (گرم)	E1		۰/۳۰ ns	۰/۲۲ ns	۰/۳۰ ns	۰/۳۰ ns	۰/۳۰ ns	۰/۳۰ ns	۰/۳۰ ns	۰/۳۰ ns	۰/۳۰ ns	۰/۲۸ ns
	E2		۰/۰۹ ns	۰/۰۶ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۰۹ ns	۰/۱۶ ns
انتقال ماده خشک (میلی گرم)	E1		۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns	۰/۳۷ ns
	E2		۰/۲۰ ns	۰/۱۷ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns	۰/۲۰ ns
SSI	E1											-۰/۱۷ ns

E1 = محیط با تنش خشکی بعد از گرده افشانی، E2 = محیط بدون تنش خشکی، * = معنی دار به ترتیب در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪، ns = معنی دار نیست، RDM = انتقال ماده خشک (میلی گرم)، SSI = شاخص حساسیت به تنش، STI = شاخص تحمل به تنش.

REFERENCES

- Anonymous. 2003. Detail results of public agricultural statistics of Iran. Management and programming organization of country. Center of statistic of Islamic Republic of Iran. pp. 302.
- Bauder, J. 2001. Irrigating with limited water supplies. Montana State University Communications Services. Montana Hall. Bozeman, MT 59717. USA.
- Blum, A., 2005. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential-are they compatible, dissonant, or mutually exclusive? Aust. J. of Agric. Res. 56:1159-1168.
- Blum, A., B. Sinmena, J. Mayer, G. Golan, and L. Shpiller, 1994. Stem reserve mobilization supports wheat-grain filling under heat stress. Aust. J. Plant Physiol. 21:771-781.
- Bradford K. J. and T. C. Hasio. 1982. Physiological responses to moderate water stress. In: Lange. O.L., Nobel, P.S., Osmond, C.P., Ziegler, H. (Eds.), Encyclopedia of plant physiology. New Series: Physiological Plant Ecology. II. Water relations and Carbon Assimilation, vol. 12B. Springer Berlin.
- Borrell, A., L.D. Incoll, and M.J. Dalling, 1993. The influence of the Rht1 and Rht2 alleles on the deposition and use of stem reserve in wheat. Ann. Bot. (London) 71:317-326.
- Cruz-Aguado, J.A., R. Rodes, I.P. Perez, and M. Dorado, 2000. Morphological characteristics and yield components associated with accumulation and loss of dry matter in internodes of wheat. Field Crops Res. 66:129-139.
- Ehdaie, B., G.A. Alloush, M.A. Madore, and J.G. Waines, 2006. Genotypic variation for stem reserves and mobilization in wheat: I. Postanthesis changes in internode dry matter. Crop Sci. 46:735-746.
- Ehdaie, B., and J. G. Waines. 1989. Adaptation of landrace and improved spring wheat genotypes to stress environments. J. Genet. Breed. 43:144-156.

10. Ehdaie, B., J. G. Waines, and A. E. Hall. 1988. Differential responses of landrace and improved spring bread wheat genotypes to stress environment. *Crop Sci.* 28:838-842.
11. Ehdaie, B., and J. G. Waines, 1996. Genetic variation for contribution of pre-anthesis assimilates to grain yield in spring wheat. *J. Genet. Breed.* 50:47-56.
12. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. pp.257-270 In proceeding of the international symposium on adaptation of vegetative and other food crops in temperature and water stress. Taiwan 13-19 Aug.
13. Fischer, R.A., and R. Maurere. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. (I-Grain yield responses). *Aust. J. Agric. Res.* 29:897-912
14. Flood, R.G., P.J. Martin, and W.K. Gardener, 1995. Dry matter accumulation and partitioning and its relationships to grain yield in wheat. *Aust. J. Exp. Agric.* 35:495-502.
15. Gent, M.P.N. 1994. Photosynthate reserves during grain filling in winter wheat. *Agron. J.* 86:159-167.
16. Gent, M.P.N., and R.K. Kiyomoto, 1985. Comparison of canopy and flag leaf net carbon dioxide exchange of 1920 and 1977 New York winter wheats. *Crop Sci.* 25:81-86.
17. Hunt, L.A. 1979. Stem weight changes during grain filling in wheat from diverse sources. In S. Ramanujam (ed.) *Proceed. 5th International Wheat Genetics Symposium.* Feb. 2328, 1978. Indian Society of Genetics and Plant Breeding. Indian Agricultural Research Institute. New Delhi, India.
18. Johnson, R.C., R.E. Witters, and A.J. Ciha, 1981. Daily patterns of apparent photosynthesis and evapotranspiration in a developing winter wheat crop. *Agron. J.* 73: 414-418.
19. Kiniry, J.R. 1993. Nonstructural carbohydrate utilization by wheat shaded during grain growth. *Agron. J.* 85:844-849.
20. McCullough, D.E., and L.A. Hunt. 1989. Respiration and dry matter accumulation around the time of anthesis in field stands of winter wheat (*Triticum aestivum L.*). *Ann. Bot. (London)* 63:321-329.
21. Pheloung, P.C., and K.H.M. Siddique, 1991. Contribution of stem reserve to grain yield in wheat cultivars. *Aust. J. Plant Physiol.* 18: 53-64.
22. Plaut, Z., B.J. Butow, C.S. Blumenthal. and C.W. Wrigley. 2004. Transport of dry matter into developing wheat kernels and its contribution to grain yield under post-anthesis water deficit and evaluated temperature. *Field Crops Res.* 86:185-198.
23. Rawson, H.M., J.H. Hindmarsh, R.A. Fischer, and Y.M. Stockman. 1983. Changes in leaf photosynthesis with plant ontogeny and relationships with yield per ear in wheat cultivars and 120 progeny. *Aust. J. Plant Physiol.* 10:503-514.
24. Sanjari, P.A. 2001. Relation among yield potential drought tolerance and stability of yield in bread wheat varieties under water deficit conditions. *Proceeding of the 10th Australian Agronomy Conference.* Hobart 2001.
25. Sanjari, P. A. and A. Yazdansepas, 2008, Evaluation of wheat (*T. aestivum L.*) under pre and post anthesis drought stress conditions. *Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)*, Vol. 2, (under press)
26. Sanjari, P.A., M. Valizadeh, I. Majidi, and M. Shiri. 2006. Evaluation of new bread wheat genotypes under different drought stress conditions for grain yield and some important agronomic and physiologic characters. *Agricultural Science. Scientific Journal of Faculty of Agriculture, University of Tabriz.* 16: 97-112.
27. SAS. 1988. *SAS/STAT user, guide.* Release 6.03 SAS Inst. Inc. Cary. USA
28. Shafazadeh, M.K., A. Yazdansepas, A. Amini, and M.R. Ghannadha. 2004. Study of terminal drought tolerance in promising winter and facultative wheat genotypes using stress susceptibility and tolerance indices. *Seed and Plant* 20(1):57-71.
29. Shakiba, M.R., B. Ehdaie, M.A. Madore, and J.G. Waines, 1996. Contribution of internode reserves to grain yield in a tall and semidwarf spring wheat. *J. Genet. Breed.* 50:91-100.
30. Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickey. 1997. *Principles and procedures of statistics*, 3rd ed., McGraw-Hill. New York.
31. Takami, S., T. Kobata, and C.H.M. Bavel. 1990. Quantitative method for analysis of grain yield in rice. *Agron. J.* 82:1149-1153.