



کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل

زهادن‌زاده: دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران*

لیلا گلی مختاری: استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

هایده آراء: استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه سمنان، شاهرود، ایران

وصول: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲، صص ۲۴۲-۲۳۱

چکیده

پاره‌ای تغییرات جزئی در یک سیستم محیطی می‌تواند پیامدهای شگرف و غیر قابل پیش بینی را بدنبل داشته باشد.

چنین تغییرات اندک، که می‌تواند تحولات بزرگ و غیر قبل تصوری را بوجود آورد اصطلاحاً کیاس گفته می‌شود. رصد تغییر در حوضه‌های آبی از جمله مباحث مهم و اساسی است که همواره دید تیز بین محققان را بخود معطوف داشته است. همچواری حوضه‌های آبی می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر رفتار پاره‌ای از حوضه‌ها بگذارد. یکی از تأثیرات مهم همچواری حوضه‌ها وقوع پدیده فرسایش قهقهائی و بدنبل آن رخ دادن پدیده اسارت است. چاله اردبیل نیز از این قاتنه مستثنی نبوده و تحت تاثیر حوضه مجاور خود در شرف وقوع پدیده فرسایش قهقهائی است که در ادامه به اسارت و انحراف شبکه اصلی زهکش‌های این دریاچه قدیمی خواهد انجامید و در صورت وقوع چنین فرایند محتملی تغییرات عمده‌ای در ساختار هیدرولوژی کل منطقه ایجاد و تحولات بسیار مهمی برای مراکز جمعیتی، کشاورزی و صنعتی این دشت رخ خواهد داد. این مقاله که بر گرفته از یک طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان است با انکا به روش تحلیل مقاطع توپوگرافی و زمین‌شناسی سعی دارد علاوه بر شناسایی عامل با عوامل ایجاد اسارت رودخانه‌ای و مکانیسم چنین فرایندی در چاله اردبیل، آثارناشی از وقوع این پدیده را نیز مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که: محتمل ترین مکان وقوع چنین پدیده‌ای در حوالی کوه خان بالغی است. با وقوع چنین پدیده‌ای جریان عمومی آب‌های سطحی و زیرزمینی در چاله اردبیل بطور کلی تغییر یافته و از میانه چاله به سمت خزر جاری خواهد شد. بیشترین خط‌پذیری در این رخداد متوجه فروگاه اردبیل خواهد بود و تغییرات بنیادی در شبکه فاضلاب شهری رخ خواهد داد. از عوامل کترل چنین فرایندی بازنگری در نحوه توسعه قسمت شرقی دشت اردبیل است.

واژه‌های کلیدی: کیاس، فرسایش قهقهائی، انحراف رودخانه‌ای، اسارت رودخانه‌ای، دشت اردبیل


تاریخ در کنار این پدیده‌های حیات بخش طبیعی،
ظهور و استمرار یافته‌اند. اسارت رودخانه یکی از مهم‌ترین تغییرات سیستم رودخانه‌ای است که می‌تواند موجبات تغییرات سایر قسمت‌های مهم سیستم رودخانه‌ای را فراهم آورد. به همین خاطر اسارت

مقدمه
رودخانه‌ها به عنوان مجاری طبیعی جمع‌آوری و انتقال بارش‌های جوی که در سطح کره خاکی جریان می‌یابند، همواره از گذشته‌های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده‌اند و تمدن‌های بزرگ و کوچک، در طول

می نماید را اصطلاحاً کیاس می نامند. کیاس مفهومی است که به بیان نوعی نظم در چارچوب روندی بی نظم می پردازد(Nicolis, 1984). از جمله مسائل مهمی که در تئوری کیاس به آن اشاره شده و دارای اهمیت زیاد می باشد وقوع حوادث و تغییرات بزرگ به واسطه تغییر اندک در پاره ای از متغیر های وابسته است. این اصل به تاثیر پروانه^۱ شهرت دارد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از تئوری کیاس به بررسی احتمال وقوع پدیده اسارت در قسمت شرقی دشت اردبیل و تاثیرات آتی این پدیده در جنبه های مختلف پرداخته شود. این پدیده در حوضه ای با مساحت حدود ۷۴.۳۱ کیلومتر در مجاورت مرز شرقی دشت اردبیل در شرف وقوع می باشد. با وجود اینکه مساحت این حوضه نسبت به دشت اردبیل که دارای مساحت حدود ۴۶۲۱ کیلومترمربع است تقریباً به صورت ناچیز می باشد ولی همانگونه که گفته شد تغییراتی که این حوضه کوچک می تواند بر روی دشت اردبیل داشته باشد گرچه خیلی کم بوده و در معبر چند کیلومتری رخ می دهد، ولی با تبعیت از اثر پروانه می تواند کل سیستم هیدرولوژی دشت را تحت تاثیر قرار دهد. با وقوع چنین پدیدهای جریان عمومی آب های سطحی و زیرزمینی در چاله اردبیل بطور کلی تغییر یافته و از میانه چاله به سمت خزر جاری خواهد شد. بیشترین خطرپذیری در این رخداد متوجه فرودگاه اردبیل خواهد بود و تغییرات بنیادی در شبکه فاضلاب شهری رخ خواهد داد.

۱ Butterfly Effect: این اصطلاح به این نکته اشاره دارد که حرکت بال های یک پروانه در یک نقطه (یعنی کمترین تاثیر ممکن) می‌تواند منجر به تغییرات آب و هوایی در کره زمین گردد.

رودخانه همواره یکی از مفاهیم مورد علاقه Stokes (et al., 2002: 23) رئومورفولوژیست ها برای مطالعه بوده است (). پدیده اسارت از ریودن بخشی از یک جریان بوسیله جریانی دیگر انجام می شود. بدین ترتیب گسترش یک حوضه را به زیان حوضه های مجاورش سبب می شود. این عمل اغلب در دو شاخه مجاور از دو حوضه متفاوت به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر با از میان برداشت میاناب دو شاخه مجاور از طریق فرسایش قهقهایی، اسارت تحقق می یابد (محمودی، ۱۳۸۵: ۱۳۷). در (شکل ۱) نمونه ای شماتیک از دشت و حوضه مجاور آن و چگونگی وقوع فرسایش قهقهایی در منطقه و پیامد آن که پدیده اسارت است، ترسیم شده است. از آنجایی که سیستم های هیدرولوژیک به صورت ذاتی دارای ماهیت غیر خطی هستند (Amorocho 1966; Izzard 1967; Amorocho and Brandstetter 1971؛ e.g. Schertzer ۱۹۶۳)، روش برای تبیین و پیش بینی رفتار این سیستم استفاده از تنوری کیاس با آنکه دارای فلسفه پیچیده بوده و به دنبال تبیین رفتارهای تصادفی می باشد به نظر می رسد ساده ترین و در عین حال بحث برانگیز ترین روش برای تبیین و پیش بینی رفتار این سیستم ها محسوب می گردد (Lorenz، ۲۰۰۲) و همکاران (Sivakumar ۲۰۰۲) و همکاران (۲۰۰۲). محققان علوم زمین همواره سعی کرده اند با تجربه و آزمون مدل های جبری ساده نحوه تحول و تکوین دامنه ها و یا حوضه های آبریز را تبیین و میزان تحول و تغییر یک نقطه ارتفاعی را در زمان t نسبت به زمان $t+1$ محاسبه نمایند؛ اما در بسیاری از موارد نوعی بسی نظمی در تبیین چنین روندهایی دیده می شود. این بسی نظمی ها که خود بر وجود ناتعادلی در یک سیستم و به صورت آشفتگی هایی در روند معادلات جبری رخ



شکل ۱: نمونه شماتیک از وقوع پدیده اسارت

اهداف

یکی از جنبه‌های مهم این تحقیق را می‌توان تازگی وقوع پدیده مورد مطالعه و دینامیسم بالای ژئومورفولوژیکی حوضه دانست. به طوری که وقوع بیشتر فرآیندها در چند صد سال گذشته بوده و سیر تکاملی آنها هنوز هم در حال شکل گیری است. از سوی دیگر نوع پدیده و عوامل تاثیرگذار در شکل گیری آن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد که شاید نظیر آن را کمتر بتوان در سایر مناطق یافت. از این رو اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود شامل؛ شناخت جزئیات بیشتری از ویژگی‌های سیستم‌های رودخانه‌ای که تحت تاثیر پدیده انحراف یا اسارت قرار گرفته‌اند و نیز بررسی پیامدهای یک رخداد اندک و تاثیر فراوان آن بر منطقه می‌باشد.


پیشینه تحقیق

تحقیق حاضر با هدف تعیین کیفیت وقوع پدیده و آثار آن در سیستم رودخانه‌ای در منطقه مورد نظر صورت می‌گیرد. در سایر مناطق ایران نیز تنها مختاری (۱۳۸۹) اسارت رودخانه‌ای و آثار آن بر روی رودخانه باغلار در دامنه شمالی میشو داغ را بررسی کرده است. در خارج از کشور نیز بیشترین مطالعات در مورد اثر پذیری سیستم‌های رودخانه‌ای از پدیده اسارت و انحراف مربوط به جنوب شرق اسپانیا Calvache and Viseras, 1997; p 251, Mather, 2000; Stokes et al., 2002 دیگری نیز در مورد این پدیده به صورت پراکنده در

قسمت‌های دیگر دنیا صورت گرفته است (Bishop Humphrey ;and Brown, 1992; Bishop, 1995 and Konrad, 2000; Hammond, 2000; Sinha-Dumont et al., 2000 ;Roy, 2001). تئوری کیاس در علوم مختلف مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال نظریه کیاس در فیزیک توسط هاریسون و بیسواس (۱۹۸۶: ۳۴۹-۴۰)، در اقلیم شناسی و متئورولوژی توسط نیکولیس (۱۹۸۴)، در هیدرولوژی Sivakumar(2000)، (2004) Phillips و در و ژئوفیزیک توسط (2006) نیز توسط (Phillips) و به همین ترتیب در سایر علوم توسعه افراد مختلف توسعه پیدا کرده است.

موقعیت منطقه مطالعاتی

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، حوضه چاله اردبیل می‌باشد که در استان اردبیل قرار گرفته و شهر اردبیل را در خود جای داده است. این چاله تقریباً نیمی از حوضه رودخانه قره سو را به خود اختصاص داده است (شکل ۲). چاله اردبیل در واقع قسمت آبگیر حوضه رودخانه قره سو را تشکیل می‌دهد. علاوه بر قره سو دو رود دیگر به نام‌های بالخلی چای و قوری چای در چاله جریان دارند که به رود قره سو ختم می‌شوند و جزء زیرحوضه‌های آن محسوب می‌شوند. مساحت کل منطقه آبخیز چاله ۴۶۲۱.۴۸ کیلومتر مربع و مساحت دو زیر حوضه بالخلی چای و قوری چای به ترتیب حدود ۹۸۱.۶۲ و ۹۰۹.۱۷ کیلومتر مربع می‌باشد.



شکل ۲: موقعیت ریاضی منطقه مطالعه‌ی

۴). وجود مراکز شهری و جمعیتی بزرگ استان اردبیل مانند شهرستان اردبیل، نمین و نیر و نقش واهیت اراضی مرتعی و کشاورزی دشت‌ها، پای کوهها، ارتفاعات و لزوم حفظ و استفاده از دیگر توانمندیهای طبیعی حوضه، پرداختن به برآورد منابع آبی و تحولات آتی آنها و نقش حیاتی این تغییر و تحولات را دو چندان می‌کند.

برای بررسی و پیش بینی وقوع پدیده اسارت در چاله اردبیل در ابتدا عوامل تاثیر گذار بر سرعت فرسایش در دو حوضه مجاور (چاله اردبیل و حوضه مجاور آن در دامنه شرقی تالش) بررسی و در مرحله بعد با استفاده از اندازه گیری فاصله بین سرشارخه‌های هر دو حوضه، بحرانی ترین قسمت برای وقوع پدیده اسارت مشخص گردید. نقشه شبیه با استفاده از نرم افزار ArcGIS اندازه گیری و مطالعه شد.

براساس مطالعات صورت گرفته بر روی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقة اردبیل و ترسیم نیميخ زمین شناسی از روی آن، مشخص شد که جنس هر دو


مواد و روش‌ها

تحلیل روند تکاملی سیستم‌های رودخانه‌ای، نیازمند بازسازی چگونگی تکامل شبکه زهکشی در گذشته است. به منظور ارزیابی دقیق‌تر وقوع فرسایش قهقهای، نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ و زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، نقشه ارتفاعی (DEM) و عکس‌های هوایی منطقه، مطالعه شد و سپس با بازدیدهای میدانی به تهیه و تصحیح اطلاعات مبادرت گردید.


در تحقیق حاضر، تحول آتی شبکه رودخانه‌ای حوضه آبریز چاله اردبیل از طریق فرآیند اسارت در دوران حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. چاله اردبیل دارای سه رودخانه اصلی به نام رودهای قره سو، بالخلی چای و قوری چای و چند رودخانه فرعی از جمله هیرچای، نمین چای، نرگس چای، سولا چای و نوران چای که از سرچشم‌های رودخانه قره سو محسوب می‌شوند، می‌باشد. عمله ترین منابع آب دشت اردبیل از طریق این رودها تامین می‌شود(شکل

حدود ۲ تا ۲۸ درصد می‌باشد. دامنه‌های سمت شرق دشت دارای شبیه حدود ۲ تا ۵ درصد، در قسمت میانی ۰ تا ۱ درصد و در سمت غرب دشت (سبلان) این شبیه شدت بیشتری پیدا می‌کند و تا حدود ۲۸ درصد می‌رسد(شکل ۴). همانطور که گفته شد شبیه دامنه‌های شرقی دشت بسیار کم و ملایم بوده و این شبیه در مقایسه با شبیه حوضه مجاور که حدود ۲۰ درصد است، بسیار ناچیز می‌باشد(شکل ۳).

دامنه عمداداً مگاپورفیت آندزیت می‌باشد(شکل ۳). از این رو چون جنس زمین شناسی هر دو دامنه یکسان است، پس سرعت فرسایش دو دامنه از نظر آبشناسی نیز به یک اندازه می‌تواند باشد. ولی مشاهدات میدانی صورت گرفته از منطقه، نشان می‌دهد که سرعت فرسایش در حوضه مجاور بیشتر از دامنه‌های شرقی چاله اردبیل است که علت آن را باید در عامل دیگر جستجو کرد. این عامل شبیه منطقه می‌باشد. نتایج مطالعات صورت گرفته بر روی شبیه منطقه حاکی از این است که دشت اردبیل بطور کلی دارای شبیه




شکل ۳: نیم‌خ زمین‌شناسی محل وقوع فرسایش قهقرایی




شکل ۴: نقشه شبیه دشت اردبیل

صورت وقوع اسارت در این مکان، عامل شیب تعیین کننده جهت تخلیه رود به اسارت درآمده، خواهد بود. در این صورت با وقوع فرسایش قهقرایی، رواناب‌های موجود در دشت به حوضه مجاور تخلیه خواهد شد که باعث از دست دادن میزان قابل توجهی آب ورودی به چاله اردبیل می‌شود.

لذا توجه به این نکته ضروری است که با توجه به اختلاف ارتفاع فاحش بین هر کدام از حوضه‌های مذکور نسبت به سطح اساس محلی، شدت جریان نیز در دو دامنه متفاوت بوده و همانطور که در (شکل ۵) مشخص شده است، اختلاف ارتفاع در دامنه شرقی تالش از دامنه غربی آن که در دشت اردبیل واقع شده، بیشتر می‌باشد بنابراین شدت فرسایش دامنه‌ای نیز در این قسمت با شدت بیشتری برخوردار است و در



شکل ۵: اختلاف ارتفاع هر کدام از دامنه‌ها نسبت به سطح اساس محلی‌شان



ادامه شکل ۵: اختلاف ارتفاع هر کدام از دامنه ها نسبت به سطح اساس محلیسان

نزدیک در این نقطه از دشت است. نیمرخ ۲۶ نیز در مرتبه دوم قرار گرفته و فاصله سرشاخه ها در این نیمرخ ۱۸۵ متر می باشد. نسبت مساحت دشت اردبیل (۴۶۲۱ کیلومتر مربع) به این حوضه (بخش بحرانی) (۷۴.۳۱ کیلومتر مربع)، حدود ۶۲/۱۸ برآورد شده است. در صورتی که پدیده اسارت در این منطقه صورت گیرد، میزان این نسبت نیز تغییر کرده و به ضرر دشت اردبیل تمام خواهد شد.

در ادامه فرسایش قهقهایی و موقعیت اسارت آب رودهای مذکور به جای تغذیه دشت اردبیل یا به کشور ارمنستان تخیله و یا وارد دریای خزر می شوند که در هر دو صورت برای دشت مخاطره محسوب می شود. از طرف دیگر وقوع این پدیده باعث تغییر در آستانه فرسایش و آستانه چشم انداز منطقه شده و در مرحله اول به دلیل کاهش آب و تغییر مسیر رودها و در ادامه به دلیل افزایش فرسایش رودخانه ای و از بین رفتن خاک، کشاورزی و بعد اقتصاد منطقه را


برای بررسی میزان خطر وقوع پدیده اسارت در طول مسیر مرز بین این دو حوضه، حدود ۳۵ نیمرخ بین سرشاخه رودهای موجود در دو طرف دامنه، ترسیم کرده که در پایین نمونه هایی از این نیمرخ ها را مشاهده می کنیم (شکل ۷). در ادامه، فاصله بین سرشاخه های دو حوضه را در نرم افزار ArcGis اندازه گیری کرده و به نتایجی که در (جدول ۱) آمده، رسیده ایم. نیمرخ های ۱۱ تا ۱۲ در شرق حوضه و در طول مرز ایران با کشور ارمنستان ترسیم شده اند. همانطور که مشاهده می شود شبکه کم چاله در این قسمت نیز احتمال وقوع پدیده اسارت را بالا برده است. نیمرخ های ۱۳ تا ۳۵ در مرز شرقی دشت در داخل ایران ترسیم شده اند. با توجه به فاصله های بدست آمده بین سرشاخه رودهای هر نیمرخ، بر روی نیمرخ ۲۱ کمترین فاصله یعنی حدود ۱۱۵ متر مشاهده می شود (شکل ۶). که این نشان دهنده بحرانی ترین مکان برای وقوع اسارت در آینده ای بسیار

ضروری می نماید. این در حاليست که یکی از شبکه های اصلی ارتباط زمینی منطقه (جاده اردبیل - آستارا) از حوالی همین نقطه حساس عبور می کند و از طرف دیگر همانطور که اسفندیاری درآباد(۱۳۹۰) به افزایش ساخت و ساز در این مکان اشاره نموده که باعث وقوع لنداسلاید در منطقه را افزایش داده و مشخص است که این امر نیز وقوع فرسایش قهقهای را شدت خواهد بخشید.


بامحاطه جدی مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر بر اثر فرسایش رودخانه ای شدیدی که به این قسمت از دشت تحمیل می شود زمین های اطراف نیز از عواقب این فرسایش به دور نبوده و ساخت و سازهای انسانی از جمله راه های ارتباطی و به خصوص فرودگاه اردبیل که در نزدیکی این منطقه بحرانی قرار گرفته (شکل ۸) را تهدید می کند. این امر توجه هرچه بیشتر مسئولین زیربسط را می طلبد و توجه به انجام جدی عملیات آبخیز داری در دامنه های شرقی دشت بسیار

جدول ۱: مشخصات فاصله رودها بر روی پروفیل ها


فاصله دو رود روی پروفیل به متر	شماره پروفیل	فاصله دو رود روی پروفیل به متر	شماره پروفیل
407.95	19	443.84	1
596.4	20	470.94	2
115.38	21	386.34	3
446.23	22	412.37	4
320.29	23	544.11	5
694.44	24	679.44	6
737.86	25	408.6	7
185.7	26	266.78	8
280.65	27	653.54	9
630.57	28	347.66	10
597.62	29	766.98	11
539.93	30	522.97	12
552.78	31	552.52	13
551.82	32	597.24	14
513.4	33	425.35	15
413.96	34	661.89	16
294.32	35	411.96	17
		683.48	18



شکل ۶: نقشه موقعیت آبراهه هایی که در معرض فرسایش قهقرایی و پدیده اسارت اند



شکل ۷: نمونه هایی از نیمرخ های توپوگرافی ترسیم شده بر روی دشت اردبیل و حوضه مجاور آن



شکل ۸: موقعیت فرودگاه اردبیل نسبت به منطقه اسارت رودخانه ای

مشاهده کردیم که، نیمرخ‌های ۱ تا ۱۲ که در شرق حوضه و در طول مرز ایران با کشور ارمنستان و نیمرخ‌های ۱۳ تا ۳۵ در مرز شرقی دشت در داخل ایران ترسیم شده و با توجه به فاصله‌های بدست آمده بین سرشاخه رودهای هر نیمرخ، بر روی نیمرخ ۲۲- کمترین فاصله یعنی حدود ۱۱۵ متر مشاهده می- شود(جدول ۱). که این نشان دهنده وقوع اسارت در آینده‌ای بسیار نزدیک در این قسمت از دشت می- باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد عملیات جاده سازی و فعالیت‌های توسعه فیزیکی چنین فرایندی را بشدت تشدید کرده است. برای کنترل و جلوگیری از خطرات آتی اسارت رودخانه ای نیاز مبرم به برنامه ریزی و توجه مسئولین می‌باشد.

منابع

اسفندیاری درآباد(۱۳۹۰)، بررسی وقوع لنداسلاید در شرق دشت اردبیل، هفتمین کنگره ملی جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

نتیجه گیری

بررسی کیاس فرسایشی در دشت اردبیل ما را به این نکته رهنمون داشت که وجود یک پدیده فرسایش قهقهائی در منطقه شرقی دشت هویت و موجودیت این دشت را شدیداً متأثر خواهد کرد. هرچند این اتفاق در مراحل اولیه وقوع به صورت ناچیزی بروز می‌کند ولی در صورت ادامه و عدم توجه به آن، در آینده‌ای نه چندان دور نتایج بسیار بزرگی به همراه خواهد داشت. چنانچه سرعت فرسایش قهقهائی در منطقه افزایش یابد بدون تردید وقوع یک اسارت رودخانه‌ای در دامنه شرقی حتمی خواهد بود که وقوع چنین رخدادی شبکه فعلی زهکش‌ها و سیستم آبی این دشت را بطورکلی دگرگون خواهد ساخت و صد البته بسیاری از پروژه‌های موجود در منطقه بویژه فرودگاه این استان در مخاطره جدی قرار خواهد داد. برای اثبات این فرضیه حدود ۳۵ نیمرخ بین سرشاخه رودهای موجود در دوطرف دامنه، ترسیم کرده و با اندازه گیری فاصله سرشاخه‌ها در نرم افزار ArcGIS

- Humphrey, N.F., Konrad, S.K., (2000), "River Incision or Diversion in Response to Bedrock Uplift", *Geolog.*, V. 28; No.1: 43-46.
- Mather, A.E., (2000), "Impact of Headwater River Capture on Alluvial System, Development: An Example from the Plio-Pleistocene of the Sorbas Basin, SE Spain", *Journal of Geological Society*, 157, 957-966.
- Nicolis, C. Long-term climatic variability and chotic dynamics. *Tellu*, Vol. 39A, 1987.
- Phillips, J. D. Evolutionary geomorphology: thresholds and nonlinearity in landform response to environmental change, *Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss.*, 3, 365–394, 2006.
- Sinha-Roy, S., (2001), "Neotectonically Controlled Catchments Capture: An Example from the anas and Chambal Drainage Basins, Rajasthan", *Current Science*, 80(2).
- Sivakumar, B. Chaos theory in geophysics: past, present and future, *Chaos, Solitons and Fractals*, 19(2), 441-462, (2004a).
- Sivakumar, B. Chaos theory in hydrology: important issues and interpretations, *Journal of Hydrology*, Vol.227, 1-20, 2000.
- Stokes, M., Mather, A.E., Harvey, A.M., (2002), "Quantification of River-captured-induces Base-level Changes and Landscape Development, Sorbas Basin, SE Spain", In: Jones, S.J.
- Frostick, L.E. (eds). Sediment Flux to Basins: Causes, Controls and Consequences, Geological Society, London, Special Publications, 191, 23-35 .
- Summerfield, Michael A. (1991); "Global Geomorphology : An Introduction to the Study of Landforms", Longman Scientific and Technical, England.
- تصاویر ماهواره ای گوگل ارث.
- داداش زاده، زهرا (۱۳۹۰)، تعادل بخشی آبخوان دشت اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان.
- مختراری، داوود (۱۳۸۹)، اسارت رودخانه ای و آثار آن در سیستم رودخانه ای مطالعه موردنی: رودخانه با غلار در دامنه شمالی میشو داغ(شمال غرب ایران)، *جغرافیا و برنامه ریزی* (دانشگاه تبریز)، ش ۳۲.
- نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰: نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰: نقشه زمین شناسی ۱:۱ ورقه اردبیل.
- Bishop, P., (1995), "Drainage Rearrangement by River Capture, Beheading and Diversion", *Progress in Physical Geography*, 19, 469-493.
- Calvache, M.L., Viseras, C. (1997), "Long-term Control Mechanisms of Stream Piracy Processes in Southeast Spain", Earh surface Processes and Landforms, Vol. 22: 93-105.
- Dumont, J.F., Santana, E., Valdez, F., Tihay, J.P., Usselmann, P., Iturralde, D., Navarette, E., (2006); "Fan beheading and Drainage Diversion as Evidence of a 3200-2800 BP Earthquake Event in the Esmeraldas-Tumaco Seismic Zone: A Case Study for the Effects of Great Subduction Earthquakes", *Geomorphology*, 74, 100-123.
- Hammond, K., (2000), "Stream Capture: A look at Natural Thieves", <http://www.geo.msu.edu/geo333/hammond.htm>
- Harrison, R. G. and Biswas, D. J. Chaos in light. *Nature*, Vol.321,1986.