

بررسی تاثیر فعالیت جسمانی در آب بر عزت نفس^۱

سید علی اکبر هاشمی جواهeri^{*}, ناصر محمد رحیمی^۲, احمد ابراهیمی عطّری^۳

^{۱,۳} استادیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، ^۲ کارشناس ارشد تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

تُویسنده پاسخگو: hashemi07@yahoo.com - ۰۹۱۵۵۰۶۲۱۷۱ - ۰۵۱۱-۸۸۲۹۵۸۰

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت جسمانی در آب بر عزت نفس مردان سالمند انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد، ۴۰ مرد سالمند جوان ۲۳-۶۰ ساله بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان رضوی به طور تصادفی و همگن به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ارزیابی عزت نفس آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامه مقیاس اندازه‌گیری عزت نفس رزنبرگ، قبل و بعد از مطالعه انجام گرفت. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت ۸ هفته برنامه طراحی شده تمرين در آب را انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از آزمون‌های t در سطح احتمال ۰,۰۵ استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سن شرکت‌کنندگان گروه تجربی و کنترل در این پژوهش به ترتیب $۳۲,۹ \pm ۳,۲$ و $۳۶,۷ \pm ۳,۱$ سال بود. بیشترین درصد افراد در محدوده سنی ۶۵-۷۰ سال ($۵۲,۷\%$) قرار داشتند. در این پژوهش سالمندانی که همسرانشان فوت کرده بودند، بیشترین درصد ($۶۷,۴\%$) از شرکت‌کنندگان بودند. و افراد مجرد، متاهل و مطلقه به ترتیب با $۱۵,۱$, $۶,۴$ و $۱۱,۱$ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. میانگین تعداد فرزندان آزمودنی‌ها $۲,۲۹ \pm ۰,۷۷$ بود. براساس محدودی از سالمندان دارای بیش از ۴ فرزند بودند. میانگین تعداد فرزندان آزمودنی‌ها $۰,۳۶ \pm ۰,۰۰۱$ در یافته‌های بدست آمده، تفاوت معناداری در پیش‌آزمون دو گروه در نتایج تست عزت نفس مشاهده شد (p < 0,001). صورتی که در پس‌آزمون، این تفاوت معنادار بوده و آزمودنی‌های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل امتیاز بهتری را کسب کردند (p = 0,001). همچنین نتایج بدست آمده از آزمون t همبسته، پیانگر تفاوت معنادار بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی در تست عزت نفس بود (p < 0,001). اما در گروه کنترل هیچ تفاوت معناداری بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمود. تست عزت نفس مشاهده نشد (p = 0,83).

نتیجه‌گیری: از آنجایی که عزت نفس به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای روحی-روانی افراد سالمند مطرح می‌باشد، و نتایج، نقش فعالیت جسمانی در آب را در بهبود عزت نفس مردان سالمند، تایید می‌کند. لذا انجام این‌گونه فعالیت‌ها در آب به عنوان یک محیط امن و بی‌خطر برای ارتقاء سلامت سالمندان توصیه می‌شود.

کلید واژه: مردان سالمند، فعالیت جسمانی در آب، عزت نفس.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۶/۲

^۱ کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران، IRCT201105106435N1

کوبتا و همکاران^{II} طی یک بررسی عنوان کردند که عزت‌نفس بر الگوهای پیشرفت، عملکرد، تعامل با دیگران و سلامت روانی تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل لازم است که ارزیابی مثبت فرد از خودش تقویت شود (۹) زیرا فردی که از احساس خود ارزشمندی بالایی برخوردار است به راحتی می‌تواند بدون از هم‌پاشیدگی روانی با تهدیدها و وقایع اضطراب‌آور زندگی، مقابله نماید (۱۰). کوبتا و همکاران معتقدند، از عوامل اصلی تقویت عزت‌نفس می‌توان به پرکردن اوقات فراغت، برقراری تعامل‌های اجتماعی با همسالان، ورزش و داشتن انگیزه اشاره کرد (۹). به طوری که آلفرمون دی^{III} و همکاران نیز معتقدند اگر جامعه‌ای افراد خود را به ورزش و ادارکند، در واقع به بالابدن عزت‌نفس و سلامت جسمی و روحی افراد خود کمک‌کرده است. چرا که ورزشکاران از عزت‌نفس و انگیزه بالایی برخوردارند. پس باید به افراد جامعه در تمام گروه‌های سنی با انجام ورزش جهت افزایش سلامتی و عزت‌نفس کمک کرد (۱۱).

استفاده از محیط آب به لحاظ رعایت موارد اینمی از جمله جلوگیری از زمین‌خوردن، برای آن دسته از افرادی که با محدودیت حرکتی در مفاصل مواجه هستند و همچنین افرادی مانند جانبازان و معلولین بدلیل برخی دشواری‌های ناشی از کاهش توان جسمانی و روانی، از اهمیت خاصی برخوردار است. وسعت ترس از افتادن، به نگرانی درباره اجتناب از خطرات محیطی و نگرانی ناتوان‌کننده از زمین افتادن منتهی می‌شود که باعث پرهیز شخص سالم‌دان از فعالیت‌هایی که قادر به انجام آن‌هاست، می‌گردد (۱۲). به این ترتیب متعاقب زمین‌افتدان ممکن است اثرات روانی، اجتماعی مانند از دست‌دادن استقلال و اطمینان، صدمات و مرگ و میر به وجود آید (۱۳). لذا به نظر می‌رسد که تمرین در خشکی به دلایلی از جمله ترس از افتادن و آسیب‌دیدن و شرایط محیطی حاکم بر این‌گونه فضاهای ورزشی، برای آن‌ها به سختی مقدور است. از طرفی به سبب مشکل در بعضی از اندام‌های افراد، امکان تمرین و پرداختن به فعالیت‌هایی مثل دویدن، دوچرخه‌سواری امکان‌پذیر نیست. بنابراین یافتن راهی جهت ایجاد شرایط تمرينی این، بی‌خطر و علمی بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر تأثیرات جسمی اثرات آن بر عزت‌نفس بررسی

مقدمه

سالم‌دانی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است (۱). افت عزت‌نفس یکی از عوامل تعیین‌کننده کلیدی در بروز افسردگی بوده است و از سوی دیگر در حضور عزت‌نفس نامطلوب، مشکلاتی نظیر اضطراب افزایش می‌یابد (۲) آنچه که دانش امروزی بدان توجه دارد، تنها طولانی‌کردن دوران زندگی نیست، بلکه باید توجه داشت که سال‌های نهایی عمر انسان در نهایت آرامش و سلامت جسمی و روانی سپری شود و در صورتی که چنین شرایطی تامین نشود، پیشرفت‌های علمی برای تامین زندگی طولانی‌تر، بی‌نتیجه و مخاطره‌آمیز خواهد بود (۳). عوامل متعددی در دوران سالم‌دانی عزت‌نفس را تحت تاثیر قرار می‌دهند از جمله افسردگی، اضطراب، گوشه‌گیری، طردشدن و تنهایی که از بین آن‌ها کم تحرکی نمود بیشتری دارد (۴). در این رابطه، مطالعه^I نشان می‌هد در حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، ۳۵ درصد از ترخيص‌های بیمارستانی و ۴۷ درصد از روزهای بستری در بیمارستان‌ها را سالم‌دان به خود اختصاص می‌دهند (۵) که با توجه به افزایش سریع تعداد سالم‌دان، مسئله بهداشت، سلامت (جسمی و روانی) و تأمین آسایش و رفاه این گروه، هر روزه ابعاد گستردۀ تری در جامعه پیدا می‌کند (۶). با افزایش سن، اختلال عملکرد جسمانی بیشتر می‌شود و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقلال، نیاز به کمک را افزایش می‌دهد که این خود می‌تواند در کاهش کیفیت زندگی و سلامت جسمی و روانی سالم‌دان موثر باشد (۷). در واقع بی‌تحرکی در سالم‌دان می‌تواند عوارض جسمی و روانی بسیاری را بدنبال داشته باشد. یکی از عوارض روانی بی‌تحرکی کاهش تدریجی عزت‌نفس است (۸).

از آنجایی که عزت‌نفس قطعی‌ترین عامل در روند رشد روانی فرد محسوب می‌شود و اثرات بر جسته‌ای در جریان فکری، احساسات، تمایلات، ارزش‌ها و هدف‌های وی دارد، هر اندازه که فرد در کسب عزت‌نفس دچار شکست شود، دستخوش اضطراب، تزلزل روانی، بدگمانی از خود، حقیقت گریزی و احساس عدم‌کفايت از زندگی می‌گردد (۸).

^{II}. Kubota

^{III}. Alfermann. d

سال چهارم، شماره سیزدهم (پاییز ۱۳۹۰)

^I. Barry

مجله‌ی علمی- پژوهشی طب جانباز

اضافه کرد معیار رزنبرگ یک معیار استاندارد است، که شهبازر زادگان و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیق خود از این پرسشنامه استفاده کردند (۱۵). این پرسشنامه در برگیرنده ۱۰ جمله است که احساس واقعی افراد درباره هر یک از این جملات، در یکی از چهار گزینه خیلی موافق، موافق، مخالف و خیلی مخالف با عالمت ضربدر در مقابل هر جمله با احتساب نمرات ۱ الی ۴ مشخص می‌شود. نمره کل برای آزمودنی از مجموع نمرات داده شده برای ۱۰ سؤال بدست می‌آید. بدین ترتیب که نمره ۱۰ حداقل و نمره ۴۰ نشان دهنده حداکثر عزت نفس می‌باشد.

در تحقیق حاضر نیز پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها از طریق آزمون-آزمون مجدد تعیین شد. به این ترتیب که نتایج پرسشنامه‌ها توسط ۴۰ نفر از سالمدان در دو مرحله تکمیل و ضریب همبستگی بین دو نوبت $r = 0.84$ بدست آمد.

میزان عزت نفس آزمودنی‌های تحقیق با استفاده از معیار اندازه‌گیری عزت نفس رزنبرگ قبل از انجام برنامه تمرین در آب اندازه‌گیری گردید. برنامه ورزشی مورد استفاده توسط محقق که بر اساس منابع علمی-پژوهشی (۱۶) انتخاب شد، سه روز در هفته به مدت ۳۵ دقیقه و برای مدت ۸ هفته اجرا گردید که در تمامی مراحل تمرینات، پژوهشگر حضور داشته و خود مستقیماً با آزمودنی‌ها تمرینات فوق را اجرا نمود. لازم به ذکر است، آزمودنی‌های گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند و از آن‌ها خواسته شد میزان فعالیت روزانه خود که در طول چهار هفته قبل از شروع دوره ثبت شده بود را حفظ کرده، در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشته باشند و به حفظ روند عادی زندگی خود در طول دوره، تشویق شدند و پس از خاتمه دوره از همه آزمودنی‌های دو گروه تفاوت بین گروهی و تی زوجی جهت تعیین تفاوت درون گروهی ($P \leq 0.05$) و نرمافزار spss ۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گردد. لذا در خصوص تاثیر برنامه تمرین در آب بر عزت نفس، با توجه به این که مهمترین مسئله در ارتقاء سلامت، حفظ استقلال افراد در فعالیت‌های روزمره و ادامه زندگی بصورت فعال مربوط می‌شود، نتایج این تحقیق می‌تواند به بسیاری از این افراد، دستاندرکاران و مسئولین در بهبود عزت نفس کمک کند و اطلاعات مفیدی را در این زمینه در اختیار قراردهد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا می‌توان با شرکت در برنامه ۸ هفتاهای فعالیت جسمانی در آب، عزت نفس م Salman را افزایش داد؟

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و در قالب طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون (pre & post test)، بر روی ۶۰ مرد ۶۰ سال به بالا در شهر مشهد انجام شد. سپس با استفاده از فرم، انتخاب نمونه بصورت نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب و بصورت همگن به دو گروه مساوی تجربی (۱۸) و کنترل (۱۸) تقسیم شدند.

معیار ورود افراد به تحقیق شامل: داشتن سن حداقل ۲۰ سال، اظهار تمایل جهت شرکت در تحقیق، تاییدیه شرکت در فعالیت ورزشی در آب توسط پزشک، و همچنین عدم استفاده از داروهای اعصاب بود و معیارهای خارج شدن از تحقیق، غیبت در سه جلسه تمرین پشت سر هم، یا غیبت در یک چهارم جلسات تمرینی و اتفاق حادثه مهم و ناگوار برای شرکت‌کنندگان بود (۱۴)، علاوه براین، کلیه آزمودنی‌ها با مراجعه به پزشک متخصص از جنبه سلامت روانی نیز همگن شدند و پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه آگاهانه، با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، تمام سالمدانی که واجد شرایط بودند، وارد پژوهش شدند و در انتهای توضیحاتی مبنی بر فواید جسمانی و روانی-اجتماعی ورزش، برای سالمدان ارائه گردید.

ابزار مورد استفاده جم‌آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، و معیار اندازه‌گیری عزت نفس بود که هر دو پرسشنامه در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت و به صورت خوداظهاری موارد خواسته شده را تکمیل نمودند. پرسشنامه اول برای جم‌آوری مشخصات فردی سالمدان شامل سن، قد و وزن مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه دوم بمنظور سنجش عزت نفس آزمودنی‌ها، از آزمون عزت نفس رزنبرگ استفاده شد. باید

۱۱,۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. ۲۷,۸ درصد سالمندان شرکت‌کننده فاقد فرزند بودند. به طوری که تعداد محدودی از سالمندان دارای بیش از ۴ فرزند بودند. میانگین تعداد فرزندان آزمودنی‌ها $4,77 \pm 2,29$ بود. حداقل تعداد فرزندان افراد شرکت‌کننده ۹ و حداقل آن صفر بود. افراد شرکت‌کننده در پژوهش هیچگونه سابقه ورزش منظم نداشته و هم‌اکنون نیز ورزش نمی‌کردند. همبستگی معنی‌داری بین تعداد فرزندان و وضعیت تأهل وجود داشت. قبل از شرکت در برنامه ۸ هفتاهای فعالیت جسمانی در آب، بین سن و میزان عزت‌نفس رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود داشت در حالی که چنین رابطه‌ای بعد از برنامه ۸ هفتاهای مشاهده نشد.

یافته‌ها

براساس یافته‌های بدست آمده در این پژوهش از ۴۰ نفر افراد داوطلب برای مشارکت در تحقیق ۴ نفر به دلیل غیبت بیش از ۳ جلسه متوالی، از مطالعه خارج شدند. میانگین سن شرکت‌کنندگان گروه تجربی و کنترل در این پژوهش به ترتیب $67,16 \pm 3,11$ و $66,77 \pm 3,29$ سال بود. در این آزمودنی‌ها پایین‌ترین سن ۶۰ و بالاترین سن ۷۳ سال بود که یشترين درصد افراد در محدوده سنی ۶۵-۷۰ سال ($52,7\%$) قرار داشتند. در این پژوهش سالمندانی که همسرانشان فوت کرده بودند، بیشترین درصد ($67,4\%$) از شرکت‌کنندگان بودند. و افراد مجرد، متاهل و مطلقه به ترتیب $15,1$ ، $6,4$ و

جدول ۱: آمار توصیفی ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های دو گروه و نتایج مقایسه آن‌ها

p	درجه	مقدار T مستقل	SD	M	گروه	متغیر
0,718	۳۴	$-0,364$	۳,۲۹	۶۶,۷۷	تجربی	سن (۶۰-۷۵)
			۳,۱۱	۶۷,۱۶	کنترل	
0,520	۳۴	$-0,650$	۳,۶۷	۶۹,۱۱	تجربی	وزن
			۳,۷۳	۷۰,۸۸	کنترل	
0,160	۳۴	$-1,438$	۴,۹۵	۱۷۳,۹۴	تجربی	قد
			۴,۲۴	۱۷۴,۹۴	کنترل	

جدول ۲: مقایسه تغییرات درون گروهی نمرات عزت‌نفس آزمودنی‌ها

p	مقدار T همبسته	درجه	پس‌آزمون (M±SD)	پیش‌آزمون (M±SD)	گروه	متغیر
0,083	1,844	۱۷	۲۲,۳۸±۵,۰۴	۲۲,۸۸±۴,۷۵	کنترل	نمره عزت نفس
0,001	-6,633	۱۷	۲۷,۶۶±۴,۰۰	۲۱,۵±۴,۲۱	تجربی	

(p = 0,001). اما در گروه کنترل هیچ تفاوت معناداری بین پیش‌آزمون (۲۲,۸۸±۴,۷۵) و پس‌آزمون (۲۲,۳۸±۵,۰۴) نمرات تست عزت‌نفس مشاهده نشد (p = 0,083). علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون تی مستقل در جدول ۳، تفاوت معناداری در پیش‌آزمون دو گروه تجربی و کنترل در نمرات عزت‌نفس مشاهده نشد (p = 0,360) در صورتی که در پس‌آزمون، این تفاوت معنادار بوده و آزمودنی‌های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نمره بهتری را کسب کردند (p = 0,001).

در این پژوهش، ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های دو گروه تجربی و کنترل در جدول ۱ ارائه شده است که نتایج مربوط به مقایسه بین دو گروه از نظر ویژگی‌های جسمانی، قد، وزن و سن دو گروه، حاکی از عدم تفاوت معنادار و در نتیجه همگن بودن دو گروه تجربی و کنترل است (سن: p = 0,718، وزن: p = 0,520 و قد: p = 0,160). نتایج آزمون تی همبسته در جدول ۲ نشان می‌دهد که بین پیش‌آزمون (۲۱,۵±۴,۲۱) و پس‌آزمون (۲۷,۶۶±۴,۰۰) گروه تجربی در تست عزت‌نفس پس از ۲۴ جلسه تمرین در آب تفاوت معناداری وجود دارد

جدول ۳: مقایسه تغییرات بین گروهی نمره عزت نفس آزمودنی‌ها

P	درجه	مقدار T مستقل	گروه تجربی (M±SD)	گروه کنترل (M±SD)	تست	متغیر
۰,۳۶۰	۳۴	-۰,۹۲۷	۲۱,۵۰±۴,۲۱	۲۲,۸۸±۴,۷۵	پیش آزمون	نمره عزت نفس
۰,۰۰۱	۳۴	۳,۴۹۷	۲۷,۶۶±۴,۰۰	۲۲,۳۸±۵,۰۴	پس آزمون	

جسمی باعث افزایش عزت نفس می‌شود. بهبود عناصر تشکیل‌دهنده آمادگی عملکردی (قدرت عضلانی، استقامت، توان، تعادل، انعطاف‌پذیری و دامنه حرکتی) به طور جداگانه و یا به صورت ترکیبی سالمندان را قادر می‌سازد تا گسترهای از حرکات عملکردی از قبیل: بالارفتن از پله، بلندشدن از روی صندلی، قدمزن و استفاده از صندلی چرخدار را اجرا نمایند (۲۳). لذا از این طریق آن‌ها می‌توانند زندگی فعال‌تری داشته باشند و سطح کیفی زندگی خود را ارتقاء بخشنند. برنامه‌های آمادگی جسمانی موثر و جامع، به سالمندان کمک می‌کند تا بتوانند از افت کارآیی عملکردی خود جلوگیری کنند و یا آن را به تعویق انداخته، حتی به آن جهت معکوس دهنده (۲۴). از آنجایی که بین عزت نفس و کیفیت زندگی ارتباط وجوددارد و عزت نفس یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی است، بسیاری از محققان به مطالعه تاثیر ورزش در ارتقاء کیفیت زندگی پرداختند. از جمله بذر افسان و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی بر روی سالمندان به این نتیجه رسیدند که بکارگیری برنامه ورزشی افزایش معناداری در نمره کیفیت زندگی آن‌ها دارد (۲۳). در مطالعه دیگری نیز نشان داده شد که فعالیت جسمانی با خود کارآیی، عزت نفس و کیفیت زندگی مرتبط بوده و در ارتقاء آن موثر می‌باشد (۲۶). علاوه‌بر این، سیمونز و هانسن^{VII} (۱۹۹۶) معتقدند که بهبود کنترل وضعیت بدن در فعالیت‌هایی که داخل آب انجام می‌شود، به این علت است که شرایط محیطی آب به افراد سالمند اجازه می‌دهد تا بدون افزایش خطرافتادن یا آسیب، دامنه وسیعی از حرکات را انجام دهند (۲۷). علاوه بر این محیط امن و محافظت آب به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا یک وضعیت مستقیم و صاف را به طور مستقل حفظ کنند (۲۸). در نهایت، بهبود تعادل در اثر تمرينات عملکردی می‌تواند در اثر بهبود عوامل روانی آزمودنی‌ها به دست آید. از نظر تئوریکی، عوامل روانی مانند ترس، افسردگی، اضطراب، اعتماد به

بحث

نتایج نشان داد برنامه فعالیت جسمانی در آب باعث افزایش عزت نفس سالمندان شده‌است که این یافته با نتایج حاصل از مطالعه توماس^I (۱۹۹۹)، آفرمن (۲۰۰۰)، بوید^{II} (۱۹۹۷)، مکاولی و کورنیا^{III} (۱۹۹۲). مطابقت دارد (۱۷-۱۹۱۱). در مطالعه‌ای که توسط توماس در انگلستان صورت گرفت گروهی که به مدت ۸ هفته در تمرينات هوایی شرکت کردند، میانگین نمرات عزت نفس قبل از مطالعه $۸۵,۲\pm۴,۳$ نسبت به بعد از آن به $۱۰۳,۶\pm۳,۲$ افزایش یافته‌بود (۱۷). در مطالعه‌ای که توسط سگار^{IV} (۱۹۹۸) بر روی افراد مبتلا به سرطان سرطان پستان صورت گرفت ارتباط معنی‌داری بین ورزش و عزت نفس مشاهده نشده‌است این تفاوت می‌تواند به خاطر تفاوت در ارزش‌ها و باورها، تفاوت سنی و سطح سلامت واحدهای مورد مطالعه باشد (۲۰). همچنان نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین نمرات عزت نفس افراد مورد مطالعه در گروه کنترل قبل و بعد از دوره تفاوت معناداری ندارد که با یافته‌های آفرمن و توماس همخوانی دارد (۱۱-۱۷). روپینز^V و همکاران (۲۰۰۲) گزارش کردند که میزان عزت نفس در دوران کودکی زیاد و در دوره نوجوانی افت می‌کند، در دوران میانسالی به تدریج افزایش می‌یابد و در دوران پیری به شدت کاهش می‌یابد (۲۱). مکاولی و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند که بین میزان فعالیت جسمانی و صحبت انجام برنامه ورزشی در سالمندان و خودکارآیی و عزت نفس همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد (۲۲). همچنان تیگمن و ویلیامسون^{VI} (۲۰۰۰) نشان دادند با وجود این که بین میزان ورزش، رضایت بدنی و عزت نفس در افراد جوان ارتباطی وجود ندارد ولی در سالمندان انجام فعالیت‌های ورزشی با انگیزه ارتقاء سلامت و توان

^I Thomas^{II} Boyd^{III} McAuley & Courneya^{IV} Segar^V Robins^{VI} Tiggemann & Williamson^{VII} - Simmons V, Hanson

سالمندی می‌باشند و به دلایل مختلف از پرداختن به فعالیت‌های جسمانی در خشکی محروم می‌باشند، می‌تواند به عنوان عاملی جهت ارتقاء سطح سلامت، مورد استفاده قرارگیرد. از این‌رو به کلیه مسئولین و دست‌اندرکاران پیشنهاد می‌شود با برنامه‌ریزی جهت توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده بویژه استخرهای آب گرم، و اجرای بیشتر چنین برنامه‌هایی، از عوارض ناشی از کم‌تحرکی و آثارات سوء آن بر خصوصیات روانی پیشگیری کرده و میزان آن را کاهش‌دهند.

محدودیت‌ها

از محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان به محدودیت در حجم نمونه، مسائل و مشکلات مختلف خانوادگی آزمودنی‌ها، نوع فعالیت‌های روزمره که قابل کنترل نبوده و ممکن است بر نتایج تحقیق تأثیر داشته باشد، نام برد.

تقدیر و تشکر

تشکر و قدردانی ویژه خود را از تمامی سالمندان محترمی که زحمت انتقال از فاصله زیاد تا استخر انجام پژوهش را تقبل نموده و با صبر و حوصله در این پژوهش شرکت‌نمودند، اعلام می‌نماییم. بدینوسیله از کلیه دوستان و همکارانی که در امر جمع‌آوری و آنالیز داده‌های این مطالعه نویسنده‌گان را یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.

نفس و عزت‌نفس پایین و گوش‌گیری و انزوا می‌تواند از طریق تعامل با عوامل جسمانی پایین و عوامل محیطی باعث افزایش خطرافتادن در بین جمعیت سالمندان گردد (۳۰ و ۲۹)، به عبارت دیگر افتادن با تبعات روانی همراه است که می‌تواند اجرای عملکردی فرد را تحت تاثیر قراردهد. همچنین ثابت شده است که مشکلات روانی افراد از طریق تمرین بهبود می‌یابد (۳۱ و ۲۹). در نتیجه تمرین در آب از طریق افزایش قدرت عضلانی، بهبود تعادل و در پی آن توان راه‌رفتن و همچنین پیشگیری از خطرافتادن، باعث بهبود کیفیت زندگی و درپی آن تقویت شرایط روانی، از جمله عزت‌نفس می‌شود. که در واقع می‌توان فریادی بر ضد خاموش نشستن به شمار آورده، بالشد تا شاید به همه کسانی که به گونه‌ای با این گونه افراد سروکار دارند و یا در زندگی آنان نقشی ایفا کرده، کمک کند و راه را برای فراهم‌ساختن عوامل موثر در بهبود زندگی، هموار سازد. تا سالمندان به عنوان کسانی که هستی خود را از کف داده و ادامه حیاتشان را عبث و بیهوده می‌پنداشند، انگاشته نشوند.

نتیجه‌گیری

بنابراین با توجه به یافته‌های این تحقیق مبنی بر تأثیر معنادار برنامه منظم تمرین در آب بر عزت‌نفس و سطح کیفیت زندگی آن‌ها، اجرای این‌گونه برنامه‌ها در مراکز مراقبتی سالمندان و همچنین افراد جانباز که در آستانه

منابع

1. Vahdaninia, MS, Goshtasbi A, Montazeri A, Mafsoon F. Health-Related Quality of life in elderly people: Population Survey. Payesh; 4(2): 113-120, 2005.
2. Rosenberg, M. *Conceiving the Self*. Basic Books, New York. 1979.
3. Von Wichert, P. The importance of atmospheric heat waves for health service in already altered people, *Med Klin (Munich)*. Feb, 15; 103(2):75-9, 2008.
4. Garret G. *Health Needs of the Elderly*. 2nd Ed. New York: MC Millan, 1987.
5. Barry, p.p. An overview of special considerations in the evaluation and management of the geriatric patient. *Am j gastroenterol*; 93(1): 8-10, 2002.
6. Kozaki, K, Murata H, Kikuchi R, Sugiyama Y, Hasegawa H, Igata A, Toba K. Activity scale for the elderly" as a measurement for the QOL of local elderly individuals and the assessment of the influence of age and exercise, *Nippon Ronen Igakkai Zasshi*.Mar; 45(2): 188-95, 2008.
7. Van Iersel, MB, Munneke M, Esselink RA, Benraad CE, Olde Rikkert MG. Gait velocity and the Timed-Up-and-Go test were sensitive to changes in mobility in frail elderly patients. *J Clin Epidemiol*. Feb; 61(2):186- 91, 2008.
8. McAuley, E, Mihalko SL, Bane SM. Exercise and self-esteem in middle-aged adults: multidimensional relationships and physical fitness and self-efficacy influences. *J Behav Med*; 20(9): 67-83, 1997.
9. Kubota, Y, Sasaki S. Aerobic exercise and self-esteem in children. *J Behav Med*; 24(12): 127 -35, 2002.
10. Robert, W. Stretching/toning, aerobic exercise increase older adult's self-esteem. *J Behav Med*; 28(4): 385-94, 2005.
11. Alfermann, D, Stoll O. Effects of physical exercise on self concept and well-being. *Int J Sport Psychol*; 30: 47- 65, 2000.
12. Evitt CP, Quigley PA. Fear of falling in older Adults: A guide to its prevalence, Risk factors, and consequences. *J rehab nurs*. 2004; 29(6): 207-10.
13. Theodos PH. Fall prevention in frail Elderly nursing Home residents, A challenge case management; part 1. *J Lippincott's case managers*. 2003: 246-251.
14. McAuley E, Elavsky S, Motl RW, Konopack JF, Hu L, Marquez DX. Physical activity, selfefficacy, and self-esteem: longitudinal relationships in older adults. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. 2005 Sep; 60(5):P268-75.
15. Shahbaz zadegan B, farmanbar R, Ghanbari A, Atrkar rushan Z, Adib M. The effect of a period regular exercise activity on self-esteem of elderly in nursing home in Rasht. *Research & scientificjournal Ardabil university of medical sciences*: 8(4): 387-393, 2008.
16. Resende, SM, Rassi CM, Viana FP. Effects of hydrotherapy in balance and prevention of falls among elderly women. ISSN 1413-3555. *Rev Bras Fisioter, São Carlos*, v. 12, n. 1, p. 57-63, jan/fev, 2007.
17. Thomas, MB. Long term effects of aerobic exercises on psychological outcomes. *Preventive Medicine*; 28: 75-85, 1999.
18. Boyd, KR, Hrycaiko DW. The effect of physical activity intervention package on the self-esteem of pre-adolescent and adolescent females. *Adolescence*; 32(127): 693-708, 1997.
19. McAuley, E, Courneya KS. Self-efficacy relationships with affective and exertion responses to exercise. *J Appl Soc Psychol*: 22(4); 312-26, 1992.
20. Segar, M, Katch VL, Rath RS, et al. The effects of aerobic on self-esteem and depressive and anxiety symptoms among breast cancer survivors. *Oncol Nurs Forum*; 25(1): 107-13, 1998.
21. Robins, RW, Trzesniewski KH, Tracy JL, Gosling SD, Potter J. Global self-esteem across the life span. *Psychol Aging*. Sep; 17(3):423-34, 2002.
22. McAuley, E, Elavsky S, Motl RW, Konopack JF, Hu L, Marquez DX. Physical activity, selfefficacy, and self-esteem: longitudinal relationships in older adults. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. Sep; 60(5):P268-75, 2005.
23. Tiggemann, M, Williamson S. The effect of exercise on body satisfaction and sel-esteem as a function of gender and age. *Sex Role*: 43(1/2): 119-127, 2000.
24. Patricia A, Brill. Functional fitness for older adults. Translate by Attarzadeh hosseini S.R., Davoudi sharifabad E., Publishin (beh nashr. 2008), 25, 2004.
25. Elavsky S, McAuley E, Motl RW, Konopack JF, Marquez DX, Hu L, Jerome GJ, Diener E. Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. *Ann Behav Med*. 2005 Oct; 30(2):138-45.
26. Marquis, P. Health-related quality of life (HRQL). *Value Health*. Jul-Aug; 4(4):344-5, 2001.
27. Simmones, V, Hanson PD. Effectiveness of water exercise on postural mobility in the well elderly: an experimental study on balance enhancement. *J Ger*, 51: 222-223, 1996.
28. Era, P, Heikkinen E. Postural sway during standing and unexpected disturbance of balance in random samples of men of different ages. *J Gerontol*, 40:287-295, 1985.
29. Kevin, M.M., Patricia, S.O., Daniel, E.R. Psychological effects of an exercise program in

older persons who fall. *J Rehabil Res & Development*, 40(1) 49-58, 2003.

30. Whooley, M.A., Kip, K.E., Cauley, J.A., Ensrud, K.E., Nevitt, M.C., Browner, W.S.

Depression, falls, and risk of fracture in older women. *Arch Intern Med*; 159: 484-490, 2003.

31. Paluska, S.A., Schwenk, T.L. physical activity and mental health: current concepts. *Sports Med*, 29: 167-180, 2000.

Archive of SID