

اثر بخشی توانمندسازی مراقبین بر خودبادی خانواده مصدومین شیمیایی

خالد بیت سعید^۱، اکرم پرنده^{۲*}، فاطمه الحانی^۳، محمد مهدی سالاری^۴

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

^۲دانشجوی دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

^۳دانشیار، عضو هیئت علمی گروه آموزش پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، ^۴مربي پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج)، گروه بهداشت جامعه

نویسنده پاسخگو: Akram.parandeh@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر بیماری‌های مزمن بر خانواده، به منظور ارائه مراقبت مناسب و درک صحیح از بیماری، توانمندسازی مراقبین بیمار امری ضروری است. این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی تأثیرمداخله مبتنی بر توانمندسازی بر خودبادی مراقبین خانوادگی مصدومین شیمیایی انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی تک گروهی قبل و بعد است. نمونه‌ها شامل ۴۰ نفر از اعضای خانواده مصدومین شیمیایی ساکن شهر تهران و حومه اطراف که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار پرسشنامه (اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودبادی آیزینگ و پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان دانش و نگرش) بوده که روایی و پایابی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است. برنامه مداخله مبتنی بر توانمندسازی طی ۵ جلسه برای افراد مطالعه انجام شد. به منظور تعیین اثربخشی مداخله میزان دانش، نگرش و خودبادی مراقبین مصدومین شیمیایی قبل و یک ماه بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش(۲۰) و با استفاده از آزمون آماری استباطی تی زوجی در سطح معنی داری (۰.۰۵) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات دانش، نگرش و خودبادی مراقبین نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بطوریکه آزمون آماری تفاوت معنی داری را نشان داد($p < 0.001$).

بحث: نظر به اثربخشی اجرای مداخله مبتنی بر توانمندسازی مراقبین خانوادگی، پیشنهاد می‌شود که به منظور کاهش عوارض ناشی از سلاح‌های شیمیایی و ارائه مراقبت مطلوب، توانمندسازی مراقبین این عزیزان مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: توانمندسازی، مراقبین خانوادگی، خودبادی، دانش، نگرش، مصدومین شیمیایی

تاریخ دریافت: ۹۲/۵/۱۵

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۱/۱۴

خانواده‌های دارای بیمار مزمن، به علت اضطراب و ترس از آینده وضعیت بالینی بیمار خود، نگران بوده و ارائه اطلاعات به درک آنان از بیماری و تغییرات آینده کمک خواهد نمود (۱۳). دانش و نگرش از عناصر و عوامل مهم ارتقای خودبازی هستند و تغییر در این دو عامل باعث تغییر در خودبازی فرد می‌شود (۱۲). آموزش می‌تواند باعث یادگیری در فرآگیر شود چراکه یادگیری فرایندی است در جهت دستیابی به دانش و مهارت، توسعه توانایی افراد در تصمیم گیری‌های بهداشتی و در نتیجه موجب تغییر رفتار در افراد می‌گردد (۱۴). مراقبین غیر رسمی باید اطلاعات کافی در خصوص بیماری عضو بیمار خود داشته باشند زیرا بیمار برای انجام امور روزمره خود به آنان متکی است (۱۵) این افراد به همراه خانواده، خود را مسئول مراقبت از بیمار می‌دانند ولی به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی در ارائه مراقبت با مشکل مواجه می‌گردند (۱۶). لذا با توجه به نقش مهم مراقبین در امر پیش‌بینی، مراقبت و فرایند تصمیم گیری، توانمند سازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است (۱۷).

پرستاران با توجه به جایگاه ویژه خود در تیم درمان و تماس بیشتر با خانواده‌ها می‌توانند دانش، مهارت و حمایت لازم را برای حفظ کیفیت مراقبت در خانه فراهم کنند و خانواده‌هایی را که داری بیمار هستند حمایت و مراقبت کرده و به افزایش آگاهی و بهبود نگرش آن‌ها در زمینه‌های مختلف مراقبت و درمان کمک نمایند (۱۸-۲۰). شیوه‌های کمک به افراد خانواده به منظور کسب یک نقش فعال در مراقبت بهداشتی‌شان، بایستی هرچه بیشتر بر توانمندسازی تأکید نماید. فقدان دانش و آگاهی موجب کاهش انگیزه، خودکارآمدی و خودبازی می‌شود و درنهایت با کاهش خودبازی، احساس ضعف و ناتوانی در فرد ایجاد شده و فرد برای خود ارزش کمتری قائل شده و به نحو نامطلوبی از خود مراقبت نموده و دیگران را نیز به این مراقبت نامطلوب تشویق خواهد نمود. بر عکس، با افزایش احساس توانمندی، میزان خودبازی و ارزشمندی در فرد احیاء می‌شود و تغییرات مثبتی چون افزایش پیشرفت کاری، افزایش تلاش برای کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، با اهمیت بودن، توجه بیشتر به سلامتی، لذت بردن از روابط با دیگران و پیش‌بینی مثبت نسبت به موفقیت‌های بعدی در او

مقدمه

پیامدهای ناشی از گاز خردل مشکلات فراوانی در دستگاه تنفسی، چشم، پوست، اینمی، دستگاه گوارش و غدد درون ریز و نیز بر سلامت و کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی داشته به طوری که اثرات مختلف و عوارض متعدد ناشی از آن چشمگیر بوده است (۱). عوارض ناشی از گاز خردل سبب ایجاد محدودیت‌هایی در فعالیت‌های معمول زندگی، انجام وظایف شغلی، مشکلات روحی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای فرد و خانواده، تغییرات مدام عمر در وظایف، شیوه زندگی، بستری شدن‌های مکرر، مشکلات اقتصادی، کاهش تعاملات اجتماعی بین افراد خانواده و فشارهای روانی زیادی برای مددجو و خانواده می‌شود (۲-۴). فراهم کنندگان مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، با توجه به ویژگی‌های فردی خود و بیمارانشان به صورت گوناگونی تحت تأثیر عوارض بیماری قرار می‌گیرند (۴-۸).

اکثر فراهم کنندگان مراقبت (مراقبین غیر رسمی) از بیماران مزمن به عنوان عضوی از خانواده حس آزادی فردی را به دلیل مسؤولیت‌پذیری در مقابل مراقبت از بیمار خود از دست داده (۹) و میزان‌های متفاوتی از ترک شغل، درگیری روزانه، تأخیر در سرکار آمدن و بازنیستگی زودرس را به منظور ارائه مراقبت گزارش نموده‌اند (۱۰). در طی دهه اخیر، نقش خانواده در امر مراقبت از بیماران مزمن بیشترمورد توجه قرار گرفته است (۱۱). با توجه به تأثیر بیماری‌های مزمن بر خانواده، در جریان مراقبت از یک بیمار، خانواده وی نیازمند درک صحیحی از بیماری است و وظیفه پرستار در کنار مراقبت از بیمار، کمک به خانواده در جهت افزایش امید و اعتماد است؛ چنین رویکردی باعث ارتقای سلامت و رفاه خانواده خواهد شد (۶). ارتقاء توانمندی‌های اعضاء خانواده در حیطه‌های مختلف، سبب توانایی غلبه بر موانع موجود در زمینه‌های بهداشتی و سلامتی می‌گردد. در همین راستا پرستاران می‌توانند خانواده‌ها را در حل مشکل راهنمایی نموده، خدمات مراقبتی کاربردی را تدارک و یک احساس پذیرش و مهربانی را با گوش دادن دقیق به نگرانی‌ها و پیشنهادات اعضاء خانواده القاء نمایند (۱۲).

XXXVIII Informal Care giver

رونده مراقبت، منجر به اعتمادسازی می‌شود (۲۷). لذا از آنجایی که هدف از توانمندسازی، ایجاد مشارکت بین پرستار و خانواده از طریق مسئولیت‌پذیری و همکاری و ارتقای توانایی‌های اعضای خانواده در حیطه‌های معینی می‌باشد تا بر موانع موجود در زمینه‌های بهداشتی و سلامتی چیره شوند (۲۸) و از سوی دیگرنتایج مطالعات انجام شده بیانگر دانش، نگرش و خودباوری پایین مراقبین بیماران مزمن می‌باشد. لذا با توجه به ماهیت مزمن بیماری در مصدومین شیمیایی و تأثیرات فراوان آن بر خانواده، توانمند کردن یک عضو از خانواده بر توانمندی کل خانواده و نحوه مراقبت آنان تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر با توجه به این که مطالعات انجام شده در گذشته به موضوع توانمندسازی مراقبین این عزیزان کمتر پرداخته، پژوهش حاضر در راستای بررسی اثر بخشی تاثیر مداخله مبتنی بر توانمندسازی بر خودباوری مراقبین خانوادگی مصدومین شیمیایی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر نوعی مطالعه شبه تجربی تک گروهی قبل و بعد، برروی مراقبین خانوادگی (یک نفر به نمایندگی از خانواده و معرفی شده توسط بیمار) مصدومین شیمیایی مراجعه کننده به درمانگاه‌های تخصصی ریه منتخب شهر تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. معیار ورود نمونه‌ها به مطالعه عبارت بودند از: یکی از اعضای خانواده- مصدوم شیمیایی که با وی زندگی می‌نماید، قدرت تصمیم گیری در مورد درمان، داروی و مراقبت از وی را داشته باشد. معیار خروج در این پژوهش، عدم تمایل عضو خانواده به ادامه همکاری می‌باشد. در ضمن مصدومین شیمیایی با ویژگی‌های مانند داشتن درصد جانبازی مورود تأیید بنیاد جانبازان، دارای سواد خواندن و نوشتن، عدم سابقه مصرف هر گونه مواد مخدر به عنوان معیارهای ورود به مطالعه اختیار شدند. جهت تعیین حجم نمونه با استناد به مطالعات گذشته (۲۹) و با استفاده از نرم‌گرام آلتمن و احتساب میزان ریزش ده درصد نمونه ۴۰ نفر برآورد گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سنجش دانش، نگرش و خودباوری استفاده شد. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک حاوی سؤالات در خصوص (سن، جنس، تحصیلات

پدیدار می‌شود. بنابراین افزایش خودباوری و خودکارآمدی بیمار موجب اتخاذ رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه خواهد شد. لذا با این رویکرد پرستار، مددجو، خانواده، جامعه و کسانی که در ارتباط با مددجو نقش فعالی را به عهده دارند توانمند می‌شوند که این فرآیند توانمندسازی می‌تواند انگیزه‌ای برای گسترش سلامت جوامع باشد (۲۱). در واقع هدف اصلی توانمندسازی، افزایش دانش و مهارت و توانایی خانواده و مددجو بوده تا اینکه بتوانند عملکرد مؤثری در زندگی خود داشته باشند (۲۱). از سوی دیگربررسی‌ها نشان می‌دهد که کمبود آگاهی حق انتخاب در مسائل درمانی و مراقبتی را از بیمار می‌گیرد (۲۲) و فقدان دانش و بینش نسبت به بیماری و عدم حمایت‌های لازم از سوی خانواده بیماری را برای بیمار مزمن دوچندان می‌کند (۲۳). نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون ارتقاء بهداشت حاکی از آن است که در فرآیندهای پیشگیری و درمان بیماری‌ها نقش خانواده‌های محوری اساسی است (۲۳). ویژگی‌های خانواده‌های توانمند شده شامل دسترسی و کنترل بر منابع مورد نیاز، توانایی تصمیم‌گیری و حل مشکل و توانایی ارتباط برقرار کردن و دستیابی به منابع مورد نیاز می‌باشد. این ویژگی‌ها به این واقعیت اشاره می‌کند که خانواده‌ها ممکن است نیاز پیدا کنند که چگونه منابع در دسترس را تعیین نمایند، چگونه سؤالات خود را بپرسند و چگونه راه حل مشکلات خود را یافته و با سازمان‌ها مشورت نمایند. پرستار اعتماد به نفس بیماران و خانواده آن‌ها را با کمک کردن در تصمیم‌گیری و تشخیص نقاط قوت آن‌ها با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تقویت می‌کند (۲۴ و ۲۵). نتایج حاصل از مطالعه واحدی و همکاران (۱۳۹۱) دانش و نگرش مراقبین جانبازان رادر سطح پایین گزارش کردند (۲۵). همچنین مطالعه مسعودی (۱۳۹۱) عزت نفس (خودباوری) مراقبین بیماران مولتیپل اسکلروزیس را نامطلوب بیان کرده و نشان داد که بکارگیری الگوی توانمندسازی خانواده محور در بهبود عزت نفس مراقبین مؤثر بوده است (۲۶). همچنین والین XXXIX و همکاران (۲۰۰۹) اظهار نمودند که ارائه اطلاعات و توانمند کردن خانواده و دخالت دادن آن‌ها در

XXXIX Wahlin

و پس از ارائه توضیح در خصوص هدف پژوهش ، کسب موافقت و رضایت آگاهانه شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین دادن اطمینان به آن‌ها در خصوص محرمانه بودن اطلاعات، مبارتر به نمونه‌گیری به صورت در دسترس انجام داد. در ابتدا پرسشنامه‌های مطالعه به منظور سنجش اطلاعات قبل از مداخله بین مراقبین توزیع گردید سپس به منظور اجرای مداخله مبتنی بر توانمندسازی مراقبین مصدومین (از هر خانواده یک نفر) در طی سه جلسه یک ساعته آموزشی جهت بالا بردن سطح دانش و نگرش در خصوص بیماری و عوارض ناشی از گازهای شیمیایی، مراقبت و تأثیر کوتاهی در برنامه درمان و نیز اهمیت رژیم غذایی، ورزش، تغیریخ، خواب و... به روش بحث گروهی و کتابچه آموزشی شرکت داده شدند. سپس به صورت گروهی طی دو جلسه یک ساعته برای هر گروه در قالب گروههای ۶ و ۷ نفره جلسات حل مسئله برگزار گردید. بدین ترتیب که پس از توضیح در رابطه با هر کدام از مهارت‌های مورد نیاز آن مهارت به صورت عملی به مراقبین نمایش داده شد. سپس از مراقبین خواسته شد تا مهارت یاد گرفته را انجام دهنند، جهت تسلط در انجام مهارت به نمونه‌ها فرصت تمرين و تکرار داده شد تا حدی که بتوانند بدون حضور پژوهشگر مهارت را به نحو احسن اجرا کنند. زمانی که فرد خود را در گروه در مراحل حل مسئله، تبیین اهداف، ارائه و شناخت راه حل، برنامه ریزی و اجرا موفق یابد، احساس موفقیت کرده که این امر موجب افزایش خودباوری و انگیزه‌ی خواهد شد؛ لذا از مراقبین درخواست می‌شد تا موارد یاد گرفته شده در هر جلسه را به دیگر اعضاء خانواده خود انتقال داده تا سبب تسلط کامل و کافی به مطلب، اعتماد به نفس و افزایش خودباوری در خود ایجاد گردد. در جلسه آخر مداخله یک جلسه جمع بندی به عمل آمد به مدت یک ماه جهت بکارگیری آموخته‌ها به مراقبین خانوادگی مصدومین فرصت داده شد تا تکرار و تمرين نمایند. در پایان زمان در نظر گرفته شده ابزارهای پژوهش مجددًا توسط نمونه‌ها تکمیل گردید و پس از جمع‌آوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۰ استفاده گردید. در این پژوهش به منظور تعیین نرمال و یا غیر نرمال بودن داده

و... مصدوم و مراقبین خانوادگی وی ، پرسشنامه سنجش دانش و نگرش هر کدام شامل ۲۳ سؤال (در خصوص عالیم هشدار دهنده، وسائل کمک تنفسی، ورزش، رژیم غذایی، داروها و ...) می‌باشد که با طیف لیکرتی ۶ قسمتی و از صفر تا ۱۰۰ امتیاز بندی شده که در سؤالات مثبت گزینه بسیار زیاد موافق (امتیاز ۱۰۰)، گزینه زیاد موافق (امتیاز ۸۰)، گزینه زیاد مخالف (امتیاز ۶۰)، گزینه مخالف (امتیاز ۴۰)، و بسیار زیاد مخالف (امتیاز صفر) تعلق می‌گیرد. برای سؤالات منفی به طور معکوس امتیاز بندی شد. به منظور تعیین خودباوری یا عزت نفس بیمار از پرسشنامه استاندارد شده آیزینگ که حاوی ۳۰ سؤال (در خصوص ارزش، احترام، موفقیت و ...) می‌باشد استفاده گردید. جواب سؤالات به صورت سه گزینه بلی، خیر و میانه است. آزمونی در مقابل هر سؤال تا حد امکان پکشید جواب بله یا خیر بدهد در صورتی که واقعاً برای او امکان نداشته باشد گزینه میانه را بر می‌گزیند. به جواب درست نمره ۱۰۰، جواب غلط نمره صفر و به گزینه میانه امتیاز ۵۰ تعلق می‌گیرد. جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه های دانش و نگرش از روش اعتبار صوری و محتوى استفاده گردید. بدینصورت که ابتدا با مطالعه کتب، مقالات جدید، تحقیقات متفاوت، تجربه پژوهشگر و نظرات اساتید متخصص و نیز بر اساس نیاز بیماران و مراقبین آنان طی مصاحبه حضوری با این عزیزان ابزار ساخته شده و سپس جهت تعیین روابطی صوری و محتوابی به ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر تهران و متخصصین داخلی و فوق ریه داده و نظرات اصلاحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید. برای تعیین پایایی یا اعتماد علمی پرسشنامه‌های دانش، نگرش در این پژوهش از آزمون- آزمون مجدد^{XL} استفاده شد که بترتیب ۰.۹۷ و ۰.۸۸ (r= ۰.۷۹) گزارش گردید. روابطی و پایایی پرسشنامه عزت نفس آیزنگ به استناد مطالعات گذشته در ایران (۰.۷۹ و ۰.۸۸) گزارش شده است (۳۰). در این مطالعه پژوهشگر پس از دریافت معرفی‌نامه از معاونت پژوهش و انتخاب محیط پژوهش و ارائه معرفی‌نامه به مراکز مربوطه به مدت ۴ ماه در محل‌های پژوهش حاضر

^{XL}Test-Retest

جدول شماره ۲: مشخصات دموگرافیک مصدومین شیمیایی

درصد	تعداد	متغیر
۵۵	۲۲	سن کمتر از ۴۶ سال بیشتر از ۴۶ سال
۴۵	۱۸	
۵۷.۵	۲۳	درصد کمتر از ۲۵ درصد بیشتر از ۲۵ درصد
۴۲.۵	۱۷	
۳۵	۱۴	تحصیلات زیر دیپلم دیپلم دانشگاهی
۳۵	۱۴	
۳۰	۱۲	
۲۲.۵	۱۳	شغل کارمند آزاد بازنیسته بیکار
۲۵	۱۰	
۲۲.۵	۹	
۲۰	۸	

همچنین نتایج مطالعه نشان داد پس از اجرای مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات دانش، نگرش و خودباعری مراقبین مصدومین شیمیایی نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بطوریکه آزمون آماری تی زوجی تفاوت معنی داری نشان داد (جدول شماره ۳).

جدول شماره ۳: مقایسه میانگین نمرات دانش، نگرش و خودباعری مراقبین خانوادگی قبل و بعد از مداخله

آزمون آماری زوجی	میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله	میانگین و انحراف معیار قبل از مداخله	متغیر
$t=10.66$ $df=39$ $P<0.001$	74.15 ± 8.35	69.47 ± 8.60	دانش
$t=10.26$ $df=39$ $P<0.001$	74.06 ± 7.49	69.67 ± 8.32	نگرش
$t=7.78$ $df=39$ $P<0.001$	87.08 ± 6.27	80.00 ± 8.19	خودباعری

XLI ها از آزمون یک نمونه‌ای کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات با توجه به نرمال بودن داده‌ها با آزمون پارامتریک t زوجی و آمارهای توصیفی (درصد و میانگین) انجام شد.
یافته‌ها:

نتایج حاصل از مطالعه براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی در هر دو گروه از مصدومین شیمیایی و مراقبین خانوادگی آنان بر اساس سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درصد جانبازی در جداول ارائه گردید (جدول شماره ۱ و ۲).

جدول شماره ۱: مشخصات دموگرافیک مراقبین خانوادگی

درصد	تعداد	متغیر
۲۵	۱۰	سن ۲۰-۳۰ سال
۳۵	۱۴	
۴۰	۱۶	
۱۰	۴	جنس ذکر
۹۰	۳۶	
۸۰	۳۲	تأهل متأهل
۲۰	۸	
۷۵	۳۰	نسبت همسر
۲۵	۱۰	
۴۰	۱۶	تحصیلات زیر دیپلم
۴۵	۱۸	
۱۵	۶	
۲۵	۱۰	شغل کارمند
۱۵	۶	
۴۵	۱۸	
۱۵	۶	
۱۰	۶	آزاد
۱۵	۱۸	خانه دار
۴۵	۱۸	سایر

(۲۲). در توافق با یافته‌های مطالعه در پژوهش واحدی و همکاران میانگین نمرات آگاهی و نگرش مراقبین جانبازان با اختلال اتونومیک دیس رفلکسی پایین بوده است که بعد از مداخله آموزشی افزایش یافته است (۲۵). از سوی دیگر نتایج مطالعه حاکی از خودبادوری بالای مراقبین خانوادگی است بطوریکه بعد از اجرای مداخله مبتنی بر توانمندسازی آزمون آماری تفاوت معنی داری را نشان داد. مراقبین خانوادگی طی کسب شناخت نسبت به بیماری عضو بیمارشان و نگرش صحیح نسبت به ابتلا وی به بیماری این امر باعث می‌شود بیمارشان رفتارهای بهداشتی ناصحیح و غیراصولی خود را ترک، کاهش و یا تعديل کرده و به جای آن رفتارهای پیشگیرانه اتخاذ نماید از آنجایی که موفقیت‌های ناشی از انجام رفتارهای پیشگیرانه و درست توسط بیمارشان را به توانایی و سعی و کوشش خود نسبت داده باعث افزایش اعتماد به خود و عزت نفس شده است. رحمانی در پژوهش خود که به منظور مقایسه عزت نفس(خودبادوری) فرزندان جانباز و غیر جانباز انجام داد نشان داد که عزت نفس فرزندان جانباز از غیر جانباز بالاتر است که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد (۳۴). همچنین مطالعه سیلویرا^{XLIV} بر روی مراقبین بیماران سلطانی بیانگر این است که دادن اطلاعات و راهنمایی مناسب مراقبین باعث افزایش خودبادوری در مراقبین و بهبود کیفیت زندگی و کاهش بیماران شده است (۳۵). خودبادوری(عزت نفس) بالا در امر پیشگیری و درمان بیماران مهم است چون که یکی از روش‌های مؤثر ایجاد سازگاری بهتر با محدودیت‌های جسمی و روانی کمک به افراد جهت کسب عزت نفس بالاست (۳۶). در مطالعه حاضر بالا بودن خودبادوری اعضا فعال خانواده احتمالاً به دلایلی همچون بالا بودن اعتقادات دینی، مذهبی و حسن میهن دوستی در جانبازان و خانواده آنان باعث تأثیر کمتر پیامدهای منفی ناشی از مشکلات جانبازی بر خودبادوری خانواده شده است، برخی اعضا خانواده فرزندان آن‌ها هستند که بیشتر جوان بودند، نمونه‌ها غالباً کسانی بودند که تا حدودی می‌توانستند کارهای خود را انجام دهند و تأثیر آن‌ها بر خانواده متفاوت‌تر از جانبازان با درصد بالا و معلومین

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر توانمندسازی بر خودبادوری مراقبین خانوادگی مصدومین شیمیایی انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین نمرات مراقبین در ابعاد دانش و نگرش و خودبادوری بعد از اجرای الگوی توانمند سازی افزایش داشته است . نتایج قبل از مداخله بیانگر سطح خوبی از دانش و نگرش مراقبین بوده که احتمالاً به دلیل ماهیت مزمن بودن بیماری و مراجعات مکرر همراه بیمار به مراکز درمانی و کسب اطلاعات از پژوهش، پرستار و سایر کادر درمان می‌تواند باشد همچنین نتایج بعد از اجرای مداخله مبتنی بر توانمندسازی افزایش در میانگین نمرات را داشته و آزمون آماری تفاوت معنی داری را نشان داد. با افزایش دانش و نگرش مراقبین و به تبع آن اعضا خانواده نسبت به بیماری عضو بیمار به خصوص در زمینه پیشگیری، رژیم غذایی، تفریح و زمینه‌های دیگر مشارکت فعالانه بیشتری خواهند نمود. دانش و نگرش از عوامل زمینه‌ساز یک رفتار بهداشتی محسوب می‌شوند. دانش و نگرش پایین افراد می‌تواند در عملکرد نامناسب افراد دخیل باشد زیرا وقتی فرد خود را در معرض یک بیماری بداند و از عواقب وخیم آن با خبر باشد برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط دست به اقدامات پیشگیرانه خواهد نمود. افزایش دانش و آگاهی در خصوص یک موضوع آموزشی بر روی بهبود نگرش فرد تأثیر داشته و منجر به تقویت نگرش مثبت به آن موضوع و به تبع آن بهبود خودبادوری در وی می‌شود. زاوادزکی^{XLII} و همکاران در مطالعه خود بر مراقبین بیماران آزاریم نشان دادند که آموزش مراقبین و پشتیبانی از آنها نباید محدود به توسعه دانش و مهارت باشد بلکه نگرش نسبت به بیماری را نیز باید هدف قرار دهد (۳۳). نیگارد^{XLIII} و همکاران در مطالعه خود بر بیماران دیالیزی نشان دادند که دانش و توانایی حمایت به موقع لزوم در مورد توانمندسازی خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و حمایت آن‌ها از بیمار باعث کاهش اضطراب و ایجاد یک نیروی مثبت در بیمار جهت تغییر رفتار و روش زندگی وی شده است

^{XLII} Zawadzky

^{XLIII} Nygårdh

^{XLIV} Silveira

مختلف استفاده و نیز اثربخشی الگوی مداخله‌ای با مراقبین سایر جانبازان انجام گردد.

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه نشان داد که اجرای مداخله مبتنی بر توانمندسازی مراقبین خانوادگی موجب افزایش داشن، نگرش و خودبادوری مراقبین گردیده بطوریکه بتوانند با توجه به ماهیت مزمن عوارض ناشی از گازهای شیمیایی بهتر و مطلوب‌تر با همسر و والد جانباز خود رفتار نمایند. امروزه جامعه ما با تعداد زیادی جانباز که جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و از میهن خود دفاع کرده و با جانبازی خود مشکلات زندگی خود و خانواده خویش را دوچندان کرده اند، مواجه است بر ما لازم است با بررسی دقیق مشکلات این عزیزان به حل و فهم بخردانه امور آن‌ها همت گمارده و کوتاهی نکنیم.

تشکر و قدردانی: از کلیه مصدومین شیمیایی عزیز و مراقبین آنان که در انجام این پژوهش ما را یاری کردنده کمال تشکر را داریم. این مقاله بخشی از نتایج پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد مستخرج گردیده که با حمایت مالی مرکز تحقیقات علوم رفتاری صورت گرفته است.

منابع

- 1- Razavi SM, Salamati P, Saghafinia M, Abdollahi M. A review on delayed toxic effects of sulfur mustard in Iranian veterans. *Daru*. 2012;20:51.
- 2- Kehe K, Thiermann H, Balszuweit F, Eyer F, Steinritz D, Zilker T. Acute effects of sulfur mustard injury—Munich experiences. *Toxicology*. 2009;263(1):3-8.
- 3-. Tavassoli Kh. Informant effect of breathing exercises on fatigue and respiratory symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease admitted to the Civil Hospital, Tehran University of Medical Sciences. Master's thesis. Tehran University of Medical Sciences, 2006.
- 4-. Jamali H. Quality of life in chemical warfare pulmonary complications due to mustard gas in 1383 lived in Sardasht city. *Tehran University of Medical Sciences and Health Centers. Master's thesis*. Tehran, 2005.
- 5- Rahimi A. Effect of continuous care model on quality of life in hemodialysis patients. *Tehran: Master's thesis*. Tarbiat Modarres University, 2005.
- 6- Bland R, Darlington Y. The nature and sources of hope: Perspectives of family caregivers of people with serious mental illness. *Perspectives in Psychiatric Care*. 2002;38(2):61-8.
- 7- Brodaty H, Luscombe G. Psychological morbidity in caregivers is associated with depression in patients with dementia. *Alzheimer*

- disease and associated disorders. 1998;12(2):62-70.
- 8- Donaldson C, Tarrier N, Burns A. Determinants of carer stress in Alzheimer's disease. International Journal of Geriatric Psychiatry. 1998;13(4):248-56.
- 9- Esbensen BA, Thomé B. Being next of kin to an elderly person with cancer. Scandinavian journal of caring sciences. 2010;24(4):648-54.
- 10-. Katz R, Lowenstein A, Prilutzky D, Halperin D. Employers' Knowledge and Attitudes Regarding Organizational Policy Toward Workers Caring for Aging Family Members. Journal of Aging & Social Policy. 2011;23(2):159-81.
- 11-. Pitceathly C, Maguire P. The psychological impact of cancer on patients' partners and other key relatives: a review. European Journal of Cancer. 2003;39(11):1517-24.
- 12-. Alhani F. Design and evaluation of family-centered empowerment model to prevent iron deficiency anemia. Tehran: PhD thesis. Tarbiat Modarres University,2005.
- 13-. Öhman M, Söderberg S. The experiences of close relatives living with a person with serious chronic illness. Qualitative health research .2004; 14(3):396-410.
- 14- Stanhope M, Lancaster J. Community & public health nursing: Mosby St Louis; 2004.
- 15- Hellesø R, Eines J, Fagermoen MS. The significance of informal caregivers in information management from the perspective of heart failure patients. Journal of clinical nursing. 2012;21(3-4):495-503.
- 16- Barrett P, Hale B, Butler M. Family Care and Social Capital. Family Care and Social Capital: Transitions in Informal Care: Springer; 2014. p. 1-15.
- 17- de Vugt ME, Verhey FR. The impact of early dementia diagnosis and intervention on informal caregivers. Progress in neurobiology. 2013.
- 18- Wagner EH. The role of patient care teams in chronic disease management. BMJ: British medical journal. 2000;320(7234):569.
- 19- Larsen LS. Effectiveness of a counseling intervention to assist family caregivers of chronically ill relatives. Journal of psychosocial nursing and mental health services. 1998;36(8):26-32.
- 20- Hassanpoor Dehkordi A, Delaram M, Safdari Dehkordi F, Salehi Tali S, Hasheminiya S, Kasiri K .Comparison between lecture method and self education in knowledge parent of children have major talasemia on caring for their children. ShahreKord Med J. 2008;10(2):52-8.
- 21- Heidari M, Alhani F, Kazemnejad A, Farzaneh M. Effect of family centered empowerment model on quality of life in adolescents with diabetes. Iranian Journal of Pediatrics. 2007;17(1):87-94.
- 22-Nygårdh A, Wikby K, Malm D, Ahlstrom G. Empowerment in outpatient care for patients with chronic kidney disease-from the family member's perspective. BMC nursing. 2011;10(1):21.
- 23-Alhyary A, Alhani F, Kazemnejad A, M Izadyar. Effect of family centered empowerment model on quality of life of school-age children with thalassemia. Iranian Journal of Pediatrics. 2006;16 (4) :455-61.
- 24- Browning AM. Empowering family members in end-of-life care decision making in the intensive care unit. Dimensions of Critical Care Nursing. 2009;28(1):18-23.
- 25- Vahedi M, Fizi F, Ebadi A, Kachuei H. Effect of physical training (lectures) and presence (booklet - Reminder) on knowledge, attitude and practice of caregivers of Tehran's veterans with spinal cord dysfunction in 1389. Veteran Medical Journal. 2012;4 (4):21-8.
- 26- Masoudi R, Soleimani M, Alhani F, Rabie L, Bahrami A, Ismaili p. Effects of family empowerment model - based on perceived satisfaction and self-care of patients with multiple sclerosis. Koomesh. 2012;14 (248-240).
- 27- Wählén I, Ek AC, Idvall E. Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(18):2580-7.
- 28- Stanhope M, Lancaster J. Public health nursing: Population-centered health care in the community: Mosby St. Louis, MO; 2008.

- 29- Mehdizadeh S. Effect of applying continuous care model on quality of life in chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans. Tehran: Master's thesis. Baghyotollah of Medical Sciences University (BMSU), 2009.
- 30- Ghasemzadeh A, Younesi R. A comparative study of self-esteem and psychological Slant new students with senior students. Journal of Educational Psychology, Islamic Azad University Tonkabon. 2010;1 (4):39-58.
- 31- Mohammadi Shahblaghi M. Self-efficacy and family caregivers to care for Elderly with Alzheimer pressure on Tehran. Journal of Ageing.2006;1(1):26-33 .
- 32- Vahedian Azimi A, Alhani F ,Ahmadi F, Kazemnejad A. Effect of family-centered empowerment model on the life style of myocardial infarction patients. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(4):127-32.
- 33- Zawadzki L, Mondon K, Peru N, Hommet C, Constans T, Gaillard P, et al .Attitudes towards Alzheimer's disease as a risk factor for caregiver burden. International Psychogeriatrics. 2011;23(9):1451.
- 34- Rahmani N, Akbar nataj K, Alipour H. A comparative study of self-esteem and depression in middle-school children, veterans and non-veterans in the city of Sari 90-1389. Veteran Medical Journal. 2012;4(4):29-34.
- 35- Silveira MJ, Given CW, Cease KB, Sikorskii A, Given B, Northouse LL, et al. Cancer Carepartners: Improving patients' symptom management by engaging informal caregivers. BMC palliative care. 2011;10(1):21.
- 36- Antle BJ. Factors associated with self-worth in young people with physical disabilities. Health & Social Work. 2004;29(3):167-75.
- 37- Habibi R, Salleh moghadam A, Talaee A, Ebrahimzadeh S, Karimi moneghi H. Effects of family-based problem-solving instruction on self-esteem of drug-dependent patients. Hakim Research Journal, 2011;14(4):249-254.
- 38- Zeighami B, Dzhabkhsh T, Nyksrsht A, Hazrati M, Zahmtkeshan N. The effect of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis. Armaghan danesh, 2005;3 (39): 53-64. .