

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی‌های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران

محمدحسن شاملی^{۱*}، عبدالله معتمدی^۲، احمد برجعلی^۳

تاریخ ارسال: ۹۶/۷/۱۸ تاریخ پذیرش: ۹۶/۷/۱۸

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی، به انجام رسید. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون به همراه گروه کنترل و دوره پیگیری ۴۵ روزه صورت گرفت. با روش نمونه‌گیری در دسترس، یک مدرسه انتخاب و از بین آن‌ها ۶۴ نفر که بر اساس پرسشنامه اعتیاد به بازی‌های اینترنتی (تعییریافته پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ) به بازی‌های اینترنتی وابسته بودند مشخص شده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. در گروه آزمایش، افراد بر اساس نمرات بدست آمده از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن و خودکنترلی تانجی، در چهار گروه هشت‌نفری جای گرفتند. به این افراد (گروه آزمایش) هشت جلسه برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های هیجان خواهی زاکرمن، خودکنترلی تانجی و پرسشنامه اعتیاد به بازی‌های اینترنتی (تعییریافته پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ)، استفاده شد. داده‌ها از طریق روش‌های آماری کوواریانس یک‌طرفه و واریانس مخلوط از نوع یک بین – یک درون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل‌های آماری نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی مؤثر است ($P < 0.01$)، و همچنین در مورد افراد گروه آزمایش، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در تمام گروه‌ها به جز گروه با خودکنترلی بالا و هیجان خواهی پایین، تأثیر معنی‌دار داشته ($P < 0.01$) و اعتیاد به بازی‌های

۱. کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. shameli921@atu.ac.ir

۲. دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

۳. دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ایнтерنی کاهش یافته بود. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق میانجی گری متغیرهای خودکترلی و هیجان خواهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی مؤثر بوده است.

واژه‌های کلیدی: اعتیاد به بازی‌های اینترنتی، خودکترلی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، هیجان خواهی

مقدمه

در طول دهه‌ی گذشته استفاده از اینترنت افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به طوری که طبق آمار اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات^۱، استفاده از اینترنت در کشورهای توسعه‌یافته طی این دهه ۲۳۹ درصد رشد داشته است (اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات، ۲۰۱۲، به نقل از کاس^۲ و همکاران، ۲۰۱۳). پژوهش‌های زیادی هم نشان می‌دهد به موازات این همه‌گیر شدن اینترنت، استفاده‌ی بیش از حد از آن می‌تواند به مشکلاتی شبیه اعتیاد و وابستگی منجر شود (کو^۳ و همکاران، ۲۰۰۹؛ لونگ و لی^۴، ۲۰۱۲)، به گونه‌ای که حتی اعتیاد به اینترنت به عنوان بیماری همه‌گیر قرن ۲۱ تعریف شده است (کریستاکیس^۵، ۲۰۱۰)، که با تخمین شیوع از ۰/۳ درصد در آمریکا (ابوجاؤده^۶ و همکاران، ۲۰۰۶، تا ۱۸/۳ درصد در بریتانیا (نیمز^۷ و همکاران، ۲۰۰۵)، متغیر است. طبق آماری که مرکز توسعه‌ی ملی اینترنت (متما) منتشر کرده است، تعداد کاربران اینترنت در ایران تا پایان سال ۹۳ ۴۰/۹۳ میلیون کاربر بوده که نسبت به پنج سال قبل ۲۵۰ درصد رشد داشته است. استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی منجر به تغییر در بسیاری از ابعاد زندگی افراد می‌شود و حتی می‌تواند باعث تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی افراد به خصوص جوانان نیز گردد (شامانی و همکاران، ۱۳۹۵).

۱. International Telecommunication Union (ITU)

۲. Kuss

۳. Ko

۴. Leung & Lee

۵. Christakis

۶. Aboujaoude

۷. Niemz

اصطلاح اعتیاد به اینترنت^۱ به درگیری بیش از حد به رفتارهای آنلاین از جمله بازی‌ها، همراه با نشانه‌های معمول اعتیاد، گفته می‌شود. اعتیاد به اینترنت می‌تواند شامل اعتیاد به بازی‌های اینترنتی، اتاق‌های گپ، هرزه‌نگاری و قمار آنلاین باشد (فلاح مهنه^۲، ۲۰۰۷، ب، نقل از پناه علی و همکاران، ۱۳۹۰). اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نشانه‌هایی شبیه وابستگی به مواد از جمله: ترک، تحمل، عدم کنترل بر توقف آن و ... دارد. اعتیاد به بازی‌های اینترنتی در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ویرایش پنجم^۳ با نام اختلال بازی اینترنتی^۴ نام‌گذاری شده است.

در این پژوهش به اعتیاد به بازی‌های اینترنتی در نوجوانان توجه شده است، زیرا: ۱- اعتیاد به بازی‌های اینترنتی در نوجوانان به خصوص نوجوانان پسر شیوع بیشتری داشته و آن‌ها نسبت به بزرگ‌سالان، آسیب‌پذیرترند (گریفیث^۵ و همکاران ۲۰۰۴؛ گریفیث و وود^۶، ۲۰۰۰، ب، نقل از لیمتر^۷ و همکاران، ۲۰۰۹). ۲- اعتیاد به بازی‌های اینترنتی در نوجوانان باعث بروز مشکلات زیادی از قبیل افت تحصیلی، مشکل در روابط اجتماعی و جدا شدن از خانواده و ازدواج شد.

در پژوهش‌های متعددی، مشخص شده است که متغیرهای خودکنترلی^۸ (برای مثال ویلس و استولمیلر^۹، ۲۰۰۲؛ بوتلر^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۰؛ جکسون^{۱۱} و همکاران، ۲۰۰۰، و هیجان خواهی^{۱۲} (برای مثال شلی^{۱۳}؛ زاکرمن^{۱۴}، ۱۹۹۴)، بر اعتیاد نقش مؤثری دارد. هیجان خواهی به عنوان جستجوی هیجان‌ها و تجربه متنوع، تازه، و پیچیده و میل به خطر

۱. internet addiction

۲. Fallah Mehneh

۳. diagnostic and statistical manual disorders, fifth edition (DSM-۵).

۴. internet game disorder

۵. Griffiths

۶. Wood

۷. Lemmens

۸. self-control

۹. Wills & Stoolmiller

۱۰. Butler

۱۱. Jackson

۱۲. sensation seeking

۱۳. Shelly

۱۴. Zuckerman

کردن تعریف گردیده است (زاکرمن، ۱۹۹۴). خودکنترلی توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان‌ها و تکانه‌های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس‌زا و توانایی خود انگیزشی درونی است. به عبارتی خودکنترلی، توانایی کنترل عواطف و هیجان‌ها و رفتارهای صادقانه و درست است (گلمن^۱، ۲۰۰۱). شواهد تجربی نشان می‌دهد که افراد با خودکنترلی بالاتر پیامدهای بهتری را در زمینه‌های کنترل تکانه، سازگاری و انجام وظایف به دست می‌آورند (صیادپور، ۱۳۸۶، به نقل از هادی و همکاران، ۱۳۹۵).

در بررسی سبب‌شناسی اعتیاد و رفتارهای اعتیادی، پژوهشگران نقص در تنظیم هیجان^۲، تحمل پایین ناراحتی^۳، اجتناب هیجانی، رفتارهای بدون تفکر و عادتی، نشخوار فکری^۴، خودکارآمدی پایین و نقص مهارت‌های مقابله‌ای را عنوان کرده‌اند (بلوم^۵، ۲۰۰۵). پژوهش‌های مختلفی هم در مورد نقش متغیرهای هیجان خواهی و خودکنترلی در اعتیاد به بازی‌های اینترنتی انجام شده است، برای مثال در پژوهش می^۶ و همکاران (۲۰۱۶) نشان داده شد که خودکنترلی رابطه‌ای بسیار قوی با مشکلات استفاده از اینترنت در نوجوانان دبیرستانی دارد؛ در پژوهشی هم که مهروف^۷ و گریفیث (۲۰۱۰) بر روی ۱۲۳ نفر از دانشجوها انجام داده است نتایج که بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره، به دست آمده بود، نشان می‌داد که پنج متغیر هیجان خواهی، خودکنترلی، مشکلات نوروتیکی، پرخاشگری و اضطراب، نقش مهمی در اعتیاد به بازی‌های اینترنتی دارند؛ همچنین کیم^۸ و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان «رابطه‌ی بین اعتیاد به بازهای آنلاین و پرخاشگری، خودکنترلی و خودشیفتگی» که بر روی ۱۴۷۱ نفر از افراد استفاده کننده از بازی‌های آنلاین اجرا شده بود، دریافتند که بین پرخاشگری و صفات شخصیت خودشیفته و اعتیاد به بازی‌های اینترنتی

۱. Goleman

۲. emotion dysregulation

۳. distress tolerance

۴. ruminative thought

۵. Blume

۶. Mei

۷. Mehroof

۸. Kim

رابطه‌ی مثبت و بین خودکنترلی و اعتیاد به بازی‌های اینترنتی رابطه‌ی منفی ($P<0.0001$) وجود دارد.

درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی^۱، رویکردنی است که توسط تیزدل و همکاران مطرح شد. این درمان که یک مداخله کوتاه‌مدت و ساختار یافته است از روی مدل کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی کابات زین ساخته و اصول درمان شناختی به آن اضافه شده است (کنگ^۲ و همکاران، ۲۰۱۱، به نقل از برجعلی، ۱۳۹۲). این درمان به افراد مهارت‌هایی را آموزش می‌دهد که بدون هیچ گونه قضاوتی بتوانند از افکارشان آگاه‌تر شوند و همچنین قادر باشند به جای افکار منفی، افکار مثبت یا خشنی را به عنوان انعکاسی از واقعیت در نظر بگیرند و به آن‌ها تنها به عنوان رخدادهای ذهنی گذرانگاه کنند (کرین، ۲۰۰۹).

با توجه به این که در پژوهش‌های گسترده، مفید بودن درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در حیطه‌های گوناگون همچون مدیریت استرس، اضطراب، و ارتقای مهارت‌های تنظیم هیجان (پوتك^۴، ۲۰۱۲)، کاهش رفتارهای اعتیادی (گارلند^۵ و همکاران، ۲۰۱۰)، سوءصرف مواد (واپرمن^۶ و همکاران، ۲۰۱۲) و پیشگیری از عود در اعتیاد (بوئن^۷ و همکاران، ۲۰۱۱)، به اثبات رسیده است؛ و همچنین شواهد تجربی زیادی هم نشان می‌دهد که متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نقش مهمی دارند (برای مثال، می و همکاران، ۲۰۱۶؛ مهروف و گریفیث، ۲۰۱۰؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۸)؛ از طرفی تأثیر ذهن آگاهی بر افزایش کنترل درونی و کنترل هیجان‌ها هم مشخص شده است (برای مثال، اپشتاین و پاسینی^۸، ۱۹۹۹، به نقل از یوسفیان و اصغری پور، ۱۳۹۲)، بنابراین در پژوهش حاضر این درمان انتخاب شده است تا اثربخشی آن بر روی اعتیاد به بازی‌های اینترنتی، از طریق میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی بررسی شود.

۱. mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)

۲. Keng

۳. Crane

۴. Potek

۵. Garland

۶. Wupperman

۷. Bowen

۸. Epstein & Pacini

بدین ترتیب فرضیه‌های پژوهش عبارت‌اند از:

- ۱) درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نوجوانان پسر مؤثر است.
- ۲) درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نوجوانان پسر، مؤثر است.

روش پژوهش

این پژوهش، یک پژوهش نیمه آزمایشی است و در آن از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون به همراه گروه کنترل و با پیگیری ۴۵ روزه استفاده شده است. برای انتخاب نمونه، با توجه به اینکه اجرای پروتکل درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نیازمند هشت جلسه (دو ماه) آموزش است که به صورت هفتگی و پیوسته انجام شده و آزمودنی‌ها نیز می‌بایست در تمام جلسات حضور داشته باشند، بنابراین برای جلوگیری از افت آزمودنی‌ها و اجرای دقیق پروتکل، مدرسه‌ای که از قبل با مدیریت آن هماهنگی صورت گرفته بود به عنوان نمونه‌ی در دسترس در نظر گرفته شد. از بین ۱۸۵ نفر از دانش آموزان پسر این مدرسه که در مقطع تحصیلی متوسطه ۲ و در بازه‌ی سنی ۱۴ تا ۱۶ سال، قرار داشتند، ۶۴ نفر بر اساس پرسشنامه‌ی اعتیاد به بازی‌های اینترنتی، به این بازی‌ها اعتیاد داشتند. این افراد (۶۴ نفر) به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (۳۲ نفر) و گروه گواه (۳۲ نفر) قرار گرفتند.

ابزار اندازه‌گیری پژوهش حاضر از قرار زیر است:

پرسشنامه‌ی هیجان خواهی زاکرمن: این مقیاس توسط ماروین زاکرمن در سال (۱۹۷۸) ساخته شده است. دکتر ماروین زاکرمن اشکال مختلفی برای تعیین میزان هیجان خواهی افراد پیشنهاد کرده است. ۶ شکل هیجان خواهی زاکرمن موجود است. شکل پنجم این مقیاس که شامل ۴۰ ماده دوچرخی است خلاصه‌شده‌ی شکل چهارم ۷۲ سوالی این مقیاس است. این آزمون بر اساس شکل پنجم هیجان خواهی زاکرمن تهیه شده است چون شکل ششم آن با شرایط فرهنگی ما سازگار نیست. این مقیاس توسط دکتر مجید محیی شیرازی در سال ۱۳۸۴ بر اساس فرهنگ ایرانی هنجاریابی شده است. این مقیاس شامل ۴۰ ماده دو عبارتی

است که آزمودنی ملزم است یکی از دو جزء هر ماده را حتماً انتخاب کند. در ازای هر پاسخ هماهنگ با کلید یک نمره دریافت می‌کند؛ و نمره‌ی هر فرد بین ۰ تا ۴۰ می‌تواند تغییر کند؛ و هرچه نمره‌ی فرد بیشتر باشد هیجان خواهی فرد هم بالاتر است. واریانس کل سوالات برابر ۸/۵۷۷ واریانس کل آزمون ۲۱/۰۲، انحراف استاندارد مقیاس ۶/۲۴، اعتبار کل آزمون (آلفای کرونباخ) ۰/۷۸ و خطای استاندارد کل آزمون برابر ۲/۹۲ است (محوی شیرازی، ۱۳۸۷).

پرسشنامه‌ی خودکنترلی تانجی^۱: این پرسشنامه توسط تانجی و همکاران در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است، که شامل دو خرده مقیاس ۱- خودکنترلی منع کننده یا بازدارنده ۲- خودکنترلی اولیه است و هدف آن سنجش میزان خودکنترلی افراد بر خودشان است (اطلسی و همکاران، ۱۳۹۳). این پرسشنامه دارای دو فرم کوتاه و بلند است. فرم کوتاه آن ۱۳ سؤال و فرم بلند آن ۳۶ سؤالی است؛ که در این پژوهش از فرم بلند یعنی ۳۶ سؤالی استفاده شده است. پاسخ‌ها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (پنج درجه‌ای)، (به هیچ وجه در مورد من صدق نمی‌کند = ۱، تا حدودی در مورد من صدق می‌کند = ۲، برخی اوقات در مورد من صدق می‌کند = ۳، بیشتر اوقات در مورد من صدق می‌کند = ۴، همیشه در مورد من صدق می‌کند = ۵)، است.

تانجی و همکاران در پژوهشی که به بررسی رابطه و اثرگذاری خودکنترلی بالا با موقیت‌های بین فردی پرداخته بودند، مشخصات روان‌سنجدی این پرسشنامه را نیز گزارش کردند. در برآورد آن‌ها، همسانی درونی و پایایی آزمون بالا گزارش شده است، بدین گونه که: آلفای کرونباخ برای مقیاس خودکنترلی فرم بلند ۳۶ آیتمی در دو نمونه پژوهشی آن‌ها ۱۳/۰ بوده است؛ و پایایی به روشنی نیز برای فرم ۳۶ سؤالی ۰/۸۹ و برای فرم ۱۳ سؤالی ۰/۸۷ به دست آمده است، بنابراین پرسشنامه‌ی موردنظر اعتبار مناسبی را دارد است (تانجی و همکاران، ۲۰۰۴).

۱. Tangney

پرسشنامه‌ی بازی‌های اینترنتی: برای اعتیاد به بازی‌های اینترنتی پرسشنامه‌ای در ایران هنچار نشده است؛ بنابراین پرسشنامه‌ی استفاده شده در این پژوهش، تغییریافته‌ی پرسشنامه‌ی اعتیاد به اینترنت یانگ^۱ (۱۹۹۸) است که بر روی ۵۲ نفر از دانش آموزان اجرا و با استفاده از نرم‌افزار spss آلفای کرونباخ آن ۰/۸۵۴ به دست آمد. این پرسشنامه نیز شبیه پرسشنامه‌ی اعتیاد به اینترنت یانگ، دارای ۲۰ آیتم بوده و به روش لیکرت بر روی مقیاس پنج درجه‌ای شامل (هر گز = ۱ نمره، بهندرت = ۲ نمره، گاه‌گاهی = ۳ نمره، اغلب = ۴ نمره و همیشه = ۵ نمره) نمره گذاری می‌شود.

پرسشنامه‌ی اعتیاد به اینترنت یانگ در سال ۱۹۹۸ توسط یانگ ساخته شد (مورالی و جورج^۲، ۲۰۰۷). این پرسشنامه در ۲۰ آیتم طراحی شده و به روش لیکرت بر روی مقیاس پنج درجه‌ای شامل (هر گز = ۱ نمره، بهندرت = ۲ نمره، گاه‌گاهی = ۳ نمره، اغلب = ۴ نمره و همیشه = ۵ نمره) نمره گذاری می‌شود، دامنه‌ی نمرات این آزمون از ۲۰ تا ۱۰۰ است که کسب نمره‌ی بیشتر نشان‌دهنده‌ی وابستگی بیشتر به اینترنت است (پناه علی و همکاران، ۱۳۹۰). در مطالعه‌ی یانگ و همکاران پایابی درونی پرسشنامه بالاتر از ۰/۹۲ ذکر شده و پایابی به روش بازآزمایی نیز معنادار گزارش شده است (سالی^۳، ۲۰۰۶، به نقل از علوی و جنتی فرد، ۱۳۹۰). در پژوهش چن^۴ و همکاران (۲۰۰۸) نیز آلفای کرونباخ بالاتر از ۰/۷۰ گزارش شده است. در ایران نیز در پژوهش ناستی زایی (۱۳۸۸)، آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۱ به دست آمده و علوی و همکاران (۱۳۸۹) نقطه برش ۴۴ را برای این پرسشنامه پیشنهاد کرده‌اند.

پروتکل استفاده شده در این پژوهش، پروتکل هشت جلسه‌ای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی است که توسط سگال^۵ و همکاران (۲۰۰۲)، توصیف شده است. این پروتکل در جدول ۱ آمده است (محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۵).

-
- ^۱. Young
 - ^۲. Murali & George
 - ^۳. Sally
 - ^۴. Chen
 - ^۵. Segal

جدول ۱. خلاصه جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

جلسه	اهداف	محظوظ	تکاليف
توضیح کلی در مورد ذهن آگاهی و فرایند مداخله			
			۱- انجام تمرین وارسی بدن در خانه (روزی یکبار)
			۲- انتخاب یکی از فعالیتهای هشیاری و توجه خود را از یک قسمت از بدن به قسمت دیگر انتقال می‌دهد، تمرین خوردن کشمش (بدین منظور که چه قدر از تجربیات زندگی را به خاطر (مانند تمرین خوردن کشمش در عدم توجه کافی به دلیل هدایت خودکار (جلسه) خودکار از دست داده‌ایم)
			۳- یادداشت تجربیات خود از ارائه‌ی جزوای خلاصه جلسه و لیست تکالیف
			۴- یادداشت مسائل و یا موانعی که توضیح در مورد اهمیت انجام تکالیف و حین انجام تمرین‌ها پیش می‌آید.
نحوه اجرای آن‌ها			
مرور تکالیف جلسه‌ی قبل اجرای تمرین وارسی بدن و بررسی بازخوردهای آن			
			توضیح و تمرین در مورد اهمیت تعبیر رویدادها و ارتباط بین افکار و احساسات (مدل شناختی) آگاهی از واقع خوشایند روزانه
			۱- انجام تمرین روزانه وارسی بدن ۱۵ دقیقه (روزی یکبار)
			۲- انجام مراقبه نشسته ۱۰ تا ۱۵ دقیقه (روزی یکبار)
			۳- ثبت وقایع خوشایند روزانه
			۴- مراقبه نشسته به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه مراقبه نشسته به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه گرفتن بازخورد از شرکت‌کنندگان در فعالیت معمول روزانه
ارائه‌ی تکالیف و جزوای خلاصه جلسه دوم			
مرور تکالیف جلسه‌ی قبل انجام تنفس مرکب در روزهای تمرین دیدن یا شنیدن به مدت ۵۰ دقیقه فرد (تمرین‌های کششی آرام به انجام مراقبه نشسته: انتقال آگاهی از همراه حضور ذهن در تنفس) تنفس و بدن به آگاهی از حس‌های قوی ۲- ثبت واکنش‌های خود نسبت به انجام این تمرین			
اعزاییش حضور ذهن با استفاده از تنفس استفاده از تنفس به عنوان تکیه‌گاهی بر بدنی			
			۱- انجام تنفس مرکب در روزهای تمرین دیدن یا شنیدن به مدت ۵۰ دقیقه فرد (تمرین‌های کششی آرام به انجام مراقبه نشسته: انتقال آگاهی از همراه حضور ذهن در تنفس) تنفس و بدن به آگاهی از حس‌های قوی ۲- ثبت واکنش‌های خود نسبت به انجام این تمرین
			۱- انجام تنفس مرکب در روزهای تمرین دیدن یا شنیدن به مدت ۵۰ دقیقه فرد (تمرین‌های کششی آرام به انجام مراقبه نشسته: انتقال آگاهی از همراه حضور ذهن در تنفس) تنفس و بدن به آگاهی از حس‌های قوی ۲- ثبت واکنش‌های خود نسبت به انجام این تمرین
اعزاییش حضور ذهن با استفاده از تنفس استفاده از تنفس به عنوان تکیه‌گاهی بر بدنی			
اعزاییش حضور ذهن با استفاده از تنفس استفاده از تنفس به عنوان تکیه‌گاهی بر بدنی			

<p>۳- انجام مراقبه نشسته در روزهای خود</p> <p>تمرين فضای تنفس ۳ دقیقه‌ای</p> <p>از کش های خود نسبت به آن</p> <p>ارائه تکاليف و جزوات مربوط به آن</p> <p>۴- تمرين فضای تنفسی ۳ دقیقه‌ای</p> <p>(سه بار در روز)</p> <p>۵- تهیی فهرستی از وقایع ناخوشایند روزانه</p>	<p>آگاهی نسبت به بازنگری تمرينات و گرفتن بازخورد</p> <p>بازنگری تمرينات و گرفتن بازخورد</p> <p>خود</p> <p>جلسه سوم</p>
<p>۱- انجام مراقبه نشسته و ثبت واکنش های خود نسبت به آن</p> <p>۲- تمرين فضای تنفسی ۳ دقیقه‌ای</p> <p>بدن، صدا و افکار</p> <p>اجرای فضای تنفس سه دقیقه‌ای</p> <p>مرور مفاهیم و روند جلسات گذشته</p> <p>ارائه تکاليف و جزوات مربوط به (در هنگام مواجهه با احساسات ناخوشایند)</p>	<p>ماندن در زمان حال (حتی وقتی تجربه‌ی ناخوشایندی در جریان است)</p> <p>مرور تکاليف (حتی وقتی تجربه‌ی دلبستگی و بیزاری محدود کردن و گسترش دادن توجه)</p> <p>چهارم</p>
<p>۳- انجام مراقبه نشسته: آگاهی از تنفس، (هرروز) محدود کردن و گسترش دادن توجه</p>	<p>کشف تجربه‌ی دلبستگی و بیزاری</p> <p>جلسه چهارم</p>
<p>۴- انجام مراقبه نشسته: آگاهی از تنفس، بدن، صداها و افکار، چگونگی واکنش های خود به افکار و احساسات و حس های بدنی، چگونگی ارتباط با تجربه انجام تنفس ۳ دقیقه‌ای منظم (۳ تا ۴۰ دقیقه (به صورت روزانه)</p>	<p>ایجاد رابطه‌ای متفاوت با تجربه</p> <p>جلسه پذیرش جهان</p>
<p>۵- انجام مراقبه نشسته: آگاهی از تنفس، بدن، صداها و افکار، چگونگی واکنش های خود به افکار و احساسات و حس های بدنی، چگونگی ارتباط با تجربه انجام تنفس ۳ دقیقه‌ای منظم (۳ تا ۴۰ دقیقه (به صورت روزانه)</p>	<p>همان گونه که هست (تقویت پذیرش بدون قضاوت)</p> <p>پنجم</p>
<p>۶- انجام مراقبه نشسته: آگاهی از تنفس، بدن، صداها و افکار، چگونگی واکنش های خود به افکار و احساسات و حس های بدنی، چگونگی ارتباط با تجربه انجام تنفس ۳ دقیقه‌ای منظم (۳ تا ۴۰ دقیقه (به صورت روزانه)</p>	<p>اجرای فضای تنفس ۳ دقیقه‌ای</p> <p>ارائه تکاليف و جزوات مربوط به جلسه پنجم</p>
<p>۷- انجام مراقبه نشسته: آگاهی از تنفس، بدن، صداها و افکار، چگونگی واکنش های خود به افکار و احساسات و حس های بدنی، چگونگی ارتباط با تجربه انجام تنفس ۳ دقیقه‌ای منظم (۳ تا ۴۰ دقیقه (به صورت روزانه)</p>	<p>مرور تکاليف (رویاروبي با افکار در شناخت درمانی و MBCT)</p> <p>جلسه ششم</p>

توجه به زمانی که افکار و خلق در افراد، اجرای تنفس ۳ دقیقه‌ای به طور منظم (سه بار در روز) اجازه اتخاذ نقطه نظر دیگر را اجري ا تنفس ۳ دقیقه‌ای مقابله‌ای در هنگام مواجهه با افکار و احساسات تمرین نقطه نظرات و یا افکار جانشین ناخوشایند تأکید بر استفاده از تنفس در اولین گام به کار بردن راه حل‌های گفته شده برای آگاهی از افکار پایدار و توجه به این که: پاسخ به افکار تنها راه برقراری رابطه‌ی متفاوت با آن‌ها نیست: توجه به تنفس به عنوان اولین گام: یعنی توجه به موقعیت‌هایی که آمده شدن برای اتمام دوره ارائه‌ی تکالیف و جزوای می‌توان از طریق توجه آگاهانه به تنفس، آن‌ها را کنترل و مدیریت کرد

مورور تکالیف جلسه قبل و گرفتن بازخورد	مراقبت از خود:
انتخاب یک الگو برای اجرای منظم انجام مراقبه‌ی نشسته: آگاهی از تنفس، تمرین به طور نظاممند (از بین تمام تمرینات، تمرینی که فرد می‌خواهد در هنگام مواجهه با مشکلات در طی ۵ هفته‌ی آینده روزانه انجام تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق دهد انتخاب می‌شود)	توجه به نشانه‌های هشداردهنده بروز اختلال هفتمن
تنفس ۳ دقیقه‌ای منظم (سه بار در روز) تهیی فهرست اولیه از فعالیت‌های لذت‌بخش (تکمیل آن به عنوان تکلیف خانگی مطرح می‌شود) برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای این فعالیت‌ها استفاده از تنفس ۳ دقیقه‌ای به عنوان گام تکمیل فهرست فعالیت‌هایی که اول برای شناسایی نشانگان عود باعث افزایش حس خود کارآمدی شناسایی کارهای موردنیاز برای و احساس لذت‌بخش در فرد می‌شود ارائه‌ی راه حل‌ها و پیشنهادها در موقعی گسترش برنامه فعالیت‌ها برای که فرد با نشانه‌های عود روبرو می‌شود تمرین قدم زدن ۳ دقیقه‌ای همراه با حضور ذهن	برنامه‌ی پیشگیری از عود

ارائهی تکالیف و جزوایت (با توجه به این که این تکالیف، آخرین تکلیف خانگی در دوره محسوب می‌شود، اجرای دقیق آن و گرفتن بازخورد در جلسه‌ی آخر بسیار مهم خواهد بود)

تمرین وارسی بدن

بازنگری تکالیف خانگی جلسه قبل (شامل نظام‌های هشداردهنده‌ی اولیه و برنامه‌های عمل)

انتخاب یک تمرین و انجام منظم و روزانه آن توجه به نشانگان احتمالی عود و استفاده از راهبردهای ارائه شده در جلسات و جزوایت ارائهی جزوایت جلسه آخر (شامل برنامه‌ها و پیشنهادها برای ادامه دادن تمرینات روزانه تمرینات و یادآوری نحوه رویارویی با نشانگان عود) پایان دادن به کلاس با انجام آخرین مراقبه

بازنگری مطالب
گذشته
استفاده از
جلسه
هشتم
دوره برای مواجهه با
مشکلات بعدی
دوهشتم آموخته‌های در طول

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش آمار توصیفی از محاسبه‌ی فراوانی، میانگین، انحراف معیار و میانگین‌های افتراقی و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل‌های کوواریانس یک طرفه و واریانس مختلط از نوع یک بین - یک درون (یکی از حالت‌های اندازه‌گیری مکرر) استفاده شده است. ضمناً برای انجام تجزیه و تحلیل‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید.

یافته‌های پژوهش

در جدول ۲ توصیف جمعیت‌شناسی نمونه، یعنی گروه‌های آزمایش و گواه ارائه شده است و بر این اساس بازه‌ی سنی افراد بین ۱۴ تا ۱۶ سال و تعداد آن‌ها ۳۲ نفر در گروه آزمایش و ۳۲ نفر در گروه گواه است.

جدول ۲. توصیف جمعیت‌شناسی گروه‌های آزمایش و گواه

بازه‌ی سنی	جنسیت	فرمودنی	گروه
۱۶-۱۴	مذکر	۲۲	آزمایشی
۱۶-۱۴	مذکر	۳۲	گواه

در جدول ۳ نتایج حاصل از آمار توصیفی ارائه و میانگین و انحراف استاندارد گروه‌های آزمایش و گواه مشخص شده است. بر اساس این نتایج مشاهده می‌شود که در گروه آزمایش میانگین نمرات اعتیاد به بازی‌های اینترنتی در حالت پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون کاهش پیدا کرده که این کاهش در گروه گواه بسیار کمتر است. البته برای مشخص شدن معنادار بودن نتایج باید از آمار استنباطی استفاده کرد. برای این کار با توجه به اینکه نتایج دو گروه آزمایش و گواه در حالت پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسش‌پذیر شده است، از تحلیل کوواریانس یک‌طرفه استفاده گردیده است. با توجه به استقلال مشاهدات، فاصله‌ای بودن متغیر وابسته، نرمال بودن داده‌ها (بر اساس آزمون کولموگروف - اسمیرنوف تک نمونه‌ای) و برابری واریانس‌ها (بر اساس آزمون F لوین) و همچنین همگنی شبیه رگرسیون، پیش‌فرض‌های مربوط به این تحلیل برقرار است.

جدول ۳. میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون اعتیاد به بازی‌های اینترنتی

در گروه‌های آزمایش و گواه

گروه	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد
آزمایشی	۶۵/۸۷۵	۴/۸۲۴	۵۲/۱۸۸	۸/۸۰۷	۶۴/۶۲۵	۵/۰۰۲
گواه	۶۴/۶۲۵	۵/۰۰۲	۶۱/۸۴۳	۶/۱۳۹		

جدول ۴. آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه اول

تعامل	df	میانگین مجددرات	F	sig	تخمین اندازه اثر
گروه	۱	۱۴۷۸/۲۸۶	۲۵/۲۴۶	۰/۰۰۱	۰/۲۹۳
خطا	۶۱	۵۸/۵۵۵			

با توجه به نتایج جدول ۴ تفاوت داده‌های مربوط به گروه آزمایش در حالت پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون نسبت به گروه گواه معنادار بوده ($p < 0.01$) و به این ترتیب فرضیه اول مبنی بر مؤثر درمان شناختی مبتنى بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نوجوانان تأیید شد.

حال برای بررسی نقش متغیرهای میانجی خودکترلی و هیجان خواهی، داده‌های مربوط به گروه آزمایش جداگانه نیز بررسی شده است. در جدول ۵ نتایج حاصل از آمار توصیفی برای گروه آزمایش در حالت‌های پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری ارائه شده است.

جدول ۵. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری آزمون اعتیاد به بازی‌های اینترنتی در گروه‌های آزمایشی

گروه	نام گروه	میانگین استاندارد	انحراف میانگین استاندارد	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیگیری
اول	خودکترلی بالا - هیجان خواهی بالا	۴/۹۵۷	۶۵	۴/۹۲۵	۵۳/۶۲	۴/۴۴۰
دوم	خودکترلی بالا - هیجان خواهی پایین	۵/۲۰۳	۶۶/۲۵	۴/۸۶۹	۶۳/۳۷۵	۴/۰۶۸
سوم	خودکترلی پایین - هیجان خواهی بالا	۵/۴۳۶	۶۶/۱۳	۳/۲۹۵	۴۲	۳/۸۹۱
چهارم	خودکترلی پایین - هیجان خواهی پایین	۴/۵۴۹	۶۶/۱۲	۴/۹۱۳	۴۹/۱۳	۳/۳۷۷

برای تبیین ساده‌تر داده‌ها، در جدول ۶ میانگین افتراقی متغیرها نیز ارائه شده است.

جدول ۶- میانگین افتراقی پیش آزمون-پس آزمون، پس آزمون-پیگیری و پیگیری - پس آزمون
در گروههای آزمایشی

گروه	نام گروه	میانگین های افتراقی	پیش آزمون-پیگیری	پس آزمون-پیگیری	پیش آزمون
اول	خودکنترلی بالا هیجان خواهی بالا	۱۱/۳۷۵	۰/۱۲۵	۱/۱۵	
دوم	خودکنترلی بالا هیجان خواهی پایین	۲/۲۵	۰/۶۲۵	۲/۸۷۵	
سوم	خودکنترلی پایین هیجان خواهی بالا	۲۴/۱۲۵	-۲/۵۰	۲۱/۶۲۵	
چهارم	خودکنترلی پایین هیجان خواهی پایین	۱۷	-۱/۲۵۰	۱۵/۷۵۰	

با توجه نتایج جدول ۵ و جدول ۶ میانگین نمرات در حالت پس آزمون نسبت به پیش آزمون در تمام گروهها کاهش داشته است اما در گروه دوم یعنی گروه خودکنترلی بالا-هیجان خواهی پایین این کاهش بسیار کم بوده است. برای بررسی معناداری نتایج باید از آمار استنباطی استفاده کرد. بدین منظور از تحلیل واریانس مختلط که حالتی از اندازه‌گیری مکرر است، استفاده شده و حالت‌های پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به عنوان متغیر درون آزمودنی و چهار سطح گروه آزمایش به عنوان متغیرهای بین آزمودنی در نظر گرفته شده‌اند.

در جدول ۷ نتایج حاصل از آزمون کرویت موچلی ارائه شده است، که با توجه به این که پیش‌فرضهای مربوط تحلیل کوواریانس در فرضیه‌ی اول بررسی شده بود و همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کرویت موچلی در جدول ۶، پیش‌فرضهای موردنیاز برای تحلیل واریانس مختلط نیز برقرار است.

جدول ۷- نتایج حاصل از آزمون کرویت موچلی

عوامل درون آزمودنی	W موچلی	خی دو تقریبی	df	sig
سطوح	۰/۹۹۷	۰/۰۸۰	۲	۰/۹۶۱

در جدول ۸ نتایج آزمون واریانس مختلط بیان شده است، با توجه به نتایج این جدول، تعامل بین سطوح متغیر درون آزمودنی (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) و همچنین تعامل کلی بین متغیر درون آزمودنی (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) و متغیر بین آزمودنی

(چهار سطح: خودکنترلی بالا - هیجان خواهی بالا، خودکنترلی بالا - هیجان خواهی پایین، خودکنترلی پایین - هیجان خواهی بالا، خودکنترلی پایین - هیجان خواهی بالا) معنی دار به دست آمد ($P < 0.01$)، بنابراین می‌توان گفت حداقل بین یکی از حالت‌های پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در چهار گروه، تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول ۸ نتایج آزمون واریانس مختلط

شاخص آماری اثر	آزمون	ارزش	<i>F</i>	<i>df</i> فرضیه	<i>df</i> خطای	<i>sig</i>	اندازه اثر
اثر پیلای	۰/۸۷۹	۰/۸۷۹	۹۸/۲۹۶	۲	۲۷	۰/۰۰۱	۰/۸۷۹
عامل درون	لامبایدی ویلکس	۰/۱۲۱	۹۸/۲۹۶	۲	۲۷	۰/۰۰۱	۰/۸۷۹
آزمودنی	اثر هتلینگ	۷/۲۸۱	۹۸/۲۹۶	۲	۲۷	۰/۰۰۱	۰/۸۷۹
	بزرگ‌ترین ریشه روی	۷/۲۸۱	۹۸/۲۹۶	۲	۲۷	۰/۰۰۱	۰/۸۷۹
تعامل عوامل بین	اثر پیلای	۰/۷۰۲	۵/۰۴۵	۶	۵۶	۰/۰۰۱	۰/۳۵۱
آزمودنی و درون	لامبایدی ویلکس	۰/۳۰۱	۷/۴۰۰	۶	۵۴	۰/۰۰۱	۰/۴۵۱
آزمودنی	اثر هتلینگ	۲/۳۱۱	۱۰/۰۱۵	۶	۵۲	۰/۰۰۱	۰/۵۳۶
	بزرگ‌ترین ریشه روی	۲/۳۰۷	۲۱/۵۳۲	۳	۲۸	۰/۰۰۱	۰/۶۹۸

در آزمون قبل مشخص نمی‌شود که کدام یک از گروه‌ها و در چه حالتی تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین برای مشخص شدن این موارد از آزمون مقایسه‌ی دویه‌دو نیز استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۹ قابل مشاهده است.

جدول ۹. مقایسه‌ی دویه‌دوی عوامل بین آزمودنی در سه حالت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری

گروه	افراقی استاندارد	افراقی استاندارد	افراقی sig	افراقی sig	میانگین خطای انحراف استاندارد	میانگین خطای انحراف استاندارد	پیش‌آزمون-پس‌آزمون	پیش‌آزمون-پیگیری	sig
خودکنترلی بالا	۱۱/۳۷۵	۲/۱۱۵	۰/۰۰۱	۰/۱۲۵	۲/۰۵۱	۱	۱۱/۵۰۰	۲/۱۴۹	۰/۰۰۱
هیجان خواهی بالا	۲/۲۵۰	۲/۱۱۵	۰/۸۹۰	۰/۶۲۵	۲/۰۵۱	۱	۲/۸۷۵	۲/۱۴۹	۰/۵۷۵
خودکنترلی پایین	۲۴/۱۲۵	۲/۱۱۵	۰/۰۰۱	-۲/۵۰	-۲/۰۵۱	۰/۶۹۹	۲۱/۶۲۵	۲/۱۴۹	۰/۰۰۱
هیجان خواهی پایین	۱۷	۲/۱۱۵	۰/۰۰۱	-۱/۲۵۰	-۲/۰۵۱	۱	۱۵/۷۵۰	۲/۱۴۹	۰/۰۰۱

بر اساس نتایج جدول ۹، در گروه خودکنترلی بالا - هیجان خواهی پایین، تفاوت در پیشآزمون نسبت به پسآزمون و همچنین پیگیری نسبت به پسآزمون معنادار نیست ($P > 0.05$)، و متغیر مستقل در این گروه (خودکنترلی بالا - هیجان خواهی پایین) تأثیر معناداری ایجاد نکرده است، ولی در سایر گروهها تأثیر متغیر مستقل معنی دار بوده است ($P < 0.01$).

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول ۸ و جدول ۹ متغیر مستقل یعنی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی های اینترنتی در تمام گروهها به جز گروه خودکنترلی بالا - هیجان خواهی پایین، تأثیر معنی داری داشته است؛ و همچنین با توجه نتایج جدول ۶ میانگین های افتراقی نمرات پسآزمون نسبت به پیشآزمون در گروه سوم بیشتر از سایر گروهها است، بنابراین می توان گفت متغیر مستقل در گروه سوم یعنی خودکنترلی پایین - هیجان خواهی بالا، بیشترین تأثیر را داشته است. به این ترتیب فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اثریخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی های اینترنتی از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی، تأیید می شود.

ضمناً از جدول ۹ به دست می آید که تفاوت به دست آمده در دوره پیگیری از نظر آماری معنادار نیست ($P > 0.05$) و نتایج در دوره پیگیری پایدار بوده است.

بحث و نتیجه گیری

اعتماد به بازی های اینترنتی به دلیل ناتوانی مداوم در کنترل عادت های بازی است که با مشکلات هیجانی و اجتماعی فرد نیز مرتبط است (لیمنز و همکاران، ۲۰۱۱). متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی نیز از متغیرهای بسیار مهم در رفتارهای اعتیادی به خصوص در دوره‌ی نوجوانی است (محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۶؛ شلی، ۲۰۰۵؛ ویلس و استولمیلر، ۲۰۰۲). درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، رویکرده‌ی است که توسط تیزدل و همکاران مطرح شد. این درمان که یک مداخله کوتاه‌مدت و ساختار یافته است به افراد مهارت‌هایی را آموخته می دهد که بدون هیچ گونه قضاوتی بتوانند از افکارشان آگاه شوند و همچنین قادر باشند به جای افکار منفی، افکار مثبت یا خشنی را به عنوان انعکاسی از واقعیت در نظر

بگیرند (کرین، ۲۰۰۹). هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی بوده است.

در این پژوهش به نوجوانان وابسته به بازی‌های اینترنتی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد و افراد حاضر با آموختن تکنیک‌های ذهن آگاهی و انجام تمرینات مربوط به آن، یاد گرفتند که در مواجهه با بازی‌های اینترنتی به جای این که از راهبردهای ناکارآمد برای مقابله با احساسات و تجربه‌ی خشم، تنفس، اضطراب، تحریک‌پذیری و فقدان کنترل، استفاده کنند، از طریق متمرکر کردن توجه خود بر روی بدن، تجارب درونی خود را به شکلی که واقعاً هستند بدون این که مورد قضاوت قرار دهند، به طور کامل تجربه کرده و ظرفیت پردازش بیشتر اطلاعات و دیدگاه فاقد قضاوت را در خود افزایش دهند؛ و ضمن لذت بردن از بازی‌ها از وابستگی به آنها و ضررها فراوانی ناشی از آن در خود، بکاهند.

بر اساس جداول ۴، ۶، ۸ و ۹ اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازی‌های اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی مورد تأیید قرار گرفت. این نتیجه با پژوهش مهروف و گریفیث (۲۰۱۰)، که در آن به این نتیجه رسیدند که پنج متغیر هیجان خواهی، خودکنترلی، مشکلات نوروتیکی، پرخاشگری و اضطراب نقش مهمی در اعتیاد به بازی‌های اینترنتی دارد و با پژوهش سلطانی و همکاران (۱۳۸۹) که در آن نشان داده بود هیجان خواهی به طور مستقیم بر اعتیاد به اینترنت مؤثر است و همچنین با پژوهش جانسون^۱ (۲۰۱۴) که به این نتیجه رسیده بود که ذهن آگاهی از طریق میانجی گری خودتنظیمی و تکانش گری، انجام رفتارهای پرخطر را کاهش می‌دهد و همچنین با پژوهش اندریسن^۲ و همکاران (۲۰۱۷) که نشان داده بودند که دانش آموز بودن و پایین بودن خودباعری با بالاتر بودن اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت رابطه دارد؛ همسوست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق

^۱. Johansen

^۲. Andreassen

افزایش خودکنترلی و کاهش هیجان خواهی، در نوجوانان وابسته به بازی‌های اینترنتی، باعث کاهش اعتیاد به این بازی‌ها در آن‌ها شده است.

در تبیین این نتیجه این طور می‌توان گفت که افراد با نمره‌ی هیجان خواهی بالا، نیاز به برآورده کردن احساسات و تجربه‌های جدید، گوناگون و پیچیده، دارند و مدام در پی تنوع بخشیدن به زندگی خود هستند که گاه منجر به انجام رفتارهای پرخطر نیز می‌شود. حال با توجه به ویژگی‌های خاص بازی‌های اینترنتی از جمله، دسترسی بسیار ساده به آن‌ها، تنوع بازی‌های بر اساس سلاطیق هر فرد، و از همه مهم‌تر بی‌انتها بودن مراحل آن؛ نوجوانانی که دارای هیجان خواهی بالایی هستند به وسیله‌ی انجام این بازی‌ها از طرفی حس تنوع‌طلبی و هیجان خواهی خود را ارضاء کرده و از طرف دیگر هم با استراکت‌گذاری این بازی‌ها و صحبت کردن در مورد آن با دوستان و آشنايان در مدارس یا میهمانی‌های خانوادگی اعتماد به نفس، ابراز وجود و قدرتمندی خود را بروز می‌دهند؛ بنابراین، این نوجوانان سعی می‌کنند قدرت خود را در بازی‌ها هرچه بیشتر افزایش دهند که این هم از هیچ راهی جز انجام هرچه بیشتر بازی و آنلاین بودن در محیط آن میسر نمی‌شود و به این ترتیب منجر به واپستگی آن‌ها به این بازی‌های می‌شود. افرادی که خودکنترلی پایینی نیز دارند، تلاش‌های ناموفق زیادی برای کاهش اعتیاد به بازی‌ها انجام داده‌اند اما دوباره به آن بازگشت کرده‌اند و به این ترتیب در بسیاری از موارد به درمان‌گی آموخته‌شده، دچار شده‌اند؛ چراکه فرد کم کم به این نتیجه می‌رسد که تلاش برای توقف این بازی‌های بی‌فایده است و دیگر نمی‌تواند از آن جدا شود و حتی اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهد.

حال دستاوردهای آموزش ذهن آگاهی برای این افراد به همراه دارد این است که بدون منع کامل آن‌ها از بازی کردن به آن‌ها کمک می‌کند که ضمن تجربه‌ی لذت بازی ابتدا بتوانند از احساسات و هیجانات خود آگاه شوند و درنهایت نیز آن را مدیریت کنند. این افراد با اجرای تمرینات ذهن آگاهی صبر و تحمل خود را بالا برده و نیاز به تنوع‌طلبی را در خود کاهش می‌دهند. در آموزش ذهن آگاهی ابتدا از توجه به تنفس که همیشه در دسترس فرد و همراه فرد است، استفاده می‌شود تا فرد بفهمد که در همه حال حداقل می‌تواند به تنفس و به بدن خود توجه کند و از این طریق به احساسات و تفکرات و قضاوت‌های خود نیز راه

یابد و نهایتاً آن‌ها را مدیریت کند. به این ترتیب دیگر خود را سرزنش نمی‌کند و گرفتار دور بی‌پایان تلاش ناموفق و بازگشت به حالت قبل نمی‌شود.

از دیگر نتایج این پژوهش این بود که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی افرادی که به بازی‌های اینترنتی وابسته بوده اما دارای هیجان خواهی پایین و خودکنترلی بالایی بودند، اثربخشی معناداری نداشت. در تبیین این مورد نیز می‌توان گفت که با توجه به این که در آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، مثل سایر درمان‌های شناختی انجام تمرینات روزانه مهم‌ترین رکن فرایند درمان است و از طرفی فرد باید با کنجکاوی و انگیزه به دنبال تغییر باشد؛ این افراد با کنجکاوی کمتری به پیرامون خود توجه دارند و از طرفی میل به تغییر یا نیاز به تغییر در آن‌ها کمتر بوده و احتمالاً در انجام تمرینات سهل‌انگاری کرده و یا آن را بیهوده تلقی می‌کنند و به این ترتیب از این درمان استفاده‌ی چندانی نمی‌برند.

از محدودیت‌های این پژوهش، بود پیشینه‌ی پژوهشی داخلی بر روی اعتیاد به بازی‌های اینترنتی و همچنین استفاده از نمونه‌ی در دسترس بود؛ بنابراین برای تعمیم بهتر نتایج پیشنهاد می‌شود که این پژوهش در مناطق و شهرهای دیگر و بر روی هر دو جنس، یعنی هم دانش آموزان پسر و هم دانش آموزان دختر اجرا گردد. ضمناً بر اساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود که آموزش‌پرورش در دوره‌های متوسطه ۱ و ۲، نسبت به اعتیاد به اینترنت، به خصوص اعتیاد بازی‌های اینترنتی در نوجوانان توجه ویژه‌ای داشته باشد و مشاورین مدرسه را در این زمینه آموزش داده تا بتوانند با اجرای پرسشنامه‌های مربوط، افراد در معرض خطر را شناسایی کرده و با آموزش پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، در کلاس‌های مشاوره یا با ارجاع به کلینیک‌های تخصصی، به دانش آموزان در معرض خطر، کمک کنند.

منابع

- اطلسی، رقیه؛ نریمانی، محمد و موسی زاده، توکل. (۱۳۹۳). مقایسه‌ی اثربخشی حساست زدایی با حرکات چشم و باز پردازش مجدد با درمان فراشناختی بر خودکنترلی بیماران مبتلا به حملات هراس. *مجله علوم رفتاری*، ۸(۳)، ۲۶۳-۲۶۹.
- برجعلى، احمد. (۱۳۹۲). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات والد-فرزنده‌پروری در نوجوانان. *مجله علوم رفتاری*، ۱، ۱-۶.
- پناه علی، امیر؛ محمدی نژاد قوشی، رحمان؛ عبدالی سلطان احمدی، جواد و اسدی، محسن. (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنت. *پژوهش‌های مشاوره*، ۱۱(۴۱)، ۱۳۵-۱۵۰.
- سلطانی، مهری؛ فولادوند؛ خدیجه و فتحی آشتیانی، علی. (۱۳۸۹). رابطه‌ی هویت و هیجان خواهی با اینترنت. *مجله علوم رفتاری*، ۴(۳)، ۱۹۷-۱۹۱.
- شامانی، اسماعیل؛ واحدی، مهدی و نوروزی، داریوش. (۱۳۹۵). رابطه‌ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران. *فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی*، ۷(۲۸)، ۱۶۴-۱۸۲.
- صیادپور، زهره. (۱۳۷۳). بررسی تحول مفهوم خانواده در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. *مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی*، ۱، ۲۶۳.
- علوی، سید سلمان؛ اسلامی، مهدی؛ مرآتی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتی فرد، فرشته و رضایپور، حسین. (۱۳۸۹). بررسی ویژگی‌های روان‌سننجی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ در کاربران دانشجو. *فصلنامه علوم رفتاری*، ۴(۳)، ۱۸۹-۱۸۳.
- علوی، سید سلمان و جنتی فرد، فرشته. (۱۳۹۰). اعتیاد به اینترنت، تعاریف، ابعاد، معیارهای تشخیصی و پیامدهای منفی ناشی از آن. چاپ اول. اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

محمدخانی، پروانه؛ تمنائی فر، شیما و جهانی تابش، عذرای. (۱۳۸۵). درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی: رویکردی نوین در پیشگیری از عود افسردگی. تهران: نشر فرادید.

محمدخانی، شهرام؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبائی، محمود. (۱۳۸۶). بررسی اثر مستقیم بازخورد نسبت به مصرف مواد، کانون کنترل و توانمندی‌های فردی و اجتماعی بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. دو فصلنامه روان‌شناسی معاصر، ۲(۳)، ۱۲-۳.

محوی شیرازی، مجید. (۱۳۸۷). بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ. دوماهنامه دانشور رفتار، ۱۵(۲۸)، ۳۵-۴۸. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما). بازیابی شده، اردیبهشت، ۱۳۹۴، <http://matma.ito.gov.ir/web/guest/internet-penetration-rate> ناستی زایی، ناصر. (۱۳۸۸). ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت. مجله طبیب شرق، ۱۱(۱)، ۶۳-۵۷.

هادی، سعیده؛ اسکندری، حسین؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبدالله و فرخی، نورعلی. (۱۳۹۵). مدل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای روابط فرازنashویی عاطفی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، ۷(۲۸)، ۳۳-۶۰. یوسفیان، فهیمه و اصغری پور، نگار. (۱۳۹۲). مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان گروهی شناختی رفتاری بر عزت نفس دانش آموزان دختر. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۵(۳)، ۲۰۵-۱۵.

Aboujaoude, E., Koran, L. M., Gamel, N., Large, M. D., & Serpe, R. T. (2006).

Potential markers for problematic internet use: a telephone survey of ۲۵۱۳ adults. *CNS spectrums*, ۱۱(۱۰), ۷۵۰-۷۵۵.

American Psychiatric Association. (۲۰۱۳). American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA.

- Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (۲۰۱۷). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. *Addictive Behaviors*, ۶۴, ۲۸۷-۲۹۳.
- Blume, A. W. (۲۰۰۵). *Treating drug problems*. New York: John Wiley.
- Bowen, S., Chawala, N. & Marlatt, G. A. (۲۰۱۱). Mindfulness-based relapse prevention for addictive behaviors: A clinician's guide, Guilford Press.
- Butler, T. (۲۰۰۰). *Principles of health education and health promotion*. New York: Morton Publishing Company.
- Chen, J. V., Chen, C. C., & Yang, H. (۲۰۰۸). An empirical evaluation of key factors contributing to internet abuse in the work place. *Industrial Management & data system*, ۱۰۸(۱), ۸۷-۱۰۷.
- Christakis, D. A. (۲۰۱۰). Internet addiction: A ۲۱st century epidemic. *Bmc Medicine*, ۸(۶۱).
- Crane, R. (۲۰۰۹). *Mindfulness-based cognitive therapy*. NEW YORK: Routledge, ۲-۱۵.
- Fallah Mehneh, T. (۲۰۰۵). Disorder of internet addiction. *Psychology of Internet*, ۱, ۲۶-۳۱.
- Garland, E. L., Schwarz, N. R., Kelly, A., Whitt A. & Howard, M. O. (۲۰۱۰). Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement for Alcohol Dependence: herapeutic Mechanisms and Intervention Acceptability. *Journal of Social Work Practice in the Addictions*, ۱۲(۲), ۲۴۲-۲۶۳.
- Goleman, D. (۲۰۰۱). Emotional Intelligence: Issues in Paradigm Building, From the book The Emotionally Intelligent Workplace.
- Griffiths, M. D., Davies, M. N. O. & Chappell, D. (۲۰۰۴). Online computer gaming: A comparison of adolescent and adult gamers. *Journal of Adolescence*, ۲۷, ۸۷-۹۷.
- Griffiths, M., & Wood, R. (۲۰۰۰). Risk factors in adolescence: The case of gambling, videogame playing, and the internet. *Journal of Gambling Studies*, ۱۶, ۱۹۹-۲۲۵.
- Jackson, K. M., Sher, K. J. & Wood, P. K. (۲۰۰۰). Prospective analysis of co morbidity: Tobacco and alcohol use disorder. *Abnorm Psychol*, ۱۰۹, ۶۷۶-۶۹۴.

- Johansen, S. V. L. (۲۰۱۴). *Sensation seeking and impulsivity in relation to youth decision making about risk behavior: Mindfulness training to improve self-regulatory skills*. In partial fulfillment of the requirements For the Degree of Doctorate of Philosophy. Colorado State University Fort Collins, Colorado.
- Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (۲۰۱۱). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. *Clin Psychol Rev*, ۳۱(۶), ۱۰۴۱-۵۶.
- Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T. & Kim, S. J. (۲۰۰۸). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. *European Psychiatry*, ۲۳(۳), ۲۱۲-۲۱۸.
- Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. S., Yeh, Y. C. & Yen, C. F. (۲۰۰۹). Predictive values of psychiatric symptoms for internet addiction in adolescents: A ۲-year prospective study, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, ۱۶۳, ۹۳۷-۹۴۳.
- Kuss, D. J., Shorter, G. W., van Rooij, A. J., Griffiths, M. D., & Schoenmakers, T. M. (۲۰۱۴). Assessing internet addiction using the parsimonious internet addiction components model—a preliminary study. *International Journal of Mental Health and Addiction*, ۱۲(۳), ۳۵۱-۳۶۹.
- Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M. & Peter, J. (۲۰۰۹). Development and Validation of a GameAddiction Scale for Adolescents. *Media Psychology*, ۱۲(۱), ۷۷-۹۵.
- Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M. & Peter, J. (۲۰۱۱). The effects of pathological gaming on aggressive behavior. *Journal of Youth and Adolescence*, ۴۰ (۱), ۳۸-۴۷.
- Leung, L. & Lee, P. S. N. (۲۰۱۲). The influences of information literacy, internet addiction and parenting styles on internet risks. *New Media & Society*, ۱۴(۱), ۱۱۷-۱۳۶.
- Mehroof, M., & Griffiths, M. D. (۲۰۱۰). Online gaming addiction: the role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, ۱۳(۳), ۳۱۳-۳۱۶.

- Mei, S., Yau, Y. H. C., Chai, J., Guo, J., & Potenza, M. N. (۲۰۱۶). Problematic Internet use, well-being, self-esteem and self-control: Data from a high-school survey in China. *Addictive Behaviors*, ۶۱, ۷۴-۷۹.
- Murali, V., & George, S. (۲۰۰۷). An over view of internet addiction. *Adv psychosom*, ۱۳, ۲۴-۳۰.
- Niemz, K., Griffiths, M. & Banyard, P. (۲۰۰۵). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the general health questionnaire (GHQ), and disinhibition. *Cyberpsychology & Behavior*, ۸(۶), ۵۶۲-۵۷۰.
- Pacini, R., & Epstein, S. (۱۹۹۹). The relation of rational and experiential information processing styles to personality, basic beliefs and the ratio-bias phenomenon. *J Pers Soc Psychol*, ۷۹, ۹۷۷-۹۸۷.
- Potek, R. (۲۰۱۲). *Mindfulness as a school-based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation*, Ph.D. NEW YORK, UNIVERSITY, ۱۸۴.
- Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (۲۰۰۲). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression: A new approach to preventing relapse: Guilford Publication.
- Sally, M. L. (۲۰۰۶). Prediction of internet Addiction for undergraduates in Hong Kong. Kong Baptist University.
- Shelly, S. K. (۲۰۰۵). Illegal download attitudes, leisure boredom, sensation seeking and value of honesty, Degree of Master of Science in New Media, School of Journalism and Communication, the Chinese University of Hong Kong.
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (۲۰۰۴). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades and interpersonal success. *Journal of Personality*, ۷۲, ۲۷۱-۳۲۴.
- Wills, T. A. and Stoolmiller, M. (۲۰۰۲). The role of self-control in early escalation of substance use, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, ۷۰, ۹۸۶-۹۹۷.
- Wupperman, P., Marlatt, G. A., Cunningham, A., Bowen, S., & Berking, M. (۲۰۱۲). Mindfulness and modification therapy for behavioral ysregulation: results from a pilot study targeting alcohol use and aggression in women. *Journal of Clinical Psychology*, ۶۸(۱), ۵۰-۶۶.

Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensationseeking*. New York: Cambridge University Press.

Archive of SID