

## توانایی محاسبات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه

ابراهیم نصیری<sup>\*</sup> MSc<sup>1</sup> حسین باباتبار درزی<sup>1</sup> MSc<sup>2</sup> یوسف مرتضوی<sup>2</sup>

<sup>\*</sup> دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

<sup>۱</sup> دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله<sup>(ع)</sup>، تهران، ایران

<sup>۲</sup> دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابل، ایران

### چکیده

**اهداف:** ارایه شکل‌های مختلف داروها، بهویژه شکل محلول آنها که به صورت میلی‌گرم، میلی‌اکی‌والان یا غلظت/درصد مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً توسط پرستاران به بیمار عرضه می‌شود می‌تواند منشاً وقوع خطا باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی خطای محاسبات داروهای محلول مورد مصرف در بخش مراقبت ویژه انجام شد.

**روش‌ها:** در این مطالعه توصیفی، جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل دادند. ۳۶ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات دموگرافیک و پنج سؤال اختصاصی در مورد سه داروی اصلی مورد مصرف در موارد بحرانی بهروش حضوری پاسخ دادند. پاسخ‌ها در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب ارزیابی شدند.

**یافته‌ها:** توانمندی اکثریت پرستاران مراقبت ویژه برای محاسبه میزان داروها در حد متوسط است (۵۵/۵٪). تفاوت قابل‌لاحظه‌ای بین پرستاران زن و مرد برای محاسبه داروها وجود نداشت.

**نتیجه‌گیری:** قادرت محاسبه پرستاران در ارتباط با داروهایی که واحدی غیر از میلی- یا میکروگرم دارند ضعیف یا متوسط است و خطای زیادی در محاسبات این داروها دارند. لذا پیشنهاد می‌شود آموزش‌هایی لازم‌ضمن خدمت برای کلیه پرستاران ویژه در حیطه محاسبات دارویی ارایه شده و در آموزش پرستاری به این مساله توجه بیشتری شود.

**کلیدواژه‌ها:** مراقبت ویژه، خطای دارویی، پرستاران، قادرت محاسبه دارویی

## Nurses' drug calculation ability in intensive care unit (ICU)

Nasiri E.<sup>\*</sup> MSc, Babatabar H. D.<sup>1</sup> MSc, Mortazavi Y.<sup>2</sup> MSc

<sup>\*</sup>Faculty of Paramedicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>۱</sup>Faculty of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

<sup>۲</sup>Paramedicine Faculty, Msc Intensive Care, Drug error, Nurses, Drug Calculation Ability

### Abstract

**Aims:** Serving multiform of drug concentration/percent, mostly by nurses investigate nurses' calculation error related to ICU.

**Methods:** In this descriptive study, 36 nurses of Mazandaran university of medical sciences' hospitals completed a questionnaire about three main drugs used in critical condition.

**Results:** Most ICU nurses (55/5%) drug calculation ability was moderate. There were no significant difference between male and female nurses in drug calculation ability.

**Conclusion:** Nurses' drug calculation ability in non milli- or microgram unit drugs is low or moderate and they do lots of mistakes. So, it is suggested that all of ICU nurses should learn about drug calculation and attend in some related educational classes.

**Keywords:** Intensive Care, Drug error, Nurses, Drug Calculation Ability

sed in milligram, milliecivalan or calculation error. This study performed to n ICU.

U nurses of Mazandaran university of demographic and 5 questions about the ated to three levels (low, moderate and good).

**مقدمه**

ویژگی بخش‌های خاص، مانند اتفاق عمل و بخش مراقبت ویژه، که در آن بیماران نیاز به درمان و مراقبت‌های دقیق و لحظه‌به‌لحظه دارند و انتظار پدید آمدن شرایط اضطراری و بحرانی، همواره دغدغه کارکنان درمانی و مراقبت‌کننده از بیماران است. به علت شرایط حساس و پیچیده‌ای که در کنترل وضعیت بیماران بدحال وجود دارد و مرگ‌ومیر بالاتر آنها نسبت به بیماران بخش‌های دیگر بیمارستانی، تنیدگی‌های شغلی مضاعفی بر فرآیندهای درمانی و مراقبتی وارد شده و ممکن است موجب افزایش خطأ در عملکرد مراقبتی بیماران شود [۱، ۲]. پرستاران به علت تداوم حضور در بخش‌های ویژه، جایگاه مهمی در چگونگی سیر بهبود بیماران بدحال نیازمند مراقبت لحظه‌به‌لحظه دارند. خطای مربوط به تزریق داخل وریدی، استفاده نادرست از وسایل و تکنیک‌ها، خطای محاسبات دارویی و موارد دیگر در مطالعات مختلف گزارش شده است. در بین انواع خطاهای، اشتباها محاسباتی مربوط به داروها بیشتر گزارش شده‌اند [۲]. علاوه بر خطاهای سهوی و احتمالی موجود در همه بخش‌های بیمارستانی، به‌ویژه ICU، شکل‌های مختلف داروها، ممکن است موجب اشتباه در محاسبات دوز ارایه شده به بیمار گردد.

از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق داروها بر اساس وزن ماده دارویی و محاسبه آن بر اساس وزن بیمار تجویز می‌شوند و از طرف دیگر، در تعداد زیادی از داروهایی که به شکل آمپول هستند، غلظت دارو در حلال به شکل میلی‌گرم/میکروگرم در میلی‌لیتر مشخص شده، میزان دارویی مورد نیاز بیماران به تناسب وزن، به‌راحتی و به‌طور دقیق و سریع قابل تبیین و محاسبه است. اما بعضی از داروهای مهم و کاربردی در ICU از این وضعیت پیروی نمی‌کنند و بر اساس رقت، میلی‌اکی‌والان یا به‌صورت غلظت‌درصد (به‌عنوان مثال، آدنالین ۱:۱۰۰۰، لیدوکائین ۱٪، محلول بیکربنات‌سدیم ۸/۴٪) که از داروهای مهم در موارد اورژانس پزشکی هستند و در شرایط بحرانی مثل احیای قلبی-ریوی یا در ICU مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرند در آمپول یا ویال مربوطه قرار دارند [۳]. معمولاً این داروها، توسط پرستاران آماده شده و به بیماران ارایه می‌شوند. اهمیت دقت در محاسبه این داروها و داروهای مشابه، بسیار زیاد است. اثربگذاری متفاوت داروها در دوزهای متفاوت و عوارض خطرناک و جبران ناپذیر بالقوه آنها موجب شده تا تمهداتی برای کاهش خطاهای محاسباتی صورت پذیرد. با توجه به ضرورت آمادگی پرستاران به‌عنوان اولین نیروهای درمانی و مراقبتی که با شرایط بحرانی مواجه می‌شوند و اهمیت به کارگیری مراقبتی که با شرایط بحرانی مواجه می‌شوند و اهمیت به کارگیری دقیق و درست داروها در حداقل زمان ممکن، این مطالعه به منظور تعیین میزان خطای محاسبات داروهای محلول مورد استفاده در بخش‌های ویژه انجام شد.

**روش‌ها**

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش توصیفی، پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند. ۳۶ نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌ای پژوهشگرساخته پاسخ دادند. پرسش‌نامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و پنج سؤال اختصاصی در مورد سه داروی مهم و مورد استفاده در موارد بحرانی احیای قلبی- ریوی در بخش‌های ویژه بود که به اشکال مختلف غلظت‌درصد و میلی‌اکی‌والان (این‌فرین، لیدوکائین، بیکربنات‌سدیم) مورد استفاده قرار می‌گیرند. روایی این پرسش‌نامه بر اساس منابع و مطالعات قبلی و اخذ نظر متخصصین از نظر محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن بعد از انجام مطالعه‌ای آزمایشی روی پنج نفر از پرستاران طی دو هفته با آزمون مجدد و همبستگی بالای ۰/۸ مورد قبول واقع شد. جمع‌آوری داده‌ها به روش حضوری انجام شد. پاسخ‌ها در سه سطح "ناتوان و ضعیف" (کمتر از یک یا یک پاسخ صحیح)، "متوسط" (دو یا سه پاسخ صحیح) و "خوب" (چهار یا پنج پاسخ صحیح) ارزیابی شد. برای هر سؤال، پاسخ به‌صورت صحیح یا اشتباه در نظر گرفته شد. از آزمون مبنی‌ذور کای برای تجزیه و تحلیل و بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.

**نتایج**

۳/۸٪ از واحدهای پژوهش زن و ۱۷٪ مرد بودند. میانگین سالگه کار آنان ۷ سال (حداقل یک و حداکثر ۱۴ سال) بود. تمامی نمونه‌های مورد پژوهش حداقل یکبار و حداکثر بیش از ۲۰ مورد، با بحرانی که نیاز به احیای قلبی- ریوی داشته و داروهای مورد مطالعه این پژوهش در مورد آنها استفاده شده بود، روپرتو شده و از این داروها استفاده کرده بودند.

اکثریت پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه برای محاسبه میزان داروها در حد "متوسط" هستند. تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین زنان و زیادی در محاسبه دارویی داشتند. تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین زنان و مردان برای محاسبه داروها وجود نداشت. همچنین تفاوت معنی‌داری بین ساقه کار و توانمندی محاسبه داروها مشاهده نشد. ۱۰۰٪ پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه حداقل یک مورد خطأ در محاسبه دارویی در ساقه خود داشتند. جداول ۱ تا ۳ نتایج تحقیق را نشان می‌دهند.

**جدول ۱)** توزیع فراوانی روپرتو شدن پرستاران با تعداد بیماران بدحالی که نیاز به داروهای مورد مطالعه داشتند.

تعداد مواجه	تعداد درصد
%۴۴	۱۶
%۳۳	۱۰
%۳۳	۱۰

تزریق مقادیر نادرست دارو باعث اختلال در فرآیند درمان و حتی تبعات خطرناکتر شود. سانتاناریا و همکاران گزارش کردند که ۵۸٪ پرستاران قادر به محاسبه دوز دارویی صحیح نیستند [۲]. همچنین بینالبر و همکاران نتیجه‌های مشابه با مطالعه حاضر داشتند و گزارش کردند که ۸۱٪ از پرستاران قادر به محاسبه دارویی به طور صحیح نیستند [۶]. با توجه به حساسیت‌های استفاده از داروهای خاص در موقعیت‌های بحرانی که توسط پرستاران انجام می‌گیرد و اثرگذاری بعضی از داروهای با مقادیر کم مثل اپی‌نفرین و نیترو‌گلیسیرین و اختلاف کم بین حداقل و حداقل دوز دارو مثل دوپامین، امکان خطای زیاد برای پرستاران وجود ندارد و تنبیه‌گی حاصل از مسئولیت نیز می‌تواند به افزایش میزان خطای محاسبات دارویی کمک کند. روش‌های معمول محاسبه دارو که به صورت میلی‌گرم یا میکرو‌گرم برای هر کیلو وزن مریض انجام می‌گیرد درصد خطای کمتری را موجب می‌شوند و نتیجه این پژوهش در راستای دیگر مطالعات نشان می‌دهد که شکل خاص داروهای محلول که به صورت غلظت/درصد یا میلی‌اکی‌والان هستند، قدرت محاسبه پرستاران را تا حد "متوسط" کاهش می‌دهند و خطای زیادی را باعث می‌شوند. لذا پیشنهاد می‌شود که اولاً، آموزش‌های لازم ضمن خدمت برای کلیه پرستاران در حیطه محاسبات دارویی ارایه و در آموزش پرستاری به این مساله توجه بیشتری شود؛ و ثانیاً در صورت امکان، شرکت‌های سازنده دارویی، واحدهای واضح‌تری برای داروهای محلول به صورت آپیول یا ویال در نظر بگیرند که مبهم و گیج‌کننده نباشد.

### منابع

- 1- Coomber S, Todd C, Park G, Baxter P, Firth-Cozens J, Shore S. Street in UK intensive care unit doctors. Br J Anaesthesia. 2002;89(6):873-81.
- 2- Santamaria N, Norris H, Claton L, Scott D. Drug calculation competencies of graduate nurses. Collegian Gul. 1997;4(3):18-21.
- 3- Flaatten H, Hevroy O. Errors in the intensive care unit (ICU). Acta Anaesthesiologica. 1999;43(6):614-16.
- 4- Sarah B, Vittone RN. Ethics in the ICU. Crit Care Nurs Clin N Am. 2002;14:157-63.
- 5- Cartwright M. Numeracy needs of the beginning registered nurse. Nurse Educ Today. 2002;16(2):137-43.
- 6- Bindler R, Bayne T. Medication calculation ability of registered nurses. Image J Nurs. 1999;23(4):221-4.

**جدول ۲)** توزیع فراوانی وضعیت پاسخ مربوط به محاسبات داروها توسط پرستاران ICU

وضعیت محاسبه	تعداد درصد نتیجه	بدون پاسخ صحیح	ناتوان
فقط یک پاسخ صحیح	۲۲	۸	ضعیف
دو یا سه پاسخ صحیح	۵۵/۵	۲۰	متوسط
چهار پاسخ صحیح یا بیشتر	۲۲	۸	خوب

**جدول ۳)** توزیع پاسخ به محاسبه داروها توسط پرستاران ICU به تفکیک سوالات اختصاصی

سوالات اختصاصی	موارد صحیح	موارد درصد درصد غلط	موارد درصد درصد غلط
چند میلی‌گرم آدنالین در ۴ میلی‌لیتر محلول ۱:۱۰۰ وجود دارد؟	۷۸	۲۸	۲۲ ۸
چند میلی‌گرم بیپیواکائین در ۱۰ میلی‌لیتر لیوکائین ۱٪ وجود دارد؟	.	.	۱۰۰ ۳۶
چند میلی‌لیتر محلول ۸/۴٪ وجود دارد؟ میلی‌لیتر محلول سدیم در ۱۰۰	۹۴	۳۴	۶ ۲
چند میلی‌گرم آدنالین در ۱۰ میلی‌لیتر آمپول بیپیواکائین ۰/۰۲۵٪ همراه با محلول آدنالین با غلظت ۱:۲۰۰۰۰ وجود دارد؟	۶۷	۲۴	۳۳ ۱۲
چند میلی‌لیتر از محلول برای به دست آوردن یک میلی‌گرم آدنالین مورد نیاز است؟	۲۸	۱۰	۷۲ ۲۶

### بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به تنوع و تفاوت شرایط بیماران از نظر وزن و جنس و حساسیت‌های محیطی حاکم بر ICU و بحران‌های متعدد بر بالین بیماران بخش‌های مراقبت ویژه، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که قدرت محاسبه دوز داروهای رقیق شده در آپیول یا داروهایی که به صورت غلظت/درصد آماده می‌شوند (در واقع بر اساس (میلی‌گرم/میکرو‌گرم در میلی‌لیتر) تنظیم و آماده نمی‌شوند) از طرف پرستاران بخش مذکور "متوسط" یا "ضعیف" بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه بیش از ۷۷٪ پرستاران در محاسبه دوز داروها وضعیت "متوسط" یا "ضعیف" دارند. در چنین شرایطی، ممکن است در اجرای عملیات‌های درمانی و مراقبتی مثل احیاء و شرایط اورژانسی دیگر،