

مطالعه اضطراب و عوامل محیطی و روانی تاثیرگذار بر آن در خانواده‌های بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

سهیلا ربیع سیاهکلی MSc*، آذر آوازه MSc¹، فریدون اسکندری MSc²، طاهره خالق دوست محمدی MSc³، سعیده مظلوم PhD⁴، عزت پاریاد MSc³

^{1*} دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
² بیمارستان آیت اله موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
³ دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
⁴ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب اثرات مخربی بر افراد می‌گذارد، از این رو این مطالعه با هدف تعیین میزان اضطراب و عوامل محیطی و روانی تأثیرگذار بر اضطراب خانواده‌های بیماران بستری در بخش ویژه انجام شد.

روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1386 انجام شد، 218 نفر از خانواده‌ی 130 بیمار بستری به روش نمونه‌گیری آسان در ساعات ملاقات مراکز آموزشی درمانی مورد نظر انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه "ابزار اضطراب و افسردگی بیمارستانی استاندارد شده" و "محقق ساخته" انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک توسط نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: شانس بروز اضطراب در افرادی که اظهار داشتند انجام ملاقات از پشت شیشه در اضطرابشان تأثیر دارد، 4/4 برابر افرادی بود که ملاقات از پشت شیشه تأثیری در ایجاد اضطراب آنان نداشت (OR=4/404). همچنین شانس بروز اضطراب در موارد عدم ملاقات حضوری با بیمار، وضعیت اقتصادی ضعیف، نگرانی خانواده از هزینه بیمارستان و تغییر نقش افراد خانواده به ترتیب 3/550، 2/501، 3/904، 4/308 برابر بود.

نتیجه‌گیری: مشاهده لوله‌ها و اتصالات، ملاقات از پشت شیشه و عدم ملاقات حضوری، وضعیت اقتصادی ضعیف و نگرانی خانواده در خصوص هزینه و تغییر نقش از عوامل تأثیرگذار در افزایش شانس بروز اضطراب خانواده‌ها است. توجه به این عوامل و خانواده محور نمودن مراقبت‌ها می‌تواند به میزان قابل‌ملاحظه‌ای اضطراب خانواده‌ها را کاهش دهد.

واژگان کلیدی: اضطراب، خانواده‌ی بیماران، بخش مراقبت ویژه.

A Survey on Psychological and Environmental Factors on Family Anxiety of the Hospitalized Patients in Intensive Care Units

Rabie Siahkali S.* MSc, Avazeh A.¹ MSc, Eskandari F.² MSc, Khalegh doost Mohamadi T.³ MSc, Mazloom S.⁴ PhD, Paryad E.³ MSc

¹ School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

² Ayatollah Moosavi Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

³ Shahid Beheshti School of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

⁴ School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Abstract

Introduction: Anxiety has many devastating effects on the individuals, so this study aimed to determine anxiety level and psychological and environmental factors on anxiety of the family of the patients hospitalized in Intensive Care Units.

Methods: This was a cross-sectional study conducted in 2007. 218 family members of 130 patients were selected in simple sampling method in meeting times of the Therapeutic Educational Centers. Collecting the data was done using two questionnaires: "standardized hospital anxiety and depression scale" and "researcher made". The data were analyzed using chi-square test and logistic regression through software SPSS 15.

Results: The odds ratio of anxiety outbreak in individuals who remarked that visiting behind the window affect their anxiety was 4.4 times more than that in the individuals who remarked visiting behind the window does not affect their anxiety (OR = 4.404). In addition, the odds ratio in cases with lack of face to face visiting, poor economic condition, family concerns on hospital costs and family member role changing were 3.550, 3.904, 2.501 and 4.308, respectively.

Conclusion: Observing pipes and fittings, visiting behind the window, lack of face to face visiting, poor economic condition, family concerns about hospital costs and family member role changing were the effecting factors in increasing odds ratio of the families' anxiety. Considering these factors and family-centered cares can significantly reduce anxiety level of the families.

Keywords: Anxiety, Patients' families, Intensive Care Unit.

مقدمه

خانواده به عنوان مهم‌ترین واحد جامعه، در احساس سلامتی و توانایی فرد برای تطابق با شرایط مختلف نقش بسزایی دارد [1]. اما برخی از عوامل می‌توانند به صورت ناگهانی سلامت خانواده را تحت تأثیر قرار داده و ساختار آن را دستخوش تغییر نمایند [2]. عوامل استرس‌زای بسیاری نظیر وقوع یک بیماری حاد و صعب‌العلاج یا بستری شدن یکی از اعضا در بیمارستان می‌تواند خانواده را به سمت اضطراب سوق داده [1,3,4] و به عنوان یک حادثه تنش‌زا خانواده را به سوی بحران بکشاند [3].

بخش مراقبت ویژه یک محیط پرتنش برای بیماران و وابستگان آن‌ها محسوب می‌شود که به واسطه‌ی آن افراد اضطراب زیادی را در طول این مدت تجربه می‌نمایند، زیرا آنان در بخشی بستری می‌شوند که اغلب بیماران آن بدحال، نیازمند به مراقبت تخصصی و یا مشرف به مرگ هستند. مواجهه با این وضعیت می‌تواند سبب افزایش غم و اندوه و کاهش امیدواری و توانمندی خانواده‌ها شود [5]. اغلب مشاهده فرد عزیز و مورد علاقه در یک وضعیت تهدیدکننده، محیط پر تنش بخش ویژه و تجهیزات و تکنولوژی پیچیده از جمله عواملی هستند که سبب افزایش فشارهای روحی روانی خانواده می‌شوند. در این گونه مواقع به علت ترس و اضطراب شدید، افراد خانواده، نیازهای ضروری و اساسی خود را نادیده گرفته و فقط به فکر بیمار و مسایل مربوط به آن هستند [1,6].

اضطراب می‌تواند توانایی تصمیم‌گیری افراد را تحت تأثیر قرار داده و همانند یک بیماری مسری از خانواده به بیمار و یا به پرستار و کارکنان و بالعکس سرایت نماید و ارتباط بین خانواده و کارکنان را مختل کند [7]. همچنین سبب کاهش قوای جسمی و فکری افراد شده و زمینه‌ساز بسیاری از مسایل و مشکلات جسمی و روانی شود [5]. مطالعات مختلف نشان می‌دهد، سالانه از هر 4 تا 5 نفر یک نفر در اثر استرس دچار اختلالات روانپزشکی می‌شود [8]. لذا ضروری است که حمایت‌ها و راه‌کارهایی برای پیشگیری و کاهش عوامل اضطراب‌زا صورت گیرد [7].

نتایج تحقیق الیزابت ون هورن و آیتاتش در سال 2001 در یک مرکز درمانی آمریکای جنوبی در افراد خانواده‌ای که دو هفته از مدت بستری شدن یکی از اعضای آن‌ها در بخش مراقبت ویژه می‌گذشت، حاکی از ایجاد تغییرات زیادی در پاسخ‌ها، رفتارها، شیوه‌زندگی، فعالیتهای روزمره، وضعیت تغذیه و رژیم غذایی و کیفیت خواب شصت درصد آنان بود [9].

مطالعه دیگری که توسط آژولای و همکاران در فرانسه انجام شد نشان داد که 70 درصد افراد خانواده بیمارانی که یکی از بستگان‌شان در بخش مراقبت ویژه بستری بودند، دچار سندرم پس از حادثه شده و 65 درصد آن‌ها نیز علائم اضطراب و افسردگی را نشان دادند [10]. پوچارد و همکاران نیز عوامل فردی، بین‌فردی، اجتماعی،

اقتصادی، روانی و محیطی را در بروز اضطراب افراد خانواده بیمار بستری در بیمارستان مؤثر ذکر نمودند [11]. با شناخت این عوامل می‌توان علل ایجاد اضطراب و میزان اهمیت آن را در خانواده بیماران تعیین کرده [10,11,12] و نسبت به تعدیل آن‌ها اقدام نمود. از این رو مطالعه حاضر با هدف "شناسایی عوامل تأثیر گذار محیطی و روانی در بخش مراقبت ویژه" انجام گرفت.

روش

پژوهش حاضر، مطالعه‌ای از نوع توصیفی - مقطعی است که در سال 1386 انجام گرفت. برای تعیین حجم نمونه آن، ابتدا یک مطالعه مقدماتی با 45 نمونه انجام شد، سپس با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% و خطای 5% و قدرت آزمون $1-\beta=90\%$ ، حجم نمونه 218 نفر برآورد شد.

نمونه‌گیری به روش آسان از میان 130 خانواده بود. نمونه‌گیری در ساعات ملاقات پس از کسب اجازه از مراکز مورد نظر و دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دو مرکز آموزشی درمانی پورسینا و رازی شهرستان رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان و در صورت رضایت نمونه‌های مورد پژوهش انجام شد.

نمونه‌های مورد پژوهش را اعضای خانواده‌ی بیمارانی تشکیل می‌داد که حداقل یک هفته از مدت بستری بیمار مورد نظر در بخش می‌گذشت و با بیمار نسبت خانوادگی با پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر و ولی یا قیم قانونی داشتند. پژوهشگر مجاز بود حد اکثر دو نفر از افراد خانواده بالای هجده سال هر بیمار را در نمونه‌گیری شرکت دهد که در صورت داشتن همسر؛ الویت مصاحبه با ایشان بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه از طریق مصاحبه فردی انجام شد. به منظور بررسی عوامل محیطی و روانی مؤثر بر اضطراب ضروری بود که ابتدا افراد دارای اضطراب شناسایی شده و سپس به عوامل مؤثر در ایجاد آن پرداخته شود. از این رو از پرسش‌نامه بررسی اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) استفاده شد. این پرسش‌نامه حاوی چهارده سوال چهارگزینه‌ای است که هفت مورد آن مربوط به افسردگی و هفت مورد دیگر در خصوص اضطراب است. در این مطالعه با توجه به اهداف تحقیق، از 7 سوال بررسی اضطراب استفاده شد. کسب نمرات 0-10 به‌عنوان غیر مضطرب و 11-21 به‌عنوان مضطرب در نظر گرفته شد [13] و فاکتورهای محیطی و روانی مؤثر بر اضطراب خانواده و اطلاعات فردی، بوسیله پرسش‌نامه محقق ساخته سنجیده شد. روایی ابزارها از طریق روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ همبستگی بین سؤالات اندازه‌گیری شد. ضریب محاسبه شده 0/88 بدست آمد که نشان دهنده همبستگی بالای سؤالات بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS15 و آمار توصیفی و تحلیلی (کای دو، رگرسیون لجستیک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

اطلاعات فردی خانواده‌ها نشان می‌دهد که 84/4% تجربه بستری یکی از اعضای خانواده در بخش مراقبت ویژه را نداشتند. 26/6% نمونه‌ها با بیمار نسبت پدری، 26/1% همسری و 11% نسبت مادری با بیمار داشتند. بیشتر 67% دچار عدم هوشیاری بودند. همچنین 51/8% نمونه‌ها در گروه سنی 60 - 36 سال قرار داشتند. 77/1% واحد‌های مورد پژوهش، مضطرب و 22/9% غیر مضطرب شناسایی شدند. در خصوص عوامل محیطی تأثیر گذار، نتایج نشان می‌دهد خانواده‌های مضطرب عوامل مشاهده لوله‌ها و اتصالات به بیمار (p=0/0001)، عدم انجام ملاقات حضوری با بیمار (p=0/0001)، نبودن اتاق انتظار برای خانواده (p=0/01)، نداشتن قدرت مالی را برای تأمین نیازهای مورد درخواست بخش (دارو، تجهیزات) را (p=0/0001) در ایجاد اضطراب خود مؤثر ذکر نمودند. همچنین آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد، شانس بروز اضطراب در افرادی که اظهار داشتند انجام ملاقات از پشت شیشه در اضطرابشان تأثیر دارد 4/404 برابر افرادی است که ملاقات از پشت شیشه تأثیری در ایجاد اضطراب آنان نداشت (OR=4/404). همچنین شانس بروز اضطراب در افرادی که عدم ملاقات حضوری با بیمار را در اضطراب خود مؤثر بیان نموده بودند 3/55 برابر بود (OR=3/550)، شانس بروز اضطراب در موارد وضعیت اقتصادی ضعیف، نگرانی خانواده از هزینه بیمارستان و تغییر نقش افراد خانواده به ترتیب 3/904، 2/501، 4/308 برابر بود (جدول 1). از بین عوامل بررسی شده، کمبود آگاهی از وضعیت بیماری فرد عزیزشان (p=0/002)، کمبود آگاهی از روند درمان در مورد بیمار خود (p=0/0001)، مشاهده بیماران بدحال دیگر (p=0/02)، نگرانی در

هزینه بیمارستان 2/501 بار (OR=2/501) و تغییر نقش در افراد خانواده به دنبال بستری شدن یکی از اعضا 4/308 بار (OR=4/308) افزایش یافت.

بحث

یافته‌ها وجود اضطراب را در بیشتر واحدهای مورد پژوهش نشان می‌دهد. پوچارد و همکاران در مطالعه خود بستری شدن در بیمارستان بخصوص در بخش‌های ویژه را به‌عنوان یک عامل اضطراب آور برای خانواده و نزدیکان فرد بیمار ذکر نموده و اضطراب را در میان آنان 73/4% گزارش نموده اند [11]. با پژوهش حاضر مشابهت دارد.

سول و همکاران نیز هم جهت با نتایج مطالعه حاضر معتقدند که وجود دستگاه‌های حمایت زندگی و دستگاه‌های پایش در بخش‌های ویژه می‌توانند به‌عنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد اضطراب مؤثر باشند [6].

ملاقات از پشت شیشه بر بروز اضطراب خانواده بیماران مؤثر بود. در این‌باره تحقیقاتی که توسط پوچارد و همکاران در فرانسه انجام شد ارتباط آماری معنی داری (p=0/01) را در رابطه با نبودن یک اتاق خصوصی به منظور ملاقات خانواده با بیمار و اضطراب آنان در بخش‌های مراقبت‌ویژه نشان داده است [14]. لی و لائو نیز یکی از ده نیاز مهم خانواده را نزدیک بودن هنگام ملاقات بیمار (در کنار بیمار بودن) شناسایی نمودند که در این رابطه ارتباط آماری معنی داری (p<0/05) را بین اولویت بندی نیازها و دیدن بیمار به طور مکرر به صورت نزدیک و حضوری پیدا نمودند [12]. در این مطالعه عدم ملاقات حضوری با بیمار در اضطراب آن‌ها تأثیر

جدول 1. جدول نسبت شانس بروز اضطراب در خانواده بیماران بستری در بخش ویژه در خصوص عوامل محیطی

| ردیف | متغیرها | B (OR) | 95% CI | p |
|------|---|--------|------------------|-------|
| 1 | انجام ملاقات از پشت شیشه | 4/404 | -2/240 0/141 | 0/02 |
| 2 | عدم انجام ملاقات حضوری | 3/550 | -15/617 1/242 | 0/02 |
| 3 | نداشتن قدرت مالی برای تأمین نیازهای مورد درخواست بخش (دارو و تجهیزات) | 3/904 | -3/513 0/455 | 0/001 |

داشت. نتایج بررسی‌های لی و لائو نشان داد که انجام ملاقات مکرر توسط همراهان به طور معنی داری نسبت به سایر نیازها مهم‌تر گزارش شده بود (p=0/0001) [13]. چاین و همکاران نیز ارتباط آماری معنی داری (p=0/04) در گروه آزمودنی در رابطه با نزدیک

مورد احتمال بهبودی بیمار (p=0/02)، نحوه ارتباط پرستاران بخش با خانواده (p=0/006) و تغییر نقش در افراد خانواده به دنبال بستری شدن یکی از اعضا را در اضطراب (p=0/0001) در ایجاد اضطراب خانواده‌ها مؤثر بود (جدول 2). همچنین شانس بروز اضطراب در افراد خانواده به ازای افزایش هر واحد نگرانی خانواده از

جدول 2. جدول ارتباط برخی از عوامل با بروز اضطراب در خانواده بیماران بستری در بخش‌های ویژه

| نوع آزمون و قضاوت | مضطرب | | غیر مضطرب | | جمع | واحد‌های مورد پژوهش |
|---|-------|------|-----------|------|-----|---------------------|
| | تعداد | درصد | تعداد | درصد | | |
| $X^2 = 9/807$ df = 1 p=0/002 معنی دار است | 144 | 81/4 | 33 | 18/6 | 177 | تأثیر دارد |
| | 24 | 58/5 | 17 | 41/5 | 41 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| کمبود آگاهی از وضعیت بیمار | 147 | 81/7 | 31 | 18/3 | 180 | تأثیر دارد |
| | 21 | 55/3 | 17 | 44/7 | 38 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| معنی دار است | 131 | 80/9 | 31 | 19/1 | 162 | تأثیر دارد |
| | 37 | 66/1 | 19 | 33/9 | 56 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| مشاهده بیماران بد حال دیگر | 30 | 58/8 | 21 | 41/2 | 51 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| | 134 | 80/7 | 32 | 19/3 | 166 | تأثیر دارد |
| نگرانی در مورد احتمال بهبودی بیمار | 34 | 65/4 | 18 | 34/6 | 52 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| | 110 | 83/3 | 22 | 16/7 | 132 | تأثیر دارد |
| ارتباط پرستاران بخش با خانواده | 58 | 67/4 | 28 | 32/6 | 86 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| | 42 | 57/5 | 31 | 42/5 | 73 | تأثیر ندارد |
| تغییر نقش در افراد خانواده به دنبال بستری شدن یکی از اعضا | 151 | 84/4 | 28 | 15/6 | 179 | تأثیر دارد |
| | 17 | 43/6 | 22 | 56/4 | 39 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| معنی دار است | 110 | 83/3 | 22 | 16/7 | 132 | تأثیر دارد |
| | 58 | 67/4 | 28 | 32/6 | 86 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |
| معنی دار است | 151 | 84/4 | 28 | 15/6 | 179 | تأثیر دارد |
| | 17 | 43/6 | 22 | 56/4 | 39 | تأثیر ندارد |
| | 168 | 77/1 | 50 | 22/9 | 218 | جمع |

جنت هارتسهون و همکاران نیز معتقدند که یکی از عوامل تنش‌زای مؤثر در اضطراب خانواده وجود مشکلات مالی در آن‌ها است [17].

بین کمبود آگاهی از وضعیت بیمار و اضطراب خانواده بیماران ارتباط معنی دار آماری وجود داشت که با نتایج لی و همکاران و آزولای و همکاران همسو بودند [10، 12].

همچنین کمبود آگاهی از روند درمان در مورد بیمار نیز در اضطراب خانواده تأثیر معنی داری داشت. چاین و همکاران نیز طی تحقیقی که در بخش مراقبت ویژه انجام دادند به نتایج همسویی دست یافتند [15].

مشاهده بیماران بد حال دیگر از عوامل مؤثر روانی در اضطراب خانواده‌ها بود که آزمون کای دو بین مشاهده بیماران بد حال دیگر و وجود اضطراب ارتباط معنی دار آماری را نشان داد. شوماخر و همکاران معتقدند که مشاهده بیماران بد حال دیگر در بخش مراقبت‌ویژه می‌تواند باعث اضطراب در خانواده بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه شود [18]. باتزلاف نیز در این رابطه معتقد است که مشاهده بیماران دیگر در وضعیت بدحال می‌تواند در ایجاد

بیمار بودن توسط خانواده و کاهش اضطراب آنان بعد از مداخله گزارش کرد [15].

در بیشتر خانواده‌ها عدم وجود اتاق انتظار در ایجاد اضطراب ارتباط معنی دار آماری را نشان داد. چاین و همکاران نیز ارتباط آماری معنی داری ($p=0/007$) را بین فراهم نمودن نیازهای بیمار از جمله احساس راحتی (اتاق انتظار) با کاهش اضطراب بیمار در گروه کنترل نسبت به گروه شاهد گزارش کردند [15]. همچنین نتایج تحقیقات لی و همکاران نشان داد که یکی از ده نیاز بر اساس اولویت برای خانواده، داشتن یک اتاق انتظار نزدیک بیمارشان بوده است [16].

نداشتن قدرت مالی برای تأمین نیازهای مورد درخواست بخش (دارو و تجهیزات) در ایجاد اضطراب ارتباط معنی دار وجود داشت که در این رابطه دوگاس معتقد است که فکر کردن در مورد هزینه‌های بیمارستانی، داروها، تجهیزات پزشکی، هزینه‌های تشخیصی و خدمات درمانی همیشه در خانواده وجود دارد و از این رو بیماری نیز در خانواده به عنوان یک بحران و حادثه است که خود می‌تواند این عامل را تشدید نماید و باعث اضطراب در خانواده بیماران شود [1].

مطالعه اضطراب و عوامل محیطی و روانی تاثیرگذار بر آن در خانواده‌های بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 179
 نقش در افراد خانواده بیماران به‌دست آورد [19]. نویدیان به نقل از بکر (1383) می‌نویسد: انجام امور مربوط به زندگی، شغل و نیز داشتن نقش‌های متعدد (همسری، والدینی، ...) باعث افزایش میزان فشار روانی در مراقبین خانوادگی می‌شود [20].

در این مطالعه شانس بروز اضطراب به‌دلیل ملاقات از پشت شیشه، عدم ملاقات حضوری با بیمار، وضعیت اقتصادی ضعیف، نگرانی خانواده از هزینه بیمارستان و تغییر نقش افراد خانواده افزایش می‌یافت ولی در مطالعه پوچارد و همکاران سه دسته از عوامل زیر شانس بروز اضطراب به دنبال بستری شدن بیمار در اعضای خانواده وی را افزایش می‌داد، که این عوامل شامل: حال عمومی بد بیمار، سن بالای بیمار و قرار گرفتن در موقعیت همسر بیمار بودند [12].

مراقبت‌های پرستاری خانواده محور می‌تواند در کاهش شانس بروز اضطراب مؤثر باشد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری تمامی عزیزانی که ما را در به ثمر رساندن این پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی می‌شود.

References

- Du Gas, Beverly Witter. Introduction to patient care comprehensive approach to nursing. 4th ed. ST. Louis: Mosby Inc; 2006. P. 55.
- Clemen-Stone S, McGuire SL, Eigsti DG. Comprehensive community health nursing family, aggregate, community practice. 6th ed. ST. Louis: Mosby Inc; 2002. P. 230-1.
- Taylor C, Lillis C. Fundamentals of nursing. 4th ed. Philadelphia Lippincott: Williams & Wilking. 2005.
- Behnoudi Z. Family health and management .1st ed. Tehran: Boshra; 2003. p.1-2.[Persian]
- Choate K, Stewart M. Reducing anxiety in patients and family discharged from ICU. Australian Nursing Journal. 2002; 10(5):29.
- Sole ML, Klein DG, Moseley JM. Introduction to critical care nursing. 4th ed. Elsevier: Saunders; 2005; P.9-16.
- Irwin R, Rippe J. Intensive Care Medicine. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilking. 2003.
- Bephage G. Social and behavior sciences for nurses. 1st ed London: Philadelphia:Churchill Livingston; 2000.P.23-5.
- Horn VA, Tesh A. Learn how to help patients' families adapt to the stresses of the ICU. Nurs Manage. 2001;31(9):32.
- Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N, Chevert S, Aboad J, Adrie C, et al. Risk of post-traumatic

اضطراب خانواده آنان نقش داشته باشد [19]. از دیگر عوامل روانی مؤثر، نگرانی در مورد بهبودی بیمار است که در اضطراب خانواده تأثیر معنی دار داشته که در مطالعه چاین و همکاران نیز نشان داده شد که یکی از ده نیاز مهم خانواده، آگاهی در مورد نتایج بیماری است [15].

در خصوص ارتباط معنی دار نحوه ارتباط پرستاران بخش با وجود اضطراب در خانواده‌ها لی و همکاران نیز به نتایج همسو با نتایج مطالعه حاضر دست یافتند [12].

بین میزان اضطراب و تغییر نقش در افراد خانواده به‌دنبال بستری شدن یکی از اعضا ارتباط معنی داری آماری وجود داشت. در این راستا تحقیقات باتزلوف نیز یکی از عوامل پیش‌بینی‌کننده مؤثر در اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش‌های جراحی را تغییر

نتیجه‌گیری

نتایج حاکی از تأثیر عوامل محیطی و روانی در ایجاد اضطراب و افزایش شانس بروز اضطراب است. اضطراب می‌تواند سبب اختلال در ایفای نقش و تصمیم‌گیری درست در مواقع ضروری و حیاتی شود. با شناسایی عوامل به‌وجود آورنده اضطراب می‌توان از بروز اختلالات روانی و روان تنی بسیاری که مخرب روابط سالم در خانواده و اجتماع است پیشگیری نمود. اعتقاد بر این است که

stress symptoms in family members of intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171(9):987-94.

- Pochard F, Darmon M, Fassier T, Bollaert P E, Cheval C, Coloigner M, et al. Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients before discharge or death: A prospective multicenter study. J Crit Care. 2005;20(1):90-6.
- Lee LY, Lau YL. Immediate needs of adult family members of adult intensive care patients in Hong Kong. J Clin Nurs. 2003;12(4):490-500.
- Montazeri A, Vahdaninia M, Ebrahimi M, Jarvandi S. The hospital anxiety and depression scale (HADS): Translation and validation study of the Iranian version. Health & Qual Life Outcomes. 2003;1(14):1-6. [Persian]
- Pochard F, Azoulay E, Chevret S, Lemair F, Hubert H, Canoui P, et al. Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients: Ethical hypothesis regarding decision-making capacity. Crit Care Med. 2001; 29(10):1893-7.
- Chien W, Chiu Y L, Lam L, IP, W. Effects of a needs-based education programme for family carers with a relative in an intensive care unit: A quasi-experimental study. Intel J Nurs Studies. 2006; 43(1):39-50.
- Lee I Y M, Chien W T, Mackenzie A E. Needs of families with a relative in a critical care unit in

- Hong Kong. Journal of Critical Nursing. 2000: 3(9):46-5.
17. Hartshon J, Sole M L, Lamborn M. Introduction to critical care nursing. 2nd ed. Tehran: Shahed University. 1379.P.30.[Persian]
18. Shomarker A, Grenvik A, Holbrook S. Text book of critical care. 4th ed. Philadelphia: Aunders Company. 2000 .p.2042-4.
19. Butzlaff A L. Family members prior to surgery: Exploring stress, anxiety, family functioning and perceived support (dissertation). San Francisco: United State University of California; 2005. Available from: <http://gradworks.umi.com>.
20. Navidian A, Saslar A, Kermansaravi F. Study of burden experienced by family patients' family caregivers of patients with mental disorder in mentally ill hospital and psychiatric center. Teb and Tazkiyeh. 2004;52(1):19-25.[Persian]