

عوامل مؤثر بر میزان و چگونگی انجام مراقبت‌های دهانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه

هادی رنجبر^{*} MSc، منصور عرب MSc، عباس عباس زاده PhD، اطهه رنجبر BSc

دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: حفظ بهداشت دهان یکی از وظایف اصلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه است. این مطالعه با هدف "بررسی روش‌های انجام، میزان تثبیت و عوامل مؤثر بر مراقبت‌های دهانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه" انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، به روش سرشماری، تمام پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفتند و 131 نفر پاسخ دادند. از پرسشنامه‌های مراقبت‌های دهانی، عوامل زمینه‌ای و چکلیست بررسی گزارش‌های پرستاری، برای جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و نرم افزار PASW 18 موردنظر تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: دهان‌شویه، بیشترین روش استفاده شده (4/82 درصد) و بیشترین محلول استفاده شده، کلرهکسیدین (2/43 درصد) بود. ثبت مراقبت دهانی توسط بیشتر پرستاران انجام می‌شد، اما اطلاعات کافی در مورد نحوه مراقبت و پی‌آمدات آن، در اختیار گذاشته نمی‌شد. بین سابقه‌ی کاری در بخش مراقبت‌های ویژه ($r=0.332$, $p<0.05$)، اهمیت‌دهی به مراقبت‌های دهانی ($\rho=0.349$, $p<0.001$) و کیفیت مراقبت دهانی ارتباط مستقیم وجود داشت. سخت و ناخوشایند داشتن مراقبت دهانی ارتباط غیر مستقیم با مراقبت دهانی داشت ($p<0.05$).

نتیجه‌گیری: نیاز به آموزش در زمینه‌ی اهمیت مراقبت‌های دهانی و روش‌های مبتنی بر مدارک وجود دارد.
وازگان کلیدی: مراقبت دهانی، بخش مراقبت‌های ویژه، ثبت مراقبت.

Affective Factors on Oral Care and its Documentation in Intensive Care Units

Hadi Ranjbar* MSc, Mansoor Arab MSc, Abbass Abbasszadeh PhD, Athareh Ranjbar BSc
Razi Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman Medical Sciences University, Kerman, Iran

Abstract

Introduction: Oral hygiene is one of the main tasks of Intensive Care Unit's Nurses. This study aimed to determine the affecting factors of oral cares interventions and its documentation in Kerman University of Medical Sciences intensive care units.

Methods: In this cross sectional study, all the nurses of intensive care units of Kerman University of Medical Sciences hospitals were surveyed and 131 responded. Oral cares questionnaires, underlying factors and nursing reports assessment check list were used to collect the data. Data were analyzed using descriptive and analytic statistics and PASW 18 software.

Results: Oral rinse was the most frequent method (82.4%) and the most used solution was chlorhexidine (43.2%). Documentation of oral care was done by most of the nurses but the information about used methods and outcomes were not provided. There was a direct relation between intensive care work experience ($r=0.332$; $p<0.05$) and priority of the oral care ($\rho=0.349$, $p<0.001$) with oral care quality. Viewing oral care as a difficult and unpleasant task had an indirect relation with oral care ($p<0.05$).

Conclusion: There was need for education and informing nurses about importance of the oral care and evidence-based methods of oral care.

Keywords: Oral care, Intensive Cares Unit, Care documentation.

مقدمه

روش‌های انجام، میزان تثبیت و عوامل مؤثر بر مراقبتهای دهانی در بخش‌های مراقبتهای ویژه‌ی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم کرمان انجام گرفت. با این امید که نتایج این پژوهش بتواند در امر توسعه‌ی مراقبت مبتنی بر مدارک در بخش‌های مراقبت ویژه کمک کننده باشد.

روش‌ها

پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی مقطعی است که در آن تأثیر عوامل مختلف بر میزان انجام و تثبیت مراقبتهای دهانی در بخش‌های مراقبتهای ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه‌ی پژوهش، شامل همه‌ی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبتهای ویژه بیمارستان‌های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود (آموزشی و غیر آموزشی). انتخاب افراد به روش سرشماری انجام شد و تمام پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل سه بخش اطلاعات زمینه‌ای، پرسشنامه‌ی مراقبتهای دهانی و چکلیست ارزیابی گزارش پرستاری بود. بخش اطلاعات زمینه‌ای، پس از مطالعه‌ی متون و استفاده از نظر دو نفر از اعضای هیأت علمی مهربان در بخش مراقبتهای ویژه طراحی شد. پس از طراحی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوى با نظرخواهی از پنج نفر

جدول 1. خصوصیات زمینه‌ای شرکت کنندگان در پژوهش

متغیر زمینه‌ای	تعداد	درصد	
جنس			
مرد	23	18/7	
زن	100	81/3	
دیپلم بهیاری	6	5	
کارشناس	113	94/2	مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد	1	0/8	
آموزشی	91	78/4	نوع بیمارستان
غیرآموزشی	25	21/6	
ثابت	38	31/9	نوع شیفت
در گردش	81	68/1	
جراحی	18	14/9	نوع ICU
داخلی	8	6/6	
تروما	23	19	
قلب	18	14/9	
اصباب	11	9/1	
عمومی	43	35/5	

حفظ بهداشت دهان یکی از وظایف اصلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه است [1]. تمام بیماران ممکن است از بهداشت ضعیف دهان رنج ببرند، اما بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی، بیشتر در معرض خطر هستند؛ زیرا در این بیماران، لوله‌ی تراشه باعث افزایش چسبندگی باکتری‌ها به مخاط می‌شود، همچنین داروهای متعدد مورد استفاده در این بیماران، احتمال خشک شدن دهان را افزایش می‌دهند و این امر، بهداشت دهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد [2]. این عوامل با افزایش تجمع پلاک‌های دندانی، کلونیزاسیون باکتریالی حلق دهانی، میزان بالاتر عفونت‌های بیمارستانی و به خصوص پنومونی ناشی از تهویه‌ی مصنوعی همراه است [3]. برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پاکسازی دهان، می‌تواند با کاهش میزان پلاک‌های دندانی، بیماری‌های لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مصنوعی همراه باشد [4، 5، 6، 7 و 8]. بررسی‌ها نشان می‌دهند که دهان محلی است که بیش از هر جا، در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مورد غفلت قرار می‌گیرد و پرستاران برای آن اهمیت کمی قایلند [9 و 10].

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پرستاران، مراقبتهای دهانی را بیشتر بر اساس روش‌های متدالو انجام می‌دهند، از روش‌ها و مواد مختلفی استفاده می‌کنند و روش خاصی برای انجام بررسی دهانی ندارند [11]. بسیاری از پرستاران عقیده دارند، که انجام مراقبت دهانی برای بیمار ایجاد مزاحمت می‌کند، که همین باور باعث می‌شود به مراقبت دهانی کمتر اهمیت داده شود [12]. دلایل مختلفی برای کم‌توجهی به انجام مراقبتهای دهانی ذکر می‌شود که از آن جمله می‌توان به کمبود آگاهی، نبود استانداردهای علمی و تکیه بر روش‌های سنتی، نبود یا متناقض بودن روش‌های بررسی دهان، روش‌ها و رژیمهای متفاوت مراقبتهای دهانی و نبود همکاری بین رشته‌ای در این مورد اشاره نمود [13]؛ اما اهمیت مراقبتهای دهانی به حدی زیاد است که مرکز کنترل بیماری‌ها در راهنمای‌های خود برای جلوگیری از پنومونی بیمارستانی، پیشنهاد ایجاد یک برنامه‌ی جامع مراقبت دهان همراه با استفاده از یک عامل ضدمیکروبی را برای بخش‌هایی که بیماران در معرض خطر عفونت هستند داده است [14]. برخی از پژوهش‌گران معتقدند که بررسی دهان و تعیین نیازهای مراقبتی باید جزیی از طرح پذیرش بیمار و مراحل بعدی بستری باشد [15].

نتایج پژوهش فیدر و همکاران در سال 2010 نشان داد که بین سیاستهای اعلام شده‌ی مراقبت از دهان و روش‌های مورد استفاده تفاوت وجود داشت [16]؛ اما تاکنون روش‌های موجود مورد استفاده، میزان انتکای آن‌ها بر مستندات علمی و میزان تثبیت این مراقبتهای مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی

تحلیلی آزمون مریع کای، آزمون تی و آنالیز واریانس یک طرفه برای ارزیابی یک متغیر اسمی و داده‌های کمی با توزیع نرمال، آزمون من-ویتی و کروسکال‌والیس برای ارزیابی یک متغیر اسمی و داده‌های کمی با توزیع غیر نرمال با فراوانی کمتر از 30 و آزمون‌های همبستگی برای ارزیابی دو متغیر عددی و بوسیله‌ی نرم افزار آماری PASW Statistics ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی‌داری در کلیه تست‌های آماری، 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در پایان از 187 پرستار بخش‌های مراقبت‌های ویژه در زمان پژوهش، 131 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند (میزان پاسخ‌دهی 70 درصد). بررسی نتایج پرسشنامه زمینه‌ای نشان داد که میانگین سن شرکت‌کنندگان در پژوهش $5/10 \pm 31/80$ سال با میانگین 4/58 $\pm 3/60$ سال سابقه‌ی کار در بخش مراقبت‌های ویژه بود. نتایج بررسی ویژگی‌های زمینه‌ای در جدول 1 آورده شده است. میانگین سن آقایان 33/95 سال و میانگین سن خانم‌ها 31/20 سال بود و میانگین سابقه‌ی کار در بخش مراقبت ویژه در خانم‌ها 4/21 سال و در آقایان 5/95 سال بود.

نتایج نشان داد که به نظر پرستاران، آن‌ها آموزش کافی در مورد مراقبت‌های دهانی دریافت نکرده‌اند، و در مقابل، تنها 9 درصد معتقد بودند که آموزش کافی دریافت کرده‌اند. 61/9 درصد، زمان کافی برای انجام مراقبت‌های دهانی ندارند و 63/3 درصد، امکانات کافی برای انجام مراقبت‌های دهانی در اختیار ندارند.

همچنین به نظر آن‌ها مراقبت‌های دهانی از اولویت بالایی در مراقبت‌های پرستاری برخوردار نیست (77 درصد) و مراقبت‌های دهانی کار ناخوشایند (40/40 درصد)، تمیز کردن دهان کار دشوار (51/9) درصد) و مراقبت از دهان تاثیری در بهبود وضعیت بیمار ندارد. بیشتر پرستاران 55/7 (درصد)، مراقبت از دهان بیمار را کار کمک‌پذیر بخش و خانواده‌ی بیمار می‌دانند. تنها 51/1 درصد پرستاران اظهار داشتند که در مورد مراقبت‌های دهانی آموزش دیده‌اند و 48 درصد از آموزش دیده‌ها در زمان تحصیل در این مورد آموزش دیده بودند. 83/8 درصد مشارکت‌کنندگان تمایل داشتند که در مورد مراقبت‌های دهانی بیشتر آموزش بینند. نتایج مربوط به نگرش نسبت به مراقبت دهانی در جدول شماره 2 آورده شده‌اند.

16 درصد موارد به طور مرتب از مسواک برای تمیز کردن دهان استفاده می‌کرند و این میزان برای مواد مرتبط کننده 12/2 درصد بود. بیشترین محلول مورد استفاده، دهان‌شویه کلره‌گزیدین 0/2 درصد بود (43/2 درصد). روش‌های مورد استفاده در مراقبت از دهان در جدول 3 آورده شده‌اند.

از اعضای هیأت دانشکده پرستاری و مامایی مجرب در مراقبت‌های ویژه، دو تن از متخصصین بیماری‌های تنفس و پنج پرستار شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه روایی بخش اول مورد تأیید قرار گرفت. این بخش شامل مواردی از قبیل سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه‌ی کار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، نوع بیمارستان، نوع بخش و نوع شیفت مراقبت ویژه بود. بخش دوم، ترجمه‌ی پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه‌ی رلو همکاران در سال 2007 بود [1]. این پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی، توسط سه نفر از اعضای تیم تحقیق برای اعمال نظرات در اختیار سه نفر متخصص بیماری‌های دهان و دو نفر از اعضای هیئت علمی مجرب در مراقبت‌های ویژه و یک نفر مریب آموزش زبان انگلیسی قرار گرفت تا مورد ارزیابی محتوای و انتباطق ترجمه قرار گیرد. پس از اعمال نظرات بررسی کنندگان، پرسشنامه مجددً توسعه یک فرد آشنا به زبان انگلیسی، به انگلیسی برگردانده شد. پس از مطابقت ترجمه با متن اصلی، تغییراتی برای هماهنگی متن در ابزار فارسی انجام شد. این پرسشنامه شامل بخش‌های 1. نگرش‌ها، باورها و دانش در مورد مراقبت دهانی، 2. تعداد و دفعات انجام مراقبت دهانی، 3. نحوه‌ی آموزش در مورد مراقبت دهانی و 4. امکانات و حمایت بیمارستان بود که پس از انجام روایی صوری مورد استفاده قرار گفت. بعد از انجام یک مطالعه‌ی مقدماتی بر روی پانزده پرستار بخش‌های مراقبت‌های ویژه، پرسشنامه تکمیل شد. از روش ثبات درونی و محاسبه آلفای کرونباخ برای تعیین روایی ابزار استفاده شد. ضریب همبستگی بخش اول پرسشنامه (نگرش‌ها، باورها و دانش در مورد مراقبت دهانی) با محاسبه‌ی آلفا 0/86، بخش دوم (تعداد و دفعات انجام مراقبت دهانی) 0/85، بخش سوم (نحوه‌ی آموزش در مورد مراقبت دهانی) 0/76 و بخش چهارم (امکانات و حمایت بیمارستان) 0/83 به دست آمد. بخش سوم ابزار شامل چکلیست ثبت مراقبت‌های دهانی، شامل ثبت بررسی دهان، انجام مراقبت، دفعات انجام، روش مورد استفاده، مواد مورد استفاده، روند وضعیت دهان و بررسی پی‌آمد مراقبت بود. چک لیست پس از مطالعه متنون، توسط پژوهش‌گران طراحی شد و با نظر سه نفر از اعضای هیئت علمی مجرب در مراقبت‌های ویژه و دو نفر مدرس کارگاه‌های گزارش‌نویسی اعتبار محظوظ انجام گرفت. برای همسانی از روش توافق ارزیابی‌ها استفاده شد به این صورت که دو تن از اعضای تیم تحقیق 10 گزارش پرستاری را مورد ارزیابی قرار دادند و همبستگی 0/92 در بررسی ثبت‌ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن به دست آمد. 270 گزارش پرستاری از بخش‌های مورد بررسی (هر بخش 30 گزارش در 3 شیفت) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. داده‌ها به وسیله‌ی روش‌های آمار توصیفی (جداول فراوانی به صورت مطلق و نسب و ارائه میانگین و انحراف معیار) اریه شده و به وسیله‌ی آماره‌های

جدول 2. جدول توزیع فراوانی پاسخهای مربوط به نگرش در مورد مراقبت دهانی

کل	کاملاً موافق	موافق		نظری ندارم		مخالف		کاملاً مخالف		درصد		تعداد		وقت کافی برای انجام مراقبت دهانی حداقل یک بار در روز دارم.	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
99/2	130	21/5	28	40/8	53	6/9	9	18/5	24	12/3	16				
99/2	130	15/4	20	25/4	33	22/3	29	26/9	35	10	13	آموزش کافی را در مورد مراقبتهای دهانی دیده‌ام.			
96/9	127	14/2	18	51/2	65	15/7	20	14/2	18	4/7	6	امکانات لازم برای انجام مراقبتهای دهانی وجود دارد.			
97/7	128	41/4	53	38/3	49	16/4	21	3/9	5	0	0	مراقبت دهانی از اهمیت بالایی برای بیماران تحت تهویهٔ مکانیکی برخوردار است.			
97/7	128	19/5	25	16/4	21	22/7	29	18/8	24	22/7	29	به نظر من مراقبت از دهان یک کار ناخوش‌آیند است.			
99/2	130	13/1	17	39/2	51	25/4	33	16/9	22	5/4	7	حفره‌ی دهان، محلی است که تمیز کردن آن سخت می‌باشد.			
97/7	128	5/5	7	18/8	24	18/8	24	23/4	30	33/6	43	اهمیتی ندارد که چگونه از دهان مراقبت شود، وضعیت دهان اکثر بیماران همراه با افزایش طول مدت بسترهای اشان بدتر می‌شود			
97/7	128	18	23	59/4	76	16/4	21	4/7	6	1/6	2	به اطلاعات بیشتری در مورد استانداردهای ثابت شده مراقبت از دهان نیاز دارم.			
98/5	129	20/2	26	55/8	72	19/4	25	3/9	5	0/8	1	به امکانات بیشتر و بهتری برای انجام مراقبتهای دهانی نیاز دارم.			
95/4	125	15/2	19	40	50	31/2	39	8	10	5/6	7	ترجیح می‌دهم یک متخصص بهداشت دهان و دندان مراقبت دهان را انجام دهد.			
96/2	126	9/5	12	17/5	22	48/4	61	18/3	23	6/3	8	مسواک برقی را به نوع دستی برای تمیز کردن دهان بیمار ترجیح می‌دهم.			
93/1	122	9/6	9	26/7	35	34/4	45	16	21	9/2	12	پرسنل احتمالاً در صورت وجود مسوک برقی بیشتر مراقبتهای دهانی را انجام می‌دهند.			
90/8	119	11/8	14	45/4	54	31/1	37	11/8	14	0	0	شرکت در کارگاه مراقبتهای دهانی جزو اولویت‌های من است.			

جدول 3. جدول توزیع فراوانی روش‌های مورد استفاده به منظور انجام مراقبت دهانی

مسواک دستی	یکبار و کمتر	هر 12 ساعت	هر 8 ساعت	هر 4 ساعت	هر 1 تا 3 ساعت	هر گز	کل
مسواک برقی	0	0	0	0	0	0	86
عوامل مرطوب کننده	9	12/2	1	15	7	5	74
خمیر دندان	5	7/9	0	0	0	0	63
دهان‌شویه	11	10/2	22	48	4/4	4	108
سایر محلول‌ها	3	42/9	1	0	2	0	7
(rho=-0.565, p<0.001)	75	21	19/4	4	0	0	52/1
ارتباط وجود داشت. اما بین مشکل بودن مراقبت از دهان با اهمیت آن ارتباطی مشاهده نشد. کسانی که آموزش قبلی در مورد مراقبت‌های دهانی دیده بودند اهمیت بیشتری برای مراقبت‌های دهانی قایل بودند ($4/33 \pm 0.75$) در برابر ($4/03 \pm 0.91$) و این تفاوت با استفاده از آزمون تی مستقل ارتباط معنی‌داری را نشان داد ($P<0.05$). ارتباط بین اهمیت مراقبت دهانی با متغیرهای زمینه‌ای در جدول 4 آورده شده است.	71/8	1/1	1	1	1/1	1	79/8

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که احتمال استفاده از روش‌های مبتنی بر شواهد با افزایش سابقه کار در بخش مراقبت ویژه ($p<0.05$), وجود امکانات مناسب مراقبت دهانی در بخش ($p<0.05$) و میزان اثربخش بودن مراقبت دهانی ($p<0.05$) افزایش پیدا می‌کند. تحلیل رگرسیون عامل پیش‌بینی کننده‌ای را برای موارد مرتبط به ثبت مراقبت دهانی نشان نداد.

بحث

نتایج این پژوهش نشان داد که پرسنل پرستاری نسبت به اهمیت مراقبت از دهان آگاهی دارند؛ اما این اهمیت نسبت به سایر موارد کم‌رنگ‌تر در نظر گرفته می‌شود. بیشترین آموزش‌ها در زمان تحصیل آموخته شده‌اند و در حال حاضر تمايل به شرکت در دوره‌های بازآموزی و کسب اطلاعات روزآمد در میان پرسنل وجود دارد. همچنین بیشترین عامل پیشگیرانه در مراقبت از دهان، سخت

درصد، معتقد بودند که به اطلاعات مورد تأیید تحقیقات برای مراقبت از دهان نیاز دارند و 77 درصد معتقد بودند که نیازمند تجهیزات بهتری برای مراقبت از دهان هستند. 44/9 درصد شرکت-کنندگان در پژوهش، شرکت در یک کارگاه مراقبت از دهان را یکی از اولویت‌های خود می‌دانستند.

چکلیست بررسی ثبت مراقبت‌های دهانی نشان داد که در 90/7 درصد موارد، تثبیت انجام مراقبت صورت گرفته بود و در بیشتر موارد محلول (81/5 درصد) و روش مورد استفاده (84/8 درصد) نیز ثبت شده بود. با این حال، تعداد دفعات انجام مراقبت، بررسی وضعیت دهان و گزارش‌دهی وضعیت دهان بیماران در هیچ یک از گزارش‌ها ثبت نشده بود. همچنین گزارشی از روند وضعیت دهان بیماران در گزارش‌ها به ثبت نرسیده بود.

بین ساقه‌ی کار در بخش مراقبت‌های ویژه ($\rho=0.352$, $p<0.05$) با میزان اهمیت مراقبت دهانی با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن ارتباط معنی‌دار وجود داشت. اما سن ارتباط معنی‌داری را نشان نداد. ارتباط بین متغیرهای زمینه‌ای با میزان اهمیت مراقبت‌های دهانی در جدول شماره 4 آورده شده است. بین میزان اهمیت با وجود زمان کافی ($\rho=0.349$, $p<0.001$), آموزش در مورد مراقبت ($\rho=0.331$, $p<0.001$), وجود امکانات کافی ($\rho=0.417$, $p<0.001$), ناخوش‌آیند بودن مراقبت از دهان ($\rho=0.352$, $p<0.001$) و بی‌اثر دانستن مراقبت دهانی

جدول 4. ارتباط بین اهمیت مراقبت دهانی با متغیرهای زمینه‌ای

متغیر	میانگین	انحراف معیار	تست آماری	نتیجه آزمون
جنس	3/78	0/671	من ویتنی	p=0.001
زن	4/33	0/8		
درجه تحصیلی	4/33	1/21	کروسکال والیس	p=0.398
دیپلم	5	0		
نوع بیمارستان	4/18	0/83	من ویتنی	p=0.440
کارشناس ارشد	0	1/21		
نوع شیفت	4/24	0/78	من ویتنی	p=0.139
غیر آموزشی	4/40	0/64		
ICU	4/46	0/70	تی مستقل	p=0.556
در گردش	4/20	0/81		
نوع	4/22	0/87	کروسکال والیس	کروسکال والیس
خارجی	4/50	0/75		
تروما	4/14	0/72	کروسکال والیس	کروسکال والیس
قلب	4/00	0/76		
اعصاب	4/18	0/75		

احتمالاً به این دلیل است که عمدۀ پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ای ایران مدرک کارشناسی دارند و گروه‌های دیگر به قدری کم هستند که امکان مقایسه‌ی آن‌ها در چنین مطالعه‌ای وجود ندارد.

دکیزر گنز و همکاران در سال 2008 در پژوهشی که بر روی 218 بخش مراقبت‌های ویژه انجام دادند به این نتایج رسیدند. مهم‌ترین روش مراقبت استفاده از گاز پدها و مهم‌ترین محلول دهان‌شویه کلره‌گرگیدین بود. اغلب پرستاران گزارش کرده بودند که دهان بیمار را مورد بررسی قرار می‌دهند اما نمی‌توانستند روش موردن استفاده را ثبت بررسی را توضیح دهند. تنها 57 درصد مراقبت دهانی خود را ثبت کرده بودند و میزان اهمیت مراقبت دهانی در یک مقیاس صفر تا 100 دارای میانگین 67 با انحراف معیار بالای 27/1 بود. بین استفاده از پروتکول‌های مبتنی بر مدارک با میزان اهمیت‌دهی به مراقبت‌های دهانی ارتباطی مشاهده نشده [11]. در پژوهش حاضر نیز، میهمان‌ترین روش موردن استفاده دهان‌شویه و با استفاده از محلول کلره‌گرگیدین بود. بین مراقبت‌های دهانی و میزان اهمیت آن ارتباط معنی‌داری وجود داشت. اما میزان تثبیت مراقبت دهانی، همانند این پژوهش، وضعیت مطلوبی نداشت.

بیشتر افراد در مطالعه رلو و همکاران در سال 2007 که بر روی 59 بخش مراقبت ویژه اروپا انجام شده بود، بیان کرده بودند که آموزش

بودن انجام آن و ناخوش‌آیند بودن آن از دید پرستاران می‌باشد. به نظر می‌رسد بیشترین روش‌های مورد استفاده در زمینه‌ی مراقبت از دهان، روش‌های سنتی مثل دهان‌شویه باشد که این خود نشان-دهنده‌ی نیاز به آموزش در مورد مراقبت‌های دهانی است. عدم ثبت دقیق مراقبت‌های دهانی، شاید نتیجه‌ی کم‌اهمیت بودن این کار از نظر پرستاران باشد که باید به طور خاص در برنامه‌های بازآموزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در مطالعه‌ی انجام‌شده توسط فیدر و همکاران در سال 2010 نتایج نشان داد که به طور متوسط، مراقبت دهانی هر 2 تا 4 ساعت یکبار انجام می‌شود و مهم‌ترین روش موردن استفاده سواب است (97%). 47 درصد پرستاران مراقبت دهانی را پر اهمیت دانسته بودند و پرستاران با سابقه‌ی کار 7 سال و بالاتر، مراقبت دهان را بیشتر انجام می‌داده‌اند. پرستارانی که در بخش‌شان خط‌مشی مراقبت دهان داشتند، روش‌های معرفی شده در خط‌مشی را شامل استفاده از مسواک، خمیر‌دنان، ساکشن دهان، و بررسی حفره‌ی دهان عنوان می‌کردند و پرستاران با مدرک لیسانس مراقبت دهانی را بیشتر با سواب انجام می‌دادند [16]. نتایج مطالعه‌ی فوق در مورد میزان اهمیت مراقبت دهانی و ارتباطش با سابقه‌ی کاری در بخش ویژه و روش غالب موردن استفاده با پژوهش حاضر مشابه‌ی داشت؛ اما در مورد عوامل مؤثری مثل مدرک تحصیلی تفاوت وجود داشت که

بلندمدتی مانند پوسیدگی دندان، بوی بد دهان، بیماری‌های لثه و عفونت سینوس‌ها جلوگیری کنند. عوارضی که در صورت بقهودی بیمار ممکن است تا مدت‌ها زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر نشان داد با وجودی که پرستارهای شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه اهمیت بالایی برای مراقبت دهانی قایل بودند، از روش‌های مؤثر مراقبت از دهان مثل مسوک زدن، کمتر استفاده می‌کردند. امری که در راهنمای و کتاب‌های مراقبتی مورد تاکید قرار گرفته است. عوامل مؤثری مانند میزان اهمیت مراقبت دهانی از نظر فرد و سخت و ناخوش آیند بودن مراقبت دهانی، عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین طراحی خط‌مشی‌های علمی مراقبت از دهان و برگاری دوره‌های آموزشی در این مورد باید جزو اهداف آموزشی بخصوص در دوره‌های بازآموزی پرسنل بخش‌های مراقبت ویژه باشند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه پرسنل پرستاری بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ی شهر کرمان که صبورانه نسبت به پاسخ دادن پرسشنامه همکاری داشتند، تشکر می‌نماییم و از معاونت پژوهشی دانشگاه کرمان که درین علاوه بر تأثیرات کوتاه‌مدت در بیماران، می‌تواند از عوارض

کافی در مورد مراقبت دهانی دیده‌اند و اغلب آن‌ها تمایل به آموزش بیش‌تر در این مورد را نیز داشتند. مراقبت از دهان اهمیت بالایی داشت. بیش‌تر افراد مراقبت از دهان را کاری ناخوش آیند و سخت می‌دانستند. مهم‌ترین روش مراقبت، استفاده از دهان‌شویه، سه بار در روز و با محلول کلرهگریدین بود. 44 درصد از مسوک نیز استفاده می‌کردند اما استفاده از مسوک بر قی گزارش نشده بود [1]. مطالعه فور و همکاران در سال 2004 الگویی را نشان داد که در آن میزان تحصیلات، داشتن زمان کافی، ناخوش آیند ندانستن مراقبت از دهان، و اهمیت دادن به مراقبت دهان، تأثیر مستقیم بر کیفیت مراقبت از دهان را داشت. همچنین داشتن سبقه‌ی کار در بخش مراقبت ویژه و آموزش قبلی در مورد مراقبت دهانی، تأثیر غیر مستقیم بر کیفیت مراقبت دهانی داشتند [17].

نتیجه‌گیری

با وجود اهمیت بسیار بالای مراقبت‌های دهانی و نقش ویژه‌ی آن در کاهش عوارض مهمی مثل پنومونی ناشی از تهیه‌ی مصنوعی، این مراقبت عمولاً به دلیل وضعیت وخیم بیمار و نیاز به توجه به نقصان‌های شدید فیزیولوژیک، مورد غفلت قرار می‌گیرد. مراقبت از دهان علاوه بر تأثیرات کوتاه‌مدت در بیماران، می‌تواند از عوارض

References

1. Rello J, Koulenti D, Blot S, Sierra R, Diaz E, De Waele JJ, Macor A, Agbaht K, Rodriguez A. Oral care practices in intensive care units: a survey of 59 European ICUs. *Intensive Care Med.* 2007;33(6):1066-70.
2. Depuydt P, Myny D, Blot S. Nosocomial pneumonia: aetiology, diagnosis and treatment. *Curr Opin Pulm Med.* 2006;12(3):192-7.
3. Johnstone L, Spence D, Koziol-McClain J. Oral hygiene care in the pediatric intensive care unit: practice recommendations. *Pediatr Nurs.* 2010;36(2):85-96.
4. Ranjbar H, Jafari S, Kamrani F, Alavi Majd H, Yaghmayee F, Asgari A. Effect of Chlorhexidine gluconate oral rinse on preventing of late onset ventilator associated pneumonia and it's interaction with severity of illness. *Iranian Journal of Critical Care Nursing.* 2010;3(2):81-6. [Persian]
5. Van Nieuwenhoven CA, Buskens E, Bergmans DC, van Tiel FH, Ramsay G, Bonten MJ. Oral decontamination is cost-saving in the prevention of ventilator-associated pneumonia in intensive care units. *Crit Care Med.* 2004;32(1):26-30.
6. Hubmayr RD, Burchardi H, Elliot M, Fessler H, Georgopoulos D, Jubran A, Limper A, Pesenti A, Rubenfeld G, Stewart T, Villar J. Statement of the 4th International Consensus Conference in Critical Care on ICU-Acquired Pneumonia--Chicago, Illinois ,May 2002. *Intensive Care Med.* 2002;28(11):1521-36.
7. Jafari S, Ranjbar H, Kamrani F, Alavi Majd H, Yaghmaei F. Effects of Chlorhexidine and normal saline on dental plaque formation in ICU patients: A comparative study. *Nursing and Midwifery Quarterly Shaheed Beheshti University of Medical Sciences.* 2007;17(56):36-43. [Persian]
8. Lee HK, Choi SH, Won KC, Merchant AT, Song KB, Jeong SH, Lee SK, Choi YH. The effect of intensive oral hygiene care on gingivitis and periodontal destruction in type 2 diabetic patients. *Yonsei Med J.* 2009;50(4):529-36 .
9. Wise MP, Cole JM. Improving standards of oral hygiene in intensive care. *Intensive Care Med.* 2007;33(12):2229; author reply 2228 .
10. McNeill H. Biting back at poor oral hygiene. *Intensive and Critical Care Nursing.* 2000;16(6):367-72 .
11. DeKeyser Ganz F, Fink NF, Raanan O, Asher M, Bruttin M, Nun MB, Benbinishty J. ICU nurses' oral-care practices and the current best evidence. *J Nurs Scholarsh.* 2009;41(2):132-8 .

-
12. Grap M, Munro C, Ashtiani B, Bryant S. Oral care interventions in critical care: frequency and documentation. *American Journal of Critical Care*. 2003;12(2):113-8.
 13. Cohn J, Fulton J. Nursing staff perspectives on oral care for neuroscience patients. *Journal of Neuroscience Nursing*. 2006;38(1):22-30.
 14. Berry AM, Davidson PM, Masters J, Rolls K. Systematic literature review of oral hygiene practices for intensive care patients receiving mechanical ventilation. *American Journal of Critical Care*. 2007;16(6):552-62.
 15. Abidia R. Oral care in the intensive care unit: a review. *J Contemp Dent Pract*. 2007;8(1):76-82 .
 16. Feider LL, Mitchell P, Bridges E. Oral care practices for orally intubated critically ill adults. *American Journal of Critical Care*. 2010;19(2):175-83 .
 17. Furr L, Binkley C, McCurren C, Carrico R. Factors affecting quality of oral care in intensive care units. *Journal of Advanced Nursing*. 2004;48(5):454-62 .