

بررسی تاثیر تمرينات هاتایوگا بر کفايت دیالیز

علی طیبی^۱، مليحه بابا حاجی^{۲*}، مهدی صادقی شرمeh^۲، عباس عبادی^۲، بهزاد عین الله^۱

۱. مرکز تحقیقات نفروولوژی و ارتوپری و دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

۲. دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در خصوص بیماران همودیالیزی طی چند دهه‌ی اخیر، کفايت دیالیز در این بیماران کمتر از مقدار طبیعی آن است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرينات هاتایوگا بر میزان کفايت دیالیز بیماران همودیالیزی انجام شد.

روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی نیمه تجربی دو گروهی شاهددار است که ۳۱ بیمار همودیالیزی از بیمارستان شهید لبافی نژاد در گروه شاهد و ۳۱ بیمار همودیالیزی از بیمارستان بقیه الله (عج) در گروه آزمون قرار گرفتند و تمرينات تعديل شده‌ی هاتایوگا پس از آموزش اولیه توسط مربی یوگا، به مدت یک ساعت، دو بار در هفته و به مدت دو ماه در گروه آزمون در سال ۱۳۸۹ انجام شد. کفايت دیالیز توسط فرمول داگرداس^۲، قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه محاسبه شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و آزمون‌های آماری توصیفی، تی زوجی و کای دو مورد تعزیزی و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که کفايت دیالیز بیماران به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p < 0.001$). میانگین کفايت دیالیز قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون به ترتیب (0.96 ± 0.23) و (1.14 ± 0.22) ($p < 0.001$) و میانگین نمره کفايت دیالیز در گروه شاهد به ترتیب (1.30 ± 0.26) و (1.31 ± 0.25) ($p < 0.09$) بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش معنی‌دار کفايت دیالیز پس از انجام تمرينات هاتایوگا، آموزش مهارت‌های ساده‌ی هاتایوگا به این گروه از بیماران و همچنین سایر بیماری‌های مزمن توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: همودیالیز؛ هاتایوگا؛ کفايت دیالیز

Study of the effect of Hatha Yoga exercises on dialysis adequacy

Ali Tayyebi¹, Malihe Babahaji^{2*}, Mahdi Sadeghi Sherme², Abbas Ebadi² PhD, Behzad Eynollahi¹

1. Nephrology and Urology Research Center & Faculty of Nursing of Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*2. Faculty of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Aims: Despite the significant progress achieved in hemodialysis patients during recent decades, dialysis adequacy is still less than the normal level. Therefore, the present study has been performed to investigate the effect of Hatha Yoga exercises on dialysis adequacy among hemodialysis patients.

Methods: The present two-grouped semi-experimental controlled trial was conducted on 31 hemodialysis patients from Shahid Labbafinejad hospital as the control and 31 condition-matched patients from Baqiatallah hospital as the case group, for whom the modified Hatha Yoga exercises were performed after the initial training by the yoga instructor for one hour twice a week during two months. Dialysis adequacy was evaluated using Daugirdas II formula before and after the intervention in both groups. Data were analyzed by SPSS₁₆ statistical software, descriptive statistics, paired t-test and chi square.

Results: The study results showed significant increase in dialysis adequacy among hemodialysis patients ($p < 0.001$). The mean dialysis adequacy was respectively $0.96 (\pm 0.23)$ and $1.14 (\pm 0.22)$ ($p < 0.001$) before and after the intervention in the case and $1.3 (\pm 0.26)$ and $1.31 (\pm 0.25)$ ($p < 0.09$) in the control group.

Conclusion: Given the significant increase in dialysis adequacy following the Hahta Yoga exercises, training simple skills of Hatha Yoga is recommended for this group of patients as well as patients with other chronic disorders.

Key words: Hemodialysis; Hatha Yoga; Dialysis adequacy

(این مقاله منتج از پایان‌نامه دانشجویی است)

مقدمه

مدت چهار ساعت در بیمارستان به سر می‌برند و این به معنی دوری از خانه است که این مسأله می‌تواند روی برنامه‌ی شغلی، وضعیت استخدامی، اقتصادی، عزت نفس و سطوح بالای وابستگی تأثیر قابل توجهی بر جای گذارد [۳] که در نهایت باعث نالمیدی به آینده، انزواج اجتماعی، عدم تحرک و کاهش اعتماد به نفس در آن‌ها می‌شود [۲]. اگر همودیالیز انجام شده نیز از کفایت لازم برخوردار نباشد، سطح توکسین‌های خون و عالیم بالینی بیمار به خوبی کنترل نشده و بنابراین میزان ناتوانی و مرگ و میر بیماران افزایش می‌یابد. محدودیت‌های بخش‌های همودیالیز مانند تعداد دستگاه‌ها، زمان و تعداد بیماران، اجازه‌ی دیالیز نامحدود را نمی‌دهد؛ از این رو بیماران باید در حدی همودیالیز شوند که هم وضعیت عمومی بیمار بهتر شود و هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی این میزان همودیالیز مقرون به صرفه باشد [۴].

بنابراین به صورت معمول باید دوز تحویلی به منظور اطمینان از مقدار کافی همودیالیز اندازگیری و پایش شود [۹]. اندازه‌گیری کلیرانس مولکول‌های کوچک به عنوان یکی از روش‌های پذیرفته شده برای کارایی دیالیز است؛ چرا که ارتباط بین میزان مرگ و میر و این مولکول‌ها در مطالعات زیادی نشان داده شده است.

محاسبه کفایت دیالیز (kt/v)

در این فرمول T زمان دیالیز، K کلیرانس دستگاه، V حجم انتشار اوره در بدن است.

محاسبه‌ی میزان برداشت اوره (Ure Redaction Ratio) URR از روش‌های پذیرفته شده جهانی است که برای اندازه‌گیری مولکول‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Kt/v یک اصطلاح ریاضی است که فرآیند دیالیز را به طور کمی ارزیابی می‌کند و پارامتری را به دست می‌دهد که در ارتباط با عالیم کلینیکی بیمار است و کنترل مستمر آن به طور اولیه، تغییرات فرآیند دیالیز را مشخص می‌کند و به سه پارامتر کلیرانس اوره، مدت زمان درمان و حجم توزیع اوره بستگی دارد [۶ و ۹].

URR یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری کفایت دیالیز است که به منظور بررسی میزان برداشت مواد زاید تولید شده توسط دیالیز انجام می‌شود و به صورت درصد بیان می‌شود و با اندازه‌گیری اوره‌ی خون قبل و بعد از دیالیز صورت می‌گیرد [۶].

نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که مشخص نمودن کفایت دیالیز با استفاده از Kt/v کاهش اوره و رساندن کفایت دیالیز به بیشتر از $1/2$ و یا URR به بیشتر از 65 درصد در پیش‌آگهی این بیماران مؤثر است [۴]. این در حالی است که نتایج مطالعات انجام شده نشان دهنده‌ی کفایت پایین همودیالیز در بیشتر شهرهای ایران است؛ از جمله 66 درصد بیماران همودیالیزی مرکز ساری (۱۳۸۰)، ۹۰ درصد بیماران مرکز همودیالیز همدان (۱۳۸۲) و نود درصد بیماران مرکز اردبیل (۱۳۸۴)، هشتاد درصد در بیماران مرکز اراک

بیماری مزمن کلیوی، یک فرآیند پاتولوژیک با علل متعدد است که نتیجه‌ی آن کاهش توقفناپذیر تعداد و کارکرد نفرون‌های است و در بسیاری موارد منجر به بیماری کلیوی مرحله‌ی انتهایی (End-stage renal disease ESRD) معرف یک حالت بالینی می‌شود. ESRD معرف یک حالت بالینی است که در آن کاهش برگشت‌ناپذیر کارکرد کلیوی به حد رسیده است که موجب وابستگی دائمی بیمار به درمان جای‌گزینی کلیه (دیالیز یا پیوند) شده است؛ که منظور از این درمان، جلوگیری از اورمی تهدید کننده حیات است [۱]. در سال 2009 حدود 25000 نفر بیمار مبتلا در ایران وجود داشت [۲] و سالانه حدود 8 درصد به این تعداد افزوده می‌شود [۳]. محققین، رشد روز افزون تعداد بیماران مبتلا به مرحله‌ی انتهایی بیماری کلیه را مختص ایران ندانسته و آن را مشکلی جهانی برآورد می‌کنند [۴]. از روش‌های درمانی رایج در درمان جای‌گزینی کلیه، می‌توان به همودیالیز، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه اشاره کرد که در این بین همودیالیز شایع‌ترین روش درمانی مورد استفاده و تنها روش درمانی نگه‌دارنده در کنار پیوند کلیه (روش قطعی درمان) محسوب می‌شود که نقش اساسی در افزایش طول عمر این بیماران دارد [۵].

اسامس کار همودیالیز، عبور مایع و ذرات از میان یک غشاء نیمه تراوا از طریق انتشار، اسمز و اولترافیلتراسیون است. بر این اساس ذرات با خاصیت انتشار و آب از طریق اسمز یا اولترافیلتراسیون از غشاء نیمه تراوا عبور می‌کنند [۶].

هدف از انجام دیالیز:

(۱) خارج نمودن محصولات نهایی و زاید ناشی از متابولیسم پروتئین مثل اوره و کراتینین در خون

(۲) حفظ یک غلظت مناسب و بی خطر از الکتروولیت‌های سرم

(۳) تصحیح اسیدوز و تأمین سیستم بافری و بی‌کربنات در خون

(۴) خارج کردن مایعات اضافی بدن [۶]

در پایان سال 2005 در جهان 1900000 نفر تحت درمان جای‌گزین کلیه قرار داشتند که از این میان 68 درصد تحت درمان با همودیالیز، هشت درصد دیالیز صفاقی و 23 درصد نیز با پیوند به زندگی خود ادامه می‌دهند [۵].

در ایران هم $52/7$ درصد بیماران از همودیالیز و $45/5$ درصد از پیوند سود می‌برند [۷]. هر کدام از این روش‌ها، مزايا و معایبي داشته و سطوح مختلفی از تأثیر را بر روی سلامت جسمی و روانی و اجتماعی بیماران بر جا می‌گذارند و نیز محدودیت‌های متفاوتی در سیک زندگی ایجاد می‌کنند [۸]. با وجود پیشرفت‌های مذکور در درمان ESRD، سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در این بیماران پایین‌تر از مردم عادی است و از سوی دیگر مشکلات ناشی از همودیالیز تغییرات چشمگیری در زندگی این بیماران ایجاد می‌کند. بیماران دیالیز با توجه به شرایط جسمی و روحی خاص بیماریشان مشکلات فراوانی را تجربه می‌کنند. آنان در هفته سه بار و هر بار به

۱۸۵
تحریک پذیر [۲۰]، لنفو [۲۱]، افسردگی خفیف [۲۲]، هیپرتانسیون [۲۳]، اعتیاد به مواد مخدر [۲۴]، استئو آرتیت [۲۵] و دردهای مزمن کمری [۲۶] بر ارتقای بهبودی بیماران مؤثر بوده است. همچنین در مقالات مروری متعدد نیز این اثرات گزارش شده است. از جمله در بیماری‌های قلبی - عروقی [۲۷]، توانبخشی بیماران پس از سکته قلبی [۲۸]، سندروم یائسگی [۲۹] و در نهایت در مطالعات اخیر بر روی ایدز [۳۰]، بیماران مبتلا به سرطان [۳۱ و ۳۲]، بیماران روانی [۳۳]، دیابت [۳۴]، بیماری‌های قلبی - عروقی [۳۵ و ۳۶]، بهبودی بیماران پس از انجام تمرينات یوگا بررسی و گزارش شده است.

در مطالعه‌ای در خارج از کشور تأثیر ورزش یوگا محور بر روی آیتم‌هایی نظیر درد، خستگی، اختلالات خواب و مارکرهای بیوشیمیایی نظیر اوره، کراتینین، کلسمیم، آکالالین فسفاتاز، فسفر، کلسترول، تری-گلیسرید و... در بیماران همودیالیزی به صورت کاهش درد ۳۷ درصد، کاهش خستگی ۵۵ درصد، کاهش اختلالات خواب ۲۵ درصد، افزایش قدرت عضلانی پانزده درصد، کاهش اوره ۲۹ درصد مشاهده شد [۱۴].

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تمرينات تعديل شده (تمريناتی که برای بیماران قابل انجام باشد) هاتایوگا برکفایت همودیالیز است.

روش‌ها

پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی نیمه‌تجربی دو گروهی شاهددار است که با هدف تعیین تأثیر تمرينات هاتایوگا بر کفایت بیماران همودیالیزی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه‌ی پژوهش، شامل بیماران همودیالیزی دو بیمارستان بقیه... (عج) و شهید لبافی‌نژاد است که گروه آزمون بر اساس معیارهای ورودی و به صورت مبتنی بر هدف از بیمارستان بقیه... (عج) و گروه شاهد نیز از بیمارستان شهید لبافی‌نژاد انتخاب شدند.

معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد زیر بود:

- حداقل شش ماه از زمان اولین نوبت همودیالیز آنان گذشته باشد.
- توانایی آموزش‌پذیری و انجام تمرينات هاتایوگا را داشته باشد.
- توان انجام تمرينات را داشته باشد.

معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل موارد زیر بود:

- هر گونه تغییر در وضعیت عمومی بدن بیمار در طول انجام تمرينات (بروز مشکلات حاد) به طوری که قادر به انجام تمرينات نباشد.

- انصراف یا عدم تمايل به انجام مستمر تمرينات در طول مطالعه. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و فرمول داگرداس دو برای سنجش کفایت دیالیز استفاده شد. پرسشنامه‌ی محقق ساخته که با توجه به اهداف پژوهش و خصوصیات دموگرافیک مددجویان شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی از نظر خود بیمار، سطح تحصیلات و مدت زمان همودیالیز

(۱۳۸۶)، ۶۴ درصد در بیماران همودیالیزی در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در تهران (۱۳۸۶) و هفتاد درصد بیماران مرکز رشت (۱۳۸۷)، کفایت دیالیز کمتر از حد قابل قبول برآورد شده است [۴]. این در حالی است که عواملی نظیر استفاده از دیالیز و رهایی با سطح بالا، افزایش سرعت جریان خون، افزایش سرعت مایع دیالیز و افزایش زمان دیالیز، باعث افزایش کفایت همودیالیز می‌شود [۱۱]. البته استفاده از بعضی از این روش‌ها، امکان پذیر نبوده و یا مقرر نبوده و صرفه نیستند؛ مانند افزایش زمان همودیالیز که یک روش مهم در افزایش کفایت دیالیز است اما از نظر اقتصادی و از نظر توان بیماران این کار در بسیاری از موارد ممکن نیست [۱۲]. از این رو باید از روش‌های دیگری استفاده کرد تا توان میزان کفایت همودیالیز را به منظور کاهش میزان مرگ و میر، تعداد دفعات بستrij شدن بیماران، روزهای بستrij شدن و بازپرداخت هزینه‌های مراقبتی توسعه بیماران و صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی کشور و حتی افزایش طول عمر بیماران بالا برد [۱۳].

بنابراین بر آن شدیم تا از روش‌هایی که علاوه بر توجه به بعد جسمانی مددجو، ابعاد عاطفی و معنوی بیمار را در نظر می‌گیرند برای افزایش در کفایت دیالیز این بیماران بهره بگیریم. طبق تحقیقات متعدد بین المللی، کاربرد روش‌های طب مکمل می‌تواند بر بیماری‌های جسمی و روحی اثر بگذاردن. یکی از ابزارهای مهم، در دسترس، کم‌هزینه و مؤثر در طب مکمل که سازمان جهانی بهداشت نیز بر آن تأکید داشته است، یوگا است که امروزه به عنوان شاخه‌ای از طب مکمل، برای ارتقای شاخصه‌های سلامت به کمک پزشکی نوین آمده است.

یوگا واژه‌ای است سانسکریت، به معنای وحدت و یگانگی ذهن، وجود و بر پایه‌ی تمرکز، انجام حرکت‌ها و توجه به تنفس. یوگا، رشته‌های مختلفی دارد که در این بین هاتایوگا از سه بخش تمرينات تنفسی و آرامسازی (پارانایاما)، تمرينات وضعیتی (آسانا)، و انحراف فکر و تمرکز (شاوسانا) تشکیل شده است و بیشترین نوع تمرينی است که انجام می‌شود. شخص با انجام دادن تمرينات هاتایوگا سلامتی را در حیطه‌ی جسم و ذهن تجربه خواهد کرد [۱۴]. یوگا مجموعه‌ای از شیوه‌های مداخله‌ای فیزیکی، روانی، معنوی و اجتماعی بوده و برخورد کل نگرانه و نظاممند با نیازهای انسان را فراهم می‌آورد. تمرينات جسمی و تنفسی یوگا، انعطاف‌پذیری و قدرت عضلانی را افزایش می‌دهد، گردش خون و جذب اکسیژن و عملکرد سیستم هورمونی را بهبود می‌بخشد. به علاوه آرامسازی و رهاسازی در یوگا با تأثیر بر سیستم اتونومیک باعث احساس سلامتی در فرد می‌شود [۱۵]. در مورد تأثیر یوگا به عنوان یک روش مکمل طبی تحقیقات زیادی صورت گرفته است که همه بر کاهش هزینه و عوارض درمان برای گروههای مورد مداخله تأکید دارند. از جمله در کارآزمایی‌های کنترل شده‌ی بالینی سندروم تونل کارپال [۱۶]، مولتی پل اسکلرroz [۱۷]، آسم [۱۸]، سل ریوی [۱۹]، سندروم روده‌ی

قبل از نمونه‌گیری، دور پمپ ماشین روى پنجاه میلی‌لیتر در دقیقه تنظیم و از ست شریانی نمونه‌ی خون تهیه شد. در پایان دیالیز نیز دوباره وزن بیماران کنترل شده و در نهایت نمونه‌ها به آزمایشگاه بیمارستان بقیه ا... (عج) فرستاده شده تا با یک نوع کیت آزمایش انجام شود.

میزان اولترافیلتراسیون از تفاضل بین وزن قبل و بعد همودیالیز به دست می‌آید و پس از دریافت نتایج نمونه نیتروژن اوره خون به منظور تعیین کفايت همودیالیز از فرمول داگراداس دو که یکی از فرمول‌های قابل قبول در سطح جهان است، استفاده شد.

اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق آزمونهای آماری تی زوج، مجدورک و نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

اطلاعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک نمونه‌های پژوهش در جدول ۱ نشان داده شده است.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون تی زوجی بین میانگین امتیازات کفايت همودیالیز نمونه‌های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه

$$Kt/v = (-1) \times \log(\text{Ratio} - 0.03) + (4 - 3.5 \times \text{Ratio}) \times (\text{Ultrafiltrate Volume} / \text{Weight})$$

$$\text{Ratio} = \text{Post BUN}/\text{Pre BUN}$$

آزمون، تفاوت معنی‌داری را نشان داد ($p < 0.001$) (جدول ۲). اما در گروه شاهد این تفاوت معنی‌دار نبود (جدول ۳).

بین وجود کفايت دیالیز واحد های مورد پژوهش با ویژگی‌های فردی (سن، جنس، سطح درآمد، سطح تحصیلات و مدت زمان ابتلا) آنان، با استفاده از آزمون‌های آماری مربوطه، رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد ($p > 0.05$).

بحث

نکته‌ی قابل توجه، بیشتر بودن نسبت مردان همودیالیزی به زنان در دو گروه آزمون و شاهد است. حجت و همکاران در این مورد بیان می‌کنند که در تمامی مطالعات انجام گرفته، تعداد مردان همودیالیزی، همواره بیشتر از زنان اعلام شده است و در ادامه بیان می‌کنند که هر چند که تحقیقی اختصاصی در این زمینه صورت نگرفته است اما این نکته به عنوان زمینه‌ی مناسب پژوهشی می‌تواند راه‌گشایی یافتن علت افزایش شیوع و بروز متفاوت بیماری نارسایی مزمن کلیوی بین دو جنس باشد [۳۷].

نکته‌ی قابل توجه دیگر در این مطالعه، میزان بروز نارسایی کلیه در گروه‌های مختلف خونی است. که در این مطالعه میزان بروز نارسایی کلیه در گروه خونی O نسبت به سایر گروه‌های خونی بیشتر است. از سوی دیگر، در گروه خونی AB به میزان بسیار کمتر مشاهده می‌شود. البته این نکته‌ای است که در تحقیقات دیگر کمتر به آن توجه شده است. پیش‌نهاد می‌شود که مطالعات اختصاصی‌تری در

بر حسب سال طراحی شده است، به تأیید ده نفر از اعضای هیأت علمی رسید. برای برآورد حجم نمونه از نوموگرام آلتمن استفاده شد که حجم نمونه با احتساب $\alpha = 5\%$ و $\beta = 10\%-20\%$ و میزان اثر $1/53$ از مطالعه‌ی اورتکوران و همکارانش (۲۰۰۷) در دانشگاه اولداگ ترکیه [۶]، با احتساب ریزش ده درصدی برای هر گروه ۳۱ نفر محاسبه شد [۱۴].

در بدو پژوهش، در گروه شاهد، پس از معرفی و جلب موافقت ایشان، اقدام به تکمیل پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و اندازه‌گیری کفايت دیالیز نموده، سپس دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای دوباره اندازه‌گیری شد.

در گروه آزمون، پژوهشگر ضمن معرفی خود، بیان اهداف مطالعه و ارایه‌ی توضیحات لازم در ارتباط با هاتایوگا، کار خود را آغاز نمود. هدف از این مرحله، آشناسازی بیمار با تمرینات تعديل شده هاتایوگا (در حد توان بیماران) و اثرات سودمند آن به عنوان طب مکمل در درمان بیماری‌ها جلب مشارکت فعال بیماران برای انجام تمرینات هاتایوگا و استمرار و مداومت در اجرای آن در طول انجام طرح بود. سپس پژوهشگر اقدام به تکمیل پرسشنامه‌ی دموگرافیک و تعیین کفايت دیالیز نمود. در مرحله‌ی بعد، جلسات آموزش تمرینات تعديل شده‌ی هاتایوگا توسط فرد متخصص، دوبار در هفته، در محل سالن ورزشی بیمارستان بقیه ا... (عج) تشکیل شد. همچنین نرم‌افزار آموزشی تمرینات هاتایوگا در اختیار نمونه‌ها قرار داده شد. در ابتدا بیمار تمرینات را به مدت پانزده‌ی الی سی دقیقه انجام داده و به تدریج به زمان انجام تمرینات در هر نوبت، بر حسب تحمل بیمار افزوده شد. سپس، بسته به سطح توانایی فرد (به طور مثال میزان توان بیمار در تعداد شمارش مکث بعد از دم) و میزان دریافت آموزش‌ها، جلسات برگزار شد. بیمار در انتخاب تمرینات تا اندازه‌ای آزاد بود و با حفظ زمان یک ساعت در روز و دو بار در هفته (بر اساس تمایل بیمار، به طور مثال سه تمرین از بین تمرینات آسانا بر اساس نظر بیمار و توصیه‌ی مری) صورت گرفت. سپس در پایان ماه دوم دوباره کفايت دیالیز تعیین شد.

برای تعیین کفايت دیالیز، فرم اطلاعاتی مربوط به کفايت همودیالیز که شامل مشخصات وزن بیمار، اولترافیلتراسیون دستگاه، مدت زمان همو دیالیز، ضریب کلیرانس فیلتر و سرعت جریان محلول همودیالیز، توسط مجری طرح تکمیل شد. میزان اوره و وزن قبل از همودیالیز با نمونه‌گیری از مسیر شریانی نیز اندازه‌گیری شد. لازم به ذکر است که برای جلوگیری از وابستگی بیماران طبق روتین بخش، به دستگاه خاص همودیالیز بیماران به صورت گردشی از دستگاه‌های مختلف همودیالیز استفاده می‌شود. از این رو انتخاب نوع و مدل دستگاه در این تحقیق از کنترل محقق خارج و برای همه‌ی بیماران شرایط گردشی و روتین بخش، یکسان سازی شده بود.

پس از پایان همودیالیز و قبل از جدا سازی بیمار از دستگاه، دوباره یک نمونه خون از ست شریانی قبل از دیالیزور تهیه شد. دو دقیقه

جدول ۱: توزیع نمونه های مورد پژوهش بر حسب خصوصیات دموگرافیک

گروه شاهد

درصد	تعداد	درصد	تعداد	متغیر
۳۸/۷	۱۲	۳۵/۵	۱۱	زن
۶۱/۳	۱۹	۶۴/۶	۲۰	مرد
۳۵/۴	۱۱	۶/۵	۲	سن ۱۵-۴۵
۳۸/۷	۱۲	۶۱/۳	۱۹	۴۵-۶۵
۲۵/۸	۸	۳۲/۲	۱۰	<۶۵
۲۲/۵	۷	۹/۷	۳	مجدد
۷۷/۵	۲۴	۹۰/۳	۲۸	متاهل
۲۹	۹	۳۸/۷	۱۲	ابتدائی تحصیلات
۳۵/۵	۱۱	۳۸/۷	۱۲	زیر دپلم
۲۲/۶	۷	۱۶/۱	۵	دپلم
۱۲/۹	۴	۶/۵	۲	دانشگاهی
۲۵/۸	۸	۱۹/۴	۶	سطح درآمد خوب
۵۸	۱۸	۷۷/۴	۲۴	متوسط
۱۶/۲	۵	۳/۲	۱	ضعیف
مدت زمان همودیالیز				
۲۲/۵	۷	۶/۵	۲	کمتر از یکسال
۲۲/۵	۷	۳/۲	۱	کمتر از دو سال
۵۵	۱۷	۹۱/۳	۲۸	< ۲ سال
۶/۴	۲	۳۲/۳	۱۰	A گروه خونی
۱۶/۱	۵	۱۶/۱	۵	B
۳/۲	۱	۶/۵	۲	AB
۷۴/۳	۲۳	۴۵/۱	۱۴	O

جدول ۲: میانگین نمرات v kt قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون

نتیجه آزمون تی زوجی

گروه آزمون	قبل از مطالعه		بعد از مطالعه		گروه
	میانگین و انحراف معیار				
آزمون	۱/۱۴ ± ۰/۲۲	۱/۱۴ ± ۰/۲۲	۰/۹۶ ± ۰/۲۳	۰/۹۶ ± ۰/۲۳	

 $p < 0/001 \ df = 29 \ t = -4/48$

جدول ۳: میانگین نمرات v kt قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد

نتیجه آزمون تی زوجی

گروه شاهد	قبل از مطالعه		بعد از مطالعه		گروه
	میانگین و انحراف معیار				
شاهد	۱/۳۱ ± ۰/۲۵	۱/۳۱ ± ۰/۲۵	۱/۳۲ ± ۰/۲۶	۱/۳۲ ± ۰/۲۶	

 $p = 0/09 \ df = 29 \ t = -1/7$

در پژوهش حاضر، میانگین میزان کفایت دیالیز بیماران در شرایط عادی در گروه کنترل، نشانه‌ی کفایت پایین دیالیز بود. همان‌طور که اشاره شد، این مسئله در بیشتر مراکز دیالیز در ایران عمومیت دارد و تحقیقات متعدد نیز آن را مورد تأیید قرار داده‌اند. از جمله در طی

این زمینه در ایران صورت گیرد تا افراد و گروه‌های در معرض خطر شناسایی شوند و روش‌های پیش‌گیرانه به طور اختصاصی‌تر در این گروه‌ها مد نظر قرار گیرد.

همچنین نتایج تحقیقات گلدبیرگ و تریشا نیز نتایج مطالعه حاضر را تأیید نموده است [۳۸، ۳۹ و ۴۰].

در مطالعه‌ی فلاحی و همکاران نیز اگرچه افزایش کفایت همودیالیز بعد از انجام دو ماهه‌ی ورزش خیلی دار نبوده است اما این مقدار افزایش در kt/v از $1/۰۳$ به $1/۲۵$ از نظر بالینی حائز اهمیت است [۴۰]: چرا که بر اساس اطلاعات (United States Renal Data System) نزدیک $۱/۲$ خطر مرگ و میر تا هفت درصد کاهش می‌یابد [۱۲] و مطالعات نیز ثابت کرد که هر چه کفایت همودیالیز بهتر باشد، عوارض اورمی بر دستگاه‌های مختلف بدن و نیز مرگ و میر بیماران کاهش می‌یابد [۹].

به طور کلی ارتباط تنگ ذهن و جسم از مدت‌ها پیش روش بوده است و هدف یوگا به عنوان فلسفه‌ی زندگی مشرق‌زمین، به تعادل رسانیدن این دو بوده است و با افزایش توان سازگاری دستگاه‌های روانی، عصبی، ایمنی، شناختی و تعدیل سیستم ایمنی بر افزایش کیفیت زندگی و احساس سلامت کلی بدن تأثیر می‌گذارد [۱۶].

نتیجه‌گیری

امروزه روش‌هایی چون افزایش دور دستگاه، استفاده از صافی‌های قوی و صافی‌های دوبل در حین انجام همودیالیز و استفاده از دیالیز شبانه، به عنوان روش‌های معمول افزایش کفایت دیالیز مطرح است؛ در حالی که در این مطالعه مشاهده شد که می‌توان با به کارگیری تمرینات ساده‌ی هاتایوگا و بدون استفاده از روش‌های پرهزینه و پرعارضه، کفایت دیالیز را بهبود بخشد. همچنین می‌توان از آن در کاهش عوارض ناشی از دیالیز بهره گرفت و علاوه بر این می‌توان از آن در کاهش علایم بسیاری از بیماری‌های مزمن استفاده نمود.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری صمیمانه‌ی پرسنل و بیماران محترم بیمارستان‌های شهید لبافی‌نژاد و بقیه... (عج) و به ویژه آقای صبوری سپرپرستار محترم بخش همودیالیز بیمارستان بقیه... (عج) و همچنین خانم صفوی، مربی یوگا، که صمیمانه و بی‌دریغ ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌نماییم.

References

1. Harrison. Principles of Internal Medicine (kidney and urinary tract diseases). Arjmand Mohsen. Tehran: nasle farad Publication, the third edition in 2005.p.47.
2. Raisifar A . Effect of applying continuous care model on quality of life of patients undergoing kidney transplantation in selected hospitals in Tehran. Master of Nursing thesis. Baghiatollah Medical Sciences 2009.

مطالعه‌ای در مرکز دیالیز اهواز (۱۳۷۸) بر ۷۴ بیمار که سه بار در هفته دیالیز شده بودند و ۹۷ درصد از بیمارانی که دو بار در هفته دیالیز می‌شدند $v/1/۲$ داشتند. در مطالعه‌ای در مرکز همودیالیز کاشان (۱۳۸۰) بر ۳۷ بیمار، هشتاد درصد و تمامی بیماران مرکز همودیالیز کردستان (۱۳۸۰)، کفایت دیالیز مطلوبی نداشتند [۱۲]. هر چند استانداردهای ملی، تحقیقات داخلی و دستورالعمل‌های دفتر امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت سطح $Kt/v: ۱/۲$ را به عنوان کیفیت مطلوب دیالیز (حداقل قابل قبول) بیان می‌کنند، اما استانداردهای بین المللی که در تحقیقات گوناگون استفاده می‌شود، بالاتر است. از جمله انجمن نفرولوژیست‌های آمریکا، سطح $۱/۴$ تا $۱/۷$ را اعلام می‌نماید [۳۷]. این در حالی است که در کشور ما رسیدن به حداقل میزان قابل قبول کیفیت در کشور نیز دشوار است. در مطالعات خارجی نیز به عنوان نمونه مطالعه دل و همکاران در اسپانیا سطح $۱/۳$ ، مطالعه گرزرکورسکا و همکاران در لهستان سطح $۱/۴۵$ ، مطالعه چیرانانتاوو و همکاران در تایلند سطح $۱/۸$ ، مطالعه هلیم و همکاران در سوئد سطح $۱/۳۲$ و مطالعه عباس و همکاران در مصر سطح $۱/۵$ را سطح قابل قبول برای کفایت دیالیز عنوان کرده‌اند که همه از استاندارد تعیین شده در ایران بالاتر است [۴].

در این مطالعه، میانگین کفایت دیالیز در گروه آزمون پس از دو ماه به طور معنی‌داری افزایش داشته است که علت آن به کارگیری شاخه‌ای از طب مکمل در کنار درمان معمول این بیماران است. انجام تمرینات یوگا و به خصوص هاتایوگا، که ترکیبی از تمرینات تنفسی و پوزیشنی و آرامسازی به همراه موسیقی و اذکار مذهبی و قرآنی است، تأثیرات شگرفی بر این بیماران داشت. چنین تأثیراتی هر یک به تنهایی در مطالعات مختلف به تأیید رسیده است. از جمله در مطالعه‌ی حجت و همکاران (۱۳۸۷) با عنوان بررسی تأثیر آوای قرآن و موسیقی بر کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی، میانگین کفایت همودیالیز به طور معنی‌داری افزایش داشته است و نکته‌ی جالب‌تر در این مطالعه تأثیر بیشتر آوای قرآن بر کفایت همودیالیز این بیماران بوده است [۳۷].

همچنین در مطالعه‌ی رفیعی (۱۳۸۷) بر بیماران همودیالیزی شهید هاشمی‌نژاد، نتایج تغیرات ایجاد شده در میزان کفایت دیالیز پس از یک دوره‌ی دو ماهه انجام حرکات نرمشی با مطالعه‌ی حاضر همخوانی دارد.

3. Sadjadi M. Relationship of self care and depression in patients treated with maintenance hemodialysis. J Ofoqhe Danesh Med Scien GONABAD. 2008;14(1):13-17.
4. Hojjat M. Adequacy of dialysis in patients with renal failure. Special Nursing Journal. 2009;2(2):61-6.
5. Grassman AN. ESRD patients in 2004: global overview of patient numbers, treatment modalities & associated trends. Nephrol Dial Transplant. 2005 Dec;20(12):2587-93.

6. Borzou R, Ghlyaf M, Amini R, Zandiyan M, Torkaman B. Evaluation of dialysis adequacy in hemodialysis Ekbatan Hospital. *J Med Scien and Health Services HAMADAN*. 2006;13(4):53-7.
7. Haghish AN, Broumand BD, Amico M, Locatelli F, Ritz E. The epidemiology of end stage renal disease in Iran in an international perspective. *Nephrol dial Transplant*. 2002;17(1):28-32.
8. Niu SF, Li IC. Quality of life of patient having renal replacement therapy. *J Adv Nurs*. 2005;51(1):15-21.
9. Raisifar A, Torab pour M, Mohseni Zad P. Review adequacy of dialysis in hemodialysis patients referred to the center city of Abadan in the 2006. *2009;2(4):157-60.*
10. Zeraati AA, Naghibi M, Jabbari Noghabi H. Factors affecting the adequacy of dialysis in hemodialysis patients.. *J Med Scien MASHHAD*. 2008;51(99):45-52.
11. Taherkhani H, Hosseini Naeeni F, Mostafavi H, Hosseini H. Effect of Yoga in treatment of obsessive - compulsive treated with standard drugs. *J ANDISHE VA RAFTAR*. 2003;9(1):47-52.
12. Borzou R, Ghalyaf M, Amini R, Zandiyan M, Torkaman B. Effect of increased blood flow on the amount of dialysis adequacy in hemodialysis patients. *SHAHRKORD KORD J Med Scien*. 2005;8(2):60-6.
13. Javadian Saraf N, Emami T. Methods of aerobic exercise and yoga on the physical components of his female students describe. *J Mental Health Principles*. 2009;10(3): 221-30.
14. Yurtkuran M A. Amodified Exercise Program In Hemodialysis Patients. 2007.p.164-71.
15. Parshad O. Role of yoga in stress management. *West Indian Med J*. 2004;53(3):191-4.
16. Garfinkel MS, Singhal A, Katz WA, Allan DA, Reshetar R, Schumacher HR Jr. Yoga – based intervention for carpal tunnel syndrome: a randomized trial. *JAMA*. 1998;280(18):1601-3.
17. Oken BS, Kishiyama S, Zajdel D, Bourdette D, Carlsen J, Haas M, et al. Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis. *Neurology*. 2004;62(11):2058-64.
18. Vedanthan PK, Kesavalu LN, Murthy KC, Duvall K, Hall MJ, Baker S, et al. Clinical study of yoga techniques in university students with asthma: a controlled study. *Allergy Asthma Proc*. 1998;19(1):3-9.
19. Visweswaraiah NK, Telles S. Randomized trial of yoga as a complementary therapy for pulmonary tuberculosis. *Respirology*. 2004;9(1):96-101.
20. Taneja I, Deepak KK, Poojary G, Acharya IN, Pandey RM, Sharma MP. Yogic versus conventional treatment in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a randomized control study. *Appl Psychophysiol Biofeedback*. 2004;29(1):19-33.
21. Cohen L, Warneke C, Fouladi RT, Rodriguez MA, Chaoul – Reich A. Phychological adjustment and sleep quality in a randomized trial of the effects of a Tibetan yoga intervention in patients with lymphoma. *Cancer*. 2004;100(10):2253-60.
22. Woolery A, Myers H, Sternlieb B, Zeltzer L. A yoga intervention for young adults with elevated symptoms of depression. *Altern Ther Health Med*. 2004;10(2):60-3.
23. Murugesan R, Govindarajulu N, Bera TK. Effect of selected yogic practices on the management of hypertension. *Indian J Physiol Pharmacol*. 2000;44(2):207-10.
24. Shaffer HJ, LaSalvia TA, Stein JP. Comparing Health yoga with dynamic group psychotherapy for enhancing methadone maintenance treatment: a randomized clinical trial. *Altern Ther Health Med*. 1997;3(4):57-66.
25. Garfinkel MS, Schumacher HR Jr, Husain A, Levy M, Reshetar RA. Evaluation of a yoga based regimen for treatment of osteoarthritis of the hands. *J Rheumatol*. 1994;21(12):2341-3.
26. Williams KA, Petronis J, Smith D, Goodrich D, Wu J, Ravi N, et al. Effect of iyengar yoga therapy for chronic low back pain. *Pain*. 2005;115(1-2):107-17.
27. Raub JA. Psychophysiological effects of Hatha Yoga on musculoskeletal and cardiopulmonary function: a literature review. *J Altern Complement Med*. 2002;8(6):797-812.
28. Jayasinghe SR. Yoga in cardiac health (a review). *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*. 2004;11(5):369-75.
29. 0 menopausal symptoms: a review of randomized, controlled trials. *Ann Intern Med*. 2002;137(10):805-13.
30. Fairfield KM, Eisenberg DM, Davis RB, Libman H, Phillips RS. Patterns of use, expenditures, and perceived efficacy of complementary and alternative therapies in HIV-infected patients. *Arch Intern Med*. 1998;158(20):2257-64.
31. Bower JE, Woolery A, Sternlieb B, Garet D. Yoga for cancer patients and survivors. *Cancer Control*. 2005;12(3):165-71.
32. Ernst E, Cassileth BR. The prevalence of complementary/alternative medicine in cancer: a systematic review. *Cancer*. 1998;83(4):777-82.
33. Lavey R, Sherman T, Mueser KT, Osborne DD, Currier M, Wolfe R. The effects of yoga on mood in psychiatric inpatients. *Psychiatr Rehabil J*. 2005;28(4):399-402.
34. Malhotra V, Singh S, Tandon OP, Madhu SV, Prasad A, Sharma SB. Effect of yoga asanas on nerve conduction in type 2 diabetes. *Indian J Physiol Pharmacol*. 2002;46(3):298-306.
35. Bijlani RL, Vempati RP, Yadav RK, Ray RB, Gupta V, Sharma R, et al. A Brief but comprehensive lifestyle education program based on yoga reduces risk factors for cardiovascular disease and diabetes mellitus. *J Altern Complement Med*. 2005;11(2):267-74.
36. Yogendra J, Yogendra HJ, Ambardekar S, Lele RD, Shetty S, Dave M, et al. Beneficial effects of yoga lifestyle on reversibility of ischaemic heart disease: caring heart project of International Board of Yoga. *J Assoc Physicians India*. 2004;52:283-9.
37. Hojat M, Zohadat Pour Z, Nasr-Esfahani M. Sound effects compared with the conditions of silence Quran, Arabic and Persian music music on the adequacy of hemodialysis. *J Special Nursing*. 2010;3(2):69-74.
38. Rafiee. H. Effect of exercise movements during hemodialysis selected hospitals in Tehran. Master of Nursing thesis. IUMS 0.2009.

39. Goldberg AP, Hagberg J, Delmez JA, Carney RM, McKevitt PM, Ehsani AA, et al. The metabolic and psychological effects of exercise training in hemodialysis patients. *Am J Clin Nutr.* 1980 Jul;33(7):1620-8.
40. Fallahi MJ, Shahidi Sh, Farajzadegan Z. Effect of exercise during hemodialysis on dialysis efficiency, serum phosphorus levels, hemoglobin, and blood pressure and compare the two different exercise program in patients. *J ISFAHAN Medical.* 2008;26(89):159-61.

Archive of SID