

## اثر چهار و هشت هفته تمرین استقامتی منظم بر برخی شاخص‌های انعقادی موش‌های صحراوی نر در دوران بلوغ

دکتر شادمهر میردار<sup>۱</sup>، دکتر ولی الله دبیدی روشن<sup>۲</sup>، دکتر اکبر حاجی زاده مقدم<sup>۳</sup>،  
<sup>\*</sup>حمید همدانی<sup>۴</sup>، یونس کلابی<sup>۵</sup>، مجید نجابت<sup>۶</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۸/۲۳ تاریخ پذیرش مقاله: ۸۹/۸/۲۴

### چکیده

رشد سیستم انعقادی در دوران رشد سبب می‌شود تفاوت‌های مهمی در فعالیت فاکتورهای کودکان، در مقایسه با بزرگسالان ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر برخی شاخص‌های انعقادی در مosh‌های صحراوی نر بالغ و نابالغ با نزد ویستار است. ۴۲ سر مosh نزد ویستار (سه هفته) به سه گروه کنترل (۲۶ سر) و تجربی (۱۶ سر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی طی چهار و هشت هفته، با تکرار بینج پار در هفته و با شدت معین اجرا شد. نمونه‌های خونی، قبل و ۲۴ ساعت پس از آخرین فعالیت بدنه (چهار و هشت هفته تمرین) گرفته شد. فیبرینوژن، PT و APTT همه گروه‌ها، با شیوه‌های استاندارد آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها، با استفاده از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه<sup>۷</sup> و توکی تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری آماری ( $P<0.05$ ) در نظر گرفته شد. فیبرینوژن مosh‌ها در دوران بلوغ، پس از چهار هفته تمرین منظم، افزایشی معنی‌دار داشت ( $P=0.000$ )، اما هشت هفته تمرین در سطوح فیبرینوژن مosh‌های بالغ تفاوت معنی‌داری ایجاد نکرد ( $P=0.771$ ). مقادیر PT گروه‌های تجربی دوران بلوغ و بالغ، پس از هشت هفته تمرین کاهشی معنی‌دار داشت (به ترتیب  $0.027$  و  $0.025$   $P=0.025$ ) و APTT نیز در تمام گروه‌های تجربی با کاهش معنی‌دار تواأم بود ( $P=0.000$ ). نتایج این پژوهش نشان داد سیستم انعقادی، قبل و پس از دوران بلوغ تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد که باید از نظر فیزیولوژیکی مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین نوع برنامه تمرینی در سنین مختلف می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد.

### کلیدواژه‌های فارسی: تمرین استقامتی، عوامل انعقادی، بالغ، دوران بلوغ.

۱ و ۲. دانشیار دانشگاه مازندران

۳. استادیار دانشگاه مازندران

۴، ۵ و ۶. کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

E-mail: hhamedany@gmail.com

7. ANOVA

**مقدمه**

تصلب شرایین، بیماری پیش‌روندهای است که از دوران کودکی شروع می‌شود و در سنین بالا بروز می‌کند (۱). این اعتقاد که ترومبوز<sup>۱</sup> نقشی اساسی در توسعه پلاگ و شروع سندرم‌های حاد کرونری ایفا می‌کند، توجه به دستگاه هموستاز<sup>۲</sup> خون و دو شاخص انعقاد<sup>۳</sup> و فیبرینولیز<sup>۴</sup> را به عنوان فرآیندهای متضاد فیزیولوژیکی در هموستاز و ترومبوز در پی داشته است (۲). تفاوت‌های فیزیولوژیکی عمدہای که در سیستم انعقادی کودکان، در مقایسه با بزرگسالان وجود دارد (۳) و پویایی سیستم هموستاز که وابسته به سن محسوب می‌شود، سبب شد پژوهشگران به واژه «هموستاز بالیدگی»<sup>۵</sup> توجه کنند (۴)، حقیقتی که امروزه، تفاوت‌های عمدۀ فیزیولوژیک سیستم انعقادی کودکان و بزرگسالان را عموماً در سطح جهان به امری پذیرفته شده تبدیل کرده است (۵). با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اطلاعات اندکی در مورد غلظت پلاسمایی شاخص‌های هموستاتیک دوران کودکی و قبل از بلوغ وجود دارد؛ زیرا فرض بر کاربرد دامنه طبیعی این شاخص‌ها در بزرگسالان برای کودکان بوده است، اما بر اساس مطالعات جدیدتر، ممکن است این طور نباشد (۶-۸).

نارسایی حاصل از دستگاه هموستازی و تغییر شاخص‌های آن مانند فیبرینوژن از عوامل تهدیدکننده سلامت کودکان است (۹، ۱۰). اگرچه برخی بر این باورند که کودکان به‌طور قابل توجهی کمتر از بزرگسالان با خطرات عوارض ترومبوتیک مواجه‌اند، سازوکارهای فیزیولوژیک محافظتی کودکان در برابر این عوارض کاملاً روشن نیست (۱۱). بر اساس مطالعات آندرئو و همکاران<sup>۶</sup> (۲۰۰۵)، بین برخی شاخص‌های انعقادی مانند PTT، PTT بین گروه‌های سنی کودکان و بزرگسالان تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود (۱۲)، اما مطالعات میکائیل و همکاران (۲۰۰۵) در شاخص‌های انعقادی دو گروه تفاوتی معنی‌دار نشان می‌دهد (۱۳). همچنین پژوهش‌های بروس و همکاران<sup>۷</sup> (۲۰۰۷) نشان می‌دهد سرعت و قدرت انعقاد کودکان بیشتر از بزرگسالان است (۱۴).

- 
1. Thrombosis
  2. Hemostats
  3. Coagulation
  4. Fibrinolysis
  5. developmental hemostasis
  6. Andrew M
  7. Bruce E.

بنا بر تحقیقات انجام شده، محرک‌های متعددی از قبیل استرس بدنی (۱۵) فشارهای فکری و هیجانی (۱۶)، شرایط تغذیه‌ای و ترکیب بدنی (۱۷)، جنسیت (۱۸)، سن و بلوغ (۱۹) و حتی تغییرات فصلی (۲۰) می‌تواند بر عملکرد دستگاه انقادی اثر بگذارد، پژوهش‌های انجام شده در زمینه هموستاز خون نیز بیانگر تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر برخی عوامل انقادی است (۲۱). مطالعات گیسپ و همکاران<sup>۱</sup> (۲۰۰۸) نشان می‌دهد سازوکارهای انقادی در کودکان تحت تأثیر رشد قرار دارد (۲۲). به عقیده برخی پژوهشگران واکنش فیبرینولیکی همراه با سن افزایش می‌یابد. همچنین این فرض وجود دارد که علاوه بر مرحله مایع هموستازی، دیواره عروقی سطح آنتی‌ترومبوتیکی مهمی را تحت شرایط فیزیولوژیک در بزرگ‌سالان ایجاد می‌کند. هر چند این موضوع به خوبی مطالعه نشده، روشن است که دیواره عروق دست‌خوش تغییرات فرآیند سنی است که احتمالاً از اوایل زندگی شروع می‌شود؛ به عنوان مثال گلیکوزامینوگلیکان<sup>۲</sup> دیواره عروق با سن تغییر می‌کند. از سوی دیگر، زمان خون‌روی طولانی کودکان به وضعیت هموستاتیک آن‌ها ارتباط داده می‌شود؛ بنابراین ممکن است تفاوت مهمی در دیواره عروق یا عملکرد پلاکتی کودکان وجود داشته باشد (۲۳). همچنین مشخص شده است که نوع تمرینات ورزشی می‌تواند تأثیر مختلفی بر عوامل انقادی داشته باشد (۲۴). بر این اساس، پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد فعالیت‌های بدنی ممکن است آغازگر سندروم کرونری حاد باشد؛ زیرا تمرینات شدید موجب وضعیت پروترومبوتیکی با فعال‌سازی پلاکتی و لوکوسیتی شده و افزایش جفت شدن پلاکت – لوکوسیت را در پی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرینات ورزشی، فعالیت پلاکتی و لوکوسیتی را مستقل از ترومبوین افزایش می‌دهد و دو ویژگی انقادی و فیبرینولیزی تحت تأثیر تمرین افزایش می‌یابند، اما به نظر می‌رسد تعادل بین آن‌ها تغییر نمی‌یابد (۲۵). نتایج برخی پژوهش‌ها حاکی از تأثیرات کاهشی فعالیت‌های ورزشی در ایجاد ترومبوین (۲۱) و افزایش یا عدم تغییر (۲۶، ۲۷) مقادیر فیبرینوژن است. کارمن<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۰۰) ارتباط آمادگی بدنی (آزمون نوارگردان) و سطح فیبرینوژن پلاسمای ۱۹۳ آزمودنی<sup>۴</sup> تا ۲۵ سال را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد سطح آمادگی بدنی با میزان فیبرینوژن پلاسما در کودکان رابطه معکوسی دارد (۲۱). بالاگوپال<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۰۵) پس از بررسی اثر فعالیت بدنی متوسط و تأثیر رژیم غذایی بر فاکتورهای التهابی هشت نوجوان چاق به این نتیجه رسیدند که شیوه لحاظ شده در کاهش معنی‌دار فیبرینوژن

1. Giuseppe Piccione

2. Glycosaminoglycan

3. Carmen

4. Balagopal, et al.

مؤثر بوده است، در حالی که یافته‌های ماهون<sup>۱</sup> و همکاران (۱۹۹۷) در بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و فیبرینوژن ۴۷ کودک و نوجوان ۱۰-۱۶ سال این ارتباط را تأیید نکرد (۲۸). تحقیقات پیشین تا حدود زیادی بر تغییرات سیستم هموستازی پس از تولد و طی دوران نوزادی متتمرکز بوده است. نتایج این پژوهش‌ها، تفاوت بین این شاخص‌ها را در شش ماه اول زندگی کودکان تأیید کرده است (۲۹)، اما با وجود نبود اطلاعات لازم در مورد دستگاه هموستاتیک در دوران کودکی و بلوغ، تصور می‌شود مقادیر دوران بزرگ‌سالی برای کودکان قابل تعمیم است، اما مطالعات اخیر این ادعا را تأیید نمی‌کند (۱۲). از سوی دیگر، در برخی پژوهش‌ها دوران کودکی و قبل از بلوغ، به دلیل نارسایی و نقصان بازدارنده‌های انعقادی مانند پروتئین‌های C و S دوران و گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند (۲۳). بر همین اساس، پژوهش حاضر با توجه به اهمیت تغییرات دوران بلوغ بر شاخص‌های مختلف فیزیولوژیک در صدد برآمد تا شاخص‌های انعقادی را در این دوره مهم زندگی بررسی کند. با توجه به عوامل فراوان اثرگذار بر دستگاه انعقادی و به تبع آن، مشکلات احتمالی در تفکیک این اثرات از یکدیگر و نیز کمبود تحقیقات مقایسه‌ای در مورد تأثیر فعالیت منظم بدنی در دو گروه بالغ‌ها و دوران بلوغ، محقق با انتخاب آزمودنی‌های حیوانی، به دلیل امکان کنترل و نظارت بیشتر و با این فرض که عوامل هموستازی تحت تأثیر فرآیند بلوغ قرار می‌گیرد (۱۹)، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تمرینات منظم بدنی به مدت چهار و هشت هفته در دوران بلوغ و بعد از آن چه تأثیری بر عوامل انعقادی منتخب در این پژوهش (فیبرینوژن، APTT و PT) دارد؟

### روش‌شناسی پژوهش

در پژوهش حاضر، ۱۸ سر موش آزمایشگاهی نر که دوران بلوغ خود را می‌گذراندند و ۱۶ سر موش آزمایشگاهی بالغ نزاد ویستار از مرکز پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی انسستیتو پاستور تهیه شدند. حیوانات، پس از انتقال به محیط پژوهش و آشنایی با محیط جدید و نحوه فعالیت روی نوارگردن، به طور تصادفی به دو گروه کنترل (دوران بلوغ ۹ سر، بالغ ۹ سر) و دو گروه تحریبی (دوران بلوغ ۹ سر، بالغ ۷ سر) تقسیم شدند.

موش‌های صحرایی نر نزاد ویستار در سن هفت تا هشت هفتگی به دوران بلوغ خود نزدیک و در سن ۱۲ هفتگی قدرت باروری پیدا می‌کنند (۳۰) که از طریق تغییرات هورمون‌های جنسی، افزایش وزن بافت تناسلی و رویش موی تنه تأیید می‌شود (۳۱). حیوانات در قفس‌های پلی کربنات شفاف (هر قفس، پنج عدد) و در محیطی با دمای

1. Mahon

$25 \pm 2$  درجه سانتی گراد، چرخه روشنایی به تاریکی ۱۲:۱۲ ساعت و رطوبت  $65 \pm 5$  درصد نگهداری شدند. برای جلوگیری از تجمع آمونیاک حاصل از ادرار حیوانات در محل نگهداری، از دو تهوية مناسب استفاده شد که صدای کم و مکش زیادی داشتند (۳۲).

جدول ۱. مشخصات موش‌های آزمون پژوهش

گروه	مدت تمرین	وزن گیری (گرم)	تعداد	سن خون‌گیری (هفته)	جمع کل
دوران بلوغ	-	$140/44 \pm 4/39$	۹	۹	۳۴
	چهار هفته	$143/89 \pm 4/65$	۹		
	-	$234/75 \pm 5/0.9$	۹	۱۳	
بالغ	هشت هفته	$239/57 \pm 5/62$	۷		

آب و غذای مورد نیاز حیوانات به صورت کاملاً آزاد در اختیار آن‌ها قرار داده شد (۳۳). جلسه آشنایی با نوارگردان از راه رفتن و دویدن سبک شروع شد و به تدریج، تا سرعت ۵ تا ۸ متر در دقیقه و مدت ۵ دقیقه افزایش یافت (۱۹، ۳۳). سپس، گروه‌های تجربی در دو گروه دوران بلوغ و بالغ، به ترتیب به مدت چهار و هشت هفته و هفتاهای پنج جلسه، با مدت و شدت پیش‌رونده و با رعایت اصل اضافه بار تمرین کردند که جزئیات تمرین در جدول ۲ ذکر شده است (۳۳).

جدول ۲. برنامه تمرینی موش‌های گروه تمرین

متغیر	هفت	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم
سرعت: متر/دقیقه	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۵
مدت: دقیقه	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۵

در هر مرحله از خون‌گیری، آزمودنی‌های مورد نظر با ترکیب ۲ به ۵، زایلازین<sup>۱</sup>، کتامین<sup>۲</sup> و به مقدار  $1/5$  سی‌سی به نسبت هر صد گرم از وزن حیوان، با تزریق آن به ناحیه صفاقی بی‌هوش شدند و خون‌گیری توسط سرسوزن آغاز شده به سیترات، به طور مستقیم از قلب انجام شد. تمام مراحل خون‌گیری با شرایط مشابه از ساعت ۹ تا ۱۱ انجام شد. در نهایت، برای استخراج پلاسمه، نمونه‌ها به مدت ۱۵ دقیقه و با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شدند. نمونه‌ها در چند لوله مجزا (یکی از لوله‌ها حاوی ۰.۲٪ سیترات برای اندازه‌گیری APTT، PT و فیبرینوژن به نسبت ۱:۹) جمع‌آوری و در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال شد. برای اندازه‌گیری فیبرینوژن به روش clauss (۳۴) و کیت‌های ویژه PTT، PT (۲۴، ۲) استفاده شد. از آزمون



1. Xylazine  
2. Ketamine

کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون  $t$  مستقل استفاده شد. در تمام بررسی‌های آماری، سطح معنی‌داری ( $P \leq 0.05$ ) تعیین شد.

### یافته‌های پژوهش

**فیبرینوژن:** مقادیر فیبرینوژن گروه کنترل بالغ نسبت به دوران بلوغ، به میزان  $40/35$  درصد افزایش معنی‌دار داشت ( $P=0.000$ ). همچنین چهار هفته تمرین به افزایش معنی‌دار این شاخص ( $28/28$ ) در گروه تجربی دوران بلوغ ( $P=0.000$ ) و هشت هفته تمرین به کاهش اندک فیبرینوژن بالغ‌ها منجر شد که از نظر آماری معنی‌دار نبود ( $P=0.771$ ), (نمودار ۱ و جدول‌های ۳ و ۴).

**PT:** نمودار ۱ و جدول‌های ۳ و ۴ نشان می‌دهند که همراه با تغییر سن، مقادیر PT از  $22/44$  ثانیه در دوران بلوغ به  $13/91$  ثانیه در موس‌های بالغ رسیده است، به‌طوری که طی دوران بلوغ، مقادیر PT نسبت به گروه سنی بالغ،  $36/36$ ٪ افزایش معنی‌دار داشت ( $P=0.006$ ). علاوه بر تأثیر بلوغ، تمرینات استقامتی لحاظ شده نیز مقادیر PT را با کاهش محسوسی همراه ساخت، به‌نحوی که چهار هفته تمرین به کاهش معنی‌دار PT به میزان  $28/28$ ٪ در گروه دوران بلوغ ( $P=0.25$ ) منجر شد. همچنین، هشت هفته تمرین نیز موجب شد PT به میزان  $5/5$ ٪ کاهشی معنی‌دار یابد ( $P=0.27$ ).



نمودار ۱. مقایسه (الف) فیبرینوژن، ب) APTT و PT گروه‌های کنترل و تجربی

**aPTT:** یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مقادیر aPTT در گروه بالغ، با افزایش سن کاهش یافته است که این کاهش معنی‌دار نیست. همچنین، اجرای تمرینات استقامتی در هر دو گروه تمرین دوران بلوغ و بالغ با چهار و هشت هفته تمرین به کاهش معنی‌دار ( $P=0.000$ ) aPTT منجر شد (نمودار ۱ و جدول‌های ۳ و ۴).

جدول ۳. مقایسه بین گروه‌های خونی گروه‌های تجربی و کنترل (آزمون  $t$ )

سطح معنی‌داری (P)	مقایسه گروه‌های کنترل با تجربی (آزمون t)	متغیر
۰/۰۰۰	کنترل دوران بلوغ	فیبرینوژن
۰/۷۷۱	تجربی بالغ	
۰/۰۲۵	کنترل دوران بلوغ	
۰/۰۲۷	تجربی بالغ	PT
۰/۰۰۰	کنترل دوران بلوغ	
۰/۰۰۰	تجربی بالغ	APTT

جدول ۴. مقایسه درون گروه‌های خونی گروه‌های تجربی و کنترل (آزمون  $t$ )

سطح معنی‌داری	میانگین و انحراف معیار	آزمودنی‌ها	متغیر	شاخص‌های آماری گروه‌ها
۰/۰۰۰	۱۴۹/۴۴±۱۱/۷۳	دوران بلوغ	فیبرینوژن	کنترل
	۲۰۹/۷۵±۲۶/۸۸	بالغ		
۰/۰۰۴	۲۲/۴۴±۷/۰۳	دوران بلوغ	PT	تجربی
	۱۴/۰۹±۰/۸۴	بالغ		
۰/۵۲۳	۴۰/۸۹±۷/۳۶	دوران بلوغ	aPTT	
	۳۸/۸۹±۳/۴۸	بالغ		
۰/۳۸۶	۲۰۹/۰۰±۳۱/۲۸	دوران بلوغ	فیبرینوژن	
	۲۰۵/۸۶±۲۳/۴۳	بالغ		
۰/۰۰۰	۱۶/۰۰±۳/۳۵	دوران بلوغ	PT	
	۱۳/۲۱±۰/۲۷	بالغ		
۰/۲۸۱	۲۵/۴۴±۴/۱۹	دوران بلوغ	aPTT	
	۲۵/۸۶±۲/۵۴	بالغ		

### بحث و نتیجه‌گیری

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد محققان با توجه به اهمیت تغییرات رشدی به هموستاز بالیدگی توجه کرده، این تغییرات را در مطالعات اخیر، طی دوره‌های سنی ارزیابی کرده‌اند (۱۹). پاولمناگل (۲۰۰۴) با استناد به نتایج گزارش‌های گرف<sup>۱</sup>، موناکو جانسن<sup>۲</sup> و چان آک<sup>۳</sup> نه تنها مقادیر پلاسمایی پروتئین‌های کودکان؛ بلکه عملکرد کلی سیستم انقادی آنان را کامل‌آ با بزرگ‌سالان متفاوت دانسته است (۳۵). بر این اساس، علاوه بر تفاوت‌های کمی (بر مبنای مدل حیوانی) تفاوت‌های کیفی در پروتئین‌های انقادی وجود دارد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، چهار هفته تمرین استقاماتی فزاینده با شدت متوسط، سبب شده است مقادیر فیبرینوژن گروه تجربی دوران بلوغ، در مقایسه با گروه کنترل، بهمیزان ۲۸ درصد افزایش معنی‌دار ( $p=0.000$ ) داشته است که احتمالاً به دلیل تحولات هورمونی خاص این دوران و سطوح فزاینده ماکروگلوبولین است. به علاوه، پژوهشگران معتقدند انتقال عوامل انقادی و فیبرینولیتیکی یکباره رخ نمی‌دهد، بلکه سیستم‌های انقادی به‌طور مستقل تکامل می‌یابند (۳۶). تحقیقات نشان می‌دهند که اثر تمرینات مختلف بر مقادیر فیبرینوژن جوانان متناظر بوده و با توجه به پروتکل‌های مختلف تمرینی، نتایج متفاوتی در پی داشته است (۳۷). از سوی دیگر، پژوهش‌هایی که متغیرهای مورد نظر را بر آزمودنی‌های حیوانی با پروتکل مشابه مد نظر قرار داده باشند یافت نشد؛ از این رو به‌نظر می‌رسد پژوهش حاضر اولین مورد در این زمینه باشد. با وجود این در پژوهش‌هایی مشابه با تحقیق حاضر، در آزمودنی‌های انسانی یافته‌های متناظر وجود دارد. کارمن و همکاران (۲۰۰۰) بین آمادگی بدنی و سطوح فیبرینوژن آزمودنی‌های ۴ تا ۲۵ سال ارتباط معکوسی مشاهده کردند (۲۱). در پژوهشی دیگر، باربیو<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۰۶) اثر برنامه تمرینی را بر سطوح فیبرینوژن ۷۴ نوجوانان چاق ۱۶-۱۲ سال، روی نوارگردان ارزیابی کردند، با آنکه در ابتدا این بررسی‌ها گزارش کردند که سطوح پایین‌تر آمادگی با افزایش غلظت فیبرینوژن در ارتباط است ( $P \leq 0.1$ )، اما ۱۲ هفته تمرین بسیار شدید اثر معنی‌داری بر غلظت فیبرینوژن نداشت. رویز<sup>۵</sup> و همکاران (۲۰۰۷) در کودکان ۹-۱۰ سال و توماس<sup>۶</sup> (۲۰۰۷) در بررسی نوجوانان ۱۲-۱۳ سال ولزی نتوانستند ارتباطی بین

1. Greffe BS
2. Manco-Johnson
3. Chan Ak
4. Barbeau, et al.
5. Ruiz
6. Tomas

آمادگی بدنی و فیبرینوژن بیابند (۲۸). همچنین پژوهش حاضر با یافته‌های برخی محققان از جمله ون دن بورگ<sup>۱</sup> (۳۴) مبنی بر افزایش فیبرینوژن پس از فعالیت بدنی همسو و با یافته‌های برخی دیگر مغایر است (۳۸).

شاخص‌های انقادی نه تنها نقشی تعیین کننده و کلیدی در عملکرد هموستازی دارند؛ بلکه ممکن است با بسیاری از شرایط پاتولوژیک و فیزیولوژیک نیز مرتبط باشند. از جمله عوامل مؤثر بر افزایش فعالیت انقادی خون، کاتکولامین‌ها و بهویژه اپی‌نفرین است. ایکاروگی<sup>۲</sup> (۱۹۹۹) پس از اجرای برنامه تمرینی‌ای با شدت ۶۰٪ حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده کرد که تمرین، بهطور معنی‌داری سطوح عوامل انقادی و کاتکولامین‌ها را افزایش داده است. وی پیشنهاد کرد، افزایش فیزیولوژیک نوراپی‌نفرین طی تمرینات ورزشی ممکن است با بیش‌انقادی مرتبط باشد (۳۹)؛ بنابراین افزایش فیبرینوژن در ۲۴ ساعت پس از اتمام فعالیت استقامتی مورد نظر در این پژوهش که با شدتی بالاتر از پژوهش فوق صورت گرفته، ممکن است در نتیجه افزایش فعالیت کاتکولامین‌ها و در نتیجه، افزایش فعالیت انقادی باشد. از سوی دیگر، اثر ورزش بر ترومبوzu به نوع، مدت و شدت ورزش بستگی دارد (۲۰)؛ برای مثال، دویدن، در مقایسه با تمرین روی چرخ کارسنج ترومبین بیشتری تولید می‌کند که احتمالاً به این دلیل است که دویدن با آسیب بیشتر بافتی همراه است که به نوبه خود باعث فعال‌سازی عوامل بافتی درگیر در انقاد می‌شود (۲۸). در پژوهش حاضر نیز مشخص شد مدت و شدت تمرین در سنین مختلف می‌تواند پاسخ‌های متفاوتی در شاخص‌های التهابی و انقادی به همراه داشته باشد و با توجه به وضعیت بلوغ و سازگاری به تمرین احتمالاً به مدت بیشتری نیاز است.

از آنجا که افزایش فعالیت یک فاکتور در گردش خون بهطور معمول ممکن است به دلیل تولید فاکتور جدید، آزاد سازی فاکتور ذخیره یا فعال شدن فاکتور غیرفعال موجود در گردش خون باشد (۴۰)، به سبب تأثیرگذاری تمرینات لحاظ شده در تخریب دیواره عروق، آزاد سازی عوامل انقادی برای بازسازی اندوتلیوم می‌تواند از دلایل اصلی افزایش فیبرینوژن در پژوهش حاضر باشد. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که پاسخ حاد به تولید فیبرینوژن پس از ۱۲ ساعت آغاز می‌شود و این افزایش، دست‌کم سه روز ادامه می‌یابد که احتمالاً با ادامه تولید فیبرینوژن یا نیمه‌عمر پلاسمای مرتبط است که ۵ تا ۷ روز به طول می‌کشد (۳۸). از طرف دیگر، طی فعالیت بدنی، گیرنده‌های  $\beta$ -Adrenergic تحریک و باعث افزایش تولید ترومبین می‌شوند. با توجه به تأثیر ترومبین بر فیبرینوژن، احتمالاً افزایش فیبرینوژن می‌تواند به دلیل تأثیر این

1. Van Den Burg

2. Ikarugi

عامل نیز باشد (۴۰، ۲۷)، بنابراین افزایش سطوح فیبرینوژن پلاسمای در موش‌های گروه دوران بلوغ ممکن است بازتاب حالت تورمی اندوتیلیوم عروقی باشد که بر تغییرات سرخرگی آنان دلالت می‌کند (۴۱).

در پژوهش حاضر، ادامه تمرینات استقامتی تا هشت هفته نیز ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در مقادیر فیبرینوژن آزمودنی‌ها پس از هشت هفته تمرین، کاهش اندکی دیده می‌شود که از نظر آماری معنی‌دار نیست، ولی به‌نظر می‌رسد روند تغییرات، میل به بهبود ویژگی‌های فیبرینولیتیکی را بر اساس گزارش لئون<sup>۱</sup> (۲۰۰۹) تأیید می‌کند. یافته‌های این پژوهشگر نشان‌دهنده بهبود عملکرد اندوتیلیال ناشی از تمرینات ورزشی در پی کاهش چسبندگی پلاکتی و برخی فاکتورهای انعقادی از جمله فیبرینوژن و بهبود فیبرینولیز در پی افزایش فعالیت فعال کننده پلاسمینوژن اندوتیلیالی است (۴۲). استراتون و همکاران<sup>۲</sup> (۱۹۹۱) اثر شش ماه تمرین استقامتی شدید را بر میزان فیبرینوژن ۱۰ نفر از مردان جوان سالم (۲۴-۳۰ سال) بررسی کردند. آن‌ها مشاهده کردند میزان فیبرینوژن در جوانان به قدری کم است که فعالیت بدنی نمی‌تواند تأثیری معنی‌دار بر آن‌ها داشته باشد یا اینکه برای ایجاد تأثیر معنی‌دار بر متغیرهای هموستازی به تغییرات بیشتری در میزان آمادگی و چاقی نیاز است (۴۳). مطالعات انسانی در این زمینه نشان می‌دهد به‌طور کلی مقادیر بیشتر فاکتورهای پیش انعقادی در کودکان، کمتر، اما شاخص‌های ضد انعقاد مانند هپارین در آنان بیشتر است و با میزان سرعت متفاوتی افزایش می‌یابد، هر چند تا دوران نوجوانی با تأخیر نسبی به سطح بزرگ‌سالی نزدیک می‌شود با این حال دلیل این کاهش چندان روشن نیست (۴۴).

در پژوهش حاضر مشخص شد که چهار و هشت هفته تمرین فرایندیه باعث کاهش معنی‌دار PT و APTT در تمام گروه‌های تمرینی می‌شود. این یافته با نتایج بسیاری از پژوهش‌ها همخوانی دارد (۱۷، ۴۱)، هر چند برخی محققان (۲۷، ۲۴) عدم تغییر یا افزایش APTT و PT را گزارش کرده‌اند. در همین زمینه مطالعات پرزیبایلوسکی<sup>۳</sup> (۱۹۹۸) نشان‌دهنده اثر افزایش تدریجی شدت تمرین بر کوتاه شدن معنی‌دار APTT بلافاصله بعد از تمرین و عدم تفاوت معنی‌دار PT بود (۴۵). هجد<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۰۱) ملاحظه کردند که دویden با ۷۰ تا ۷۵٪ حداقل اکسیژن مصرفی به مدت ۳۰ دقیقه، APTT را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد (۱۶). نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد تغییرات پروترومبین در مراحل سنی یک تا ۵ سال، ۶ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۶

1. S. Leon

2. Stratton JR

3. Przybylowki

4. HEGDE

سال در کودکان سالم، در مقایسه با دوره بزرگ‌سالی (بیش از ۱۸ سال) از ۱۱ ثانیه به ۱۱/۱، ۱۱/۲ و ۱۲ ثانیه افزایش یافته است. این تغییرات در شاخص زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال، از ۳۰ ثانیه به ۳۱، ۳۲ و ۳۳ ثانیه افزایش یافت، در حالی که شاخص فیبرینوژن از ۲/۷۶ گرم در لیتر به ۲/۷۸ و ۲/۷۹ گرم در لیتر رسید که نشانگر تغییر کاهشی پس از شتاب دوران بلوغ است (۴۶).

مشاهدات بالینی نشان دهنده ارتباط افزایش خون‌ریزی و ترومبوز با کوتاه شدن APTT و PT می‌باشد و از طرفی، همین مشاهدات گواهی می‌دهند که APTT و PT به تهای نمی‌تواند شاخص دقیق و قطعی انعقاد باشد؛ زیرا در شرایط متفاوت که اجزای مختلف مسیرهای داخلی و خارجی به صورت‌های مختلف پاسخ می‌دهند، رفتار آنها قابل پیش‌بینی نیست (۱۵). در پژوهش حاضر، با آنکه زمان PT و APTT کوتاه شده است، این کوتاهی در تمام گروه‌ها برابر نبود و کوتاهی زمان دو شاخص ذکر شده در دوران بلوغ بیشتر در گروه تجربی بالغ بوده که می‌توان به احتمال تأثیرپذیری بیشتر از تمرين برای این گروه اشاره کرد. با توجه به تأثیرگذاری فرآیند بلوغ بر مقادیر دو فاکتور ۵ و ۷ (۱۹) تأثیر این فرآیند بر تفاوت نتایج حاصل از تمرين استقامتی بر آزمودنی‌های بالغ و دوران بلوغ دور از انتظار نیست. علاوه بر این از آنجا که شدت تمرين عاملی مؤثر و تعیین کننده در فعالیت شاخص‌های انعقادی محسوب می‌شود، برخی محققان بر این باورند که فعالیت‌های شدید موجب فعال شدن لوکوسیت‌ها و پلاکت‌ها و در نتیجه، افزایش تراکم و تجمع لوکوسیت-پلاکت می‌شود (۲۵). با این حال، از آنجا که سازوکارهای حفاظتی کودکان روش نیست، در این مورد احتمال‌های مختلفی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. میزان پروترومبین در کودکان ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از بزرگ‌سالان است. افزایش واکنش‌های فیبرینولیزی با افزایش سن در مطالعات اندرو و همکاران (۲۰۰۸) پیشنهاد شده است. هایدل و همکاران (۲۰۰۷)<sup>۱</sup> گزارش کردند کودکان پارامترهای انعقادی معمولی مانند PT و aPTT طولانی دارند که عمدتاً به دلیل غلظت کمتر فاکتورهای پیش‌انعقادی و حتی کاهش فاکتورهای بازدارنده است. این تفاوت در سال‌های اویل زندگی مشخص است، اما در تمام دوران کودکی و نوجوانی افزایش می‌یابد. بر این اساس، نوزادان تنها قادر به تولید ۳۰-۵۰ درصد از مقادیر ترومبوز بزرگ‌سالی هستند که این امر به دلیل استفاده مقدار زیادی از فاکتور بافت<sup>۲</sup> شبیه ماده انعقادی معمولی PT برای شروع انعقاد است. نشان داده شده است که میزان استفاده از TF (ماده‌ای که بازتاب احتمالی شرایط فیزیولوژیکی است) در

1. H. Haidl

2. Tissue factor (TF)

حد ناچیزی است. مشاهدات این محققان نشان می‌دهد کودکان می‌توانند هنگامی که مقدار فاکتور رشد کمی (کمتر از ۱۰ pmol) داشته باشند تقریباً به اندازه بزرگ‌سالان ترومبین تولید کنند (۴۷).

به طور کلی، بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که انجام تمرینات استقامتی باشد متوسط برای دوره‌ای کوتاه (چهار هفته در این پژوهش) می‌تواند باعث افزایش فعالیت سیستم انعقاد خون در سنین پرخطر دوران بلوغ شود؛ از این رو شتاب تغییرات رو به رشد ظرفیت انعقادی با رشد و بلوغ همراه می‌گردد، اما برای سازگاری آزمودنی‌ها احتمالاً مدت طولانی‌تر دوره تمرینی (۸ الی ۱۲ هفته) مؤثر است و خطرات احتمالی متعاقب سیستم انعقاد را کاهش می‌دهد. تمرینات ورزشی می‌تواند هم ویژگی‌های انعقادی و هم فیبرینولیزی خون را افزایش دهد، اما تعادل بین سازوکارهای این دو وضعیت، هنگام بروز استرس حفظ می‌شود؛ از این رو، بخشی از این تغییرات ممکن است به دلیل این تأثیر دو سویه در کنار تغییرات حاصل از رشد باشد. مطالعات جی ریبریو و همکاران<sup>۱</sup> (۲۰۰۷) مؤید افزایش متوسط فعالیت انعقادی و افزایش قابل ملاحظه فعالیت فیبرینولیکی نوجوانان بود که احتمالاً نشانه قدرت حفاظتی در برابر حوادث ترومبوژنیکی است. در مقایسه با بزرگ‌سالان، به نظر می‌رسد این تفاوت در واکنش‌های ترومبوژنیکی به دلیل تفاوت عملکرد اندوتیالی مرتبه با سن باشد (۴۸) که ممکن است تحت تأثیر تغییر غلظت گلیکوزامینو گلیکان دیواره عروق، همراه با تغییرات رشد و بلوغ قرار گیرد که می‌تواند نقشی تعیین کننده در کاهش فعالیت سیستم انعقادی، طی سازوکارهای قفل و کلیدی یا همکاری اختصاصی الکترواستاتیک ایفا نماید (۴۹)؛ بنابراین توجه مردمیان به سن افراد، بهویژه در دوران رشد و بلوغ در تجویز برنامه تمرینی امری ضروری است. به علاوه، با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای کنترل بهتر و دقیق‌تر روند اجرای پژوهش از نمونه‌های حیوانی بهره گرفته است و با عنایت به پژوهش‌های اندک صورت گرفته در مورد این دوره حساس از رشد، به نظر می‌رسد هنوز به مطالعات بیشتر و تعریفی دقیق‌تر از رابطه واکنش مطلوب در ایجاد و حفظ سازگاری و هموستانزی بالیدگی حاصل از تمرین و بلوغ و نیز طراحی متفاوت‌تر مراحل قبل و پس از بلوغ و همچنین بهره‌گیری از نمونه‌های انسانی علاوه بر نمونه‌های حیوانی نیاز است.

1. J. Ribeiro

**منابع:**

1. Jayachandran, M., Okano, H., Chatrath, R., Owen, W. G., Joseph, P. (2004). Sex-specific changes in platelet aggregation and secretion with sexual maturity in pigs. *J Appl Physiol*, 97: 1445-1452.
2. Cadroy, Y., Fabien, P., Kjells, S.S., Claire, T., Bernard, B., Riviere, D. (2002). Strenuous but not moderate exercise increase the thrombotic tendency in healthy sedentary male volunteers. *J Appl Physiology*, 93(3): 829-833.
3. Ignjatovic, V., Furmedge, J., Newall, F., Chan, A., Berry, L., Fong, C., Cheng, K., Monagle, P. (2006). Age-related differences in heparin response. *Thrombosis Research*, 6: 741-745.
4. Monagle, P., Andrew, M. (2003). Developmental hemostasis: relevance to newborns and infants. In: D.G. Nathan and S.H. Orkin, Editors, *Nathan and Oski's hematology of infancy and childhood*. 6th ed. vol. 1, W.B. Saunders Company, Philadelphia, United States of America, pp. 121–168 Chapter 5.
5. Monagle, P., Hagstrom, J. N. (2003). Developmental haemostasis. In: R.A. Polin, W.W. Fox and S.H. Abman, Editors, *Fetal and neonatal physiology*. 3<sup>rd</sup> ed. vol. 2, W.B. Saunders, Philadelphia.
6. Andrew, M., Paes, B., Milner, R., Johnston, M., Mitchell, L., Tollefsen, D.M., Castle, V., Powers, P. (1988). Development of the coagulation system in the healthy premature infant. *Blood*, 72:1651.
7. Andrew, M., Paes, B., Milner, R., Johnston, M., Mitchell, L., Tollefsen, D.M., Powers, P. (1987). The development of the human coagulation system in the full-term infant. *Blood*, 70:165.
8. Andrew, M., Paes, B., Johnston, M. (1990). Development of the hemostatic system in the neonate and young infant. Clinical research update. *Am J Pediatr Hematol Oncol*, 12: 95.
9. Spronk H. M., Van Der Voort D., and Cate H. T. (2004). Blood Coagulation and the risk of atherothrombosis: A complex relationship. *Thrombosis Journal*, 2(12).
10. Boucher, M., et. al. (2003). Plasma lipid and fibrinogen levels in aerobically trained and untrained postmenopausal women. *J. Spo. Med. Phys. Fitness*, 43.
11. Andrew, M. Hemorrhagic and thrombotic complications in children, in Hirsh J, Colman R (eds): *Hemostasis and Thrombosis*. Philadelphia, PA, Lippincott (in press)
12. Andrew M, Vegh P, Johnston M, Bowker J, Ofosu F, Mitchell L. (2005). Maturation of the hemostatic system during childhood. *Blood* 1992;80:1998.
13. Flanders, M.M., Ronda, L., Crist, A., Roberts, W.L., Rodgers, G.M. (2005). *Clinical Chemistry*, 51(9):1738-1741.

14. Miller, B.E., Bailey, J.M., Mancuso, T.J., Weinstein, M.S., Holbrook, G.W., Silvey, E.M., Tosone, S. R., Levy, J.H. (1997). Functional Maturity of the Coagulation System in Children: An Evaluation Using Thrombelastography. PEDIATRIC ANESTHESIA SECTION EDITOR, PAUL R. HICKEY . Anesth Analg, 84: 745-8.
15. Karakoc, Y., Duzova, H., Polat, A., Emre, M., Arabaci. (2005). Effects of training period on haemarheological variables in regulary trained footballers. Br j sports Med, 4: 39.
16. Hegde, Sudhir S., Goldfarb, Allan H., Hegde, Sepna. (2001). Medicine & Science in Sports & Exercise. Clotting and fibrinolytic activity change during the 1h. after a sub maximal run. 33(6): 887-892.
17. Barauna, V.G., Kaleizu, T.R., Irigoyen, M.C., de Oliveira, E. M. ( 2007). Effects of Resistance Training on Ventricular Function and Hypertrophy in a Rat Model. Clinical Medicine & Research, 5(2): 114-120
18. Kulaputana1, O., Macko, R.F., Ghiu1, I., Phares1, D.A., Goldberg, A.P., Hagberg1, J.M. (2005). Human gender differences in fibrinolytic responses to exercise training and their determinants. Experimental Physiology, 90 (6): 881-887.
19. Andrew, M., Vegh, P., Johnston, M., Bowker, J., Ofosu, F., Mitchell, L. (1992). Maturation of the hemostatic system during childhood. American Society of Hematology, 52(80): 1998-2005.
20. Rudnicka, A.R., Rumley, A., Lowe, G., Strachan, D.P. (2007). Diurnal, Seasonal, and Blood-Processing Patterns in Levels of Circulating Fibrinogen, Fibrin D-Dimer, C-Reactive Protein, Tissue Plasminogen Activator, and von Willebrand Factor in a 45-Year-Old Population. Circulation, 115: 996-1003.
21. Isasi, C.S., Starc, T.J., Tracy, R.P., Deckelbaum, R., Berglund, L., Shea, S. (2000). Inverse Association of Physical Fitness with Plasma Fibrinogen Level in Children The Columbia University BioMarkers Study. American Journal of Epidemiology, 152(3): 212-218 .
22. Piccione1, G., Bertolucci, C., Giannetto, C., Giudice, E. (2008). Clotting profiles in newborn maltese kids during the first week of life. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 20(1): 114-118
23. Cromme-Dijkhuis, A.H., Henkens, C.M.A., Bijleveld, C.M.A., Hillege, H.L., Bom, V.J.J., Van der Meer, J. (1990). Coagulation factor abnormalities as possible thrombotic risk factors after Fontan operations. Lancet, 336:1087,
24. Li, N., He, S., Blomback; M., Hjemdahl, P. (2007). Platelet Activity, Coagulation, and Fibrinolysis During Exercise in Healthy Males. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 27:407.

25. Piccione, G., Fazio, F., Giudice, E., Grasso, F., Caola, G. (2005). Exercise-induce changes in the clotting times and fibrinolytic activity during official 1600 and 2000 meters, trot races in standard bred horses. *Actavet Bro*, 74: 509-514.
26. Hammett, C.J., Prapavessis, H., Baldi, J.C., Varo, N., Schoenbeck, U., Ameratunga, R., Frenchm J. (2006). Effects of exercise training on 5 inflmmatory Markers associated with cardiovascular risk. *Am Heart J*, 151(2): 367.e7-367.e16.
27. El-Sayed, M.S., Sale, C., Jones, P.G.W, Chester, M. (2000). Blood hemostasis in exercise and training. *Med Sci Sports Exerc*, 32(5): 918-925.
28. Thomas1, N. E., Williams, D.R.R. (2008). Inflammatory factors, physical activity and physical fitness inyoung people. *Scand J Med Sci Sports*, 18: 543-556.
29. Johnston, M., Zipursky, A. (1980). Microtechnology for the study of the blood coagulation system in newborn infants. *Can J Med Tech*, 42:159,
30. Rowsell, D.V.M. (1984). Guide to the Care and Use of Experimental Animals. Canadian Council on Animal Care.
31. Whihe, W.H. (1987). The laboratory rat.In T. Pool (Ed):UFAW Handbook on the care and management of Laboratory animals. 6<sup>th</sup> Ed. UK. Longman scientific and technical, Harlow.
32. Guide To The Care Anduse Of Experimental Animals - Edited by: Ernest D. Olfert, DVM; Brenda M. Cross, DVM; and A. Ann McWilliam1993.
33. Gaeini, A.A., Sheikholeslami Vatani, D., Allame, A.A., et al. (2008). Effect of endurance training and a detraining period on lipid peroxidation and antioxidant system in wistar rats. *Journal of Movement Science*, 6(11): 51-63.[ Persian]
34. Van Den Burg, P.J.M, Hospers, J.E.H, Mosterd, W.L., Bouma, B.N. (2000). Aging, physical conditioning and exercise induced changes in hemostatic factors and reaction products. *J Appl Physiol*, 88:1558-1567.
35. Monagle, P. (2004). Anticoagulation in the young. *Heart*, 90: 808-812
36. Barton, M.H., Deem Morris, D., Crowe, N., Collatos, C., Prasse, K.W. (1995). Hemostatic indices in healthy foals from birth to one month of age. *J Vet Diagn Invest*, 7:380-385 .
37. Montgomery, H.E., Clarkson, P., Nwose, O.M., Mikailidis, D.P. (1996). The Acute Rise in Plasma Fibrinogen Concentration with Exercise is influenced by the G-453-A Polymorphism of the  $\beta$ -Fibrinogen Gene. *American Heart Association*, 16:386-391.

38. Carroll, S., Cook, C.B., Buttery, R.J. (2000). Physical activity, cardiorespiratory fitness, and the primary components of blood viscosity. *Med. Sci. Spo. Exer*, 32(2): 353-58.
39. Ikarugi, H., Taka, T., Nakajima, S., Noguchi, T., Watanabe, S., Sasaki, Y., Haga, S. (1999). Norepinephrine, but not epinephrine, enhances platelet reactivity and coagulation after exercise in humans. *86(1):133-138*.
40. Rezaian, Z.S., Torkaman, G., Nadali, F., Ravanbod, R., Nejataian, M., Gosheh, B., et al. (2006). Effect of aerobic training on coagulant activity in healthy young male. *physiology and pharmacology*, 10(1): 79-85. [Persian]
41. Fujii, C., Sakakibara, H., Kondo, T., Yatssuya, H., Tamakoshi, K., Toyoshima, H. (2006). Plasma Fibrinogen Level and Cardiovascular Risk Factors in Japanese Schoolchildren. *16:64-70*.
42. S. Leon. (2009) Biological Mechanisms for the Cardioprotective Effects of Aerobic Exercise. *American journal of life style medicine*; 3; 32S
43. Stratton, J.R., Chandler, W.L., Schwartz, R.S., et al. (1991). Effects of physical conditioning on fibrinolytic variables and fibrinogen in young and old healthy adult. *Circulation*, 83:1692-1697.
44. Odegard, K.C., Zurkowski, D., Hornykewycz, S., DiNardo, J.A., Castro, R.A., Neufeld, E.J., Laussen, P.C. (2007). Evaluation of the Coagulation System in Children with Two-Ventricle Congenital Heart Disease. *The Annals of Thoracic Surgery*, 83(5): 1797-1803
45. Przybylowki, J., Hajduk, A., Slomba, M., Obodynski, K. (1998). The effect of progressive incremental exercise on some parameters of hemostasis, *Wiad Lek*
46. Ignjatovic, V., Furmedge, J., Newall, F., Chan, A., Berry, L., Fong, C., Cheng, K., Monagle, P. (2006). Age-related differences in heparin response. *Thrombosis Research*, 118(6): 741—745
47. Haidl, H., Cimenti, C., Leschnik, B., Zach, D., Muntean, W. (2007). Thrombin Generation is Age-Dependent in Children as well as in Adults. *36<sup>th</sup> Hemophilia Symposium Hamburg 2005/ Springer Berlin*.
48. Ribeiro, J., Almeida-Dias, A., Ascens, A., Magalh, J., Oliveira, A.R., Carlsund, J., Motac, J., Appelle, H.J., Duarte, J. (2007). Hemostatic response to acute physical exercise in healthy adolescents. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 10: 164—169
49. Bourin, M.C., Ulf, L. (1993). Glycosaminoglycans and the regulation of blood coagulation. *Biochem J*, 289: 313-330.