

واژه‌های کلیدی: *Chlorella vulgaris*, خاصیت مهارکنندگی، عصاره *Bacillus subtilis*, *Aeromonas hydrophila*

مقدمه

طیف وسیعی از انواع آنتی‌بیوتیک‌های سنتتیک با ساختارهای شیمیایی گوناگون برای درمان بیماری‌های مختلف و عفونی در سراسر جهان استفاده می‌شوند. از طرفی آثار جانبی این آنتی‌بیوتیک‌ها باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود (2). ریزجلبک‌ها منابع غنی از پروتئین و سایر مواد مغذی شبیه به گیاهان آلی هستند و نقش مهمی را به‌عنوان تولیدکنندگان اولیه برای مصرف‌کنندگان مختلف در شبکه غذایی ایفا می‌کنند. همچنین منبع غنی از کربوهیدرات و اسیدهای چرب ضروری به حساب می‌آیند (3). متابولیت‌های اولیه یا ثانویه تولیدشده توسط این ارگانیسم‌ها از مواد فعال زیستی قابل استفاده در صنعت داروسازی هستند (4، 6). اسیدهای چرب، ترکیبات آلیفاتیک هالوژنه، کربوهیدرات‌ها، فنول‌ها و ساپونین‌ها در جلبک‌ها فعالیت ضد میکروبی دارند (7). فعالیت ضدباکتری عصاره‌های سلولی و ترکیبات فعال جلبک‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده‌اند (8، 10). *Chlorella vulgaris* یکی از مشهورترین ریزجلبک‌هاست. این جلبک میکروسکوپی با قطر 2 تا 10 میکرون ساکن آب‌های شیرین، مشابه سایر گیاهان از فعال‌ترین موجودات فتوسنتزکننده، دارای کلروفیل با

تراکم بالا و پروتئین‌های با ارزش است. بخشی از خواص درمانی آن مربوط به غلظت بالای کلروفیل و ساختمان دیواره سلولی، به‌ویژه مواد تشکیل‌دهنده دیواره سلولی آنها است. از عصاره جلبک *Chlorella* در تهیه لوازم آرایشی، بهداشتی و با توجه به پلی‌ساکاریدهای موجود در آن در داروسازی استفاده می‌شود (11). مطالعات زیادی بر فعالیت ضدباکتری ریزجلبک‌ها انجام شده است. پراکاش¹ و همکاران فعالیت ضدباکتری 8 گونه جلبک آب شیرین علیه 6 گونه از باکتری‌های بیماری‌زای انسانی را بررسی کردند (12). نیر¹ و کریشنیکا²، فعالیت ضدباکتری اعضای *Chlorophyceae* مانند *Chlorella* sp. و *Chlamydomonas* sp. را علیه باکتری‌های گرم‌مثبت و منفی بررسی کردند (13). چاکماک⁴ و همکاران فعالیت ضدباکتری جلبک *Dunaliella salina* را علیه باکتری‌های بیماری‌زای ماهی و انسان بررسی کردند (14). اولین بررسی فعالیت ضدباکتری از جلبک *Chlorella* Sp. را پرات⁵ و همکاران انجام داده‌اند که فعالیت ضدباکتری را به کلرولین⁶ نسبت دادند. این اسیدچرب فعالیت مهاری علیه باکتری‌های گرم‌منفی و گرم‌مثبت دارد (6). *B. subtilis* باکتری گرم‌مثبت، میله‌ای شکل، هوازی و

به‌روش پلیت آگار بر محیط کشت جامد Zehnder انجام شد (17). این کار برای به‌دست آوردن کلونی‌های خالص چندین بار تکرار شد. کلنی‌های موجود در پتری‌دیش و لوله‌های آزمایش کشت داده شد. بدین منظور 5 میلی‌لیتر از محیط کشت مایع Zehnder به هر لوله آزمایش تزریق شد. سلول‌های جلبک با استفاده از آنس استریل شده روی شعله به لوله‌های آزمایش منتقل شدند. نمونه‌ها زیر لامپ فلورسنت (با شدت نوری 2500 لوکس) به مدت 10 روز در دمای $24 \pm 0/5$ درجه سانتیگراد پرورش یافتند. مراحل بعدی کشت به ترتیب در ارلن-مایره‌های 250 و 1000 میلی‌لیتر انجام شد. سرانجام کشت در داخل ارلن‌مایره‌های 4000 میلی‌لیتر با اعمال هوادهی صورت گرفت. سلول‌های جلبک پس از رسیدن به حجم و تراکم سلولی مناسب (50×10^4 سلول در میلی‌لیتر) از کشت برداشت شدند.

عصاره‌گیری: برای گرفتن عصاره ریزجلبک از روش کانل و همکاران استفاده شد (1). تغلیظ جلبک به مدت 10 دقیقه با سرعت 100 دور در دقیقه با سانتریفیوژ انجام شد. برای خشک کردن بیومس، نمونه‌ها به مدت 8 ساعت در دستگاه فریزدرای قرار داده شدند. سپس در هاون ساییده شدند. مقدار 0/2 گرم از بیومس خشک شده جلبک با 5 میلی‌لیتر از حلال‌های هگزان و اتر به صورت جداگانه به مدت 2 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد بر روی دستگاه هیتراستیرر قرار داده شد. مایع روئی با سانتریفیوژ جدا و برای خارج شدن حلال در دمای محیط قرار داده شد. تمام عصاره‌های خشک شده در میکروتیوپ‌های استریل جمع‌آوری و تا

اسپوردار است (2). این باکتری کمتر باعث بیماری در انسان می‌شود ولی می‌تواند غذا را آلوده کند و در نقاط مختلف جهان به‌عنوان عامل مسمومیت غذایی گزارش شده است. مسمومیت غذایی ناشی از *B. subtilis*، ناگهانی اتفاق می‌افتد و از نشانه‌های آن حالت تهوع، اسهال و استفراغ است که 10 دقیقه تا 4 ساعت بعد از مواجهه با باکتری بروز می‌کند (15). علت انتخاب *B. subtilis* فرصت طلب بودن و مقاومت بسیار بالای آن در محیط‌های مختلف است. *Aeromonas hydrophila* باکتری گرم منفی، متحرک هوازی و بی‌هوازی اختیاری است که در محیط‌های آبی و دستگاه گوارش ماهیان سالم یافت می‌شود. این باکتری در شرایط استرس‌زا عامل اصلی مرگ‌ومیر در ماهیان آب شیرین است و موجب سپتیسمی همراه با خونریزی‌های جلدی و احشایی، تورم روده و مرگ می‌شود (16). مطالعات مختلف تأثیر معنی‌دار عصاره‌های *C. vulgaris* بر اکثر باکتری‌های بیماری‌زا را نشان داده است (11). از این رو با توجه به کشت آسان و تولید انبوه این ریزجلبک در شرایط آزمایشگاهی و به‌عنوان یک منبع تجدیدپذیر در تولید مواد دارویی، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر ضدباکتری عصاره‌های اتری و هگزانی *C. vulgaris* بر دو سویه از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی انجام شد.

مواد و روش‌ها

کشت و نگهداری نمونه‌ها: در این مطالعه تجربی سویه ریزجلبک *Chlorella vulgaris* از مجموعه ریزجلبک‌ها از انستیتو ماهیان خاویاری تهیه شد. ابتدا برای اطمینان از خالص بودن نمونه‌ها، خالص‌سازی

Agilent انجام شد. ستون HP-5MS استفاده شد. برای آشکارسازی از سیستم یونیزاسیون الکترون با انرژی یونیزاسیون 70 الکترون‌ولت استفاده شد. گاز هلیوم به‌عنوان گاز حامل و سرعت جریان آن 3 میلی‌لیتر در دقیقه تنظیم شد و تزریق نیز در دمای محفظه تزریق 300 درجه سانتیگراد انجام شد. تغییرات دمایی آن به‌صورت دمای ابتدایی 50 درجه سانتیگراد، سپس 120 درجه سانتیگراد به‌مدت 10 دقیقه و 270 درجه سانتیگراد به‌مدت 5 دقیقه بود. ولتاژ مطلق 1118 ولت بود. تخمین کمی ترکیبات شناخته‌شده براساس سطح پیک نسبی انجام شد. تعیین ترکیبات براساس مقایسه زمان بازداری نسبی و طیف جرمی با کتابخانه موجود در دستگاه (WILLY, NIST) انجام شد.

نتایج

آثار ضدباکتریایی عصاره *C. vulgaris* بر گونه‌های باکتریایی *B. subtilis* و *A. hydrophyla* به‌وسیله ارزیابی قطر هاله عدم‌رشد سنجش شد (شکل 1، 2، 3 و 4). نتایج حاصل از فعالیت ضدباکتری عصاره هگزانی و اتری ریزجلبک *C. vulgaris* در جدول 1 ارائه شده است. نتایج نشان داد که عصاره هگزانی و اتری ریزجلبک *C. vulgaris* فعالیت ضدباکتری علیه باکتری‌های *B. subtilis* و *A. hydrophyla* دارند و اثرگذاری عصاره اتری بر هر دو گونه باکتری بیشتر از عصاره هگزانی بود. چنان‌که در جدول 1 مشاهده می‌شود فعالیت ضدباکتری با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت. این ویژگی یک فعالیت وابسته به دوز تا

زمان انجام آزمایش‌های بعدی در دمای منفی 16 درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

میکروارگانیسم‌های موردبررسی: باکتری بیماری‌زای *Aeromonas hydrophila* و باکتری بیماری‌زای انسانی *Bacillus subtilis* از سازمان پژوهان و انستیتو بین‌المللی ماهیان خاویاری تهیه شدند. محیط نوترینت آگار^۷ و تریپتون سوی آگار^۸ برای رشد باکتری استفاده شد. محیط کشت باکتری‌ها به‌مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد در درون دستگاه انکوباتور قرار داده شد. فعالیت ضد میکروبی با استفاده از روش چاهک‌گذاری تعیین شد. پس از طی مدت‌زمان لازم برای رشد باکتری‌ها در محیط نوترینت آگار و تریپتون سوی آگار 40 میکرولیتر از هر باکتری بر محیط کشت نوترینت آگار و تریپتون سوی آگار اضافه و با استفاده از سوآپ پنبه‌ای به‌صورت سفره‌ای کشت داده و در هر پلیت به‌وسیله انتهای پیت پاستور سه چاهک در وسط محیط کشت ایجاد شد و از غلظت‌های (50، 100 و 200 میکروگرم بر میلی‌لیتر) عصاره در چاهک‌ها ریخته و پلیت‌ها در دمای 37 درجه سانتیگراد در درون دستگاه انکوباتور قرار داده شدند. پس از 24 ساعت هاله عدم‌رشد باکتری‌ها بررسی و قطر آنها با خط‌کش شفاف در حد میلی‌متر اندازه‌گیری شد. تمام مراحل در کنار شعله و شرایط استریل انجام پذیرفت (12، 18 و 19).


کروماتوگرافی جرمی-حجمی: شناسایی و تخمین ترکیبات موجود در عصاره‌ها با استفاده از کروماتوگرافی جرمی-حجمی^۹ با دستگاه 5975 c

(93 درصد)، 1 هیدرو ایزوایندول 1 و 3 (2 هیدرو) دی تی یون و دو اتیل¹⁵ (90 درصد) را نشان داد (جدول 2 شکل 5). در حالی که در عصاره هگزانی لیمونن (98 درصد)، دی هیدرو متیل جاسمونات¹⁶ (96 درصد) ترکیبات غالب بودند (جدول 3 شکل 6).

غلظت 200 میلی گرم بر میلی لیتر است. در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از گاز کروماتوگرافی، عصاره اتری *C. vulgaris* درصد بالایی از ترکیبات دی اتیل فتالات¹⁰ (98 درصد)، سیکلو پنتاتیک اسید¹¹ (98 درصد)، 7 استیل - 6 اتیل 1 و 1 و 4 - 4 - تترا متیل تترالین¹² (96 درصد)، لیمونن¹³ (96 درصد)، ایکوسان¹⁴

جدول 4- نتایج حاصل از فعالیت ضدباکتری عصاره هگزانی و اتری ریزجلبک *C. vulgaris* (میلی متر)


غلظت	عصاره هگزانی (mg/ml)			عصاره اتری (mg/ml)		
	50	100	200	50	100	200
<i>B. subtilis</i>	11	11/3	15/6	12	12/6	18/6
<i>hydrophila A</i>	9/6	10	11	7/6	11/3	16




شکل 2- حالت عدم رشد عصاره هگزانی جلبک *C. vulgaris* علیه باکتری *B. subtilis*




شکل 4- حالت عدم رشد عصاره اتری *C. vulgaris* علیه باکتری *B. subtilis*




شکل 4 هاله عدم‌رشد عصاره هگزانی جلبک *C. vulgaris* علیه باکتری *A. hydrophila*



شکل 3 هاله عدم‌رشد عصاره اتری جلبک *C. vulgaris* علیه باکتری *A. hydrophila*





شکل 5 کروماتوگرافی گازی جرمی عصاره اتری ریزجلبک *C. vulgaris*





شکل 6 کروماتوگرافی گازی جرمی عصاره هگزانی ریزجلبک *C. vulgaris*

جدول 2 ترکیبات حاصل از کروماتوگرافی گازی-جرمی عصاره اتری ریزجلبک *C. vulgaris*

اسم ترکیب	%	فرمول بسته	ساختار	دسته ترکیبات شیمیایی
Limonene	96	$C_{10}H_{16}$	<chem>CC1=CCC(CC1)C(C)C</chem>	هیدروکربن
1H-Isoindole-1,3(2H)-dithione, 2-ethyl	90	$C_{10}H_9NS_2$	<chem>CC1=CNC(=S)S1</chem>	هتروسیکل
Eicosane	93	$C_{20}H_{42}$	<chem>CCCCCCCCCCCCCCCCCC</chem>	هیدروکربن
Diethyl Phthalate	98	$C_{12}H_{14}O_4$	<chem>CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC</chem>	استر
Cyclopentaneacetic acid	98	$C_{13}H_{22}O_3$	<chem>CCCCC(=O)O</chem>	استر

Galaxolide	95	C ₁₈ H ₂₆ O		هتروسیکل
7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin	96	C ₁₈ H ₂₆ O		کتون

جدول 3 ترکیبات حاصل از کروماتوگرافی گازی جرمی عصاره هگزانی ریزجلبک *C. vulgaris*

اسم ترکیب	درصد	فرمول بسته	ساختار شیمیایی	دسته ترکیبات شیمیایی
Limonene	98	C ₁₀ H ₁₆		هیدروکربن
Dihydro methyl jasmonate	96	C ₁₃ H ₂₂ O ₃		استر

بحث و نتیجه گیری

با توجه به مقاومت روزافزون ریزجلبک‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها و گرایش عمومی به کارگیری ترکیبات طبیعی در مناطق مختلف دنیا، شناسایی میکروارگانیسم‌ها و بررسی آثار ضد میکروبی آنها اهمیت خاصی پیدا کرده است. بسیاری از ریزجلبک‌های آب شیرین به عنوان منبع بالقوه از مواد ضدباکتری شناخته شده‌اند (20). در بررسی حاضر مشاهده شد که عصاره اتری و هگزانی حاصل از ریزجلبک *C. vulgaris* فعالیت مهارکننده بر باکتری *B. subtilis* و *A. hydrophila* دارد. در مقایسه اثر ضدباکتریایی دو نوع عصاره بر دو سویه از باکتری، تمامی غلظت‌های عصاره‌های *C. vulgaris* علیه باکتری‌های *B. subtilis* و *A. hydrophila* خاصیت مهارکنندگی نشان دادند. عصاره هگزانی تنها در غلظت

200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بر باکتری *B. subtilis* (میانگین 15.6 میلی‌متر) فعالیت مهارکنندگی بالایی نشان داد. در حالی که تأثیر این عصاره در همه غلظت‌های دیگر علیه باکتری *A. hydrophila* دارای خاصیت مهارکنندگی متوسط بود. عصاره اتری در غلظت 200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر علیه باکتری *B. subtilis* (میانگین 18.66 میلی‌متر) و *A. hydrophila* (میانگین 16 میلی‌متر) فعالیت مهارکنندگی بالایی نشان داد. خاصیت مهارکنندگی این عصاره علیه باکتری *A. hydrophila* در غلظت 50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر ضعیف بود. در مقایسه بین دو عصاره، بزرگ‌ترین قطر هاله عدم‌رشد در باکتری‌های گرم‌مثبت (میانگین 18.6 میلی‌متر) و گرم‌منفی (16 میلی‌متر) مربوط به عصاره اتری بود. فعالیت ضدباکتریایی عصاره‌های اتری این ریزجلبک بر باکتری

Klebsiella pneumoniae و *Micrococcus luteus*، *aureus* به وسیله ارزیابی هاله عدم رشد، قطر هاله و ارزش MIC سنجش کرد. همه عصاره‌های اتری *C. vulgaris* در برابر همه باکتری‌ها تست شد، میزان خاصیت ضدباکتری بستگی به میزان مصرفی عصاره‌ها دارد (3). در بررسی‌هایی که یوما²² و همکاران بر جلبک سبز *Chlorococcum humicola*، *Chlorella vulgaris*، *Desmococcus Olivaceous* با استفاده از عصاره‌های اتری، متانولی، اتانولی و دی‌متیل سولفواکسید²³ علیه 5 باکتری گرم منفی و یک باکتری گرم مثبت انجام دادند، حداکثر فعالیت ضدباکتری توسط عصاره اتری ریزجلبک *C. vulgaris* بر باکتری‌های گرم مثبت مشاهده شد (26). ترکیبات ضد میکروبی مشتق شده از جلبک‌های آب شیرین شامل گروه‌های مختلفی از مواد شیمیایی مانند ترکیبات آلیفاتیک هالوژنه، ماکرولیدها، پپتید حلقوی، پروتئین‌ها، پلی‌کتیدها، تریپن‌ها، ساپونین‌ها، کربوهیدرات‌ها، فنول‌ها و اسیدهای چرب هستند (7) و (27) که آثار ضدباکتری آنها در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری‌های گرم مثبت و منفی اثبات شده است (8، 10 و 28) و این فعالیت‌ها وابسته به عوامل بسیاری از جمله گونه جلبک، اندامک مورد استفاده جلبک، حلال‌های مورد استفاده، میکروارگانیسم‌ها، فصل و شرایط رشد و نگهداری جلبک‌ها هستند (12، 29، 30 و 31). در بررسی کروماتوگرافی جرم‌حجمی عصاره‌های اتری و هگزانی ترکیب لیمونن با درصد بالا در هر دو عصاره مشترک است. کاماردا²⁴ و همکاران و شائو²⁵ و همکاران بیان کردند لیمونن موجود در عصاره، یکی از ترکیبات اصلی در فعالیت‌های ضد میکروبی است. لیمونن به عنوان رایحه و طعم‌دهنده در داروها، مواد غذایی و شوینده‌ها و به عنوان حلال در آزمایشگاه‌های بافت‌شناسی استفاده

B. subtilis با مطالعه صفری¹⁷ مقایسه شد. در مطالعه وی عصاره استونی فعالیت بیشتری را علیه باکتری *B. subtilis* نشان داده بود که تقریباً مشابه فعالیت دی‌اتیل اتر بر باکتری *B. subtilis* در این مطالعه است (2). با توجه به استفاده از حلال‌های مختلف برای فعالیت‌های ضدباکتریایی، هنوز بهترین نوع حلال برای استخراج عصاره نامشخص است (21). تأثیر نوع حلال در عصاره‌گیری جلبک روی میزان خواص ضدباکتریایی در پژوهش رانیا¹⁸ و همکاران به خوبی مشهود است. آنها سه گونه سیانوباکتری *Arthrospira platensis*، *Anabaena oryzae*، *Tolypothrix ceitonica* و دو ریزجلبک *Chlorella sp* و *Scenedesmus quadricauda* را با چهار حلال متانول، اتانول، دی‌اتیل اتر و استون عصاره‌گیری کردند که این عصاره‌ها خواص ضدباکتری علیه باکتری *B. subtilis* نشان دادند و به ترتیب هاله عدم رشدی معادل 15، 20 و 25 میلی‌متر تشکیل دادند. بالاترین فعالیت ضدباکتری علیه *B. subtilis* در عصاره‌های استونی و اتری مشاهده شد (22). نتایج حاصل از مطالعه کوکوئو¹⁹ و همکاران نشان داد عصاره اتری بیشترین تأثیر را علیه باکتری‌های گرم منفی دارد در حالی که نتایج آل واتسانی²⁰ و همکاران نشان داد که تأثیر عصاره اتری بر باکترهای گرم منفی از سایر عصاره‌ها بیشتر است که با نتایج حاصل از این مطالعه همسو است (23 و 24). شاید علت آن طبیعت قطبی ترکیبات ضد میکروبی جلبک و خاصیت قطبی‌تر دی‌اتیل اتر باشد. *B. subtilis* باکتری گرم مثبت محسوب می‌شود که برخلاف باکتری‌های گرم منفی دیواره سلولی چندلایه ندارد که این خود می‌تواند سبب شود که ترکیبات فعال به آسانی در آن نفوذ کند (25). پریا²¹ آثار ضد میکروبی عصاره اتری *C. vulgaris* علیه گونه‌های باکتریایی *Staphylococcus*، *Bacillus subtilis*

تخریب غشاء از رشد میکروارگانیسم جلوگیری کنند (36). یوما و همکاران و باگاواتی²⁸ و همکاران فعالیت ضدباکتری از *C. vulgaris* را به اسیدهای چرب، ترپن‌ها، فنول‌ها و کربوهیدرات‌ها نسبت دادند (21، 27). بررسی حاضر نشان داد که می‌توان از عصاره‌های *C. vulgaris* برای کنترل عوامل بیماری‌زا و غیربیماری‌زا در صنعت داروسازی و آبی‌پروری استفاده کرد. از لحاظ اکولوژیکی این احتمال وجود دارد که متابولیت‌های ثانویه تولیدشده توسط جلبک‌های مختلف، می‌توانند در حفاظت از بیماری‌های انسان و ماهی‌ها نقش داشته باشند. تجدیدپذیر بودن ریزجلبک‌ها (با کشت یا به‌طور طبیعی) برای توسعه محصولات ضدباکتری مزیت دیگر این متابولیت‌ها است و به لحاظ اقتصادی می‌توان روش‌های استاندارد تهیه عصاره در مقیاس بزرگ با راندمان ضدباکتری بالا و تجدیدپذیر را توسعه داد.

References

- (1) Cannell R., Ania M., Owsianka M. Results of a large-scale screening programme to detect antibacterial activity from freshwater algae. *British Phycological Journal* 1988; 23(1): 41-44.
- (2) Moniri R., Mosayebi Z., Movahedian AH., Mossavi GhA. Increasing trend of antimicrobial drug-resistance in *Pseudomonas aeruginosa* causing septicemia. *Iranian Journal Pub Health* 2006; 35(1): 58-62.
- (3) Priya s. Analysis of value added biochemical compounds and antimicrobial activity of green algae *Chlorella vulgaris*. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research* 2012; 4(5):2577-2579.
- (4) Safari M., Ahmadi S., Soltani N. Antimicrobial activity of aqueous and methanol extracts of some species of cyanobacteria In vitro. *Journal of Biology of*
- می‌شود، این ترکیب باعث افزایش عملکرد در تحریک گیاهان می‌شود و فعالیت ضدباکتری قوی در مقایسه با ترکیبات تجاری مصنوعی دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک ترکیب طبیعی حاوی مواد ضد میکروبی استفاده کرد. شاید بتوان خاصیت ضد میکروبی عصاره‌های این ریزجلبک را به ترکیب لیمونن نسبت داد (۳۲، ۳۳ و ۳۴). احتمالاً وجود اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع اثبات‌کننده اثر ضد میکروبی این ریزجلبک باشد. دزبویز^{۲۶} و همکاران، حضور اسید چرب غیراشباع در عصاره متانولی از ریزجلبک *C. vulgaris* را گزارش دادند که یک اسید چرب اشباع نشده در برابر باکتری‌های گرم‌مثبت و گرم‌منفی بوده و بسیار فعال است. اثر ضد میکروبی می‌تواند مربوط به ترکیبات فرار در نمونه مانند ترپن‌وئید و اسیدهای چرب فرار باشد (35). چو^{۲۷} و همکاران نشان دادند که ترکیبات فنولی و ترپن‌وئیدها دارای فعالیت ضدباکتریایی هستند و قادرند از طریق

Microorganisms 2015; 14(4): 111-130.

- (5) Febles C. In vitro study of antimicrobial activity in algae (Chlorophyta, Phaeophyta and Rhodophyta) collected from the coast of Tenerife. *Anuario del Instituto de Estudios Canarios* 1995; 34(2): 181-192.
- (6) Pratt R., John F., Oneto J. Studies on *Chlorella vulgaris*. X. Influence of the age of the culture on the accumulation of chlorellin. *American Journal of Botany* 1944; 405-408.
- (7) Kannan R., Ragupathi R., Rajasekaran A., Perumal A. In vitro antioxidant activities of ethanol extract from *Enhalus acoroides* (LF) Royle. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine* 2012; 3(11): 898-901.
- (8) Borowitzka M. Algal biotechnology products and processes—matching science and economics. *Journal of applied phycology* 1992; 4(3): 267-279.
- (9) Ostensvik O. Antibacterial properties of

- extracts from selected planktonic freshwater cyanobacteria-a comparative study of bacterial bioassays. *Journal of applied microbiology* 1998; 84(6): 1117-1124.
- (10) Goud M., Prakash J., Seshikala D., Singara Charya MA. Antibacterial activity and biomolecular composition of certain fresh water microalgae collected from River Godavari (India). *International Journal on Algae* 2007; 9(4), 350-358.
- (11) Safari R. Effects of *Chlorella vulgaris* on some pathogenic bacteria causing food poisoning. *Journal of Food Science and Technology* 2005; 4(1): 66-73.
- (12) Prakash J., Johnson M., Jeeva S. Antimicrobial activity of certain fresh water micro-algae from river Thamirabarani, Tamilnadu, South India. *Asian Pac Journal Trop Biomed* 2011; 1: 168-171.
- (13) Nair B., Krishnika A. Antibacterial activity of freshwater Microalga (*Scenedesmus* sp.) against three bacterial strains. *Journal Bioscience Research* 2011; 2(4): 160-165.
- (14) Cakmak Y., Murat K., Meltem A. Biochemical composition and bioactivity screening of various extracts from *Dunaliella salina*, a green microalga. *Experimentl and clinical Sciences* 2014; 13: 679-690.
- (15) Tavakoli H., Akhlaghi M. Evaluation of changes in lysozyme, immunoglobulins, and hematocrit blood cells in *rainbow trout* after experimental infection with the pathogen *Aeromonas hydrophila*. *Journal of Veterinary Research*. 2010; 64(2): 157-162
- (16) Safari R, Abtahi B, Tayybi P. Inhibitory Effects of *Chlorella vulgaris* algae extract in culture media on *Bacillus subtilis* bacteria. *Journal of Food Science and Technology*. 2014; 3(2): 87-92.
- (17) Kotai J. Instructions for preparation of modified nutrient solution Z8 for algae. *Norwegian Institute for Water Research* 1972; 11(69): 5-11.
- (18) Inci T. Antimicrobial activities of the extracts of marine algae from the coast of Urla (Izmir, Turkey). *Turkish Journal of Biology* 2006; 30(3): 171-175.
- (19) Sharma A., Kanika Sh. Should solubility and zone of inhibition be the only criteria for selection of solvent in antimicrobial assay. *Advances in Biological Research* 2011; 5(5): 241-247.
- (20) Bhagavathy S., Sumathi P., Bell I. Green algae *Chlorococcum humicola*-a new source of bioactive compounds with antimicrobial activity. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine* 2011; 1(1): 1-7.
- (21) Zheng Y., Chen Y., Lu H. Screening for antibacterial and antifungal activities in some marine algae from the Fujian coast of China with three different solvents. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology* 2001; 19(4): 327-331.
- (22) Rania M., Abedinhala A., Taha M. Antibacterial and Antifungal Activity of Cyanobacteria and Green Microalgae. *Global Journal of Biotechnology and Biochemistry* 2008; 3(1): 22-31.
- (23) Kokou F., Makridis P., Kentouri M., Divanach P. Antibacterial activity in microalgae cultures. *Aquaculture Research* 2012; 43(10): 1520-1527.
- (24) Al-Wathnani H., Ara I., Tahmaz R., Al-Dayel T., Bakir M. Bioactivity of natural compounds isolated from cyanobacteria and green algae against human pathogenic bacteria and yeast. *Journal Medicinal Reserarch* 2012; 6(18): 3425-3433.
- (25) Ördög V., Stirk W., Lenobel R., Banciřová M., Strnad M., Van Staden J., et al. Screening microalgae for some potentially useful agricultural and pharmaceutical secondary metabolites. *Journal of Applied Phycology* 2004; 16(4): 309-314.
- (26) Uma R., Sivasubramanian V., Niranjali Devaraj S. Preliminary phycochemical analysis and in vitro antibacterial screening of green micro algae, *Desmococcus olivaceous*, *Chlorococcum humicola* and

- Chlorella vulgaris*. *Journal Algal Biomass Utln* 2004; 2: 74-81.
- (27) Wijesinghe W., Jeon Y. Biological activities and potential industrial applications of fucose rich sulfated polysaccharides and fucoidans isolated from brown seaweeds: A review. *Journal Carbohydrate Polymers* 2012; 88(1): 13-20.
- (28) Kolanjinathan K., Ganesh P., Govindarajan M. Antibacterial activity of ethanol extracts of seaweeds against fish bacterial pathogens. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences* 2009; 13(3): 173-177.
- (29) Nelson M., Phleger C., Nichols P. Seasonal lipid composition in macroalgae of the northeastern Pacific Ocean. *Botanica Marina* 2002; 45(1): 58-65.
- (30) Freile-Pelegrin Y., Morales J. Antibacterial activity in marine algae from the coast of Yucatan, Mexico. *Botanica Marina* 2004; 47(2): 140-146.
- (31) Radhika D., Veerabahu C., Priya R. Antibacterial activity of some selected seaweeds from the Gulf of Mannar coast, South India. *Asian Journal Pharm Clinical Research* 2012; 5(4): 276-282.
- (32) Camarda L., Dayton T., Di Stefano V., Pitonzo R., Schillaci D. Chemical composition and antimicrobial activity of some oleogum resin essential oils from *Boswellia* spp. (Burseraceae). *Annali di chimica* 2007; 97(9): 837-44.
- (33) Shao Y., Ho C., Chin C., Badmaev V., Huang M. Inhibitory activity of boswellic acids from *Boswellia serrata* against human leukemia HL-60 cells in culture. *Planta medica* 1998; 64(4): 328-331.
- (34) Rancic A., Sokovic M., Van Griensven L., Vukojevic J., Brkic, D., Ristic M. Antimicrobial activity of limonene. *Lekovite sirovine* 2003.
- (35) Desbois A., Mearns-Spragg A., Smith V. A fatty acid from the diatom *Phaeodactylum tricorutum* is antibacterial against diverse bacteria including multi-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA). *Marine Biotechnology* 2009; 11(1): 45-52.
- (36) Cho W., Choi J., Lee K., Chung M., Pyun Y. Antimicrobial activity of Toilin Isolated from *Torilis japonica* Fruit against *Bacillus subtilis*. *JFS M: Food Microbiology and Safety* 2008; 1: 37- 43.

-
- 1- Prakash
 - 2- Nair
 - 3- Krishnika
 - 4- Cakmak
 - 5- Pratt
 - 6- Chlorellin
 - 7- Nutrient agar
 - 8- Tryptone soya agar
 - 9- Gas Chromatography- Mass Spectrum
 - 10- Diethyl Phthalate
 - 11- Cyclopentaneacetic acid
 - 12- 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin
 - 13- Limonene
 - 14- Eicosane
 - 15- 1H-Isoindole-1,3(2H)- dithione, 2-ethyl
 - 16- Dihydro methyl jasmonate
 - 17- Safari
 - 18- Rania
 - 19- Kokou
 - 20- Al-Wathnani
 - 21- Priya
 - 22- Uma
 - 23- Dimethyl sulfoxide
 - 24- Camarda
 - 25- Shao
 - 26- Desbois
 - 27- Cho
 - 28- Bhagavathy