

طب ورزشی – بهار و تابستان ۱۳۹۲
شماره ۱۰ – ص ص : ۶۸-۵۵
تاریخ دریافت : ۲۷ / ۰۶ / ۹۱
تاریخ تصویب : ۲۱ / ۰۱ / ۹۱

تأثیر سه روش آرومترایی، ماساژ و آرومترایی - ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان

۱. منصوره عارفی نیا^۱ - ۲. بهنام قاسمی - ۳. سجاد عارفی نیا - ۴. محمد رضا مرادی

۱. کارشناس ارشد دانشگاه شهرکرد، ۲. استادیار دانشگاه شهرکرد، ۳. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

همان‌گونه که ورزش بر جسم و روان تأثیر می‌گذارد، عوامل جسمانی و روانی نیز بر ورزش و عملکرد ورزشی تأثیر می‌گذارند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سه روش آرومترایی، ماساژ و آرومترایی - ماساژ بر میزان درد عضلانی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان بود. بازیکن شرکت‌کننده در مسابقات دهه فجر ۱۳۹۰، به شیوه در دسترس انتخاب و به گروه‌های مساوی، کنترل، آرومترایی، ماساژ و آرمترایی - ماساژ تقسیم شدند. به این منظور از پرسشنامه‌های مشخصات فردی و درجه‌بندی ذهنی درد و کوفتگی عضلانی تالوگ استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آرمون همبسته و مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد به جز گروه آرمترایی، بین میزان درد عضلانی قبیل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد ($P < 0.05$) و گروه‌های کنترل و ماساژ و کنترل و آرمترایی - ماساژ موجب ایجاد اختلاف شده‌اند. نتایج نشان داد روش‌های مورد استفاده مداخلات مؤثری برای کاهش میزان درد عضلانی ورزشکاران در مسابقات است.

واژه‌های کلیدی

آرمترایی، ماساژ، درد عضلانی.

مقدمه

ورزش و مشارکت‌های ورزشی عامل ممی در کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات جسمانی مانند بیماری‌های قلبی – عروقی، فشار خون بالا و چاقی است، علاوه بر این، در درمان بسیاری از اختلال‌های روانی مانند اضطراب، افسردگی و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس مؤثر است (۱۲). ورزش بر جسم و روان تأثیر می‌گذارد و عوامل جسمانی و روانی نیز متعاقباً بر ورزش و عملکرد ورزشی مؤثرند. درد عضلانی یکی از مشکلاتی است که ورزشکاران با آن مواجهند و اغلب با کاهش عملکرد ورزشی همراه است و ورزشکار را بر آن می‌دارد تا راهی برای خلاصی از درد پیدا کند (۵). میزان درصد عضلانی به عوامل مختلفی مانند سطح رقابت، مدت و شدت فعالیت، سن و تفاوت‌های فردی بستگی دارد (۲۷). آروماترایپ^۱ با استفاده از روغن گیاهان معطر در کاهش اضطراب، درد، خستگی و بهبود زخم‌های پوستی مؤثر است و به طریق استشمام، استنشاق و ماساژ^۲ اجرا می‌شود (۱). از سوی دیگر، ورزشکاران در طول دوره‌های ریکاوری به منظور آماده‌سازی برای اوج عملکرد، تخلیه خستگی و از بین بردن تورم، کاهش تنش عضلانی و افزایش انعطاف‌پذیری و درمان صدمات، به طور گسترده‌ای از ماساژ درمانی استفاده می‌کنند (۱۰).

ماساژ را به عنوان یک کار دستی روی بافت‌های بدن با فشار ریتمیک و ضربه‌ای با اهداف افزایش سلامتی و ایجاد حسی خوب، تعریف کرده‌اند (۲۵)، و شامل انواع روش کار با دست، روش‌های فشاری، مالش، ساییدن و مالیدن بدن است (۱۳). تکنیک آروماترایپ – ماساژ (با ترکیب آرومترایپی و ماساژ) یکی از محبوب‌ترین روش‌های درمانی است که در کاهش اضطراب و درد عضلانی مؤثر است (۲۶). آرومترایپ – ماساژ یکی از متداول‌ترین روش‌های درمانی طب مکمل است که با استفاده از روغن‌های ضروری به صورت جداگانه یا ترکیبی موجب ارتقای سلامت جسمانی و روانی می‌شود. آرومترایپ با اعمال نفوذ به سیستم عصبی مرکزی به تسکین افسردگی، اضطراب، کاهش استرس، آرامش و تحريك بازسازی جسم و روان منجر می‌شود. از طرفی، آرومترایپ – ماساژ از طریق تماس دست درمانگر با اعمال دستکاری بافت‌های بدن، همواره با تأثیر بر روان از طریق حس بویایی موجب آرامش روانی و بهبود درد ناشی از صدمات ورزشکاران می‌شود. در نتیجه بسیاری از مربیان در

1 . Aromatherapy

2 . Massage

طول رقابت، در زمان ریکاوری از این روش استفاده می‌کنند (۲۱). وکیلیان و همکاران (۱۳۹۰)، به بررسی تأثیر انسانس اسطوخودوس بر درد زایمان پرداختند. پژوهش حاضر نشان داد که آروماترایپی با اسطوخودوس می‌تواند یکی از جایگزین‌های مناسب دیگر طب‌های مکمل باشد (۸). تحقیق کیم ام جی و همکاران^۱ (۲۰۰۵) با عنوان «تأثیرات آروماترایپی بر درد، افسردگی و رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به آرتروز» انجام گرفت. نتایج نشان داد آروماترایپی به‌طور چشمگیری موجب کاهش درد و افسردگی می‌شود، با این حال احساس رضایت از زندگی را در این افراد افزایش نمی‌دهد (۲۰). پیله‌ورزاده و همکاران (۱۳۸۱) به بررسی تأثیر ماساژ بر کاهش درد و اضطراب در طول کار پرداختند. نتایج نشان داد در هر گروه افزایش درد ناشی از کار به‌طور پیشرونده وجود دارد، اما در گروه ماساژ میزان درد کمتر از گروه کنترل بود و سطح اضطراب نیز در پایان آزمون به‌طور معناداری در گروه ماساژ کاهش یافت (۳). نتایج تحقیق متولسیان و همکاران (۱۳۸۲)، با عنوان «تأثیر ماساژ قبل از پانسمان بر درد و اضطراب بیماران سوخته» نشان داد که ماساژ قبل از پانسمان موجب کاهش درد و اضطراب بعد از پانسمان می‌شود (۷). سوسان و همکاران^۲ (۲۰۱۰)، تحقیقی با عنوان «تأثیر ماساژ درمانی بر درد، اضطراب و کشیدگی در افرادی که عمل جراحی قلب داشتند» انجام دادند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود ماساژ به‌عنوان بخش مهمی در مدیریت دوره ریکاوری پس از عمل جراحی افراد مبتلا به بیماری قلبی انجام گیرد (۲۴). مانسینلی و همکاران^۳ (۲۰۰۶)، تحقیقی با عنوان «تأثیرات ماساژ روی شروع درد عضلانی تأخیری (DOMS) و عملکرد فیزیکی در ورزشکاران زن دانشگاهی» انجام دادند. نتایج حاصل از این مطالعه از کاهش درد عضلانی تأخیری و بهبود پرش عمودی در زنان ورزشکار دانشگاهی از طریق ماساژ حمایت کرد (۲۲). از آنجا که تحقیقات آروماترایپی - ماساژ بیشتر در زمینه برخورد با کنترل درد در بیماران مبتلا به استئوارتیت، آرتیت روماتوئید، درد مزمن عضلانی و درد مزمن ناشی از سرطان و بیماری‌ها و کاهش اضطراب و افزایش ارتقای آرامش و رفاه در بیماران انجام گرفته (۱۵) و اینکه تحقیقی در زمینه تأثیر آروماترایپی - ماساژ بر میزان درد عضلانی پس از مسابقه در ایران و خارج از کشور یافت نشد و از سوی دیگر، بررسی علمی اجرای رایحه در انسان کمیاب است (۲۴)، همچنین با توجه به نقش درد عضلانی بر عملکرد ورزشکاران، ضرورت اجرای تحقیق، اولاً

1 . Kim MJ & et al

2 . Susanne & et al

3 . Mancinelli & et al

تعیین اثر سه شیوه آرومترایپی، ماساژ و آرومترایپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان و ثانیاً تعیین میزان تأثیر این سه شیوه و مقایسه آنها با هم بود.

روش تحقیق

طرح این تحقیق به روش نیمه تجربی بود و سعی شد براساس روش مقایسه‌ای، تأثیر استفاده از سه روش آرومترایپی، ماساژ و آرومترایپی – ماساژ با استفاده از انس اسطوخودوس بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار آمادگی جسمانی شهر اصفهان مقایسه شود. اطلاعات مورد نظر برای اندازه‌گیری متغیرهای وابسته تحقیق از طریق پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در آزمودنی‌های تجربی بررسی شد.

۳۲ بازیکن دختر آمادگی جسمانی شهر اصفهان در رده قهرمانی کشور به شیوه در دسترس به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و در ۴ گروه ۸ نفره به عنوان گروههای آرومترایپی، ماساژ، آرومترایپی – ماساژ و کنترل قرار گرفتند.

ابتدا کلیه شرکت‌کنندگان در تحقیق به پرسشنامه مشخصات فردی شامل سن، قد، وزن و ۵ سؤال درباره سابقه آلرژی به گیاهان، سابقه میگرن، سابقه سردردهای مزمن، اختلال در حس بویایی و استفاده از داروهای آرام بخش پاسخ دادند و صلاحیت آنها برای شرکت در تحقیق مشخص شد.

سپس آزمون‌شونده‌ها در چهار گروه (آرومترایپی، ماساژ، آرومترایپی – ماساژ و گروه کنترل) قرار گرفتند. پس از مسابقه، آزمودنی‌های چهار گروه به پرسشنامه درجه‌بندی ذهنی درد و کوفتگی عضلانی تالوگ پاسخ دادند. سپس گروه ماساژ ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تحت ماساژ کلاسیک با استفاده از روغن زیتون (به منظور کاهش اصطکاک) قرار گرفت، در گروه آرومترایپی، انس اسطوخودوس بعد از مسابقه به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به صورت استنشاقی استفاده شد و در گروه آرومترایپی – ماساژ هر دو عمل ماساژ و آرومترایپی به صورت همزمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از مسابقه انجام گرفت. در گروه کنترل هیچ یک از این اعمال صورت نگرفت. در پایان، هر چهار گروه

بار دیگر به پرسشنامه درجه‌بندی ذهنی درد و کوفتگی عضلانی تالوگ پاسخ دادند و در نهایت، نتایج تحقیق به‌وسیله آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.

برای تحلیل داده‌های پژوهشی مورد نظر به‌ترتیب از ازمون‌های گلوموگروف - اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع نمره‌ها، همبسته برای مقایسه نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون، مستقل به‌منظور بررسی تفاوت اختلاف نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به‌منظور بررسی تفاوت اختلاف نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون در چهار گروه استفاده شد و با توجه به معنادار بودن، آزمون تعقیبی توکی به‌کار گرفته شد. از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

نتایج و یافته‌های تحقیق

ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها شامل میانگین و انحراف معیار متغیر سن، قد و وزن در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱ - میانگین و انحراف معیار ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها ($n = ۳۲$)

| متغیر | دامنه | میانگین | انحراف معیار |
|----------------|---------|---------|--------------|
| سن (سال) | ۱۹-۲۷ | ۲۲/۳۷ | ۲/۰۶ |
| قد (سانتی‌متر) | ۱۷۱-۱۵۷ | ۱۶۴/۴۴ | ۴/۰۸ |
| وزن (کیلوگرم) | ۶۵-۴۳ | ۵۶/۹۴ | ۶/۱۶ |

نتایج نشان داد با توجه به ارزش به‌دست‌آمده ($P = ۰/۰۸۰$), یک جلسه آرومترایی استنشاقی بر درد عضلانی بازیکنان دختر آمادگی جسمانی تأثیر معناداری نداشته است (جدول ۲).

از ارزش به‌دست‌آمده در جدول ۲ ($P = ۰/۰۰۱$) این نتیجه حاصل شد که یک جلسه ماساژ بر درد عضلانی بازیکنان دختر آمادگی جسمانی تأثیر معناداری داشته است.

داده‌های جدول ۲ نشان می‌دهد که یک جلسه آروماتراپی – ماساژ بر درد عضلانی بازیکنان دختر آمادگی جسمانی تأثیر معناداری داشته است ($P = 0.001$).

جدول ۲ – مقایسه تغییرات درون‌گروهی میزان درد عضلانی در گروه‌های آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی– ماساژ

| گروه | آماره | پیش آزمون | پس آزمون | تعداد | درجه آزادی (df) | مقدار t | ارزش p |
|--------------------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|---------|--------|
| آروماتراپی | | ۳/۰۰ | ۲/۶۳ | ۸ | ۷ | ۲/۰۴۹ | ۰/۰۸۰ |
| ماساژ | | ۳/۲۵ | ۱/۷۵ | ۸ | ۷ | ۵/۷ | ۰/۰۰۱ |
| آروماتراپی – ماساژ | | ۰/۲۵ | ۰/۸۸ | ۸ | ۷ | ۱۶/۸۰ | ۰/۰۰۱ |

ارزش p به دست آمده در جدول ۳ ($P = 0.001$) نشان می‌دهد که بین تأثیر یک جلسه آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر درد عضلانی بازیکنان دختر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد ($P = 0.001$).

جدول ۳ – مقایسه بین‌گروهی درد عضلانی تفاوت نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در آزمودنی‌های چهار گروه

| متغیر | تغییرات | مجموع مربعات | درجه آزادی | میانگین مربعات | مقدار F | ارزش p | مقدار |
|--------------|---------|--------------|------------|----------------|---------|--------|------------|
| بین گروه‌ها | | ۳۲/۵۹ | ۳ | ۱۰/۸۶ | | | |
| داخل گروه‌ها | | ۸/۸۷ | ۲۸ | ۰/۳۱۷ | ۳۴/۲۷۷ | ۰/۰۰۱ | درد عضلانی |
| کل | | ۴۱/۴۶ | ۳۱ | | | | |

برای مشخص شدن اینکه این اختلاف بین کدام گروه‌ها بوده از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول ۴ آمده است. نتایج آزمون توکی نشان داد گروهی که موجب ایجاد تفاوت شده است، گروه کنترل و ماساژ و گروه کنترل و آروماتراپی – ماساژ بوده است.

جدول ۴ - نتایج آزمون تعقیبی (توکی) برای تعیین تفاوت بین گروه‌ها

| P | میانگین اختلافات | گروه‌ها | متغیر |
|-------|------------------|-------------------|------------------|
| ۰/۹۷۰ | -۰/۱۲ | آرومترایی | |
| ۰/۰۰۱ | -۱/۲۵ | ماساژ | درد عضلانی کنترل |
| ۰/۰۰۱ | -۲/۵۰ | آرومترایی - ماساژ | |

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج بهدست آمده، با استفاده از روش آرومترایی، میزان درد عضلانی گروه آرومترایی کاهش معناداری نداشته است. تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه تأثیر آرومترایی بر درد عضلانی محدود است. یافته‌های این تحقیق با یافته‌های کیم و همکاران^۱ (۲۰۰۶) در خارج از کشور و پازنده و همکاران (۱۳۸۶) در داخل کشور همسو و با یافته‌های کیم جی تی و همکاران^۲ (۲۰۰۶) مغایر است. دلیل احتمالی عدم تأثیر آرومترایی بر درد عضلانی در این تحقیق می‌تواند مربوط به تعداد کم آزمودنی‌ها، مدت استفاده از اسطوخودوس و مقدار مصرفی آن باشد.

کیم و همکاران (۲۰۰۶) تأثیر آرومترایی در درمان درد پس از عمل را بررسی کردند. نتایج نشان داد آرومترایی با روغن اسطوخودوس عادی بر شدت درد پس از عمل تأثیر معناداری ندارد (۲۰).

پازنده و همکاران (۱۳۸۶)، در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر آرومترایی با انسس بر درد اپی زیاتومی»، نشان دادند بهطور کلی اساس بابونه در کاهش درد اپی زیاتومی مؤثر نیست. شاید بتوان با تعییر در مقدار، اشکال و راه‌های تجویز انسس‌های گیاهی نتایج بهتری در زمینه کاهش درد ناحیه پرینه بهدست آورد (۲).

1 . Jung T. Kim & et al

2 . Kim, J. T & et al

کیم جی تی و همکاران (۲۰۰۶)، در تحقیقی با عنوان «تأثیر آروماترایپی در درمان درد پس از عمل»، بعد از عمل جراحی آروماترایپی با روغن اسطوخودوس به بیماران تحت عمل جراحی بیوپسی پستان دادند. یافته‌ها نشان داد بیماران رضایت بیشتری در مورد کنترل درد نسبت به گروه کنترل داشتند (۱۹). نتایج نشان داد که با استفاده از روش ماساژ درد عضلانی به طور معناداری کاهش می‌یابد. یافته‌های این تحقیق با یافته‌های کارن و همکاران^۱ (۲۰۰۹)، لاستینگ و همکاران^۲ (۲۰۰۹) و فورلان و همکاران^۳ (۲۰۰۹)، در خارج از کشور (۱۴، ۱۸، ۲۳) و با یافته‌های عباسی و همکاران (۱۳۹۰)، یعقوبی و همکاران (۱۳۸۸) و جوزی (۱۳۸۸)، در داخل کشور همسوست.

کارن و همکاران (۲۰۰۹)، در تحقیقی با عنوان مطالعه تصادفی ماساژ درمانی برای درمان درد مزمن گردن، نشان دادند که ماساژ ایمن است و ممکن است حداقل در کوتاه‌مدت مزایای بالینی برای درمان درد مزمن گردن داشته باشد (۱۸).

لاستینگ و همکاران (۲۰۰۹)، به بررسی این موضوع پرداختند که ماساژ درمانی ناراحتی‌های فیزیکی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود اختلال‌های خلقی در زنان مبتلا به سلطان پستان می‌شود. با توجه به یافته‌ها، به نظر می‌رسد ماساژ کلاسیک برای کاهش درد جسمی و خستگی و بهبود اختلال‌های روحی در زنان مبتلا به سلطان سینه در مراحل اولیه، درمان کمکی مؤثری است (۲۳).

فورلان و همکاران (۲۰۰۹)، در تحقیقی با عنوان «ماساژ برای کمر درد» نشان دادند که ماساژ، بهویژه همراه با تمرين و آموزش ممکن است برای بیماران مبتلا به کمر درد تحت حاد و مزمن مفید باشد. شواهد نشان می‌دهد که ماساژ طب سوزنی مؤثرتر از ماساژ کلاسیک است، اما این موضوع به تأیید بیشتری نیاز دارد (۱۴).

Abbasی و همکاران (۱۳۹۰)، تأثیر ماساژ بر درد هنگام واکسیناسیون نوزادان را بررسی کردند. درد یک سازوکار دفاعی در پاسخ به آسیب بافتی است که در نوزادان به راحتی نادیده گرفته می‌شود. ماساژ با تأثیر بر سیستم عصبی و آزادسازی اپیوئیدهای داخلی می‌تواند بر شدت درد ناشی از عوامل دردناک مؤثر باشد. این

1. Karen J. & et al
2 . Listing & et al
3 . Furlan & et al

پژوهش با هدف تعیین تأثیر ماساژ بر شدت درد هنگام واکسیناسیون در نوزادان انجام گرفت. نتایج نشان داد شدت درد هنگام واکسیناسیون را کاهش می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی کاهش درد هنگام واکسیناسیون نوزادان به کار رود (۶).

یعقوبی و همکاران (۱۳۸۸)، تأثیر ماساژ را بر میزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز بررسی کردند. هدف از این تحقیق، تعیین تأثیر ماساژ در پیشگیری و تسکین شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز بود. با توجه به نتایج بدست آمده ماساژ در بیماران تحت همودیالیز یک روش غیرداروئی و فاقد هرگونه عوارض جانبی است و موجب پیشگیری و کاهش شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی می‌شود (۹).

جوزی (۱۳۸۸)، به بررسی تأثیر ماساژ درمانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی پرداخت. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت ماساژ در کاهش فشار خون و سطح اضطراب بیماران است. بنابراین می‌توان این روش را به عنوان روشی مکمل در کنار درمان معمول سکته مغزی، به منظور افزایش بهبود بیماران و احساس رفاه آنها توصیه کرد (۴).

ماساژ از راههای متفاوتی بر احساس و دریافت درد تأثیر می‌گذارد. یک راه حذف فیزیکی مواد زائد از بافت ماهیچه‌ای است. به محض اینکه بدن ورزیده، نوازش و گرم می‌شود، جریان خون افزایش می‌یابد و مواد غذایی و اکسیژن به ناحیه مورد نظر برد می‌شود. فعالیت سیستم لنفاوی افزایش یافته و به این طریق، مواد زائد حذف می‌شود و تأثیرات مواد شیمیایی القاکننده درد را کاهش می‌دهد. این حذف نوروترنسمیترهای شیمیایی^۱ احتمالاً بهترین توضیح برای درک تأثیرات ماساژ است. هرچند راههای دیگری وجود دارد که از طریق ماساژ، درد کاسته می‌شود. ماده زمینه پوشش فاسیای^۲ عضله و تارهای عضلانی، از حالت نازک و مایع به حالت جامد و ضخیم تغییرپذیر است. ضخامت این ماده زمینه تحت تأثیر گرما، فشار، نوسان، کشیدگی و دیگر تغییرات مکانیکی قرار می‌گیرد. وقتی عضله به واسطه جریان خون، تحریک مالشی و دیگر فشارهای مکانیکی گرم می‌شود، فاسیا مایع و انعطاف‌پذیرتر خواهد شد. به محض اینکه فاسیا نرم می‌شود و انقباضات عضلانی کاهش می‌یابد، فشار مکانیکی

1 . Chemical neurotransmitter

2 . Fascia

روی ماهیچه‌ها کاسته می‌شود. وقتی فاسیا بیشتر در حالت مایع به خود می‌گیرد، ماهیچه نیز می‌تواند راحت‌تر کشیده شود. در نتیجه فشار داخل مفصلی کاهش یافته و تحریک عصبی ورودی به وتر عضله کاهش بیشتری می‌یابد. به محض اینکه بدن لمس می‌شود، سیستم کنترل درد مغز و نخاع ممکن است فعال شود. این سیستم هر دو نوع سیگنال درد تند و کند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین روی درد حاد و مزمن تأثیر می‌گذارد (۱۶).

ماساژ از یک سو با برطرف کردن مواد زائد در بافت‌ها موجب کاهش درد و ناراحتی می‌شود (در اثر افزایش گردش خون عوارضی مانند کوفتگی عضله را کاهش می‌دهد) و از سوی دیگر به بالا رفتن آستانه درد گیرنده‌های عصبی منجر می‌شود، زیرا چنانچه حرکات ماساژ را به صورت ملایم شروع کرده و به تدریج بر شدت حرکات آن اضافه کنیم، امکان دارد در نتیجه این عمل، حساسیت گیرنده‌های درد کاهش و آستانه درد افزایش یابد. ماساژ دادن، مغز را به تولید آندروفین تحریک می‌کند و اعتماد به نفس بیماران را با تشویق آنها برای مقابله مؤثر با درد افزایش می‌دهد. ماساژ قبل و بعد از تمرین‌های ورزشی خطر صدمات و آسیب‌های حین ورزش را کاهش می‌دهد و بازسازی و احیای عضلات خسته را تسريع می‌کند.

نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش آرومترایپی – ماساژ درد عضلانی به‌طور معناداری کاهش می‌یابد. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه محدود است. یافته‌های این تحقیق با یافته‌های چنگ^۱ (۲۰۰۸) همخوانی دارد. تحقیقی که نتایج ان با نتایج تحقیق مخالف باشد، یافت نشد. چنگ (۲۰۰۸)، تحقیقی با عنوان «تأثیر آرومترایپی ماساژ بر درد، اضطراب حالتی و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستانی» انجام داد. ماساژ با مخلوط روغن ترنج، اسطوخودوس و کندر انجام گرفت و گروه کنترل فقط با روغن بادام شیرین ماساژ دریافت کرد. یافته‌ها نشان داد آرومترایپی ماساژ به مقدار بیشتری درد را کاهش می‌دهد (۱۱).

نتایج دیگر تحقیقات نشان می‌دهد که کاهش میزان درد عضلانی پس از مسابقه به تعداد جلسات ماساژ و آرومترایپی، مدت انجام ماساژ و آرومترایپی، روغن مورد استفاده برای ماساژ و انسس به کاررفته برای آرومترایپی بستگی دارد.

1 . Chang, S. Y.

منابع و مآخذ

۱. باباشاهی، منیره. فیاضی، صدیقه. عاقل، نسرین. حقیقی زاده، محمدرضا. (۱۳۸۹). "تأثیر آروماتراپی استنشاقی بر بیماران قبل از عمل جراحی". *مجله علمی پزشکی جندی شاپور*. ۹ (۵) ۵۱۶ - ۵۰۷.
۲. پازنده، فرزانه. سوادزاده، شهین. حجاب، فراز. علوی مجد، حمید. (۱۳۸۶). "بررسی تأثیر آروماتراپی با انسانس بایونه بر درد ایپی زیatomی". *نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی*، دوره ۱۸، شماره ۶۲.
۳. پیلهور زاده، مطهره. سالاری، سادات. شفیعی، نعمت (۱۳۸۱). "تأثیر ماساژ بر کاهش درد و اضطراب در طول کار". *دوره ۳، شماره ۴، مسلسل ۱۲*.
۴. جوزی، مینا. (زمستان ۱۳۸۸). "بررسی تأثیر ماساژ درمانی بر بیماران مبتلا به سکته مغزی". *فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی*، ۱۹ (۴) (پی در پی ۵۸) ۲۶۱ - ۲۵۶.
۵. رضایی، سعید. (۱۳۸۶). "تأثیر رقابت بر میزان اضطراب رقابتی و غلظت تستوترون و کورتیزول بزاقی در والیبالیست‌های مرد نخبه". *پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکزی*.
۶. عباسی، زهره. سالاری، الهه. رشیدی، فرزانه. طاهرپور، معصومه. (پاییز ۱۳۹۰). "تأثیر ماساژ بر درد هنگام واکسیناسیون در نوزادان". *مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی*، دوره سوم، شماره ۳، ص ۵۶ - ۵۱.
۷. متولیان، منیره. دهقانی، خدیجه. (۱۳۸۲). "تأثیر ماساژ قبل از پاسman بر درد و اضطراب بیماران سوخته"، *مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی بزد*، سال یازدهم، ص ۱۳.
۸. وکیلیان، کتایون. کرامت، افسانه. موسوی، عباس. شریعتی، محمد. عجمی، محمد اسماعیل. عطارها، مهتاب. (۱۳۹۱). "بررسی تأثیر انسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان". *مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد*، دوره ۱۴، شماره ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱، ۴۰ - ۳۴.
۹. یعقوبی، مختار. امینی، کورش. (۱۳۸۸). "بررسی تأثیر ماساژ بر میزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز". *سیستم نشریات پزشکی ایران*، ۱۷. ۱۳۸۸، ۱(۱): ۴۶ - ۳۹.

10. Arroyo – Morales, Manuel. Olea, Nicolas. Manual Martines, Matrin. Hidalgozcano, Amparo, Ruiz – Rodriguez, Concepcion. Diaz – Rodriguez, Lourdes. (2009). "Psychobiological effect of massage – myofacial release after exercise ". *The journal of alternative and complementary medicine*, 14. 10. PP: 1223-1229.
11. Chang, S. Y. (2008). "Effects of aroma hand massage on pain, state anxiety and depression in hospice patients with terminal cancer ". *Taehan kanho hakhoe chi*, 38,PP: 493-502.
12. Donaldson, Sarah, J. Ronan, Kelvin, R. (2006). "The effects of sports participation on young adolescents emotional well – being". *Journal health publications*.41(162); PP:369-89.
13. Dubrovsky, V. (2005). "The effect of massage on athlete's cardiorespiratory system ". *Soviet sport review*. 25: PP:36-38.
14. Furlan, Andrea, D. Imamura, Marta, Dryden, Trish RMT. Irvin, Emma. (2009). "Massage for low back pain ". An updated systematic review within the framework of the cochrane back pain: an updated systematic review within the framework of the cochrane back review group. 34 – 16: 1669-1684
15. Hauora, Manatu (2006). "Does massage or aromatherapy massage relieve symptoms of nausea, pain, anxiety and depression in people with cancer? " *Ministry of health. Newzeland*.
16. Judith (Walker) Delany, LMT. (2002). "Massage helps relieve muscular pain ". *NMT Center.St.Petersburg,Fl33705*.
17. Jung, T. Kim; Michael Wajda. Germaine Cuff, David Serota. Michael Schlame. Deborah M. Axelrod, Amber A. Guth, Alex Y. Bekker. (2006). "Evaluation of aromatherapy in treating postoperative pain: pilot study ". *World institute of pain*, 1530 – 7085/06/%15.00. *pain practice*, 6 (4).PP: 273-277.

18. Karen, J. Sherman, Daniel. C. Cherkin, Rene, J. Hawkes, Diana, L. Miglioretti and Richard A. Deyo. (2009). "Randomized trial of therapeutic massage for chronic neck pain". *Clin J Pain.* 25 (3). PP:233-238
19. Kim, J. T., Wajda, M. Cuff, G., Serota, D., schlame, M., Axelrod, D. M., Guth, a. A., and Bekker, A. Y. (2006). "Evaluation of aromatherapy in treating postoperative pain: pilot study". *Pain practice,* 6,PP: 273-277.
20. Kim. MJ: Nam, ES. Paik, SI. (2005). "The effects of aromatherapy on pain, depression, and life satisfaction of arthritis patients". *Taehan Kanbo Hakhoe Chi, (journal of Korean academy of Nursing).* 35 (1). PP:186-94
21. Lin, Zen P. (2004). "Aromatherapy massage". *United states sports academy America sport university.The Sport Digest_ISSN:1558-6448.*
22. Mancinelli CA. Daivis DS, Aboulhosn L. et al (2006). "The effects of massage on delayed onset muscle soreness and physical performance in female collegiate athletes". *Phys Ther in Sport.* 7:PP: 5-13.
23. Miriam Listing, Anett reibhauer, Michaela Krohn, Barbara Voigt, Gracia Tjahono, Janine Becker, Burghard F. Klapp, Martina Rauchfuss (2009). "Massage therapy reduces phsysical discomfort and improves mood disturbances in women with breast cancer". *Psycho – oncology.* 18 (12). PP:1290-1299
24. Susanne, M. Cutshal, Wentworth, Lauraj, Engen, deborah, Sundt, Thoralf M. Kelly, Ryan F. Bauer, Brent A. (2010). "Effect of massage therapy on pain, anxiety and tension in cardiac surgical patients: a pilot study". *16.PP:* 92-95
25. Thomas, M. Best Robin Hunter, aaron Wilcox, et al (2008). "Effectiveness of sport massage for recovery of skeletal mudcle from strenuous exercise ".*Clin J sport Med.* 18: PP:446-460.
26. Wilkinson, Susie, M. Love, Sharon, B. Weestcombe, Alex, M. Gambles, Maureen A. Burgess, Caroline C. Cargill, Anna. Young, teresa. Maher, Jane

and Ramirez, Amand J. (2007). "Effectiveness of aromatherapy massage in the management of anxiety and depression in patients with cancer a multicenter randomized controlled trial". *Journal of Clinical Oncology*. Vol.14;No.5; PP:532-539.

27. Woodman, Tim. Hardy, Lew. (2003). "The relative impact of cognitive anxiety and self confidence upon sport performance: a meta analysis". *Journal of sport sciences*. 21.PP: 433-457.