

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۴
صفحات ۱۵-۳۱

* مکان‌یابی بهینه توسعه کشاورزی با تأکید بر پارامترهای طبیعی شهرستان بروجرد

عزت‌الله قنواتی**، دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
فاطمه دلفانی گودرزی، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی

دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
پذیرش نهایی: ۱۳۹۲/۵/۱۸

چکیده

در دهه‌های آینده به دلیل نیاز روز افزون انسان به غذا و کاهش ذخایر فسیلی، اتفاقی کشور هم از لحاظ تامین مواد غذایی و هم از لحاظ تامین منابع ارزی مورد نیاز اقتصاد، به زمین و خاک پایگاه اصلی فعالیت‌های کشاورزی بیشتر می‌شود. از تبعات رشد جمعیت وسعت یافتن سطوح انواع کاربری‌های شهری، مسکونی و صنعتی است که به ضرر اراضی کشاورزی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه استفاده از منابع مانند خاک، آب، جنگل و مرتع حالت تشدیدی و تخریبی به خود گرفته است، لذا شناخت قابلیت‌های اراضی و تخصیص اراضی به کاربری‌های منطبق و همساز با ویژگی‌های آن امری ضروری و حیاتی می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است با شناسایی ویژگی‌های محیطی و ارزیابی آن، مکان‌های بهینه برای توسعه کاربری کشاورزی شهرستان بروجرد مشخص شود. برای ارزیابی از ۱۲ شاخص استفاده شده که با استفاده از تلفیق دو مدل منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ۳۸/۶ درصد منطقه مورد مطالعه (۶۵۸ کیلومتر مربع) در کلاس تناسب کم، ۴۸/۶ درصد (۷۲۴/۸ کیلومتر مربع) در کلاس تناسب زیاد قرار می‌گیرد. بر اساس نقشه نهایی مناسب‌ترین پهنه‌ها برای توسعه کشاورزی در قسمت مرکزی منطقه از شمال و شمال غربی به جنوب کشیده شده است.

کلمات کلیدی: توسعه کشاورزی، مدل فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، شهرستان بروجرد.

* این مقاله از پایان‌نامه خانم فاطمه دلفانی گودرزی به راهنمایی دکتر عزت‌الله قنواتی تهیه شده است.

Email: ezghanavati@yahoo.com

** نویسنده مسئول: ۰۹۱۲۳۸۴۱۳۲۱

(۱) مقدمه

برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده از سرزمین و منابع آن پدیده‌ای جدید و منحصر به دوران اخیر و جهان پیشرفته امروزی نیست (سرور، ۱۳۸۷: ۲۷). می‌توان گفت کوچ کردن بشر از مکانی به مکان دیگر، در واقع نشان گر ارزیابی او از سرزمین، برای زیستن بوده است. بنابراین آدمی از آغاز، سرزمین خود را برای نیازهای ابتدایی اش ارزیابی می‌کرده است (باقری، ۱۳۸۷: ۷). در این خصوص مطالعات بسیاری برای کاربریهای مختلف (توسعه شهری، کشاورزی، جنگل، و....) صورت گرفته است. پریرا و تیلان دراجان^۱ به مطالعه کاربری اراضی سریلانکا با استفاده از GIS پرداخته و تناسب اراضی را برای کشت محصولات کشاورزی تعیین نمودند. آنها بر اساس عوامل شیب، سری خاک، و قابلیت زمین و چگونگی آبیاری منطقه مورد مطالعه خود را به چهار واحد تقسیم کرده، سپس با استفاده از تحلیل نقشه‌ها و اطلاعات مربوطه به ارزیابی تناسب اراضی برای هر واحد پرداختند (۱۹۹۱). پراکاش و گوپتا با استفاده از داده‌های ماهواره‌های لندست و IRS اقدام به تهیه نقشه‌های کاربری اراضی و تغییرات کاربری اراضی در معدن زغال سنگ ناحیه جهاریای هند کردند و با استفاده از داده‌های سنجش از دور، انواع کلاس‌های کاربری را تفکیک کرده و کاربری‌های بهینه را مشخص نمودند (۱۹۹۸).

در سال ۲۰۰۹ ریشمایدوی^۲ و همکاران در مطالعه خود با به کارگیری منطق فازی در یک رویکرد تلفیقی با GIS به ارزیابی توان کشاورزی حوضه آبخیز بنگال غربی پرداخت. در سال ۱۳۸۳ جلیلی به بهینه سازی کاربری اراضی حوزه برموند به منظور کمینه سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه ریزی خطی پرداخت. وی برای جلوگیری از فرسایش خاک ضمن معرفی کاربری بهینه اراضی بر کاهش اراضی دیم و افزایش اراضی باغی در منطقه اشاره کرده است. ملکی به بررسی ویژگیها و تحولات دشت ملکان و نقش آن پرداخته و برای تعیین کاربری اراضی در این دشت از متغیرهای خاک شناسی، زمین شناسی، کیفیت آبهای زیرزمینی و سطح ایستابی آن، ارتفاع و شیب زمین استفاده کرد و با استفاده از روش پنهان بندی وزنی منطقه را بر اساس قابلیت کشاورزی به پنج منطقه تقسیم کرد (۱۳۸۵). گلشیری اصفهانی و همکاران (۱۳۸۷) در مقاله‌ای به تحلیل و ارزیابی منابع و کاربری فعلی و آتی بخش گندمان شهرستان بروجن پرداختند و با توجه به شناخت خصوصیات اصلی و بررسی وضعیت، استعداد و گسترش خاک‌ها برنامه‌های استفاده اصلی معین و نیازهای توسعه در هر قسمت را مشخص نمودند. هم

¹Perera , Thilla darajan

²Reshmidevi

چنین منابع قابلیت‌های اراضی را نیز بررسی و بهترین تناسب را برای آن مشخص کردند. منصوریان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی و خاک‌شناسی منطقه هرمز آباد جهت تعیین قابلیت اراضی پرداخت و قابلیت اراضی را برای کشت محصولات مختلف تعیین کردند (۱۳۹۰).

شهرستان بروجرد از خصوصیات توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی و همچنین شرایط اقلیمی ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم برخورداری از آب و هوای نیمه مرطوب و نسبتاً پر باش و پوشش گیاهی مطلوب، در بعضی مناطق به دلیل کوهستانی بودن از دامنه‌های پرشیب و خاک کم عمق برخوردار می‌باشد و به شدت در مقابل فرسایش آسیب پذیر بوده است (۵۸/۶ درصد از اراضی شهرستان بروجرد در معرض فرسایش شدید قرار دارند) و هر گونه تغییر غیر اصولی در کاربری و عدم رعایت اصول صحیح کاشت خسارتهای جبران ناپذیری به منابع اراضی وارد خواهد نمود. اراضی کشاورزی واقع در شیب‌ها به دلیل عملیات خاک ورزی (که عمدتاً به سهولت در جهت شیب انجام می‌شود) موجبات فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی خاک زمین‌ها و افت بازده را فراهم کرده است. دیم کاری به همراه عملیات خاک ورزی در شیب‌های بالا سبب شده که برخی مناطق در اثر فرسایش زیاد به شکل اراضی بدلنده در آید.

از سوی دیگر طی چند دهه اخیر با توجه به گسترش شهر، ساخت و سازهای مناطق مسکونی به ضرر اراضی کشاورزی بوده است. لذا شناسایی منابع و قابلیتهای محیطی و بهره‌برداری متناسب با توان محیط در این منطقه لازم و ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مکانهای مناسب برای توسعه کشاورزی بر اساس پارامترهای طبیعی و با استفاده از مدل تلفیقی فازی / AHP در شهرستان بروجرد انجام شده است.

(۲) مبانی نظری

شناخت محیط طبیعی پیرامون و شرایط و تغییرات آن همواره مورد توجه و عنایت انسان بوده است و حتی نخستین انسانها نیز از این امر مستثنی نبوده و به آن توجه داشته‌اند. در این بین، شناخت علمی با ویژگی‌های خاص، روزنه‌های جدیدی را در افق زندگی انسان گشوده است و او را هر چه بیشتر به سوی کانون‌های پژوهش رهنمون می‌سازد. تجربیات تاریخی این نکته را اثبات کرده است که جامعه به تناسب علم و اطلاعاتی که از استعدادهای خاک، آب، هوا و مردم خود داشته، بر میزان بازده تولیدی خویش افزوده است (نوری و صیدایی، ۱۳۸۹). توسعه و حفظ توازن اکولوژیک نیز زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین به


تناسب قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن استفاده گردد. بر این اساس شناسایی قابلیت‌ها و توانمندی‌های سر زمین پیش از بارگذاری فعالیت‌های گوناگون اهمیت زیادی دارد. ارزیابی توان اکولوژیک محیط عبارت است از تعیین قدرت بالقوه یا نوع کاربرد طبیعی سرزمنی و از آنجا که در فرایند برنامه ریزی و طراحی محیط، حفظ تعادل اکولوژیک بر اساس توان اکولوژیک سرزمنی مورد توجه قرار می‌گیرد، چنین روندی به عنوان شیوه مناسب در بهره‌برداری و مدیریت سرزمنی تلقی می‌گردد(توکل، ۱۳۷۶).

با توجه به ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های کشاورزی با محیط طبیعی، شناسایی علمی توان‌های محیط طبیعی برای داشتن کارایی بالاتر و تناسب بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. هاولين ضمن توجه به محیط طبیعی به سود بخشی کشاورزی، یکپارچگی تکنولوژی و مدیریت کشاورزی توجه خاص دارد(McCauley Ann, 2000) چیدری و همکاران کشاورزی پایدار را پاسخی به در هم پیچیدگی ارتباطات اقتصادی محیط زیست می‌داند(Chizari et al, 1998). محیط پهنه و بستری است که مجموعه زیستی نقش حیاتی خود را در آن ایفا می‌کند و همه جا توان زیستی یکسانی ندارد. قدرت عمل برخی عوامل تغییردهنده آن شدید و برخی کند است. دامنه تغییرات نیز به تناسب زمانه نسبی است. محیط جغرافیایی خصلت پویایی دارد و به دلیل همین خصوصیت دینامیکی تغییرات و درک علت آن نیز حائز اهمیت فراوان است. در مطالعات جغرافیایی توان‌های محیطی در طول زمان و پهنه مکان بررسی می‌شوند. از این رو محیط جغرافیایی به صورت مجموعه کامل متشکل از عناصر متفاوت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در جغرافیای سرزمنی مفهوم محیط نه فقط در معنای طبیعی آن بلکه در معنای اجتماعی و اقتصادی نیز مورد توجه است(رهنمایی، ۱۳۷۰). منظور از توان‌های محیطی مجموعه داده‌های محیطی است که در بهره‌وری‌های اقتصادی از محیط توسط انسان مؤثر بوده و در راستای فعالیت‌های اقتصادی انسان در محیط کاربری داشته باشد.

(۳) روش تحقیق

به منظور بررسی و ارزیابی تناسب زمین برای کاربری کشاورزی با استفاده از پارامترهای محیطی تعداد ۱۲ عامل مرتبط شامل شب، جهت شب، نقشه لندفرمها، طبقات ارتفاعی، فاصله از آبراهه‌های اصلی و فرعی، لیتلولژی و اقلیم شناسی، کاربری فعلی اراضی، خاک، فاصله از مناطق شهری و روستایی، فاصله از راههای ارتباطی شناسایی شدند. تمام لایه‌ها با سیستم زمین مرجع یکسان (UTM WGS1984 zone 39N)، با مقیاس مشترک و یکسان (30×30)

در محیط GIS آماده پردازش و ارزیابی قرار گرفته اند. برای تعیین اهمیت شاخص های مورد نظر جهت ارزیابی تناسب زمین ابتدا اهمیت نسبی هر کدام از معیارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی توسط نرم افزار Expert Choise 11 تعیین شده اند. سپس هر کدام از آنها توسط نرم افزار GIS10 فازی شده و در طیف عددی صفر تا یک قرار گرفتند. بعد از این مرحله با تلفیق مدل AHP و فازی تمامی لایه های استاندارد شده در هر یک از وزنهای حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی ضرب شده اند. در این صورت به لایه های وزن دار فازی تبدیل گردیده اند. سپس عملگرهای ضرب و جمع فازی روی لایه ها انجام و هم پوشانی لایه ها نیز صورت گرفت، سرانجام با عملگر گاما نقشه های نهایی تناسب زمین برای کاربری کشاورزی بدست آمد (شکل ۱).



شکل شماره (۱): فرآیند پژوهش جهت مکان یابی برای توسعه کاربری کشاورزی

در مطالعه حاضر در ارزیابی زمین برای کاربری کشاورزی از تلفیق دو مدل فازی و فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) استفاده شده است. فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) از جامع ترین مدل های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است و تئوری فازی شامل تمام تئوری هایی است که از مفاهیم اساسی مجموعه های فازی یا توابع عضویت استفاده می کند و هدف از آن ایجاد روشی نوین در بیان عدم قطعیت ها و ابهامات روزمره است. منطق فازی به دلیل در نظر گرفتن محدوده ای از امکانها به جای اعداد علاوه بر مزایای روش آماری به دلیل قابلیت فرموله نمودن دانش بشری در قالب ریاضی، ابزاری سودمند در ارزیابی محیطی به شمار می آید. عملکردهای فازی که در این پژوهش برای تلفیق نقشه ها استفاده شده اند عبارتند از :

عملگر ضرب فازی

تمامی لایه های اطلاعاتی در هم ضرب می شوند و در نقشه خروجی اعداد کوچکتر شده و به سمت صفر میل می کنند در نتیجه تعداد پیکسل کمتری در کلاس خیلی خوب قرار می گیرد. به همین دلیل این اپراتور حساسیت بالایی در مکان یابی اعمال می کند

$$\mu_{combination} = \prod_{i=1}^n \mu_i$$

که در آن $\mu_{combination}$ لایه حاصل از حداقل سازی μ_i لایه وزن دار فازی $i = 1, 2, 3, \dots, n$ تعداد نقشه های ترکیب شونده را نشان می دهد.

عملگر جمع فازی

در این اپراتور متمم ضرب مجموعه ها محاسبه می شود. به همین دلیل در نقشه خروجی بر خلاف عملگر ضرب جبری فازی ارزش پیکسل به سمت یک میل می کند. در نتیجه تعداد پیکسل بیشتری در کلاس خیلی خوب قرار می گیرد و حساسیت کمی در مکان یابی دارد و عرصه های بیشتری نسبت به ضرب فازی عنوان مناسب به خود می گیرد.

$$\mu_{combination} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mu_i)$$

که در آن $\mu_{combination}$ لایه حاصل از حداقل سازی، μ_i لایه وزن دار فازی $i = 1, 2, 3, \dots, n$ تعداد نقشه های ترکیب شونده را نشان می دهد.

عملگر گاما

برای تعدیل حساسیت خیلی بالای عملگر فازی ضرب و حساسیت خیلی کم عملگر فازی جمع، عملگر دیگری به نام گامای فازی معرفی شده است. که حد فاصل ضرب و جمع جبری فازی می باشد. اگر γ برابر با یک باشد خروجی همان نقشه حاصل از fuzzy sum خواهد بود و اگر γ برابر با صفر باشد نقشه خروجی همان نقشه fuzzy product خواهد بود.

$$\mu_{combination} = (\text{fuzzy algebraic sum} \times \text{fuzzy algebraic product})^{1-\gamma}$$


که در آن $\mu_{combination}$ لایه حاصل از گامای فازی و γ پارامتر انتخاب شده در محدوده (۰ و ۱) است.

معرفی محدوده مورد مطالعه

شهرستان بروجرد با مساحت ۱۷۱۰ کیلومتر مربع در شمال شرقی استان لرستان بین ۴۸ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است(شکل شماره ۲). این شهرستان دارای دو بخش به نامهای اشتريينان و مرکзи، ۲ نقطه شهری به نام های بروجرد و اشتريينان و دارای هفت دهستان می باشد. بروجرد دارای آب و هوای نیمه خشک سرد تا مرطوب کوهستانی با ميانگين بارندگی ۴۴۴ ميليمتر در سال می باشد. طبق آمار و ارقام ميانگين دمای سالانه شهرستان بروجرد برابر با ۱۴/۹ درجه سانتيگراد و ميانگين تعداد روزهای بخندان در ماههای سرد سال به ۲۱ روز می رسد. از لحاظ زمين شناسی منطقه بروجرد پيکره دگرگونی در امتداد زون سنندج - سيرجان در شمال و زاگرس مرتفع در جنوب را به خود اختصاص داده است. بين دو واحد دگرگونی در شمال شرق و شرق و زاگرس خرد شده در شمال غرب و غرب نهشته های کواترنری بخشی از دشت بروجرد - دورود (سيلاخور) را تشکيل داده اند که در قسمتهای جنوب بر وسعت نهشته های آبرفتی اضافه می شود. محدوده ارتفاعی منطقه مورد مطالعه بين ۱۴۷۱ تا ۳۴۸۳ متر از سطح دريا واقع شده است. شهرستان بروجرد از لحاظ پستی و بلندی شامل سه قسمت مهم کوههای مرتفع یا زاگرس خرد شده، واحد تپه ماهوری، دشت ها می باشد.

از لحاظ کشاورزی بيشترین اراضی کشاورزی شهرستان در دشت سیلاخور به وسعت تقریبی ۷۱۷۱۰ هكتار قرار دارد. شهرستان بروجرد با ۷۴۶۷/۴ هكتار سطح زیر کشت محصولات


دائمی و باغی بعد از شهرستان دورود در رده دوم استان قرار دارد. در مجموع باغات متمر
۵۷۷/۵ هکتار و کل تولید سالانه ۲۷۲۴۴ تن در مقام اول استان قرار دارد.




شکل شماره (۲): نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

۴) یافته‌های تحقیق


برای ارزیابی پنهانه‌های مناسب توسعه کاربری کشاورزی بر اساس مدل تلفیقی فازی / AHP هر کدام از لایه‌ها، فازی سازی شده‌اند. برای فازی سازی، لایه‌ها باید به صورت فرمت رستری باشند. بنابراین لایه‌های نقطه‌ای و خطی شامل فاصله از نقاط شهری و روستایی، فاصله از آبراهه و فاصله از راه‌های اصلی با استفاده از تحلیل Distance و برای لایه‌های پلیگونی شامل زمین‌شناسی، کاربری اراضی، اقلیم، لند فرم، خاک و مشخصات خاک (واحدهای ارضی) بر اساس مناسب بودن آنها برای کاربری کشاورزی طبق نظر کارشناسی کد گذاری شده است. با دادن کدهای ۱ به بالا و با تحلیل feature to raster به لایه‌های رستری تبدیل شده‌اند. بعد از رستری کردن لایه‌ها، با استفاده از توابع شکل (۳ و ۵) در محیط ARC GIS 10 هر کدام از لایه‌ها فازی سازی شده‌اند (شکل ۴ و ۶).




شکل شماره (۳) : توابع فازی سازی معیارها (۱) فاصله از محدوده شهر (۲) لند فرم (۳) اقلیم (۴) ارتفاع (۵) زمین شناسی (۶) جهت شبیه شناسی



شکل شماره (۴) : لایه های فازی شده (۱) لند فرم (۲) زمین شناسی (۳) اقلیم (۴) ارتفاع (۵) ارتفاع (۶) فاصله از محدوده شهر





شکل شماره (۵): توابع فازی سازی معیارهای ۷) فاصله از نقاط روستایی ۸) کاربری اراضی ۹) شیب ۱۰) فاصله از آبراهه اصلی ۱۱) فاصله از آبراهه فرعی ۱۲) فاصله از راههای ارتباطی



شکل شماره (۶): لایه‌های فازی شده ۷) فاصله از نقاط روستایی ۸) کاربری اراضی ۹) شیب ۱۰) فاصله از آبراهه اصلی ۱۱) فاصله از آبراهه فرعی ۱۲) فاصله از راههای ارتباطی

در نهایت توابع و لایه های فازی شده مربوط به معیار خاک که به صورت زیر می باشند(شکل ۷).






شکل شماره (۷): توابع و لایه‌های فازی شده معیار خاک و مشخصات خاک

تعیین ضرایب اهمیت شاخص با استفاده از AHP

برای وزن دهی و اولویت بندی معیارها در نرم افزار Expert Choise 11 ابتدا هدف پژوهش که برنامه ریزی بهینه کاربری زمین برای توسعه کشاورزی که در بالاترین سطح است، مشخص می‌شود. در سطح دوم معیارها وجود دارند. جهت مقایسه زوجی از روش ماتریسی در نرم افزار استفاده شده است و طبق نظر کارشناسی با توجه به شناخت منطقه مورد مطالعه وزن دهی به هر کدام از معیارها انجام گردیده است (شکل ۸). بعد از وزن دهی و انجام محاسبات در نرم افزار و با توجه به نرخ سازگاری (نرخ سازگاری باید کمتر از $0/1$ باشد) وزنهای نهایی به دست آمده است که در کاربری توسعه کشاورزی بیشترین وزن به شاخص خاک ($0/222$) و کمترین وزن به شاخص زمین شناسی ($0/014$) تعلق گرفته است (شکل ۹).

	soil	slope	landform	landuse	clima	distance of river	distance of city	distance of road	elevation	aspect	litology
soil		2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0	7.0
slope				2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	6.0
landform					2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0
landuse						2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	5.0
clima							2.0	2.0	3.0	4.0	5.0
distance of river							2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
distance of city								2.0	2.0	3.0	3.0
distance of village									2.0	2.0	3.0
distance of road									2.0	2.0	3.0
elevation										2.0	3.0
aspect											2.0
litology											2.0
Total: 10.0											

شکل شماره (۸): ماتریس مقایسه زوجی برای معیارها




شکل شماره (۹): وزن های بدست آمده برای معیارها و میزان سازگاری

بعد از وزن دهی معیارها در نرم افزار Expert Choise 11 وزن هر کدام از معیارها در لایه مربوطه ضرب شد.

$$f(x) = w_i \mu(x_i)$$


که در آن $f(x)$ لایه وزن دار فازی، w_i وزن هر یک از معیارهای AHP و $\mu(x_i)$ تابع فازی هر کدام از لایه ها می باشد.

بعد از فازی سازی و ضرب وزنهای در لایه های فازی شده عملگرهای sum ، product ، gama بر لایه های فازی شده اجرا شد.




شکل شماره (۱۰): نقشه‌های حاصل از عملگر ضرب و جمع فازی

در شکل (شماره ۱۰) نقشه‌های حاصل از عملگر ضرب فازی با حساسیت بالا در مکان‌یابی و نقشه حاصل از عملگر جمع فازی با حساسیت کم در مکان‌یابی نشان داده شده است. برای تعدیل حساسیت خیلی بالای عملگر فازی ضرب و حساسیت خیلی کم عملگر فازی جمع، نقشه حاصل از عملگر گامای فازی ۰/۷، ۰/۸ (شکل شماره ۱۱) و نقشه حاصل از عملگر گامای ۰/۹ (شکل شماره ۱۲) معرفی شده است.



شکل شماره (۱۲): نقشه تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با گامای ۰/۸ و ۰/۷



شکل شماره (۱۳): نقشه تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با گامای ۰/۹


برای انتخاب گام‌ای مناسب لازم است با توجه به کاربری کشاورزی فعلی در سطح شهرستان بروجرد و در نظر گرفتن پهنه‌های مناسب هر کدام از مقدادیر مختلف گاما مطابقت صورت گیرد. با توجه به لایه‌های گاما و نقشه کاربری اراضی مشخص شد، که گاما ۹/۹ بیشترین انطباق را با وضعیت کشاورزی منطقه دارد. همچنین برای انتخاب گاما بهینه علاوه بر روش ذکر شده، از روش دیگری نیز استفاده شده است. به عبارتی با تحلیل zonal statistic مساحت لایه‌هایی را که در محدوده تناسب زیاد و بسیار زیاد قرار می‌گیرند، محاسبه و مشخص شد که بیشتر مساحت لایه‌ها در گاما ۹/۰ قرار می‌گیرد. لذا گاما ۹/۰ به عنوان لایه نهایی تناسب زمین برای کاربری توسعه کشاورزی معرفی می‌گردد.

(۵) نتیجه‌گیری

با توجه به نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجرد در حال حاضر حدود ۹۴۰ کیلومتر مربع از اراضی شهرستان یعنی معادل ۵۴ درصد آن به کاربری کشاورزی اختصاص دارد. در نقشه گاما ۹/۰ حدود ۷۲۴/۸ کیلومتر مربع یعنی معادل ۴۸ درصد منطقه در تناسب زیاد و بسیار زیاد قرار گرفته است و اگر مناطق با تناسب متوسط هم به این مساحت اضافه کنیم (مساحت منطقه با تناسب متوسط حدود ۳۲۵/۴ کیلومتر مربع معادل ۱۹ درصد) به طور کلی ۱۰۵۰ کیلومتر مربع معادل ۶۱ درصد از مساحت شهرستان برای کاربری کشاورزی دارای تناسب متوسط تا زیاد می‌باشد (جدول ۱).

جدول شماره (۱): مقدادیر طبقات تناسب زمین برای کاربری کشاورزی مدل گاما فازی ۹/۰

تناسب زمین برای توسعه کاربری کشاورزی با گاما ۹/۰، فازی		طبقه بندی تناسب زمین
مساحت به درصد	مساحت به کیلومتر مربع	
۲۵/۸	۴۴۴	تناسب بسیار کم
۱۲/۸	۲۱۴/۹	تناسب کم
۱۹	۳۲۵/۴	تناسب متوسط
۲۴	۴۱۱/۳	تناسب زیاد
۱۸/۶	۳۱۳/۵	تناسب بسیار زیاد
۱۰۰	۱۷۱۰	مجموع مساحت



شکل شماره (۱۴): نقشه نهایی تناسب زمین برای کاربری کشاورزی با مدل تلفیقی فازی / AHP

طبق نقشه (شکل ۱۴) مناسب ترین پهنه ها برای توسعه کشاورزی در قسمت مرکزی منطقه (دشت های آبرفتی و دامنه ای) از شمال و شمال غربی به جنوب کشیده شده است. قسمتهای جنوبی شهر بروجرد برای کاربری کشاورزی بهترین تناسب را دارد که مهمترین علت آن وجود رودخانه اصلی شهرستان می باشد. علاوه بر اینکه موجب دسترسی به آبهای سطحی شده، باعث به وجود آمدن رسوبات آبرفتی زیاد و خاک حاصلخیز در این منطقه شده است. از سوی دیگر در این منطقه هموار بودن زمین هم عاملی برای توسعه کشاورزی بوده است به طوریکه شب منطقه بین صفر تا ۵ درصد می باشد. یکی از دلایل افزایش تعداد نقاط روستایی در این منطقه و رونق کشاورزی به علت وجود پارامترهایی همچون هموار بودن زمین، جریان آبهای سطحی، دشت آبرفتی می باشد. همچنین به دلیل تغذیه قسمتهای جنوبی از مناطق مرتفع کوهستانی سطح آب زیر زمینی نیز بالا می باشد. مناطق شمالی شهرستان بروجرد نیز جز مناطق با تناسب زیاد قرار گرفته است. همانطور که اشاره شد حدود ۳۸ درصد منطقه مورد مطالعه جزء پهنه های نامناسب جهت کاربری کشاورزی بوده که بیشتر ناشی از مرتفع و کوهستانی بودن آن و به عبارتی وضعیت توپوگرافی شهرستان می باشد. قسمت وسیعی از پهنه های نامناسب در غرب شهرستان و شرق و شمال شرق می باشد. پهنه های با تناسب کم بیشتر در قسمتهای شرقی و جنوب شرقی منطقه قرار دارند که به دلیل فرم زمین (تپه ها که دارای

خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سبک)، و زمین شناسی این منطقه می‌باشد که از سنگهای نفوذی تشکیل شده است. در بعضی مناطق شرقی علی رغم تناسب کم این مناطق برای کاربری کشاورزی به دلیل شیب زیاد و ارتفاع زیاد، کشاورزی در این مناطق شکل گرفته، در واقع مردم در شیبهای نامناسب افدام به کشاورزی کرده اند، که این باعث فرسایش خاک و از بین رفتن بخشی از مراتع منطقه مورد مطالعه می‌شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده نتیجه می‌گیریم که در مجموع از اراضی شهرستان بروجرد حدود ۱۰۵۰ کیلومتر آن برای کاربری کشاورزی مناسب می‌باشد که از این میزان حدود ۹۴۰ کیلومتر آن مورد کشت قرار می‌گیرد، در این صورت حدود ۱۱۰ کیلومتر از اراضی با تناسب مناسب استفاده نمی‌شود، که این اراضی با توجه به نقشه کاربری اراضی، بیشتر در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی منطقه قرار دارند پس برنامه ریزان باید برای توسعه کشاورزی این اراضی را مد نظر قرار دهند.

(۶) منابع

- استانداری استان لرستان (۱۳۸۶)، سالنامه آماری استان لرستان.
- اداره منابع طبیعی شهرستان بروجرد، نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ کاربری اراضی شهرستان.
- اداره منابع طبیعی شهرستان بروجرد، نقشه ۱:۱۰۰۰۰ زمین شناسی شهرستان.
- اسکندری، سعیده، ایوب مرادی، جعفر اولادی (۱۳۹۰)، کاربری اراضی و تحلیل سیمای سرزمینی روستای گل سفید از نظر زیست محیطی با استفاده از RS و GIS ، آمایش سرزمین، سال ۳، شماره ۴، ۱۶۲-۱۲۷.
- باقری بداغ آبادی، محسن (۱۳۸۷)، ارزیابی سرزمین کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات پلک، تهران.
- توکل، محمد سعید، (۱۳۷۶)، ضرورت ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین در طرح های هادی توسعه کالبدی، مجله محیط شناسی شماره ۱۸ سال ۲۲ دانشگاه تهران.
- جلالیان، احمد و ایوبی، شمس الله (۱۳۸۵)، ارزیابی اراضی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
- جلیلی، خلیل (۱۳۸۳)، بهینه سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز بریموند به منظور کمینه سازی فرسایش خاک، پایان نامه دانشگاه تهران.
- حسینی، هاشم (۱۳۹۰)، ارزیابی زئومورفولوژیکی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر دیوان دره با استفاده از مدل فازی و AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
- رهنماei، محمد تقی، (۱۳۷۰)، توان های محیطی ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی.

- شعبانی، رحمت الله(۱۳۷۴)، بررسی منابع آب زیرزمینی دشت سیلاخور و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
- سینگ، جاسبر، اس.اس دیلون(۱۳۸۲)، **جغرافیای کشاورزی**، ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی، علی اهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۳)، **مطالعات جامع شهرستانهای استان لرستان**.
- مشهودی، سهراب (۱۳۸۹)، **قابلیت سنگی زمین روستایی**، بنیاد مسکن.
- منصوریان، اسماعیل (۱۳۹۰)، **مطالعه ویژگیهای ژئومورفولوژیکی و خاک شناسی منطقه هرمز آباد جهت تعیین قابلیت اراضی**، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
- ملکی، جبرئیل (۱۳۸۵)، **ویژگیها و تحولات ژئومورفولوژیکی دشت ملکان و نقش آن بر کاربری زراعی**، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- نوروزی آورگانی، اصغر، سید هدایت الله نوری، صدیقه کیانی(۱۳۸۹)، **ارزیابی توان های محیطی برای توسعه کشاورزی**.
- نوری، سید هدایت الله، اسکندر صیدایی(۱۳۸۹)، **ارزیابی توان محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی**، سال ۲۱، شماره ۴۶، ۳۷ - ۴۶.
- یمانی، مجتبی، جبرئیل ملکی، احمد انصاری لاری(۱۳۸۸)، پنهانه بندی ژئومورفولوژیکی دشت ملکان به منظور ارزیابی قابلیت کشاورزی با استفاده از GIS &RS ، **فصلنامه جغرافیای طبیعی** ، سال اول، شماره ۳.
- Chizari, M, Pazeshki, G., (1998), **Perceptions of extension agents regarding sustainable agriculture in the Khorasan province of Iran**, 14th Annual association for international agriculture and extent ion education conference. Tuscan, Arizona.
 - McCauley, Ann, (2000), **Soil scientist: Clain jones**, sustainable agriculture, Montana state university.
 - Perera .A and Thillaanadarajan V, (1991),**GIS for land use planning, asia –pacific remote sensing** , Valume, 3, no.2
 - Prokash and R, P, Gupta, (1998) ,**land use mapping and change detection in cool mining area, case study in the jharia coalfield , india**,international journal of remote sensing, Valume,19,no.3, p-p 391-610.
 - Reshmidevi, T.V., T.L Eldho and R.jana. (2009) **A GIS –Integrated fuzzy rule-based inference system for land suitability evaluation in agricultural watershads** , Agricultural systems, 101-109.