



دانشگاه شهرد بهشتی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

پاییز و زمستان ۱۳۹۹، دوره ۱۳، شماره ۲، صفحه‌های: ۲۱-۱۳

اثریک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی با شدت بالا و پایین، با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی پیتید ناتریورتیک دهیزی (ANP) و فشار خون مردان فعال

اسماعیل کرمی^{*}، علی حسنی^۱، محمد رضا دهخدا^۲، پژمان معتمدی^۲

۱دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهرود، شهرود، ایران.

۲دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: اسماعیل کرمی، تلفن: ۰۲۱۸۸۴۷۹۵۷، رایانه: esi.karami67@gmail.com

دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
ویرایش مقاله: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
پذیرش مقاله: ۰۵/۰۵/۱۳۹۸

چکیده

هدف: ناتریورتیک پیتید دهیزی از قلب ترشح می‌شود و می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر دستگاه‌های مختلف بدن بگذارد. از جمله مهم‌ترین تأثیرات این هورمون تأثیر بر سازوکارهای تنظیمی فشار خون است. هدف از این مطالعه بررسی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون بر ناتریورتیک پیتید دهیزی و متعاقب آن فشار خون است.

روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح گروهی متقاطع با اندازه‌گیری مکرر با هدف تعیین اثریک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا و پایین، با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی ناتریورتیک پیتید دهیزی و فشار خون مردان تمرین‌کرده انجام گرفت. بدین منظور از میان جامعه در دسترس ۸ مرد تمرین‌کرده با دامنه سنی 25 ± 7 سال و درصد چربی 27 ± 4 % به صورت تصادفی انتخاب شدند. این افراد با فاصله ۴۸ ساعت پروتکل‌های مختلف شامل فعالیت مقاومتی با شدت بالا (درصد ۷۵% تکرار بیشینه) با و بدون محدودیت جریان خون انجام دادند. سطوح سرمی ناتریورتیک پیتید دهیزی با (۳۰% درصد یک تکرار بیشینه) با و بدون محدودیت جریان خون انجام دادند. استفاده از روش الیزا بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: سطوح ناتریورتیک پیتید دهیزی سرمی در اثر اعمال فعالیت‌های مقاومتی با شدت بالا و پایین، با و بدون محدودیت جریان خون تفاوت معناداری با هم ندارد ($p=0.50$). همچنین تغییر معناداری در فشار خون مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد اثر فعالیت‌های مقاومتی با شدت بالا و پایین، با و بدون محدودیت جریان خون، بر سازوکارهای تنظیمی فشار خون از طریق ترشح ناتریورتیک پیتید دهیزی در مردان تمرین‌کرده تفاوتی با هم ندارد.

واژه‌های کلیدی: پیتید ناتریورتیک دهیزی، فعالیت ورزشی مقاومتی، محدودیت جریان خون.

مقدمه

در زمینه پیشگیری و کنترل اختلالات قلبی فراهم کند. در سال‌های اخیر ترکیب تمرینات استقامتی، سرعتی، مقاومتی بر کاهش فشار خون و افزایش ترشح ANP اثبات شده است^(۶). درباره نوع فعالیت بدنی و تمرینات مقاومتی بر هورمون ANP، سوزا و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی با نام «اثرینج هفته تمرین مقاومتی بر روی موش‌های نر» نشان دادند که بعد از تمرینات مقاومتی هورمون ANP افزایش می‌یابد^(۷). لیپاری^۸ و همکاران (۲۰۱۵) در تحقیق روی موش‌های نژاد ویستار با برنامه مقاومتی افزایش ANP در موش‌های صحرایی نژاد ویستار را پس از دو ماه تمرین مقاومتی نشان دادند^(۸). احمدی‌زاده^۹ و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی با نام «تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح استراحتی هورمون‌های قلبی» نشان دادند فعالیت مقاومتی اثری بر ترشح ANP ندارد^(۹).

در تحقیق ماندروکاس^{۱۰} و همکاران (۱۹۹۵) با عنوان «پاسخ ANP به ورزش زیر بیشینه و ورزش بیشینه» روی ۱۵ زن تمرین‌کرده سالم نشان داده شد که ورزش بیشینه محرك قوی‌تری برای افزایش ANP است، اگرچه در ورزش زیر بیشینه نیز ANP افزایش داشت، بنابراین شدت تمرینات می‌تواند عامل مثبت در افزایش ANP باشد^(۱۰). نقی‌زاده^{۱۱} و همکاران (۲۰۰۶) به مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی و سرعتی بر ANP در مردان ورزشکار پرداختند و نشان دادند که هر دو نوع فعالیت سبب افزایش معنادار سطوح سرمی ANP نسبت به پیش از مسابقه می‌شود و فعالیت با شدت بالا تأثیر بیشتری بر این پیتید داشت^(۱۲). از طرفی، چون تمرینات با شدت بالا به دلیل بار بالا معمولاً برای افراد تمرین نکرده، بیمار و سالم‌ند انجام نشدنی است یا در صورت انجام، ممکن است با مشکلاتی چون فشار خون بالا، آسیب مفصلی و عضلانی وغیره همراه باشد^(۱۱)، این موضوع موجب شده است در سال‌های اخیر ترکیب محدودیت جریان خون و تمرینات با شدت پایین مورد توجه قرار گیرد. در این نوع تمرینات جریان خون ورودی به عضو را قبل از شروع ورزش با باند کشی یا غیرکشی محدود می‌کنند. فشار این کار به طور معمول بیشتر از فشار سیستولیک فرد است^(۱۲). سازوکار اثر تمرینات با محدودیت جریان خون به درستی شناخته نشده است، اما به نظر می‌رسد در نگاه اول به علت انباست متabolیت‌هایی چون لاکتات باشد^(۱۳). این انباست متabolیت‌ها سبب افزایش پاسخ غدد درون‌ریز

کم تحرکی و متعاقب آن فشار خون بالا، از عوامل تهدیدکننده سلامت عمومی و از شایع‌ترین علل اصلی ابتلاء به بیماری‌های قلبی-عروقی است^(۱). عوامل متعددی در تنظیم فشار و حجم خون نقش دارند که از هورمون پیتید ادرارآور دهلیزی (ANP)^(۱۴) از جمله آنهاست^(۲).

پیتید ادرارآور دهلیزی یا همان (ANF)^(۱۵)، از گرانول‌ها در سلول‌های عضلانی دهلیز هنگام انبساط دهلیزی ترشح می‌شود و به گیرنده‌ها روی سطوح سلول‌های کلیوی، بستر عروقی و غده آدرنال می‌نشینند و در دستگاه عصبی مرکزی به عنوان عامل مهمی در حفظ تعادل اعمال حیاتی بدن عمل می‌کند و نقش مهمی در تنظیم فشار و حجم خون، تنظیم دما و سدیم بدن دارد^(۳). این هورمون قلبی نقش خود را غالب بر روی ریه (شل‌کننده سلول‌های ماهیچه‌ای شکم و شل‌کننده تراشه)، قلب (کاهش بروند قلب، عملکرد بطن چپ، افزایش قطر عروق خونی کرونری)، دستگاه عصبی مرکزی (جلوگیری از فعالیت سمپاتیک، افزایش در ضربان قلب، افزایش قطر لیپولیز، تنظیم نواحی از مغز، تأثیر بر حجم و فشار خون)، کلیه (افزایش سرعت فیلتراسیون گلومرلی، افزایش در حجم ادرار و الکترولیت‌ها)، هورمون‌ها (کاهش فعالیت زین پلاسمایا، کاهش آلدسترون، کورتیزول و افزایش سطوح تستوسترون، جلوگیری از ترشح شیره لوزالمعده، ترشح انسولین یا آن، جلوگیری از ترشح شیره لوزالمعده، ترشح انسولین یا متabolیسم) و عضله صاف عروقی (کاهش فشار خون) ایفا می‌کند. همچنین اغلب به شکل گرانول‌های ذخیره‌ای در سلول‌های میوکارد دهلیزی‌ها پستانداران وجود دارد و در بطن‌ها به مقدار کم دیده می‌شود و هنگام تحریک گیرنده‌های کششی یا فشار بر دهلیز قلب رها می‌شود. عوامل بسیاری در ترشح هورمون‌ها اثرگذارند که از جمله می‌توان به تمرینات و فعالیت‌های ورزشی اشاره کرد که بر سطوح خونی اغلب هورمون‌ها تأثیر می‌گذارند و از لحاظ زیستی حائز اهمیت‌اند^(۴).

براساس نتایج مطالعات هورمون ANP در پاسخ به فعالیت ورزشی، کشش دیواره دهلیزی‌های قلب و رگ‌ها، افزایش مایعات بدن و آسیب‌های بطنی ترشح می‌شود^(۵). با توجه به نقش این هورمون در عملکرد سیستمی و هومئوستاز بدن، بررسی تغییرات سطوح آن بر اثر فعالیت‌های بدنی مختلف می‌تواند اطلاعات ارزنده‌ای را

روش‌های آزمایشگاهی

اکسیژن مصرفی بیشینه $V_{O_2 \text{max}}$ با استفاده از روش بروس^۷ (۱۱) و به سیله نوار گردان مدل کازمد (cosmedT150) ساخت ایتالیا و دستگاه گاز آنالایزر مدل زن (zan600) (۱۲) ساخت آلمان انجام گرفت.

برای تعیین سطوح سرمی ناتریوتیک پیتید دهیزی مقدار ۳ میلی لیتر خون از سیاهرگ بازویی آزمودنی‌ها گرفته شد و در لوله‌های پلاستیکی حاوی ژل جداکننده سرم و بدون مواد جلوگیری‌کننده از انعقاد خون ریخته شد. این نمونه‌ها در دمای اتاق به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بدون هم زدن نگهداری شدند، سپس از طریق سانتریفیوژ به مدت ۵ دقیقه و با دور ۲۱۰۰ قرار داده شدند و سرم آن‌ها جدا شد. سرم جدا شده در لوله‌های پلاستیکی ۲ میلی لیتر ریخته شد، سپس در دمای ۷۰ درجه زیر صفرتاً تکمیل همه نمونه‌ها و انتقال به آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل نگهداری شدند. در آزمایشگاه از روش الایزا و با استفاده از کیت‌های آزمایشگاهی ناتریوتیک پیتید دهیزی انسانی شرکت ژلیو آلمان با حساسیت (۵, ۲۵ ng/L) سطوح هریک از این شاخص‌ها در سرم تعیین شد.

با استفاده از دستگاه سنجش فشار خون الکترونیکی مدل پالنکس در حالت استراحت و به صورتی که دست شخص پنج دقیقه در سطح قلب نگهداری شده بود، فشار خون آزمودنی اندازه‌گیری شد (۲۲).

یک تکرار بیشینه هر شخص در حرکات مختلف با استفاده از برآورد زیر به دست آمد (۷):

یک تکرار بیشینه:

(تعداد تکرار انجام گرفته) $\times ۰/۹$ / (مقدار وزنه (کیلوگرم))

پروتکل پژوهش

دو برنامه فعالیت مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در حجم سبک و سنگین در ساعات اولیه روز به صورت یکسان انجام گرفت (جدول ۱). فاصله بین انجام برنامه‌های فعالیت مقاومتی توسط هر آزمودنی بیش از ۴۸ ساعت در نظر گرفته شد (۲۳) و افراد هیچ فعالیت بدنی سنگینی در این مدت نداشتند. تمامی افراد با فاصله بیش از ۵ ساعت ناشتاپی برنامه تحقیق را انجام دادند (۲۴). در این تحقیق دما و همچنین رطوبت هوای داخل اتاق آزمایشگاه کنترل شد. غذای آزمودنی‌ها یکسان بود، چون در خوابگاه اقامت داشتند و از غذاخوری دانشگاه استفاده می‌کردند.

بیشتر نسبت به تمرینات بدون محدودیت جریان خون می‌شود (۱۴). تأثیر بیشتر در کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا (۱۵)، شامل افزایش کار قلب در نتیجه بهبود عملکرد کرونر قلب (۱۶)، افزایش رگ‌رایی (۱۷)، افزایش رگ‌شایی به دلیل تجمع متابولیت‌ها و افزایش کامپلیانس رگ‌ها می‌شود (۱۸). از طرف دیگر، تأیید شده است تمرینات انسدادی سبب افزایش کار قلب نسبت به تمرینات باشد مشابه بدون انسداد می‌شوند (۱۹). همچنین افزایش ضربان و کار قلب و افزایش کشش بر دیواره دهیزها ناشی از افزایش حجم پایان دیاستولی سبب افزایش آزاد شدن ANP می‌شود (۲۰). تجزیه و تحلیل این تحقیقات نشان می‌دهد که تمرینات با انسداد جریان خون می‌تواند اثر مثبتی بر ترشح هورمون ANP داشته باشد. از سوی دیگر به طور متقاض تحقیقات اثبات کرده‌اند که تمرینات انسداد در پاها می‌تواند موجب تجمع خون در سیاهرگ‌ها و کاهش خون برگشتی به قلب و در نتیجه کاهش حجم ضربه‌ای و کاهش کشش دیواره دهیزها شود (۲۱) و در مورد عوامل مؤثر بر ترشح ANP تحقیقات اثبات کرده‌اند که این می‌تواند عامل منفی در ترشح ANP باشد (۲۰).

با توجه به تناقض‌ها این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که تمرینات با محدودیت جریان خون باشد بالا در افراد تمرین‌کرده اثر افزایشی بر ANP دارد یا کاهشی؟

روش پژوهش

نمونه‌های پژوهش

این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با طرح گروهی متقاطع با اندازه‌گیری‌های مکرر است و جامعه آماری تحقیق ۸ دانشجوی پیتریت بدنی با میانگین سن ۲۵±۱/۷۵ سال، وزن ۷۶/۷۵±۷/۹۵ کیلوگرم، قد ۱۷۷±۳/۵۸ سانتی‌متر و میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی: $47\pm 7/9$ L/min بود که به صورت تصادفی از میان نمونه‌های فراخوان شده جامعه در دسترس که شامل ۳۰ نفر بودند، انتخاب شدند. این افراد بعد از طی مراحل اخلاقی و امضای رضایت‌نامه کتبی و غربالگری از نظر نداشتن بیماری‌های متabolیکی، اسکلتی و غیره با استفاده از پرسشنامه سلامتی مراحل مختلف پژوهش را انجام دادند.

جدول ۱. برنامه مقاومتی اجراسده توسعه آزمودنی های مرد

ردیف	نام حرکت	تعداد نوبت	تعداد نکار	%IRM	استراحت بین حرکات (SEC)	تمپو	استراحت بین نوبتها (SEC)
برنامه ۱	اسکات هالترآزاد لانگز هالترآزاد	۴	۲۰	۳۰	۱۲۰	۰۱۰۲	۱۲۰
	اسکات هالترآزاد لانگز هالترآزاد	۴	۲۰	۳۰	۱۲۰	۰۱۰۲	۱۲۰
برنامه ۲	اسکات هالترآزاد لانگز هالترآزاد	۴	۸	۷۵	۱۸۰	۰۱۰۲	۱۸۰
	اسکات هالترآزاد لانگز هالترآزاد	۴	۸	۷۵	۱۸۰	۰۱۰۲	۱۸۰

ویلک^۱ و برای معناداری تفاوت میانگین سطوح سرمی ناتریورتیک پیتید دهیزی بین گروههای مختلف از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری های مکرر تک گروهی^۲ استفاده شد. سطح معناداری برای تمامی آزمون ها $P \leq 0.05$ در نظر گرفته شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های آماری (SPCC) نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل شد.

نتایج

نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد که داده های به دست آمده از ناتریورتیک پیتید دهیزی سرمی در تمامی گروه ها طبیعی است. داده های توصیفی در جدول ۲ نشان داده شده است.

فرایند گرم کردن: ۷ تا ۸ دقیقه جاگینگ و سپس ۲ تا ۳ دقیقه حرکات کششی پویا به منظور رعایت اصل گرم کردن قبل از شروع پروتکل مقاومتی جدول ۱ انجام می گرفت. انسداد خون با باند ۵/۱۲ سانتی متری نایلونی و ۸۰ درصد فشار سیستولی استراحتی هر شخص (بر حسب میلی متر جیوه) هنگام انجام فعالیت های مقاومتی در فوقانی ترین قسمت ران افراد ایجاد شد. باند در فواصل استراحت بین حرکات و بین نوبتها باز شد، این مقدار از فشار باند پس از انجام مطالعات راهنمای نیز بررسی پیشینه پژوهشی (۲۵)، در این زمینه انتخاب شد.

تحلیل آماری

برای مشخص کردن نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-

جدول ۲. تغییرات سطوح ناتریورتیک پیتید دهیزی سرمی بین فعالیت مقاومتی با شدت پایین (۱IRM%۳۰) و شدت بالا (۱IRM%۷۵) همراه و بدون محدودیت جریان خون در مردان

نوع فعالیت مقاومتی	مقدار پیش از فعالیت ورزشی بر حسب / ng	مقدار پس از فعالیت ورزشی بر حسب / ng	میزان تغییرات بر حسب / ng
BFR بدون ۱IRM%۷۵	۳۶/۲۵۷±۶/۲۵۰	۲۶/۶۷۴±۵/۲۲۴	-۰/۴۱۴
BFR با ۱IRM%۷۵	۳۶/۲۵۷±۶/۲۵۰	۳۸/۲۷۷±۴/۷۸۳	+۰/۰۱۴
BFR بدون ۱IRM%۳۰	۳۶/۲۵۷±۶/۲۵۰	۳۷/۰۴۲±۶/۵۶۵	+۰/۰۷۸۶
BFR با ۱IRM%۳۰	۳۶/۲۵۷±۶/۲۵۰	۳۷/۳۱۴±۵/۵۹۶	+۰/۰۵۷

دهیزی سرمی را سبب می شوند. پس از اندازهگیری، نتایج به صورت جدول های ۳ و ۴ به دست آمد. جدول ۳ نشان می دهد که کاهش فشار خون سیستولیک به ترتیب در فعالیت ها با محدودیت جریان خون (HBFR)، فعالیت های با شدت کم همراه با محدودیت جریان خون (LBFR)، فعالیت های با شدت کم (L) و پس از فعالیت های با شدت بالا بدون محدودیت جریان خون (H) اتفاق افتاد. اطلاعات جدول ۴ نشان می دهد که کاهش فشار خون دیاستولیک به ترتیب در فعالیت ها با محدودیت جریان خون (L) و فعالیت بدون محدودیت جریان خون با شدت پایین (L) و فعالیت بدون محدودیت جریان خون با شدت پایین (H) سطوح پایین تری از ناتریورتیک پیتید

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری های مکرر (جدول ۲)، نتایج نشان داد که تفاوت سطوح ناتریورتیک پیتید دهیزی سرمی در اثر هریک از فعالیت های ذکر شده تفاوت معناداری با هم ندارد ($P=0.40$). در ادامه مقایسه میانگین ها نشان داد سطوح سرمی ناتریورتیک پیتید دهیزی در فعالیت های همراه با محدودیت جریان خون و شدت بالا (HBFR) "بالاترین سطح و بعد از آن فعالیت با محدودیت جریان خون با شدت پایین (LBFR)"، فعالیت بدون محدودیت جریان خون با شدت پایین (L) و فعالیت بدون محدودیت جریان خون با شدت پایین (H) سطوح پایین تری از ناتریورتیک پیتید

جدول ۳. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد میزان تغییرات سطوح فشار خون سیستولیک بر اثر فعالیت مقاومتی با شدت پایین (IRM%۳۰) و شدت بالا (IRM%۷۵) همراه و بدون محدودیت جریان خون نسبت به پیش از فعالیت مقاومتی در مردان

مقدار تغییر (کاهش)	انحراف معیار	میانگین	حد بالا	حد پایین	تعداد	گروه فعالیت مقاومتی
۰/۲۵۰	۰/۲	۱۷/۶۶۲	۱۳/۰۰	۹/۵۰	۸	پیش آزمون
	۰/۱	۱۰/۰۸۱	۱۳/۰۰	۹/۵۰	۸	پس آزمون
۰/۳۱۲	۰/۲	۱۰/۵۶۲	۱۲/۰۰	۸/۵۰	۸	پیش آزمون
	۰/۹۶	۱۰/۵۶	۱۷/۰۰	۸/۵۰	۸	پس آزمون
۰/۸۱۲	۰/۱	۱۱/۲۵	۱۳/۰۰	۹/۰۰	۸	High BFR
	۰/۶	۱۰/۴۳	۱۲/۰۰	۷/۰۰	۸	High BFR
۰/۶۲۵	۰/۰۶	۱۱/۰۰	۱۲/۰۰	۹/۰۰	۸	پیش آزمون
	۰/۶	۱۰/۳۷۵	۱۲/۰۰	۷/۰۰	۸	پس آزمون

جدول ۴. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد میزان تغییرات سطوح فشار خون دیاستولیک بر اثر فعالیت مقاومتی با شدت پایین (IRM%۳۰) و شدت بالا (IRM%۷۵) همراه و بدون محدودیت جریان خون نسبت به پیش از فعالیت مقاومتی در مردان

مقدار تغییر (کاهش)	انحراف معیار	میانگین	حد بالا	حد پایین	تعداد	گروه فعالیت مقاومتی
۰/۳۷۴	۰/۰۴	۷/۳۱۲	۹/۰۰	۶/۰۰	۸	پیش آزمون
	۰/۹۷	۶/۹۳۸	۸/۵۰	۵/۵۰	۸	High
۰/۴۳۷	۰/۹۵۲	۷/۵۶۲	۸/۵۰	۶/۰۰	۸	پیش آزمون
	۰/۵۶۳	۷/۱۲۵	۸/۰۰	۶/۰۰	۸	پس آزمون
۰/۷۵۰	۰/۰۵	۸/۰	۷/۰۰	۱۰/۰۰	۸	High BFR
	۰/۵۰	۷/۲۵	۶/۰۰	۸/۰۰	۸	High BFR
۰/۶۲۵	۰/۴۸۲	۷/۶۲۵	۷/۰۰	۸/۰۰	۸	پیش آزمون
	۰/۴۴۵	۷/۰	۶/۰۰	۷/۵۰	۸	پس آزمون

جریان خون (L) سبب ترشح ناتریورتیک پیتید دهلیزی بیشتر و کاهش فشار خون بالاتری به صورت غیرمعنادار می‌شود. در این خصوص نتو^{۱۰} و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشی با هدف مقایسه تمرين حاد مقاومتی همراه محدودیت جریان خون با شدت پایین با تمرين مقاومتی بدون محدودیت جریان خون نتو^{۱۰} و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند که تمرينات با محدودیت جریان خون سبب افزایش بیشتر ضربان قلب می‌شود که احتمال می‌رود افزایش سطح ناتریورتیک پیتید دهلیزی نیز در پژوهش آن‌ها تحت تأثیر افزایش ضربان قلب افزایش یافته است (۱۹). از طرفی نتایج میزان فعالیت‌های با شدت بالا و با محدودیت جریان خون (HBFR) نسبت به این فعالیت‌ها با شدت کم (LBFR) نشان می‌دهد که میزان ناتریورتیک پیتید دهلیزی و کاهش فشار خون در فعالیت‌های با شدت بالا و با محدودیت جریان خون

شدت کم (L) و فعالیت‌های با شدت بالا بدون محدودیت جریان خون (H) اتفاق افتاد.

بحث و نتیجه‌گیری

بیشتر پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینه میزان ترشح هورمون ANP حاکی از آن است که فعالیت مقاومتی افزایشی را در میزان این هورمون ایجاد کرده‌اند و در بعضی از موارد این افزایش از نظر آماری معنادار و برحی نیز غیرمعنادار بوده است (۱۳، ۱۴، ۲۶). علاوه بر ضربان قلب، افزایش هورمون ANP می‌تواند تحت تأثیر شدت تمرين و بالا رفتن میزان کاتکولامین‌ها باشد (۱۲).

نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت‌های با شدت بالا با محدودیت جریان خون (HBFR) نسبت به همین فعالیت‌ها با شدت بالا بدون محدودیت جریان خون (H) و فعالیت‌های با شدت کم همراه با محدودیت جریان خون (LBFR) نسبت به همین فعالیت‌ها بدون محدودیت

و همکاران (۲۰۱۳)، لیپاری و همکاران (۲۰۱۵)، نقیزاده و همکاران (۲۰۱۴) و حکیمی^{۲۲} و همکاران (۲۰۱۵) اشاره کرد که اختلاف معناداری را در ترشح ناتریورتیک پیتید دهلیزی اعلام کردند. افزایش قطر میوکارد و هایپرتووفی بافت قلب در فعالیت مقاومتی می‌تواند بر ترشح ناتریورتیک پیتید دهلیزی تأثیر بگذارد، بنابراین احتمالاً علت این تناقض‌ها را می‌توان درورزشکار یا غیرورزشکار بودن و سن آزمودنی‌ها دانست (۳۱، ۳۰، ۲، ۲). با توجه به داده‌های فشارخون و مطالعات انجام‌گرفته، سیمائو و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند که فعالیت مقاومتی با حجم بیشتر به کم‌فشارخونی پیشتری منجر می‌شود (۲۹). نتایج پژوهش بروجردی^{۲۳} و همکاران (۲۰۰۹) نیز نشان داد که کم‌فشارخونی پس از فعالیت مقاومتی با شدت ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه بیشتر از فعالیت مقاومتی با شدت ۵ درصد یک تکرار بیشینه است (۳۲). نتایج این مطالعات با نتایج تحقیق حاضر مغایر است. همراستا با نتایج مطالعه حاضر کولتن^{۲۴} و همکاران (۱۹۹۹) در تحقیقی با نام «شدت‌های مختلف ورزش مقاومتی بر روی اضطراب و فشارخون»، نشان دادند که برنامه تمرین مقاومتی به صورت ۵ درصد یک تکرار بیشینه از برنامه تمرینی ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه بیشتر سبب کاهش فشارخون می‌شود و علت آن راتنش عضلانی بیشتر در ۸۰ درصد تکرار بیشینه ذکر کردند (۳۳).

نتایج میزان فعالیت‌های با شدت پایین و با محدودیت جریان خون (LBFR) نسبت به فعالیت‌های بدون محدودیت جریان خون و شدت بالا (H) نشان می‌دهد که میزان ناتریورتیک پیتید دهلیزی و کاهش فشارخون در فعالیت‌های با شدت پایین و با محدودیت جریان خون (LBFR) بیشتر بود. تحقیقاتی درباره مقایسه این نوع فعالیت در دسترس نیست، بنابراین به بحث در مورد مطالعات غیرمستقیم و استفاده از مبانی نظری موجود پرداخته می‌شود، بنابراین، این افزایش می‌تواند در اثر افزایش بیشتر ضربان قلب، افزایش بیشتر فعالیت سمباتیکی باشد که سبب ترشح بیشتر ناتریورتیک پیتید دهلیزی می‌شود و متعاقب آن کاهش بیشتر فشارخون در فعالیت‌های سبک همراه با محدودیت جریان خون نیز احتمالاً در اثر ترشح بیشتر ناتریورتیک پیتید دهلیزی باشد (۲۱). البته اگرچه در این تحقیق افزایش ناتریورتیک پیتید دهلیزی معنادار نبود، احتمالاً به دلیل وجود عضلات آماده و آزمودنی‌های فعال، محدودیت جریان خون را کمزنگ‌تر می‌کند، همچنین

(HBFR) بیشتر بود که این نیز ممکن است به علت افزایش بیشتر ناتریورتیک پیتید دهلیزی به دلایل سازوکارهای مانند افزایش ضربان قلب، افزایش فعالیت عصبی سمباتیکی بیشتر با توجه به بیشتر بودن شدت در این برنامه فعالیت باشد. جومیرا^{۲۵} و همکاران (۲۰۱۴) در مطالعات همسوی با هدف بررسی اثر تمرینات با محدودیت جریان خون بر متغیرهای همودینامیک قلب و عروق افراد دارای فشارخون بالا نشان دادند که تمرینات با محدودیت جریان خون تأثیر بیشتری در کاهش فشارخون این افراد نسبت به تمرینات با بار متوسط ولی بدون محدودیت جریان خون دارد (۲۷). همچنین در تحقیق ناکی جاما^{۲۶} و همکاران (۲۰۰۸) که با هدف پاسخ همودینامیکی به بی‌وزنی شبیه‌سازی شده در طول ۲۴ ساعت سر به پایین، همراه محدودیت جریان خون انجام گرفت، نشان داده شد که حجم ضربه‌ای و فشارخون کاهش داشتند که با نتایج تحقیق حاضر همسوست (۱۵).

مقایسه نتایج میزان فعالیت‌های با شدت بالا و با محدودیت جریان خون (HBFR) نسبت به این فعالیت‌ها با شدت کم (LBFR) نشان می‌دهد که میزان ناتریورتیک پیتید دهلیزی و کاهش فشارخون در فعالیت‌های با شدت بالا و با محدودیت جریان خون (HBFR) بیشتر بود که این مسئله نیز ممکن است به علت افزایش بیشتر ناتریورتیک پیتید دهلیزی به دلایل سازوکارهایی همچون افزایش ضربان قلب، افزایش فعالیت عصبی سمباتیکی بیشتر با توجه به بیشتر بودن شدت در این پروتکل فعالیت باشد، البته در زمینه کاهش فشارخون متعاقب آن می‌توان به تحقیقات سیمائو^{۲۷} و همکاران (۲۰۰۵) اشاره کرد که عنوان می‌کنند تمرینات با حجم بیشتر اثر بیشتری بر کاهش فشارخون دارند (۲۸). ولی در خصوص مطالعات ناهمسو می‌توان به تحقیق محبی^{۲۸} و همکاران (۲۰۰۹) اشاره کرد که گزارش کردند شدت و حجم فعالیت مقاومتی اثری بر اندازه و مدت کم‌فشارخونی ندارد (۲۹).

مقایسه بیشتر نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت‌های مقاومتی بدون محدودیت جریان خون با شدت کم (L) سبب ایجاد ترشح بیشتری بر کاهش فعالیت‌های بدون محدودیت جریان خون و شدت بالا (H) می‌شود که هیچ‌کدام از آن‌ها معنادار نشد. ولی در تحقیقات ناهمسو با تحقیق حاضر، می‌توان به تحقیق کاریز سودا^{۲۹}

- samy The effect of twelve weeks of resistance training on resting levels of cardiovascular and related hormones in healthy men. *Physiology and Pharmacology*: Winter 2011, Volume 15, Number 4; From page 518 to page 526. [In Persian].
- [10] Mandroukas K, Zakas A, Aggelopoulou N, Christoulas K, Abatzides G, Karamouzis M. Atrial natriuretic factor responses to submaximal and maximal exercise. *British journal of sports medicine*. 1995; 29(4):248–51.
- [11] Madarame H, Neya M, Ochi E, Nakazato K, Sato Y, Ishii N. Cross-transfer effects of resistance training with blood flow restriction. *Medicine and science in sports and exercise*. 2008; 40(2):258–63.
- [12] Jackson AS, Sui X, Hébert JR, Church TS, Blair SN. Role of lifestyle and aging on the longitudinal change in cardiorespiratory fitness. *Archives of Internal Medicine*. 2009; 169(19):1781–7.
- [13] Loenneke JP, Kearney ML, Thrower AD, Collins S, Pujol TJ. The acute response of practical occlusion in the knee extensors. *J Strength Cond Res*. 2010; 24(10):2831–4.
- [14] Abe T, Fujita S, Nakajima T, Sakamaki M, Ozaki H, Ogasawara R, et al. Effects of low-intensity cycle training with restricted leg blood flow on thigh muscle volume and VO₂max in young men. *J Sports Sci Med*. 2010; 9(3):452–8.
- [15] Nakajima T, Iida H, Kurano M, Takano H, Morita T, Meguro K, et al. Hemodynamic responses to simulated weightlessness of 24-h head-down bed rest and KAATSU blood flow restriction. *Eur J Appl Physiol*. 2008; 1037–727 (4).
- [16] Yasuda T, Fukumura K, Iida H, Nakajima T. Effects of detraining after blood flow-restricted low-load elastic band training on muscle size and arterial stiffness in older women. SpringerPlus. 2015; 4(1):1.
- [17] Faramarzi M, Azamiyan-Jozi A, A G. The effect of resistance excrcise on cndothelin-1 concentration, systolic and diastolic blood pressure of older women. *Applied research in Sport Manag*. 2012; 1(1):95–104. [In Persian]
- [18] Loenneke JP, Wilson JM, Wilson GJ, Pujol TJ, Bemben MG. Potential safety issues with blood flow restriction training. *Scand J Med Sci Sports*. 2011; 21(4):510–8
- [19] Neto GR, Sousa MS, Costa e Silva GV, Gil AL, Salles BF, Novaes JS. Acute resistance exercise with blood flow restriction effects on heart rate, double product, oxygen saturation and perceived exertion, Clinical physiology and functional imaging. 2016.36(1): 53–59.
- [20] Hansen D, Meeusen R, Mullens A, Dendale P. Effect of acute endurance and resistance exercise on endocrine hormones directly related to lipolysis and muscle protein synthe-

به دلیل تأثیر بیشتر ترشح ناتریورتیک پیتید دهیزی در افراد با فشار خون بالاست (۲). بنابراین برای تجویز فعالیت‌های مقاومتی احتمالاً فعالیت‌های با انسداد نیاز به مطالعات متعدد بیشتر پیشنهاد می‌شود.

تشکر و قدردانی

از استادان ارجمند که مرا در انجام این پژوهش یاری کردند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از دانشجویان دانشگاه خوارزمی که به عنوان جامعه آماری مرا در انجام این تحقیق یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

منابع

- [1] Cardoso Jr CG, Gomides RS, Queiroz ACC, Pinto LG, Lobo FdS, Tinucci T, et al. Acute and chronic effects of aerobic and resistance exercise on ambulatory blood pressure. *Clinics*. 2010; 65(3):317–25.
- [2] Naghizadeh S, Rawai A. Effect of resistance and speed training on non-athletic male plasma ANP. *Sports Journal of Sport Sciences*. 2014; 6 (3): 301–15 [In Persian]
- [3] Tanaka M, Ishizaka Y, Ishiyama Y, Kato J, Kida O, Kitamura K, et al. Exercise-induced secretion of brain natriuretic peptide in essential hypertension and normal subjects. *Hypertension Research*. 1995; 18(2):159–66.
- [4] Daniel Bulten and et al, Atrial Natriuretic Peptide "receptors along the rat and rabbit nephronse spriniger-verlag". April 1987, NO.4, vol.408, pp: 356–365.
- [5] De Almeida JC, Alves CL, de Abreu LC, Sato MA, Fonseca FL, de Mello Monteiro CB, et al. Involvement of the atrial natriuretic peptide in cardiovascular pathophysiology and its relationship with exercise. *International archives of medicine*. 2012; 5(1):4.
- [6] Lipari EF, Lipari D, Valentino B. Modifications of atrial natriuretic peptide and vasopressin peptides in the rat hypothalamic supraoptic nucleus during resistance training. *Italian Journal of Anatomy and Embryology*. 2010; 115(3):211–7.
- [7] Souza R, Silva, GDP. Gomes, PS. Gonçalves, L. Gama, EF. And Maifrino, LBM. Effects of 5 weeks resistance exercises on ANP-granules in wistar rats. *J Morphol*. 2008; 25(35):35–108.
- [8] Lipari EF, Lipari D, Valentino B. Modifications of atrial natriuretic peptide and vasopressin peptides in the rat hypothalamic supraoptic nucleus during resistance training. *Italian Journal of Anatomy and Embryology*. 2010; 115(3):211–7.
- [9] Ahmadizad Z, Zahedi Asl S, Sajjadi M, Ebrahim Kh., Bas-

[32] Boroujerdi, S.S., Rahimi, R., Noori, S.S. Effect of high versus low-intensity resistance training on post exercise hypotension in male athletes. International Sport Med Journal, 2009; (10), 95–100.

[33] Koltyn KF, Focht BC, Influence of resistance exercise of different intensities on state anxiety and blood pressure. Medicine and science in sports and exercise. 1999; 31(3):456–463.

پی‌نوشت‌ها

1. Atrial Natriuretic Peptide
2. Atrial Natriuretic factor
3. Lipare
4. Ahmadizad
5. mandrokas
6. Naghizadeh
7. Bruce
8. pollnex
9. Shapiro-Wilk test
10. ANOVA with repeated measure
11. High blood flow restriction
12. Low blood flow restriction
13. Low
14. High
15. Neto
16. Ratings of perceived Exertion
17. Jomira
18. Nakajima
19. Simao
20. Mohabi
21. Suda
22. Hakimi
23. Boroujerdi
24. Koltyn

sis in adult individuals with obesity: a review. 2012

[21] Park S-Y, Kwak YS, Harveson A, Weavil JC, Seo KE. Low Intensity Resistance Exercise Training with Blood Flow Restriction: Insight into Cardiovascular Function, and Skeletal Muscle Hypertrophy in Humans. The Korean Journal of Physiology & Pharmacology. 2015; 19(3):191–6.

[22] van den Akker F, Zhang X, Miyagi M, Huo X, Misono KS, Yee VC. Structure of the dimerized hormone-binding domain of a guanylyl-cyclase-coupled receptor. Nature. 2000; 406(6791):101–4.

[23] Madarame H, Sasaki K, Ishii N. Endocrine responses to upper-and lower-limb resistance exercises with blood flow restriction. Acta Physiologica Hungarica. 2010; 97(2):192–200.

[24] Kang J R, S. L., Tranchina, C. P. Ratamess, N. A., Faigenbaum, A. D and Hoffman JR. Effect of preceding resistance exercise on metabolism during subsequent aerobic session. Eur J Appl Physiol 107. 2009:43–50.

[25] Loenneke JP, Fahs CA, Rossow LM, Thiebaud RS, Mattocks KT, Abe T, et al. Blood flow restriction pressure recommendations:a tale of two cuffs. Frontiers in Physiology Article 249. 2013; 4:1–4.

[26] Halliwill JR, Minson CT, Joyner MJ. Effect of systemic nitric oxide synthase inhibition on postexercise hypotension in humans. Journal of Applied Physiology. 2000; 89(5):1830–6.

[27] Araújo JP, Silva ED, Silva JC, Souza TS, Lima EO, Guerra I, et al. The acute effect of resistance exercise with blood flow restriction with hemodynamic variables on hypertensive subjects. Journal of human kinetics. 2014; 43(1):79–85

[28] Simao, R., Fleck, S., Polito, M.P., Monterio, W.D., Farinati, P.T. Effects of resistance training intensity, volume and session format on the post exercise hypotensive response. Journal of Strength Conditioning Research, 2005; 11: 340–6.

[29] Mohabi, Hamid. Rahmani Nia Farhad. Shaykh al-Islam, Mawtani, Darius. Faraji, Hassan. The effect of intensity and volume of exercise activity on blood pressure, heart rate and the cost of myocardial oxygen following activity. Journal of Islamic Azad University, Islamic Azad University, 2009; (1). [In Persian]

[30] Suda K. Natriuretic peptide and exercise. The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine. 2013; 2(3):333–5.

[31] Hakimi M, Ali Mohammadi, Baqa'i B, Sorkhian M, Blabley L. "Comparison of the effects of 12 weeks of endurance and resistance training of Brandutylin 1 and ANP and hypertension in middle-aged men with high blood pressure." Urmia Medical Journal, Urmia Medical Journal, 2010; 26 (12): 1089.[In Persian]



Shahid Beheshti University

Sport and Exercise Physiology

Autumn and Winter 2020; Vol.13; No.2

The effect of a session of high and low intensity resistance exercise, with and without of blood flow restriction, on the serum levels of atrial natriuretic Peptide and Blood pressure in trained men

Esmail Karami^{1*}, Ali Hasani¹, Mohammadreza Dehkoda¹, Pejman Motamed²

¹ Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University, Iran, Shahrood.

² Faculty of Physical Education and Sport Sciences Kharazmi University, Iran, Tehran.

*Corresponding Author: Esmail Karami, Tel: 09193607646, E-mail: esi.karami67@gmail.com

Received: 28/10/2018

Revised: 01/07/2019

Accepted: 28/07/2019

Abstract

Purpose: Atrial natriuretic peptide secretion from the heart, and can have different effects on different body organs including the effects of these hormones influence the mechanisms of blood pressure. The purpose of this study is to identify the effects of resistance training with blood flow restriction on atrial natriuretic peptide and subsequent blood pressure.

Methods: This quasi-experimental study was Cross-group design with repeated measures with the aim of determining the effect of a session of high and low intensity exercise, with and without the of blood flow restriction, on the serum levels of atrial peptide natriuretic and men's blood pressure. To this end, from the available subjects, 8 trained men with an age range from (25 \pm 7.1) and fat percentage of (15.7 \pm 4.7) were randomly selected. These people with 48 hours of various protocols included: resistive activity with high intensity (%75 1RM) with and without blood flow restriction and the same activity with low intensity (%75 1RM) and without blood flow restriction. Serum levels of atrial natriuretic peptide were examined using ELISA method. Data were analyzed using repeated measure ANOVA.

Results: Therefore, it seems that the effect of high and low intensity resistance exercise, with or without blood flow restriction through the secretion of peptide natriuretic atrial had no difference with each other.

Conclusion: Therefore, it seems that the effect of high and low intensity resistance exercise, with or without blood flow restriction through the secretion of peptide natriuretic atrial had no difference with each other.

Keywords: Resistance exercise, Blood flow restriction, Atrial natriuretic Peptide.

