

## مقدار ترکیبات فنلی برگ واریته‌های مختلف زیتون و اثر آن بر پایداری روغن کلزا

پریسا جعفریان<sup>۱\*</sup>، نارمل‌آصفی<sup>۲</sup> و رامین تموری<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۱/۳۰ تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۵

<sup>۱</sup> فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

<sup>۲</sup> استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد، معاونت غذا و دارو آذربایجان غربی

\*مسئول مکاتبه: Email: p\_jafarian@yahoo.com

### چکیده

برگ زیتون منبع طبیعی از ترکیبات پلی‌فنلی می‌باشد که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی بوده و غنی‌سازی روغن‌ها با عصاره برگ زیتون که حاوی مقادیر بالایی پلی‌فنلی است موجب افزایش پایداری اکسیداتیو آن می‌شود. در این مطالعه، مقدار پلی‌فنل کل عصاره متنالولی استخراج شده از برگ زیتون در چهار واریته ایرانی برگ زیتون تعیین شده و اثر آنتی-اکسیدانی عصاره‌ها روی روغن کلزا بررسی شد. روغن کلزای حاوی عصاره‌ها بوسیله رنسیمت مقایسه شد. مقدار توکوفرول‌ها، ترکیب اسیدهای چرب و مقدار پلی‌فنل‌ها قبل و بعد از حرارت دهی در  $180^{\circ}\text{C}$  در تمام نمونه‌ها تعیین شد. بیشترین مقدار پلی‌فنل ۸۰ میلی‌گرم (اسید گالیک در ۱۰۰ گرم برگ خشک) در برگ زیتون طارم و پایین ترین مقدار آن در نمونه برگ زیتون مغان به میزان  $52/5$  میلی‌گرم (اسید گالیک در ۱۰۰ گرم برگ خشک) تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقدار توکوفرول‌ها ( $2\alpha$  و  $\gamma$ ) بعد از حرارت دهی در  $180^{\circ}\text{C}$  کاهش می‌یابد. همچنین نتایج حاصل از رنسیمت نشان داد که نمونه روغن کلزای حاوی عصاره برگ زیتون از طارم با زمان القا  $11/2$  ساعت، پایدارترین نمونه در مقایسه با نمونه کنترل بدون آنتی‌اکسیدان بود. از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت افزودن برگ زیتون به عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی و با ارزش به روغن برای افزایش پایداری آن می‌تواند پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی: پایداری اکسیداسیونی، ترکیبات فنلی، روغن کلزا، عصاره برگ زیتون

### مقدمه

آزاد را دارا می‌باشدند (فورنری و همکاران ۲۰۰۲). ترکیبات موجود در برگ‌های زیتون شامل سکوریدود (مانند الئوروپین، لیکستروسید، دی متیل اولئوروپین والئوزید) و همچنین ترکیبات فلاونوئیدی مانند آپیجنین، کامپفرون، لوئئین و ترکیبات فنولی شامل اسید کافئیک، تیروزول و هیدروکسی تیروزول می‌باشد. اولئوروپین

درخت زیتون با نام علمی *Olea europaea*. علاوه بر میوه‌های بسیار مفید و مغذی، دارای برگ‌های شفابخشی نیز می‌باشد. از میان بخش‌های مختلف درخت زیتون، برگ‌های آن بالاترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بیشترین اثر خنثی کنندگی بر رادیکال‌های

بررسی‌ها نشان داد که واریته‌های زیتون ایرانی قدرت بالایی در به دام انداختن رادیکال‌های دارند و می‌توانند به عنوان منبع خوبی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی برای مصارف دارویی و تجاری باشند. کریستاکیس و همکاران (۲۰۰۹) ترکیب فنولی برگ زیتون ۳ واریته مختلف یوتان را با استفاده از LC/MS اندازه گیری کردند. رابطه خطی مثبت بین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنولی کل عصاره برگ زیتون مشاهده شد. هدف از این مطالعه، تعیین مقدار پلی‌فنل کل عصاره متانولی استخراج شده از برگ زیتون (*Olea europaea*) در چهار واریته ایرانی برگ زیتون و بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها بر روی روغن کلزا بود.

### مواد و روش‌ها

#### مواد شیمیایی

متانول، اسید کافئیک، کربنات سدیم و معرف فولین سیوکالتیو تولیدی شرکت مرک و فولکا بود. کلیه حلالها و مواد شیمیایی مورد استفاده دارای درجه تجزیه‌ای بودند.

#### برگ زیتون و روغن کلزا

برگ‌های زیتون از چهار منطقه ایران (مغان، طارم، نور و رودبار) جمع آوری شد. روغن کلزا خام و صاف شده، بدون آنتی‌اکسیدان از کارخانه‌های تولید روغن به روش پرس سرد در پیراپاشهر، استان آذربایجان غربی تهیه گردید.

#### استخراج عصاره الکلی

برگ‌های زیتون جمع آوری شده تا زمان مصرف در دمای فریزر نگهداری شدند. برگ زیتون توسط مخلوط کن معمولی خرد شد و به صورت پودر درآمد. ۶۰ گرم پودر برگ زیتون با ۳۰۰ میلی‌لیتر حلال متانول: آب به نسبت ۲۰:۸۰ حجمی حجمی مخلوط کرده به مدت یک شب در محل تاریک هم زده شد. بعد از این مدت مخلوط فیلتر می‌شود. عصاره جداسازی شده با تبخیر کننده

که به مقدار زیادی در برگ زیتون و به مقدار کمی در روغن زیتون وجود دارد، اصلی ترین ترکیب فنولی برگ زیتون می‌باشد. از ترکیبات مهم حاصل از هیدرولیز الوروبین، هیدروکسی تیروزول می‌باشد که دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌میکروبی قوی می‌باشد. هر دو این ترکیبات دارای دو گروه کاتکول می‌باشد که برای اپتیموم فعالیت گیرندگی رادیکال‌های آزاد یا آنتی‌اکسیدانی مورد نیاز می‌باشد (بیانکو و همکاران ۲۰۰۰). برگ‌های زیتون محصول جانبی درخت زیتون بوده و در کارخانه‌های روغن زیتون به وفور یافت می‌شود (۱۰٪ کل وزن زیتون) (تابرا و همکاران ۲۰۰۴). در گذشته برگ‌های زیتون معمولاً برای تغذیه دام مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما امروزه برای کاربردهای دیگری مانند صنایع دارویی و غذایی نیز استفاده می‌شود. بنابر این برگ زیتون می‌تواند به عنوان یک منبع طبیعی ترکیبات پلی‌فنلی باشد (پاییوا مارتینس و همکاران ۲۰۰۳). طبق نتایج به دست آمده از مطالعات پیشین مشخص شده که استفاده از عصاره برگ زیتون به عنوان منبع غنی از پلی‌فنل‌ها، سبب افزایش پایداری روغن‌های گیاهی می‌شود و همچنین غنی‌سازی روغن‌های سرخ کردنی با این ترکیبات توصیه می‌شود (بوآزیز و همکاران ۲۰۰۵). آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی TBHQ، BHA، BHT و PG اکسیداسیون مانند BHA، BHT و PG اکسیداسیون چربی‌ها را در طول نگهداری و حمل و نقل مهار می‌کنند اما به دلیل فراریت‌شان اثر کمتری در دمای سرخ کردن دارند. همچنین اثرات سمی و سرطان‌زایی BHA به اثبات رسیده است (فاراق و همکاران ۲۰۰۳). در حالیکه مواد آنتی‌اکسیدانی طبیعی (پلی‌فنل‌ها) موجود در گیاهان فواید بسیاری برای سلامتی در مقایسه با آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی دارند (آنتاکلولوچیک و همکاران ۲۰۰۴).

طبق گزارش حاجی محمودی و همکاران (۲۰۱۰) رابطه خطی مثبت بین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنولی کل و قدرت احیای نمونه‌های پالپ زیتون وجود دارد.

اتوسیمپلر spark TRIATHLON پمپ KNAUER K1000 و دتکتور فلورسنس RF-551 مورد استفاده قرار گرفت. فاز متحرک -n هگزان: ایزوپروپانول (۱۶:۹) انتخاب و استفاده شد. سرعت جریان فاز متحرک ۵/۰ میلی لیتر در دقیقه بود. براساس زمان ماند آلفا توکوفرول ترکیبات توکوفرولی در نمونه روغن مشخص گردید. جهت تعیین مقدار از روش استاندارد خارجی استفاده شد (تابی و همکاران ۲۰۰۸).

### افزودن برگ زیتون به روغن کلزا

۱۰ گرم از پودر برگ زیتون که قبلاً رطوبت و درصد ماده خشک آن محاسبه گردیده به هر کدام از ارلن های حاوی ۱۰۰ گرم از روغن کلزا خام و تصفیه شده اضافه نموده و به مدت ۳ ساعت در تاریکی هم زده و پس از صاف کردن تا زمان انجام آزمون های مربوطه در یخچال نگهداری شد.

**آزمون تعیین پایداری روغن در مقابل اکسیداسیون**  
تعیین پایداری اکسیداسیونی روغن ها بوسیله رنسیمت اندازه گیری شد. زمان پایداری با استفاده از رنسیمت مدل Metrohm برای ۲/۵ گرم نمونه روغن و در دمای ۱۱۰ °C اندازه گیری گردید (تابی و همکاران ۲۰۰۸).

آزمون گرمخانه گزاری در ۱۸۰ °C نمونه های روغن کلزا حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی پس از ارزیابی و بررسی نتایج آزمون رنسیمت، نمونه های با بالاترین مدت زمان پایداری و نمونه شاهد انتخاب گردیده و حدود ۲۰ میلی لیتر از نمونه ها داخل بشر در گرمخانه ۱۸۰ °C به مدت ۳ ساعت قرار داده شد.

**تجزیه و تحلیل آماری**  
داده های حاصل از آزمایش ها بر اساس طرح کاملاً تصادفی one way ANOVA در سطح ۵ % و مقایسه Tukey توسط نرم افزار Minitab13 تجزیه شدند. رسم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار Excel صورت پذیرفت.

دوارد رد مای ۰ درجه سانتیگراد تا رسیدن به حالت کاملاً خشک، تبخیر شد. سپس باقی مانده در پنج میلی- لیتر متانول حل کرده و در دمای ۲۰ °C تا زمان آزمایش نگهداری گردید (بو آریز و همکاران ۲۰۰۸).

### اندازه گیری پلی فنل کل

غاظت پلی فنل های کل عصاره الکلی توسط معرف فولین - سیوکالتیو تخمین زده می شود. از هر یک از نمونه های عصاره الکلی استخراجی مقدار ۱/۰ میلی لیتر را در بالن حجمی ۱۰ میلی لیتری ریخته، مقدار ۵ میلی- لیتر آب م قطر بعلاوه ۰/۵ میلی لیتر معرف فولین سیوکالتیو اضافه می کنیم پس از ۳ دقیقه مقدار یک میلی لیتر محلول کربنات سدیم اشباع به هر یک از بالن ها اضافه می کنیم و پس از مخلوط نمودن آنها، با آب م قطر به حجم رسانده و رقیق می کنیم. مقدار جذب نمونه ها پس از یک ساعت در طول موج ۷۲۵ نانومتر در مقابل شاهد اندازه گیری شد (حامدی و همکاران ۱۳۸۳).

### اندازه گیری اسیدهای چرب

اندازه گیری اسیدهای چرب از طریق مشتق سازی (استر متیل) و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل (6890N, AGILENT, USA) مجهز به آشکار ساز شعله ای (FID) با دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد و ستون مویین BPX70 به طول ۵۰ متر، قطر لوله ۳۲/۰ میلی متر و ضخامت فیلم ۰/۲۵ میلی متر تزریق ۲۵۰ °C و فشار گاز حامل ۲۵/۷۳ psi می باشد. سرعت جریان ۴ میلی لیتر در دقیقه و دمای گرمخانه ۲۵۰ °C مطابق روش ایزو ۵۰۰۸ (۱۹۹۰) استفاده شد. گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل به کار رفت (آزاد مرد دمیرچی و داته ۲۰۰۸).

**آنالیز توکوفرول ها با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا**

اندازه گیری محتوای توکوفرول در نمونه روغن، با استفاده از دستگاه HPLC ساخت شرکت SI LICHROSOR آلمان انجام شد. بدین منظور ستون ۵-60 با ابعاد ۴.۶ mm × ۲۵۰ mm و اندازه ذرات ۵ μm

### ترکیب اسیدهای چرب

ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزای خام اولیه در جدول ۲ آمده است. روغن کلزا حاوی مقدار زیادی اسید اولئیک (بیش از ۶۰ درصد)، اسید لینولئیک (بیش از ۲۰ درصد)، اسید لینولنیک (بیش از ۹ درصد) و مقدار کم اسیدهای چرب اشباع (کمتر از ۶۰ درصد) است. اسید اولئیک مهمترین اسید چرب تک غیر اشباع و اسید لینولئیک بارزترین اسید چرب پلی غیر اشباع در روغن کلزا می‌باشد (آزادمرد دمیرچی ۱۳۸۸).

جدول ۲- ترکیب و درصد اسیدهای چرب موجود در روغن کلزا

A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	B0*	نام نمونه	
				اسید	چرب
۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۴	C14:0	
۲/۸	۳/۹	۲/۸	۳/۹۵	C16:0	
۰/۱۷	۰/۱۷	۰/۱۸	۰/۱۸	C16:1	
۰/۱	۰/۱۱	۰/۱۱	۰/۱۱	C17:0	
۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۰۸	C17:1	
۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۰۹	C18:0	
۶۳	۶۵/۱	۶۲/۱	۶۴/۵۲	cisC18:1	
۱۶/۱	۱۷/۲	۱۵/۰	۱۶/۸۶	C18:2	
۷/۵	۷/۷	۵	۷/۵۱	C18:3	
---	--	--	۰/۸۲	C20:0	

B0: روغن کلزای خام بدون آنتیاکسیدان قبل از حرارت دهی  
B1: روغن کلزای حاوی آنتیاکسیدان طبیعی قبل از حرارت دهی  
A0: روغن کلزای خام بدون آنتیاکسیدان بعد از حرارت دهی  
A1: روغن کلزای حاوی آنتیاکسیدان طبیعی بعد از حرارت دهی

بررسی تغییرات در ترکیب اسیدهای چرب برای ارزیابی اثر حرارت در دمای ۱۸۰°C بر روی روغن الزامی بود. همانطور که در جدول ۲ دیده می‌شود در بین اسیدهای چرب اندازه گیری شده در روغن کلزای خام ، اسید اولئیک بیشترین مقدار را نشان می‌دهد

### نتایج و بحث

#### پلیفنل کل

در این بررسی، مقدار پلیفنل کل، به تفکیک در برگ ۴ رقم زیتون بدست آمده است. مقدار پلیفنل کل برای برگ زیتون محلی مغان، طارم، نور و روبار به ترتیب ۵۷/۵، ۸۰، ۵۷/۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم برگ خشک به دست آمد (جدول ۱). نمونه برگ زیتون طارم بیشترین و نمونه برگ زیتون مغان کمترین مقدار پلی-فنل را دارا بودند. آبودی و همکاران (۲۰۱۱) مقدار ترکیبات فنلی کل برگ‌های زیتون سه واریته مختلف تونس را ۵۳/۰ mg/g DM به دست آوردند.

جدول ۱- مقدار ترکیب پلیفنل در برگ ۴ رقم زیتون

ردیف	گونه	مقدار پلیفنل کل (mg/g DM*)
۱	زیتون طارم	۸۰ <sup>a</sup>
۲	زیتون مغان	۵۷/۵ <sup>b</sup>
۳	زیتون نور	۵۷/۵ <sup>c</sup>
۴	زیتون روبار	۷۴/۵ <sup>d</sup>
۵	روغن کلزا	۱۴/۹۷ <sup>e</sup>

\*: ماده خشک

همچنین کریستاکیز و همکاران (۲۰۱۰) مقدار ترکیبات فنلی کل برگ‌های زیتون سه واریته یونان را mg/g DM ۶۱/۹ mg/g DM، ۵۵/۷ mg/g DM، ۶۰/۹ mg/g DM گزارش کردند. در حالی‌که لی و همکاران (۲۰۰۹) مقدار ترکیبات فنلی کل در ۸٪ عصاره اتانولی استخراج شده از برگ‌های زیتون را ۱۴۸ mg/g DM اعلام نمودند. همچنین هایس و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای مقدار ترکیبات فنلی کل عصاره برگ زیتون را بر اساس اسید گالیک در گرم وزن خشک عصاره برگ زیتون با استفاده از روش فولین سیوکالتیو ۱۶۰ میلی‌گرم گزارش کردند. همانطور که ملاحظه می‌شود نتایج حاصل در این مطالعه با گزارش‌های منتشر شده مطابقت دارد.

برگ زیتون مورد ارزیابی قرار دادند. بوآزیز و همکاران (۲۰۰۸) فعالیت آنتی‌رادیکالی عصاره برگ زیتون با BHT را مقایسه کردند. نتایج نشان دادند که فعالیت آنتی‌اکسیدانی روغن تصفیه شده و روغن سبوس زیتون غنی شده با برگ و عصاره برگ زیتون در مقدار ppm ۴۰۰ اثر محافظتی بالایی در برابر اکسیداسیون روغن دارد. روغن‌های حاوی عصاره، عدد پراکسید پایین‌تر و پایداری بیشتری داشتند که با روش رانسیمت مورد ارزیابی قرار گرفت.

**جدول ۳- زمان پایداری روغن کلزا بعد از افزودن عصاره برگ زیتون**

زمان پایداری	ردیف	گونه
۱۱/۳ <sup>a</sup>	۱	زیتون طارم
۱۰/۹ <sup>b</sup>	۲	زیتون مغان
۱۱ <sup>c</sup>	۳	زیتون نور
۱۱/۲ <sup>d</sup>	۴	زیتون رودبار
۹/۱۵ <sup>e</sup>	۵	روغن کلزا

#### توكوفرول

روغن کلزا حاوی مقدار نسبتاً بالایی از توكوفرول است و مقدار گاما توكوفرول در آن نسبت به سایر اجزاء توكوفرولی بیشتر است (جدول ۴). شکل ۱ کروماتوگرام مربوط به ترکیبات توكوفرولی را در روغن کلزا نشان می‌دهد.

(۶۴٪). حرارت بر روی اسیدهای چرب در سطح احتمال (P<۰/۰۵) تاثیر معنی‌داری نداشت و پروفایل اسیدهای چرب روغن کلزاً بدون فنل بعد از حرارت دهی در ۱۸۰°C تغییر نکرد. همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود میزان اسیدهای چرب غیراشباع به میزان جزئی کاهش یافته که در سطح احتمال (P<۰/۰۵) معنی‌دار نیست. همچنین حرارت دهی روغن کلزاً حاوی آنتی-اکسیدان طبیعی تغییری در میزان اسیدهای چرب غیراشباع ایجاد نکرد. تنها مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع کاهش جزئی نشان داد. می‌توان گفت افزودن آنتی‌اکسیدان طبیعی (عصاره برگ زیتون) و حرارت دهی در ۱۸۰°C تاثیر معنی‌داری بر روی ترکیب اسیدهای چرب به ویژه اسید اولئیک، لینولئیک و لینولینیک نداشته است.

#### پایداری اکسیداتیو

پایداری اکسیداتیو روغن، توانایی روغن در مقابل اکسیداسیون بوده و پارامتر مهم در شناسایی شرایطی است که کیفیت محصول در آن حفظ می‌گردد. در این مطالعه پایداری نمونه‌ها با رنسیمت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار روغن کلزاً با برگ زیتون به طور معنی‌داری (P<۰/۰۵) باعث افزایش پایداری آن می‌شود. همانطور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، بیشترین پایداری مربوط به نمونه طارم (۱۱/۳ ساعت) و کمترین پایداری مربوط به نمونه کنترل (۹/۱۵ ساعت) بود. بوآزیز و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که نمونه‌های با غلظت‌های بالا از ترکیبات فنلی ثبات اکسیداسیونی بیشتری دارند. همچنین افزودن عصاره برگ زیتون باعث افزایش زمان القای روغن زیتون خالص از ۲۲/۱ ساعت به ۵۳ ساعت در دمای ۱۰۰°C می‌شود. بالدیولی و همکاران (۱۹۹۶) نشان دادند که پایداری اکسیداتیو روغن زیتون بکر با غلظت پلی‌فنلهای هیدروفیلیک مرتبط است. آلتیوکو همکاران (۲۰۰۸) پلی‌فنل کل برگ‌های زیتون و تاثیرات شرایط استخراج را روی مقدار فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره

**جدول ۴- مقدار توکوفرول موجود در روغن کلزا قبل و بعد از حرارتدهی در  $180^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳ ساعت**


B1	B0*	پارامتر
۴۸ <sup>b</sup>	۲۶۵ <sup>a</sup>	توکوفرول $\alpha$
۲۰ <sup>d</sup>	۴۲۰ <sup>c</sup>	توکوفرول $\gamma$

\*: روغن کلزا بدون فتل قبل از حرارت دهی      B1: روغن کلزا

حاوی فتل بعد از حرارت دهی

### نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره‌های استخراجی برگ زیتون همه دارای فعالیت آنتی-اکسیدانی هستند. به طوریکه بیشترین پایداری اکسیداسیونی در نمونه طارم ( $11/3\text{ h}$ ) و به دنبال آن نمونه رودبار ( $11/2\text{ h}$ ), نمونه نور ( $11\text{ h}$ ) و نمونه مغان ( $10/9\text{ h}$ ) مشاهده شد. بنابراین می‌توان گفت با افزایش مقدار پلی‌فنل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز افزایش می‌یابد. همچنین این عصاره به علت دارا بودن ترکیبات فنولی می‌تواند به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی در تاخیر اکسیداسیون روغن کلزا هم در شرایط ذخیره سازی و هم طی فرایند حرارتی مطرح باشد و باعث افزایش ماندگاری آن شود. بنابراین برگ زیتون می‌تواند به عنوان جایگزین آنتی‌اکسیدان سنتزی برای جلوگیری یا تاخیر اکسیداسیون روغن در سطح تجاری مطرح باشد.



شکل ۱- کروماتوگرام مربوط به ترکیبات توکوفرولی در روغن کلزا

1)  $\alpha$  Tocopherol      2)  $\gamma$  Tocopherol

نتایج حاصل از مقایسه میانگین محتوای ترکیبات توکوفرول در سطح احتمال ( $P < 0.05$ ) در جدول ۴ نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری در مقدار توکوفرول‌های نمونه کنترل و نمونه حاوی آنتی‌اکسیدان طبیعی وجود دارد. همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود مقدار توکوفرول‌ها ( $\gamma$  و  $\alpha$ ) بعد از حرارت دهی در  $180^{\circ}\text{C}$  به مدت سه ساعت در نمونه کاهش یافت. که می‌تواند به دلیل اکسیداسیون توکوفرول‌ها که ترکیبات حساس به حرارت هستند باشد. مقدار  $\alpha$  توکوفرول در هر دو نمونه روغنی آنالیز شده کمتر از  $\gamma$  توکوفرول می‌باشد.

### منابع مورد استفاده

- آزادمرد دمیرچی، ص. ۱۳۸۸. روغن‌های خوراکی، ترکیبات، کنترل فرآیندها، مشکلات تصفیه و راه حل‌ها. انتشارات عمیدی تبریز.
- Antalovich M, Bedgood D J R, Bishop A, Jardine D, Prenzler P, & Robards K, 2004. LC-MS investigation of oxidation products of phenolic compounds. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52: 962–971.
- Altıok E, Baycin D, 2008. Isolation of polyphenols from the extracts of olive leaves (*Olea europaea L.*) by adsorption on silk fibroin. Journal of Separation and Purification Technology 342–348.
- Artajo L S, Romero M P, Morello J R and Motilva M J, 2006. Enrichment of refined olive oil with phenolic compounds: evaluation of their antioxidant activity and their effect on the Bitter index. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54: 6079–6088.
- Aouidi F, Ayari S, Ferhi H, Roussos S, Hamdi M, 2011. Gamma irradiation of air-dried olive leaves: Effective decontamination and impact on the antioxidative properties and on phenolic compounds. Food chemistry, 1105–1113.

- Baldioli M, Servili M, Perretti G & Montedoro G F, 1996. Antioxidant activity of tocopherols and phenolic compounds of virgin olive oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society* 73: 1589-159.
- Bianco A, Uccella N, 2000. Biophenolic components of olives. *Food Research*, 33: 475-485.
- Bouaziz M, Sayadi S, 2005. Isolation and evaluation of antioxidants from leaves of a Tunisian cultivar olive tree. *European Journal of Lipid Science and Technology* 107: 497-504.
- Bouaziz M, Fki I, Jemai H, Ayadi M, Sayadi S, 2008. Effect of storage on refined and husk olive oils composition: Stabilization by addition of natural antioxidants from Chemlali olive leaves. *Journal of Food Chemistry* 108: 253-262.
- Farag, R.S, El-Baroty, G.S. Amany, S, Basuny M, 2003. The influence of phenolic extracts obtained from the olive plants (cvs. Picual and Kronakii) on the stability of sunflower oil. *Journal of Food Science and Technology* 38: 81-87.
- Hajimahmoodi M, Sadeghi N, Jannat B, Oveisi MR, Madani, S, Kiayi M, Akrami MR & Ranjbar AM, 2010. Antioxidant Activity, Reducing Power and Total Phenolic Content of Iranian Olive Cultivar. *Journal of Biological Science* 8: 779-783.
- Hayes JE, Allen P, Brunton N, Ogrady MN, Kerry JP, 2001. Phenolic composition and in vitro antioxidant capacity of four commercial phytochemical products: Olive leaf extract (*Olea europaea* L.), lutein, sesamol and ellagic acid. *Food Chemistry* 948-955.
- Kiritsaki K, Kontominas M G, Kontogiorgis C, Hadjipavlou-Litina D, Moustakas A & Kiritsakis A, 2009. Composition and Antioxidant Activity of Olive Leaf Extracts from Greek Olive Cultivars. *Journal of the American Oil Chemists' Society* 87: 369-376.
- Lalas S, Athanasiadis V, Gortzi O, Bonitis M, 2011. Enrichment of table olives with polyphenols extracted from olive leaves. *Food Chemistry* 1521-1525.
- Paiva-Martins F, Gordon M H & Gameiro P, 2003. Activity and location of olive oil phenolic antioxidants in liposomes. *Journal of Chemistry and Physics of Lipids* 124: 23-36.
- Paiva-Martins F, Gordon M H, 2001. Isolation and characterization of the antioxidant component 3, 4-dihydroxyphenylethyl 4-formyl-3-formylmethyl- 4-hexenoate from olive (*Olea europaea*) leaves. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 49(9): 4214-4219.
- Tabee E, Azadmard-Damirchi S, Jagerstad M, Dutta PC, 2008. Effects of  $\alpha$ -Tocopherol on oxidative stability and phytosterol oxidation during heating in some regular and high-oleic Vegetable Oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society* 85: 857-867.

## Phenolic compounds content in leaf of different varieties of olive and its effect on stability of rapeseed oil

P Jafarian<sup>1\*</sup>, N Asefi<sup>2</sup> and R Teimori<sup>3</sup>

Received: February 18, 2013 Accepted: March 16, 2014

<sup>1</sup>MSc, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

<sup>2</sup>Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

<sup>3</sup>MSc, Food Hygienic and Cosmetic, Department of Food and Drug Deputy of West Azarbaijan, Urmai, Iran

\*Corresponding author: E mail: p\_jafarian@yahoo.com

### Abstract

Olive leaf is a source of natural polyphenolic compounds that have antioxidant activity and enrichment of oils with olive leaf extract which contains high amounts of polyphenols and tocopherol can increase its oxidative stability. In this study, the total amount of methanolic extracts of polyphenols of olive leaf (*Oleaeurpopeae*) in four Iranian varieties of olive was determined and the leaf antioxidant effect on thermal stability of rapeseed oil was studied by rancimat ( $P<0.05$ ). The amount of tocopherols, fatty acids and polyphenols were determined before and after heating at 180°C. Maximum amount of polyphenols was 80 mg (acid galic in 100 grams of dry leaf) in Taram variety and minimum amount was 52.5mg in Moghan variety. The results showed tocopherols amount were decreased after heating at 180°C. Rancimat results showed that oil fortified with Taram variety extract with induction time of 11.3 hr was stable in comparison with control samples without antioxidants. According to the obtained results, adding olive leaf as a natural and valuable antioxidant to increase stability of oil can be recommended.

**Key word:** Olive leaf extract, Oxidative stability, Phenolic compounds, Rapeseed oil