

تأثیر قارچ قارچریشته آربسکولار (*Glomus mosseae*) بر جذب و توزیع برخی عنصرهای غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، روی و مس) در دانهال‌های پسته سرخس، ابارقی و بنه‌باغی در شرایط تنش شوری

مسعود فتاحی^۱، محمد حسین شمشیری^{۲*} و شیرین نصراله پورمقدم^۱
۱ و ۲. دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۳/۱۸ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۴)

چکیده

این پژوهش برای تعیین اثر همزیستی قارچ میکوریز آربسکولار (*Glomus mosseae*) و مقایسه سه پایه پسته از نظر جذب و توزیع عنصرهای غذایی فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، روی و مس در تنش شوری انجام شد. بدین منظور آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با سه عامل: میکوریز (میکوریز و بدون میکوریز)، شوری آب آبیاری (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ ds/m) و پایه (سرخس، ابارقی و بنه‌باغی) اجرا شد. نتایج نشان داد، سطوح مختلف شوری موجب کاهش همزیستی و جذب عناصر (فسفر، پتاسیم، کلسیم، روی و مس) در پایه‌ها شد و با افزایش سطح شوری تجمع سدیم و کلر در ریشه و شاخساره افزایش یافت. توزیع عنصرها تحت تأثیر تیمار میکوریز قرار گرفت به طوری که میزان عنصرهای فسفر، پتاسیم، سدیم و کلر در ریشه کمتر از شاخساره بود. گیاهان دارای میکوریز در مقایسه با گیاهان بدون میکوریز غلظت بالاتری از فسفر، پتاسیم، کلسیم و روی داشتند همچنین غلظت سدیم و کلر در گیاهان میکوریزی کمتر از گیاهان بدون میکوریز بود. در مجموع همزیستی پایه‌های پسته با میکوریز سبب افزایش مقاومت به تنش شوری شد که دست کم می‌توان بخشی از آن را به افزایش جذب برخی از یون‌های کانی کم‌تحرک مانند فسفر و روی و فراهم نمودن تنظیم اسمزی بیشتر نسبت داد. پایه بنه‌باغی نسبت به دو پایه دیگر محتوای سدیم و کلر کمتری در ریشه و شاخساره داشت که می‌تواند دلیلی برای مقاومت بیشتر این پایه در مقایسه با دو پایه دیگر در برابر شوری آب آبیاری باشد.

واژه‌های کلیدی: پسته، تنش شوری، عنصرهای غذایی، میکوریز.

Effect of arbuscular mycorrhizal (*Glomus mosseae*) on the uptake and distribution of elements (P, K, Ca, Mg, Na, Cl, Cu and Zn) in Pistachio seedlings 'Sarakh's', 'Abareghi' and 'Bane Baqi' (*P. eurycarpa* × *P. mutica*) in salinity conditions

Masoud Fattahi¹, Mohammad Hossein Shamschiri^{2*} and Shirin Naslolahpournmoghadam¹

1, 2. M.Sc. Student and Associate Professor, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

(Received: Jun. 8, 2015 - Accepted: Nov. 25, 2015)

ABSTRACT

This study was planned to determine the effect of arbuscular mycorrhiza (*G. mosseae*) symbiosis and three pistachio rootstocks of 'Sarakh's', 'Abareqi' and 'Bane Baqi' on elements uptake and distribution under salt stress. A greenhouse experiment was conducted as factorial with three factors of mycorrhizae by two levels (with or without mycorrhizae), saltiness of irrigation water by four levels (EC of 0.5, 5 10 and 15 dS.m⁻¹) and rootstock by three levels (Sarakh's, Abareghi and Bane Baqi). Different levels of salt stress caused reduction in mycorrhizal colonization as well as elements uptake in all rootstocks while Na⁺ and Cl⁻ accumulation in shoot and roots were increased as the effect of salt stress intensity. Elements distribution was affected by arbuscular mycorrhizal fungi as their accumulation (P, K, Na, Cl) were lower in roots than shoot. Mycorrhizal plants had higher concentrations of P, K, Ca and Zn and lower of Na and Cl in comparison to non-mycorrhizal plants. Symbiosis relations of pistachio rootstocks with arbuscular mycorrhizal fungus led to increase salt stress resistance, which can be attributed, at least partially, to improve uptake of some low mobile elements like P and Zn and better osmosis regulation. Bane Baqi had lower content of Na and Cl in shoot and roots in comparison with two other which can be reason for its more resistance to salt stress.

Keywords: Mycorrhizae, nutrient elements, pistachio, salt.

مقدمه

پسته یکی از محصولات مهم تجاری در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران است. ایران با حدود ۴۳۱۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت پسته (۸۸ درصد آن درختان بارور و ۱۲ درصد نهال) و تولید سالانه ۱۹۲۰۰۰ تن محصول، بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده پسته و رفسنجان بزرگ‌ترین مرکز تولید پسته در جهان است که در شمال غرب استان کرمان واقع شده است (Radmehr, 2010; Bagheri et al., 2012). ارزش محصول تولیدشده حدود ۱۰ درصد از مجموع درآمدهای غیرنفتی کشور است (Radmehr, 2010).

شوری خاک یک از چالش‌های جدی و رو به افزایش در بسیاری از قسمت‌های جهان به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است (Giri et al., 2003; Al-Karaki, 2006). خاک‌های شور حدود ۷ درصد از خشکی‌های زمین را به خود اختصاص داده است (Ruiz-Lozano et al., 2001). سطوح بالای شوری (بیش از ۱۴ دسی‌زیمنس بر متر یا بیش از ۰/۱ درصد) در خاک بیشتر ناشی از تجمع نمک‌های محلول در آب آبیاری، کاربرد کودهای شیمیایی (Copeman et al., 1996; Al-Karaki, 2000)، کمبود بارندگی و دمای بالا در این مناطق است (Cantrell & Linderman, 2001; Al-Karaki, 2006; Ishii, 2006 Mouk & Tester & Davenport, 2003). شوری بسیار زیان‌آور است (Giri et al., 2007; Mathur et al., 2003; Karimi et al., 2011) در بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر پایه‌های پسته بادامی‌ریز زرد (A و B)، قزوینی و سرخس اظهار داشتند که محتوای سدیم در شاخساره و ریشه همه پایه‌ها با افزایش شوری افزایش یافت و میزان تجمع سدیم به‌جز در پایه سرخس در ریشه بیشتر از شاخساره بود همچنین میزان پتاسیم و کلسیم با افزایش شوری به‌طور شایان‌توجهی افزایش یافت.

قارچ‌های قارچ‌ریشه آربسکولار باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش شوری می‌شوند به‌طوری‌که برخی، همزیستی قارچ‌ریشه‌ای را به‌عنوان یکی از راهکارهای

اصلاح خاک‌های شور پیشنهاد کرده‌اند (Rabi & Almmadani, 2005). اثر قارچ قارچ‌ریشه آربسکولار (*Glomus mosseae*) بر مقاومت به شوری (۰ و ۱۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم) دانه‌های نارنگی نشان داد که با تلقیح دانه‌ها با قارچ قارچ‌ریشه، میزان سدیم ریشه در نهال‌های بدون قارچ‌ریشه نسبت به دانه‌های قارچ‌ریشه‌ای بیشتر بود و غلظت K^+ ، Ca^{2+} و Mg^{2+} در ریشه دانه‌های قارچ‌ریشه‌ای بیشتر بود اگرچه تفاوت غلظت Mg^{2+} در شوری ۱۰۰ میلی‌مولار با نهال‌های غیر قارچ‌ریشه‌ای معنی‌دار نبود (Wu & Zou, 2009). در بررسی تأثیر همزیستی پایه نارنج سه برگ (*Poncirus tribaliata*) با قارچ قارچ‌ریشه آربسکولار (*Glomus mosseae*) در تنش شوری (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌مولار کلرید سدیم)، نتایج گویای آن بود که همزیستی نارنج سه برگ با قارچ‌ریشه باعث شد که میزان منیزیم، کلسیم و فسفر بیشتری در شاخساره تجمع یابد (Murkute et al., 2006). در آزمایشی که تأثیر قارچ *Glomus etunicatum* بر رشد گیاه پسته در شرایط شوری (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ میلی‌مولار نمک کلرید سدیم) بررسی شد، نتایج نشان داد که غلظت عنصرهای روی، فسفر و مس در تیمار شاهد، شوری پایین و متوسط در گیاهان قارچ‌ریشه‌ای بالاتر از گیاهان بدون قارچ‌ریشه بود که این افزایش ممکن است به دلیل افزایش سطح جذب ریشه یا انتقال مواد توسط هیف قارچ باشد (Falaghan et al., 2006).

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر شوری آب آبیاری و همزیستی قارچ‌ریشه‌ای بر سه پایه پسته سرخس، ابارقی و بنه‌باغی از نظر جذب و توزیع عنصرهای غذایی اجرا شد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش روی پایه‌های پسته سرخس، ابارقی و بنه‌باغی انجام شد. در این آزمایش از یک گونه قارچ قارچ‌ریشه آربسکولار به نام *Glomus mosseae* استفاده شد. قارچ مورد نظر با استفاده از ذرت به‌عنوان گیاه تله به مدت چهار ماه در گلخانه افزایش شد آنگاه اندام‌های هوایی ذرت قطع شد، ریشه‌ها قطعه‌قطعه و

الکتريکی آب آبیاری (۵/۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر) و با استفاده از نمک کلرید سدیم انجام شد. دامنه سطوح شوری به گونه‌ای در این پژوهش تنظیم شد که هم اثرگذاری تنش شوری دیده شود و هم اینکه سطوح بالا موجب از بین رفتن دانه‌های پسته و از دست رفتن بخشی از اطلاعات نشود. در طول انجام تیمار شوری، دمای گلخانه 32 ± 5 درجه سلسیوس و میانگین رطوبت نسبی $30/1$ درصد و شدت نور میانه روز 50 ± 10 کیلولوکس ثبت شد. گیاهان به مدت ۷۵ روز با نمک محلول در آب آبیاری (با EC $5/0$ ، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر) تحت تنش شوری قرار داشتند و در این مدت گلدها به فاصله هر سه روز یکبار تا ۳۰ درصد بیش از ظرفیت مزرعه برای جلوگیری از تجمع نمک در خاک به صورت وزنی آبیاری شدند.

در پایان آزمایش برای ارزیابی میزان همزیستی قارچ‌ریشه، نمونه‌های ریشه‌ای جدا و به قطعه‌های ۱ سانتی‌متری تقسیم و رنگ‌آمیزی به روش Schenck & Perez (1990) انجام شد. ریشه‌ها پس از شستشو در آغاز در محلول هیدروکسید پتاسیم ۱۵ درصد، به مدت ۲۰ دقیقه در دمای 121 درجه سلسیوس و فشار $1/5$ اتمسفر اتوکلاو شدند، سپس ۲۰ دقیقه در محلول پراکسید هیدروژن قرار داده شده و پس از شستشو، چهار دقیقه در محلول اسیدکلریدریک ۱ درصد قرار داده شدند. برای رنگ‌آمیزی، نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در معرف تریپان بلو قرار گرفتند. در پایان، نمونه‌ها به منظور از بین رفتن رنگ اضافی در محلول حاوی 575 میلی‌لیتر اسیدلاکتیک + 63 میلی‌لیتر گلیسرین + 63 میلی‌لیتر آب مقطر قرار داده شدند. در مرحله پس از هر تکرار چهل نمونه ریشه ۱ سانتی‌متری تهیه و زیر میکروسکوپ با بزرگ‌نمایی $40 \times$ مشاهده شدند و درصد آلودگی از رابطه ۱ محاسبه شد:

$$(1) \quad \frac{\text{شمار ریشه آلوده}}{\text{شمار ریشه مشاهده شده}} \times 100 = \text{درصد آلودگی ریشه}$$

برای اندازه‌گیری عنصرهای غذایی در آغاز $0/5$ گرم نمونه خشک‌شده ریشه و شاخساره را آسیاب کرده و در کوره به مدت یک ساعت در دمای 250 درجه سلسیوس و سه ساعت در دمای 550 درجه سلسیوس قرار داده شد تا نمونه‌ها خاکستر شدند. پس از خنک شدن، ۵

با خاک گلدان مخلوط شد که در نهایت مخلوط یکنواختی از قطعه‌های ریشه آلوده، اسپور و خاک ناحیه ریشه تهیه شد که در مراحل پس‌از آن به عنوان مایه قارچ استفاده شد (Bagheri *et al.*, 2012). خاک مورد استفاده به نسبت دوبه یک به ترتیب خاک مزرعه و ماسه مخلوط شد که برخی ویژگی‌های آن در جدول ۱ آورده شده است. برای سترون (استریل) کردن خاک، نمونه‌های خاک به مدت یک ساعت در دمای 120 درجه سلسیوس و فشار $1/5$ اتمسفر قرار گرفتند.

جدول ۱. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شده
Table 1. Physical and chemical characteristics the soil

Property	Amount
Clay %	15.2
Silt %	14.6
Sand %	7.02
Class structure	Sandy loam
PH	7.2
The electrical conductivity (dS/m)	1.7

بذرهای مورد نیاز در این آزمایش از مؤسسه تحقیقات پسته رفسنجان تهیه و آنگاه بذرهای بنه باغی پیش از کشت به مدت ۶۵ روز در شرایط چینه سرمایی قرار گرفتند و بذرهای دو پایه سرخس و ابارقی پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد در پارچه مرطوب و در اتاقک رشد (انکوباتور) با دمای 25 درجه سلسیوس به مدت یک هفته قرار داده شدند. در مرحله بعد، شش عدد از بذرهای جوانه‌دار در گلدان‌های حاوی $3/5$ کیلوگرم خاک اتوکلاو شده کشت و همزمان مایه کوبی با افزودن 100 گرم از مایه قارچ به گلدان انجام شد و پس از گذشت سه هفته، شمار نهال‌ها در هر گلدان به چهار عدد کاهش داده شد. نهال‌ها به مدت 150 روز تا آغاز تیمار شوری رشد کردند و در این مدت هر دو روز یکبار تا حد ظرفیت مزرعه (FC) آبیاری شدند. پیش از آغاز تنش شوری و به منظور اطمینان از آلودگی ریشه‌ها به قارچ‌ریشه، نمونه‌هایی به صورت تصادفی از ریشه گیاهان گرفته شد و پس از رنگ‌آمیزی و مشاهده میکروسکوپی، میزان آلودگی ریشه‌ها به قارچ قارچ‌ریشه مورد استفاده در پایه سرخس، ابارقی و بنه باغی به ترتیب 85 ، 80 و 90 درصد ثبت شد (Giovanetti & Mosse, 1980). تیمار شوری در چهار سطح بر پایه قابلیت هدایت

نتایج

درصد همزیستی قارچ‌ریشه

بر پایه نتایج به دست آمده (شکل ۱) تنش شوری باعث کاهش درصد همزیستی در هر سه پایه شد. شوری در سطح ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر سبب شد که بین پایه‌های مورد استفاده، اختلاف معنی‌داری از نظر میزان همزیستی مشاهده شود. در همه سطوح شوری بیشترین درصد همزیستی مربوط به رقم سرخس و کمترین درصد همزیستی مربوط به رقم ابارقی بود. بیشترین درصد همزیستی در هر سه پایه در تیمار شاهد با میانگین ۹۷/۲۸، ۹۶ و ۸۸/۴۳ درصد به ترتیب در پایه سرخس، بنه‌باغی و ابارقی بود در حالی که میزان آلودگی با افزایش سطح شوری آب آبیاری و در سطح ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر به ۸۷/۷۰، ۶۹/۴۵ و ۳۷/۵۸ درصد کاهش یافت (شکل ۱).

جذب و توزیع عنصرهای کانی

در جدول تجزیه واریانس (جدول ۲) تاثیر تیمارها بر میزان جذب عناصر مختلف در ریشه و شاخساره نمایان است. نتایج نشان داد همزیستی قارچ‌ریشه‌ای تا سطح شوری ۵ دسی‌زیمنس بر متر تأثیری بر کاهش سدیم شاخساره نداشت ولی در EC₁₀ و EC₁₅ گیاهان قارچ‌ریشه‌ای سدیم کمتری را نسبت به گیاهان بدون قارچ‌ریشه داشتند (شکل ۲-a). سدیم ریشه و شاخساره با افزایش تنش شوری افزایش یافت که این افزایش در شاخساره و به‌ویژه در سطح EC₁₀ و EC₁₅ قابل توجه بود (شکل ۲-b). تجمع سدیم در شاخساره پایه‌های پسته تا سطح EC₅ تفاوتی نداشت اما در سطوح EC₁₀ و EC₁₅ به شدت افزایش یافته و تفاوت‌های معنی‌داری از نظر آماری ظاهر شد به طوری که پایه بنه‌باغی نسبت به دو پایه دیگر در سطوح شوری یادشده، سدیم کمتری داشت (شکل ۲-b). به‌طور کلی تجمع سدیم در ریشه پایه‌های سرخس و بنه‌باغی و در سطوح EC₁₀ و EC₁₅ بسیار کمتر از شاخساره بود اما در پایه ابارقی و به‌ویژه در گیاهان بدون قارچ‌ریشه، غلظت سدیم در سطوح شوری یادشده بالا و در حد غلظت آن در شاخساره بود (شکل ۲-c).

میلی لیتر اسیدکلریدریک ۲ نرمال به هر نمونه اضافه و با آب مقطر به حجم ۵۰ میلی لیتر رسانیده شد. این عصاره به‌طور مستقیم برای اندازه‌گیری پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن، مس، روی و سدیم استفاده شد. عنصرهای منیزیم، کلسیم، مس، روی و آهن با استفاده از دستگاه جذب اتمیک (GBA, Avanta, USA) و سدیم و پتاسیم با استفاده از دستگاه شعله‌سنج نوری (فلیم‌فتمتر) (Flame photometer, PFP7, USA) اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری فسفر، ۵ میلی لیتر از عصاره تهیه‌شده را با ۱۰ میلی لیتر از محلول آمونیوم مولیبدات مخلوط کرده و با آب مقطر به حجم ۵۰ میلی لیتر رسانیده شد. پس از صاف کردن میزان فسفر با استفاده از طیف‌سنج نوری (اسپکتروفتمتر، LAM; Leaf Area Meter-C1-2002, USA) در طول موج ۴۷۰ نانومتر اندازه‌گیری شد (Olsen et al., 1954).


برای اندازه‌گیری کلر در ریشه و شاخساره با استفاده از روش Chapman & Praht (1961)، ۱ گرم از نمونه خشک‌شده را آسیاب کرده، ۱۰۰ میلی لیتر اسید نیتریک ۰/۰۱ مولار به آن افزوده و پس از گذشت یک شب، pH محلول با کربنات سدیم ۱ نرمال روی ۷/۵-۸ تنظیم شد. در مرحله بعد چند قطره معرف کرومات پتاسیم به آن اضافه کرده و محلول با نیترات نقره ۰/۰۵ نرمال تیتیر شد و برای اندازه‌گیری میزان کلر از رابطه ۲ استفاده شد:

$$Cl \text{ (mg g}^{-1} \text{ dw)} = \frac{[(\text{ml. AgNO}_3 - \text{ml. Blank}) \times N \text{ AgNO}_3 \times 35.5]}{w \times 1000} \quad (2)$$

در این رابطه:

N: نرمالیت نیترات نقره، ml: میلی لیتر نیترات نقره
W: وزن نمونه و Blank: شاهد می‌باشد.

این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با تیمارهای قارچ قارچ‌ریشه (با و بدون قارچ‌ریشه) شوری آب آبیاری (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر) و پایه (سرخس، ابارقی و بنه‌باغی) در سه تکرار انجام شد. تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MSTATC و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۵ درصد صورت گرفت.



شکل ۱. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، بر درصد همزیستی میکوریز در پایه‌های سرخس (S)، بنه‌باغی (B) و ابارقی (A).

Figure 1. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), on percentage of mycorrhizal symbiosis in rootstocks Sarakhs (S), Bane Baghi (B) and Abareghi (A).

جدول ۲. تجزیه واریانس عنصرهای شاخساره و ریشه دانهال‌های پسته

Table 2. ANOVA of shoots and roots elements of pistachio seedlings


Shoot S.O.V.	df	Mean Square									
		Na	Cl	P	K	Ca	Mg	Zn	Cu	Fe	
Cultivar	2	84.89**	13.55**	0.26*	74.95**	1.08**	1.83**	0.131**	0.0001**	0.002**	
Mycorrhizal	1	110.74**	14.04**	1.94**	9.56**	0.64**	1.10**	0.014**	0.0001**	0.001**	
Cultivar*Mycorrhizal	2	6.73**	3.07**	0.10 ^{ns}	2.95 ^{ns}	0.57*	0.45 ^{ns}	0.020**	0.0001**	0.003**	
Salinity	3	8477.09**	259.56**	7.04**	104.67**	1.13**	4.92**	0.333**	0.0001**	0.036**	
Cultivar*Salinity	6	65.97**	6.94 ^{ns}	0.28 ^{ns}	69.08**	1.03 ^{ns}	1.51**	0.047**	0.0001**	0.005**	
Mycorrhizal*Salinity	3	91.28 ^{ns}	4.53 ^{ns}	0.52*	1.50 ^{ns}	0.16 ^{ns}	0.54 ^{ns}	0.32**	0.0001**	0.001 ^{ns}	
Cultivar*Mycorrhizal*Salinity	6	11.94 ^{ns}	2.96 ^{ns}	0.31 ^{ns}	1.37 ^{ns}	0.82 ^{ns}	0.72 ^{ns}	0.24**	0.0001**	0.007**	
Error	48	113.32	44.25	1.80	29.83	4.57	4.06	0.33	0.0001	0.011	
C.V. (%)		9.32	9.77	15.48	8.61	10.55	18.68	14.58	15.50	15.97	

ادامه جدول ۲. تجزیه واریانس عنصرهای شاخساره و ریشه دانهال‌های پسته

Continued table 2. ANOVA of shoots and roots elements of pistachio seedlings

Root Sources of changes	df	Mean Square							
		Na	Cl	P	K	Ca	Mg	Zn	Cu
Cultivar	2	491.49**	2.350 ^{ns}	1.48**	2.38 ^{ns}	0.45 ^{ns}	0.24 ^{ns}	0.001**	0.0001 ^{ns}
Mycorrhizal	1	214.19**	13.014**	0.41**	2.47*	2.32**	0.70**	0.001**	0.0001*
Cultivar*Mycorrhizal	2	238.92**	4.024 ^{ns}	0.03 ^{ns}	0.90 ^{ns}	1.32**	0.10 ^{ns}	0.0001 ^{ns}	0.0001*
Salinity	3	1067.54**	126.36**	6.68**	29.70**	4.21**	3.71**	0.003**	0.001**
Cultivar*Salinity	6	499.80**	2.645 ^{ns}	0.66*	1.36 ^{ns}	0.68 ^{ns}	0.4 ^{ns}	0.0001**	0.0001**
Mycorrhizal*Salinity	3	182.79**	7.904*	0.43*	0.26 ^{ns}	0.29 ^{ns}	0.14 ^{ns}	0.0001 ^{ns}	0.0001*
Cultivar*Mycorrhizal*Salinity	6	198.08**	4.973 ^{ns}	0.10 ^{ns}	0.21 ^{ns}	0.74 ^{ns}	0.95**	0.00001 ^{ns}	0.0001**
Error	48	26.32	47.19	2.31	22.84	4.08	2.57	0.0001	0.0001
C.V. (%)		7.89	14.70	16.62	10.22	13.34	14.58	17.11	15.50

ns, *, **: Non-significant differences and significantly differences on 5% and 1% probability level, respectively.




شکل ۲. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه‌باغی، A: ابارقی) بر غلظت سدیم ریشه و شاخساره

Figure 2. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakhs, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on Na concentration of roots and shoots.

شاخساره پایه ابارقی و سرخس بیشتر از بنه‌باغی بود (شکل ۳-b). همزیستی قارچ‌ریشه تا سطح EC_{10} تأثیری بر کاهش کلر ریشه نداشت در حالی که در سطح EC_{15} شوری گیاهان قارچ‌ریشه‌ای کلر کمتری را نسبت به گیاهان بدون قارچ‌ریشه داشتند (شکل ۳-c).

میزان کلر شاخساره با افزایش تنش شوری افزایش یافت به طوری که بیشترین میزان کلر شاخساره در EC_{15} و کمترین میزان آن در شاهد مشاهده شد (شکل ۳-a). تجمع کلر در شاخساره پایه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بود به طوری که تجمع کلر در



شکل ۳. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه‌باغی، A: ابارقی) بر غلظت کلر ریشه و شاخساره

Figure 3. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakhs, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on Cl concentration of roots and shoots.


بدون قارچ‌ریشه در EC_{10} و EC_{15} مشاهده نشد (شکل ۴-c).

نتایج آزمایش نشان داد، غلظت پتاسیم شاخساره در پایه سرخس با افزایش شوری کاهش یافت اما در پایه‌ها بنه‌باغی و ابارقی تنها در سطح EC_{15} با شاهد تفاوت معنی‌دار داشت (شکل ۴-a). غلظت پتاسیم ریشه نیز در سطوح شوری EC_{10} و EC_{15} نسبت به شاهد کاهش معنی‌دار داشت (شکل ۴-b). پتاسیم شاخساره در دانه‌های قارچ‌ریشه‌ای با میانگین ۹/۵ میلی‌گرم در گرم بیشتر از دانه‌های بدون قارچ‌ریشه با میانگین ۸/۷ میلی‌گرم در گرم بود و اختلاف ۷/۶ درصدی آن‌ها از نظر آماری در سطح ۱ درصد معنی‌دار شد (جدول ۳). همچنین میزان پتاسیم ریشه


صرف‌نظر از تأثیر قارچ‌ریشه و پایه، شوری باعث کاهش غلظت فسفر در شاخساره و ریشه شد و این کاهش در همه سطوح شوری با شاهد معنی‌دار بود (شکل ۴-a, b). غلظت فسفر ریشه و شاخساره در گیاهان قارچ‌ریشه‌ای و بدون قارچ‌ریشه در رویارویی با شوری کاهش یافت اما کاهش میزان فسفر شاخساره در گیاهان قارچ‌ریشه‌ای تا سطح EC_{10} شوری آب آبیاری نسبت به دانه‌های بدون قارچ‌ریشه کمتر بود اما با افزایش شوری (EC_{15}) بین دانه‌های قارچ‌ریشه‌ای و بدون قارچ‌ریشه تفاوتی مشاهده نشد (شکل ۴-b). میزان فسفر ریشه گیاهان قارچ‌ریشه‌ای در سطح EC_5 و شاهد بیشتر از دانه‌های بدون قارچ‌ریشه بود و تفاوتی بین دانه‌های قارچ‌ریشه‌ای و

به طور معنی داری کمتر بود (شکل ۶-ا). نسبت سدیم به پتاسیم در نتیجه اعمال تنش شوری در هر سه پایه استفاده شده افزایش یافت و میزان آن در پایه بنه باغی نسبت به دو پایه دیگر کمتر بود (شکل ۶-ب). نسبت سدیم به پتاسیم در ریشه هر سه پایه تحت تأثیر شوری افزایش یافت و بیشترین میزان آن در سطح EC₁₅ و EC₁₀ در دانهال های بدون قارچریشه پایه ابارقی مشاهده شد (شکل ۶-ج).


دانهال های قارچریشه به میزان ۵/۳ درصد بیشتر از دانهال های بدون قارچریشه بود (جدول ۳). نتایج نشان داد، تیمار شوری سبب افزایش نسبت سدیم به پتاسیم در شاخساره و ریشه شد (شکل ۶). تنش شوری باعث افزایش نسبت سدیم به پتاسیم نسبت به شاهد شد و این افزایش در سطح EC₁₀ و EC₁₅ به طور شایان توجهی بیشتر بود در حالی که این نسبت در گیاهان قارچریشه نسبت به گیاهان بدون قارچریشه



شکل ۴. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۵، ۱۰ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه باغی، A: ابارقی) بر غلظت فسفر ریشه و شاخساره
Figure 4. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakh, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on P concentration of roots and shoots.




شکل ۵. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۵، ۱۰ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه باغی، A: ابارقی) بر غلظت پتاسیم ریشه و شاخساره
Figure 5. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakh, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on K concentration of roots and shoots.



شکل ۶. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه‌باغی، A: ابارقی) بر نسبت سدیم به پتاسیم ریشه و شاخساره
Figure 6. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakhs, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on Na/K concentration of roots and shoots.

د-۷). قارچ‌ریشه باعث شد که غلظت کلسیم ریشه و شاخساره در دانهال‌های قارچ‌ریشه‌ای بیشتر از دانهال‌های بدون قارچ‌ریشه باشد (جدول ۳). در مقایسه پایه‌های استفاده‌شده نتایج نشان داد، میزان کلسیم شاخساره در پایه ابارقی و سرخس بیشتر از بنه‌باغی بود (شکل ۷-ب).


غلظت کلسیم ریشه و شاخساره در اثر تنش شوری آب آبیاری نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. بین سطوح شوری از نظر میزان کلسیم شاخساره تفاوتی مشاهده نشد (شکل ۷-ا) درحالی‌که غلظت کلسیم ریشه با افزایش شوری به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت (شکل



شکل ۷. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۰/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه‌باغی، A: ابارقی) بر غلظت کلسیم ریشه و شاخساره
Figure 7. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakhs, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on Ca concentration of roots and shoots.

مس و روی در ریشه شد (شکل ۹-a, c)، درصد تجمع مس در ریشه نسبت به شاخساره بیشتر بود درحالی که درصد روی ریشه خیلی پایین تر از شاخساره بود (شکل ۱۰-a). تلقیح با قارچریشه آریسکولار تأثیر شایان توجهی بر غلظت عنصرهای غذایی کم مصرف دانهالهای پسته داشت. غلظت روی در ریشه گیاهان قارچریشه‌ای به طور معنی داری بیشتر از گیاهان بدون قارچریشه بود (جدول ۳). غلظت روی در ریشه ابارقی و سرخس بیشتر از بنه باغی بود (شکل ۹-a).

صرف نظر از تأثیر قارچریشه و پایه، شوری باعث شد که میزان منیزیم در شاخساره و ریشه افزایش پیدا کند (شکل ۸-a, b). همچنین در مقایسه گیاهان قارچریشه و بدون قارچریشه، بیشترین میزان منیزیم شاخساره مربوط به گیاهان قارچریشه‌ای بود (جدول ۳). پایه‌ها از نظر غلظت منیزیم شاخساره در سطح شاهد و EC_{15} تفاوتی نداشتند اما در سطوح دیگر شوری تفاوت‌هایی مشاهده شد (شکل ۸-a). صرف نظر از اثر قارچریشه و پایه، شوری باعث کاهش روی در شاخساره (شکل ۹-b) و همچنین




شکل ۸. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۵/۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، میکوریز (M): با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه باغی، A: ابارقی) بر غلظت منیزیم ریشه و شاخساره

Figure 8. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (5/0, 5, 10 and 15 dS m), Mycorrhizal (M: with mycorrhiza and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakhs, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on Mg concentration of roots and shoots.

جدول ۳. اثر تیمار میکوریز (M): با میکوریز و NM: بدون میکوریز) بر غلظت Cl، K، Mg و Ca ($mg\ g^{-1}$) شاخساره و K و Zn ریشه ($mg\ g^{-1}$)

Table 3. The effect of mycorrhizal treatments (M: with mycorrhiza and NM: without mycorrhiza) on the concentration of Cl, K, Mg and Ca ($mg\ g^{-1}$) of shoots and K and Zn ($mg\ g^{-1}$) of root

Mycorrhizal	Shoot				Root	
	Cl	K	Mg	Ca	K	Zn
Without Mycorrhizal	10.27 ^a	4.78 ^b	1.52 ^b	2.58 ^b	6.65 ^b	0.013 ^b
With mycorrhizal	9.38 ^b	9.52 ^a	1.77 ^a	2.78 ^a	6.94 ^a	0.016 ^a




شکل ۹. تأثیر تیمار شوری آب آبیاری بر پایه قابلیت هدایت الکتریکی (۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر)، میکوریز (M: با میکوریز و NM: بدون میکوریز) و پایه (S: سرخس، B: بنه‌باغی، A: ابارقی) بر غلظت منیزیم ریشه و شاخساره و مس ریشه Figure 9. Effect of Irrigation water Salinity on the basis of the electrical conductivity (0.5, 5, 10 and 15 dS/m), Mycorrhizal (M: with mycorrhizal and NM: without inoculation) and rootstock (S: Sarakhs, B: Bane Baghi, A: Abareghi) on Mg concentration of roots and shoots and Cu of roots.

(شکل ۱۰-a, c). همچنین تنش شوری سبب کاهش غلظت فسفر ریشه در هر سه پایه شد و کمترین غلظت فسفر ریشه مربوط به ابارقی بود. محتوای فسفر شاخساره در پایه ابارقی (۵۳/۶ درصد) بیشتر از سرخس (۴۷ درصد) و بنه‌باغی (۴۵ درصد) بود (شکل ۱۰-c). به‌طورکلی توزیع فسفر در ریشه و شاخساره تحت تأثیر سطوح مختلف شوری یکسان بود (شکل ۱۰-b) و همزیستی قارچ‌ریشه‌ای باعث افزایش فسفر شاخساره نسبت به ریشه شد (شکل ۱۰-a) درحالی‌که پایه‌های سرخس و بنه‌باغی نسبت به ابارقی فسفر بیشتری در شبکه ریشه‌ای خود داشتند (شکل ۱۰-c). درصد بیشتری از پتاسیم جذب‌شده توسط

در بررسی نسبت توزیع عنصرها بین شاخساره و ریشه نتایج نشان داد، با افزایش شوری انتقال سدیم ریشه به شاخساره افزایش یافت (شکل ۱۰-b)، انتقال سدیم از ریشه به شاخساره در گیاهان بدون قارچ‌ریشه‌ای بیشتر از گیاهان قارچ‌ریشه‌ای بود (شکل ۱۰-a) و در مقایسه بین پایه‌ها بیشترین انتقال سدیم در پایه سرخس و کمترین آن در پایه ابارقی بود (شکل ۱۰-c). در بررسی نسبت توزیع کلر بین ریشه و شاخساره، نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری اختلافی در انتقال کلر از ریشه به شاخساره مشاهده نشد (شکل ۱۰-b) و در مقایسه بین تیمار قارچ‌ریشه و پایه‌ها نیز تفاوتی از نظر انتقال کلر مشاهده نشد

کلسیم در شاخساره بیشتر شد و پایه بانه‌باغی کلسیم بیشتری نسبت به دو پایه دیگر در ریشه داشت (شکل ۱۰-b, c). توزیع عنصر منیزیم در ریشه و شاخساره نشان داد، در سطح EC₁₅ تجمع منیزیم در شاخساره بیشتر شد (شکل ۱۰-b) درحالی‌که تفاوتی بین دانهال‌های قارچریشه و بدون قارچریشه مشاهده نشد (شکل ۱۰-a). همچنین درصد مس ریشه ابارقی ۸۵ درصد بود که این میزان بالاتر از سرخس و بانه‌باغی بود و از نظر روی و آهن تفاوت زیادی بین سه پایه استفاده‌شده مشاهده نشد (شکل ۱۰-c).

دانهال‌های پسته در شاخساره مشاهده شد و سطوح شوری بر درصد توزیع آن بین ریشه و شاخساره تأثیر زیادی نداشت هرچند که با افزایش شوری نسبت پتاسیم ریشه به شاخساره بیشتر شد (شکل ۱۰-b). پتاسیم شاخساره پایه سرخس بیشتر از ابارقی و بانه‌باغی بود اما تفاوتی بین ابارقی و بانه‌باغی از نظر محتوای پتاسیم شاخساره و همچنین تفاوتی بین دانهال‌های قارچریشه و بدون قارچریشه از نظر میزان انتقال پتاسیم مشاهده نشد (شکل ۱۰-a, c). بررسی چگونگی توزیع کلسیم بین ریشه و شاخساره نشان داد، با افزایش شوری، تجمع



شکل ۱۰. توزیع عناصر در ریشه و شاخساره پایه‌های میکوریزی (M) و بدون میکوریز (NM) پسته سراس (S)، بانه باغی (B) و ابارقی (A) در شرایط تنش شوری آب آبیاری (۵/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی‌زیمنس بر متر).

Figure 10. Distribution of elements in the root and shoot of rootstocks Symbiosis with mycorrhizal (M) and non-mycorrhizal symbiosis (NM), Sarakhs (S), Bane Baghi (B) and Abareghi (A) Pistachio in irrigation water salinity (5.0, 5, 10 and 15 dS m).

بحث

(Broadley, 2002). شوری خاک به‌طور شایان توجهی باعث کاهش جذب مواد کانی به‌ویژه فسفر می‌شود، زیرا یون‌های فسفات با Ca^{2+} ، Mg^{2+} و Zn^{2+} در شرایط تنش شوری رسوب کرده و تثبیت می‌شوند و بنابراین برای گیاه غیرقابل دسترس می‌شوند (Evelin *et al.*, 2009). همچنین نتایج نشان داد، غلظت عنصرهای کم‌مصرف نیز تحت تأثیر شوری قرار می‌گیرد. Frans (2006) گزارش کرد، جذب یون‌های مس، روی و آهن تحت تأثیر تنش شوری کم می‌شود. محققان کاهش در جذب عنصرهای غذایی را ناشی از کاهش کارایی شبکه ریشه‌ای در جذب عنصرهای غذایی در شرایط تنش شوری و رقابت بین یون‌های سدیم و کلر با عنصرهایی همچون کلسیم و پتاسیم می‌دانند (Asghari, 2008).

نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش سطوح شوری باعث کاهش درصد همزیستی قارچ‌ریشه در دانه‌های پسته شد (شکل ۱). کاهش همزیستی قارچ‌ریشه در نتیجه وجود نمک کلرید سدیم بیشتر ناشی از اثر بازدارندگی آن بر رشد ریشه است و بنابر یافته‌های Millen *et al.* (1998)، کاهش رشد ریشه نیز ناشی از سمیت یونی یا تنش اسمزی به‌دست‌آمده از غلظت بالای این یون‌ها در محلول خاک است. همزیستی گیاهان با قارچ‌ریشه آربسکولار از اثرگذاری زیان‌آور تنش شوری در گیاهان جلوگیری می‌کند. در این آزمایش دانه‌های قارچ‌ریشه‌ای میزان سدیم کمتر و پتاسیم بیشتری نسبت به دانه‌های بدون قارچ‌ریشه داشتند. بالا بودن نسبت سدیم به پتاسیم به علت شوری باعث به هم زدن تعادل یونی در سیتوپلاسم و در نتیجه اختلال در مسیرهای مختلف سوخت‌وسازی (متابولیکی) می‌شود (Giri *et al.*, 2007). همزیستی گیاهان با قارچ‌ریشه باعث می‌شود که تأثیر شوری بر عنصرهای پتاسیم و سدیم معکوس شود. همزیستی قارچ‌ریشه می‌تواند جذب پتاسیم را در شرایط شور افزایش دهد، این در حالی است که از انتقال سدیم به شاخساره جلوگیری می‌کند (Alguacil *et al.*, 2003; Giri *et al.*, 2007; Sharifi *et al.*, 2008; Zuccarini & Okurowska, 2007). قارچ‌ریشه آربسکولار می‌تواند جذب یون‌های کلر را کاهش دهد

جذب آب و عنصرهای کانی مختلف در گیاه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و عامل‌هایی که جذب آب را محدود می‌کند ممکن است سبب بروز تنش در جذب عنصرهای غذایی نیز شوند. جذب یون‌های کانی توسط گیاه به‌صورت محلول بوده و میزان آن به جریان آب از راه زنجیره خاک-ریشه-شاخساره بستگی دارد (Keller, 2005). تعرق برگی شیب لازم را برای جذب آب و عنصرهای محلول فراهم می‌آورد (Keller, 2005). به‌طور کلی گیاهان در مناطق شور با سه مشکل اساسی روبه‌رو هستند: اول تنظیم اسمزی به‌منظور جذب آب از خاکی که پتانسیل آب منفی دارد. دوم، غلظت بالای یون‌های نمکی در خاک و در نتیجه افزایش تجمع یون‌های سمی در گیاه. سوم، تغییر در تعادل عنصرهای گیاهی ناشی از رقابت در جذب که باعث کاهش جذب برخی از عنصرها در گیاه شده و فرایندهای طبیعی رشد را مختل می‌کند (Kafi & Mahdavidamghani, 2001). نتایج این آزمایش نشان داد که میزان سدیم و کلر ریشه و شاخساره در نتیجه تنش شوری افزایش یافت درحالی‌که میزان فسفر و پتاسیم کاهش پیدا کرد. تیمار شوری باعث افزایش میزان کلر و سدیم گیاه شده درحالی‌که گیاهان قارچ‌ریشه‌ای میزان کمتری از این عنصرها را در خود داشتند که این یافته در بررسی برخی پژوهشگران پیشین نیز به اثبات رسیده است (Ghazi & Al-Karaki, 2000; Al-Karaki & Hammad, 2009; Sheng *et al.*, 2001). بررسی‌ها نشان داده، هنگامی که غلظت نمک کلرید سدیم در خاک بالا باشد گیاهان بیشتر به جذب سدیم گرایش دارند که در نتیجه باعث کاهش جذب پتاسیم می‌شود. یون‌های سدیم و پتاسیم برای اتصال به محل‌های جذب با همدیگر رقابت می‌کنند (Blaha *et al.*, 2000). Sepaskhah & Maftoon (1981) گزارش کردند، در شرایط تنش شوری غلظت سدیم در برگ پسته کمتر از کلر بوده درحالی‌که سدیم بیشتر در ریشه‌ها انباشته می‌شود. یاخته‌های ریشه Cl^- را از محلول خاک از راه سیمپورت‌های H^+/Cl^- و همچنین از راه مسیرهای آنیونی در شرایط شوری جذب می‌کنند (White &

پسته، رقم قزوینی سازگاری بهتری نسبت به بادامی ریز زرد در شرایط تنش شوری از خود نشان داده است (Karimi et al., 2009). نتایج این آزمایش نیز نشان داد بین پایه‌های ابارقی، سرخس و بنه‌باغی از نظر جذب عنصرهای در شرایط تنش شوری تفاوت وجود دارد و پایه سرخس از نظر جذب فسفر و پتاسیم بهتر از بنه‌باغی بود و پایه بنه‌باغی در مقایسه با دو پایه دیگر غلظت کمتری از سدیم و کلر در شاخساره داشت. با توجه به یکسان بودن شرایط رشد گیاهان در گلخانه، ممکن است تفاوت بین پایه‌ها در سازگاری به تنش شوری ناشی از کنترل ژنتیکی باشد. Karimi et al. (2011) نیز اظهار داشتند که تفاوت بین پایه‌های پسته ممکن است به دلیل دگرگرده‌افشانی و سازوکار دو پایه بودن آن‌ها باشد.

به‌طور کلی نتایج این بررسی نشان داد، تلقیح با قارچریشه آربسکولار بر جذب عنصرهای غذایی توسط پایه‌های مورد استفاده در شرایط تنش شوری مؤثر بود به‌طوری‌که جذب عنصرهای کم‌تحرک در خاک همچون فسفر و روی را افزایش داد اما این تأثیر همزیستی قارچریشه‌ای تا سطح EC_{10} مشاهده شد و در سطح EC_{15} چنین تأثیری مشاهده نشد. همچنین همزیستی قارچریشه‌ای با افزایش جذب پتاسیم باعث کاهش نسبت سدیم به پتاسیم در ریشه و شاخساره پایه‌های پسته شد. باین‌حال تأثیر قارچریشه آربسکولار بر افزایش مقاومت به شوری در دانه‌های پسته تنها یک فرایند تغذیه‌ای نیست و برخی سازوکارهای دیگر نیز در آن تأثیر دارد (داده‌ها آورده نشده است). پایه بنه‌باغی نسبت به دو پایه دیگر محتوای سدیم و کلر کمتری در ریشه و شاخساره داشت که می‌تواند دلیلی برای مقاومت این پایه در مقایسه با دو پایه دیگر در برابر شوری آب آبیاری باشد.

(Zuccarini & Okurowska, 2008) به این صورت که یون‌های کلر را می‌توانند در یاخته دارای آربسکول تجمع دهند در نتیجه بازدارنده دخالت در مسیرهای سوخت‌وسازی گیاهان می‌شوند (Cantrell & Lindermann, 2001). همچنین نتایج نشان داد، میزان فسفر در گیاهان قارچریشه آکاسیا تا حدی از شوری، بیشتر از دانه‌های بدون قارچریشه بود و پس‌از آن با افزایش شوری تفاوتی بین دانه‌های قارچریشه و بدون قارچریشه وجود نداشت. تحقیقات نشان داده که با توجه به اثر سمی سدیم بر رشد و نمو قارچ، جذب فسفر به‌وسیله گیاهان قارچریشه‌ای آکاسیا در غلظت بالای نمک ($9/5 \text{ dSm}^{-1}$) کاهش پیدا کرد (Giri et al., 2007) که نشان می‌دهد، تأثیر قارچریشه تنها تا سطح خاصی از شوری است. تلقیح با قارچریشه می‌تواند به‌وسیله افزایش جذب فسفر غلظت فسفر را در گیاه افزایش دهد. قارچریشه فرآیند جذب را با گسترش ریشه‌ها آسان می‌کند و در مقایسه با گیاهان بدون قارچریشه باعث می‌شود حجم بیشتری از خاک در دسترس گیاه قرار گیرد (Ruiz-Lozano & Azcón, 2000). بهبود جذب فسفر توسط قارچریشه آربسکولار در گیاهان رشد کرده در شرایط شور می‌تواند اثر منفی Na^+ و Cl^- را به‌وسیله حفظ تمامیت غشا و اکوتل و تسهیل در نفوذپذیری انتخابی غشا کاهش دهد (Rinaldelli & Mancuso, 1996). نتایج نشان داد که تنش شوری سبب افزایش منیزیم در ریشه و شاخساره شد همچنین میزان منیزیم در گیاهان قارچریشه بیشتر از گیاهان بدون قارچریشه بود.

Walker et al (1983) گزارش کردند، با افزایش شوری غلظت منیزیم برگ مرکبات افزایش می‌یابد که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. بر پایه نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌های پیشین روی رقم‌های دیگر

REFERENCES

1. Al-Karaki, G. N. (2006). Nursery inoculation of tomato with arbuscular mycorrhizal fungi and subsequent performance under irrigation with saline water. *Scientia Horticulturae*, 109, 1-7.
2. Al-Karaki, G. N. (2000). Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. *Mycorrhiza*, 10, 51-54.
3. Cantrell, I. C. & Linderman, R. G. (2001). Preinoculation of lettuce and onion with VA mycorrhizal fungi reduces deleterious effects of soil salinity. *Plant and Soil*, 233, 269-281.

4. Al-Karaki, G. N. & Hammad, R. (2001). Mycorrhiza influence on fruit yield and mineral content of tomato grown under salt stress. *Journal of Plant Nutrition*, 24, 1311-1323.
5. Alguacil, M. M., Hernandez, J. A., Caravaca, F., Portillo, B. & Roldan, A. (2003). Antioxidant enzyme activities in shoots from three mycorrhizal shrub species afforested in a degraded semi-arid soil. *Physiologia Plantarum*, 118, 562-570.
6. Azcon-Aguilar, C., Azcon, R. & Barea, J. M. (1979). Endomycorrhizal fungi and Rhizobium as biological fertilizers for *Medicago sativa* in normal cultivation. *Nature*, 279, 325-327.
7. Asghari, H. R. (2008). Vesicular-arbuscular mycorrhiza improves salinity tolerance in pre-inoculation subterranean clover seedling. *International Journal of Plant Production*, 2(3), 243-256.
8. Bagheri, V., Shamshiri, M., Shirani, H. & Roosta, H. (2012). Nutrient uptake and distribution in mycorrhizal pistachio seedlings under drought stress. *Journal of Agriculture Science Biotechnology*, 14, 1591-1604.
9. Brin, M., Aliasgharzade, N. & Nphammadi, A. (2005). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on yield and nutrient uptake of tomato under NaCl salinity and mixed salts. *Journal of Soil and Water Sciences*, 20(1), 104-95. (in Farsi)
10. Blaha, G., Stelzl, U., Spahn, C. M. T., Agrawal, R. K., Frank, J. & Nierhaus, K. H. (2000). Preparation of functional ribosomal complexes and effect of buffer conditions on tRNA positions observed by cryoelectron microscopy. *Methods in Enzymology*, 317, 292-309.
11. Cantrell, I. C. & Linderman, R. G. (2001). Preinoculation of lettuce and onion with VA mycorrhizal fungi reduces deleterious effects of soil salinity. *Plant and Soil*, 233, 269-281.
12. Chapman, H. D. & Prah, D. F. (1961). *Methods of analysis for soil, plant and water*. University of California Agriculture Science, pp, 60-62.
13. Chapman, H. D. & Pratt, P. F. (1982). *Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters*. Division of Agriculture, University of California, Berkeley, CA, 4034 p.
14. Evelin, H., Kapoor, R. & Giri, B. (2009). Arbuscular mycorrhizal fungi in alleviation of salt stress. a review. *Anatomy and Botany*, 42, 154-159.
15. Falahian, F., Abaspour, H., Fahimi, H. & Khavarinezhad, R. (2004). Examine the effect of endomycorrhiza fungi on plant growth and mineral nutrition of pistachio salt conditions. *Research and development in agriculture and horticulture*, 82-86. (in Farsi)
16. Ghazi, N., AL-Karaki, R. H. & Rusan, M. (2001). Response of two tomato cultivars differing in salt tolerance to inoculation with Mycorrhiza fungi under salt stress. *Mycorrhiza*, 11, 43-47.
17. Ghazi, N. & AL-Karaki. (2000). Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. *Mycorrhiza*, 10, 51-54.
18. Giovannetti, M. & Mosse, B. (1980). An evaluation of techniques for measuring vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. *New Phytology*, 84, 489-500.
19. Giri, B., Kapoor, R. & Mukerji, K. G. (2007). Improved tolerance of *Acacia nilotica* to salt stress by arbuscular mycorrhiza, *Glomus fasciculatum*, may be partly related to elevated K⁺/Na⁺ ratios in root and shoot tissues. *Microbial Ecology*, 54, 753-760.
20. Giri, B., Kapoor, R. & Mukerji, K. G. (2003). Influence of arbuscular mycorrhizal fungi and salinity on growth, biomass and mineral nutrition of *Acacia auriculiformis*. *Biology and Fertility of Soils*, 38, 170-175.
21. Kafi, M. & Mahdavidamghani, A. (2001). *Resistance mechanisms of plants to environmental stresses* (translation). Ferdowsi University of Mashhad. 107-137. (in Farsi)
22. Karimi, S., Rahemi, M., Maftoun, M., Eshghi, M. & Tavallali, V. (2009). Effect of long-term salinity on growth and performance of two pistachio (*Pistacia vera* L.) rootstocks. *Australian journal of Crop Science*, 3, 1630-1639.
23. Karimi, H. R., Ebadi, A., Zamani, Z. & Fatahi, R. (2011). Effect of water salinity on growth indices and physiological parameters in some pistachio rootstocks. *Journal of Plant Nutrition*, 34, 935-944.
24. Keller, M. (2005). Deficit Irrigation and Vine Mineral Nutrition. *Am. J. Enol. Vitic*, 56(3), 267-283.
25. Mathur, N., Singh, J., Bohra, S. & Vyas, A. (2007). Arbuscular mycorrhizal status of medicinal halophytes in saline areas of Indian Thar Desert. *International Journal of Soil Science*, 2, 119-127.
26. Mouk, B. O. and Ishii, T. (2006). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on tree growth and nutrient uptake of *Sclerocarya birrea* under water stress, salt stress and flooding. *Journal of the Japanese Society for Horticultural Science*, 75, 26-31.
27. Murkute, A. A., Sharma, S. & Singh, S. K. (2006). Studies on salt stress tolerance of Citrus rootstock genotypes with arbuscular mycorrhizal fungi. *Horticulture Science*, 33, 70-76.
28. Olsen, S. R., Cole, C. V., Watanable, F. S. & Dean, L. A. (1954). *Estimation of available phosphorous in soil by extraction with sodium bicarbonate*. USDA Circ. 939, U. S. Govern. Prin. Office, Washington, D. C., U. S. A.

29. Radmehr, A. (2010). *The results of a sample survey design horticultural products in 1387*. Ministry of Agriculture, Tehran. (in Farsi)
30. Rinaldelli, E. & Mancuso, S. (1996). Response of young mycorrhizal and non mycorrhizal plants of olive tree (*Olea europaea* L.) to saline conditions. Short term electro physiological and long term vegetative salt effects. *Advances in Horticultural Science*, 10, 126-134.
31. Rabie, G. H. & Almmadani, A. M. (2005). Role of bioinoculants in development of salt tolerance of *Vicia faba* plants under salinity stress. *Africa Journal of Biotechnology*, 4(3), 210- 222.
32. Sepaskhah, A. R. & Maftoun, M. (1981). Growth and chemical composition of pistachio cultivars as influenced by irrigation regimes and salinity levels of irrigation water. *Journal of Horticultural Science*, 56, 277-284.
33. Schenck, N. C. & Perez, K. (1990). *Manual for the identification of VA mycorrhizal fungi*. Synerdistic, Publishing, Gainesville, Florida, USA.
34. Sharifi, M., Ghorbanli, M. & Ebrahimzadeh, H. (2007). Improved growth of salinity-stressed soybean after inoculation with pre-treated mycorrhizal fungi. *Journal of Plant Physiology*, 164, 1144-1151.
35. Tester, M. & Davenport, R. (2003). Na⁺ tolerance and Na⁺ transport in higher plants. *Annals of Botany*, 91, 503-527.
36. Walker, R. R., Torokflavy, E., Grive, A. M. & Prior, L. D. (1983). Water relations and ion concentration of leaves on salt stressed citrus plants. *Australian Journal of Plant Physiology*, 10, 265-277.
37. Wu, Q. S & Zou, Y. N. (2009). Arbuscular mycorrhizal symbiosis improves growth and root nutrient status of citrus subjected to salt stress. *Science Asia*, 35, 388-391.
38. Zuccarini, P. & Okurowska, P. (2008). Effects of mycorrhizal colonization and fertilization on growth and photosynthesis of sweet basil under salt stress. *Journal of Plant Nutrition*, 31, 497-513.

Archive of SID