

مقاله کوتاه علمی

مطالعه تغییر محتوی پرولین، خسارت غشاء سلولی و تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم (*Triticum turgidum* var. *durum*) در شرایط کنترل شده

Evaluation of Proline Content, Cell Membrane Damage, and Drought Tolerance in Durum Wheat (*Triticum turgidum* var. *durum*) Genotypes under Controlled Conditions

مصطفی آقائی سربروزه^۱، رحمن رجبی^۲، رضا حق‌پرست^۳ و رضا محمدی^۴

- ۱- دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.
- ۲- پژوهشگر، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه.
- ۳- استادیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه.
- ۴- مربی پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۹/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۱۲/۱۵

آقائی سربروزه، م.، رجبی، ر.، حق‌پرست، ر.، و محمدی، ر. ۱۳۸۷. مطالعه تغییر محتوی پرولین، خسارت غشاء سلولی و تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم (*Triticum turgidum* var. *durum*) در شرایط کنترل شده. نهال و بذر ۲-۲۵ (۳): ۳۴۷-۳۵۴.

سازوکارهای موثر در سازگاری به تنش خشکی کمک کند.

اصلاح گندم برای تحمل به خشکی فرآیندی زمان‌بر و مشکل‌است، معمولاً ژنوتیپ‌های گندم را بر اساس آزمایش‌های مقایسه‌ای در محیط‌های مختلف

واکنش گیاهان به تنش خشکی به صورت‌های مختلفی از جمله پاسخ‌های فیزیولوژیک کوتاه مدت نمود پیدا می‌کند (Pessarkli, 1999). مطالعه واکنش‌های فوق در گیاهان زراعی از جمله گندم در شرایط بدون تنش و تنش می‌تواند به شناسایی

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول: barati_vahid_sh@gmail.com

خشکی تجمع می‌یابد. با این وجود تجمع به طور گسترده‌تر و سریع‌تر در برگ‌ها ظاهر می‌شود. پایداری غشا سلولی تحت تنش رطوبتی نیز به عنوان یک شاخص تحمل به خشکی مهم بیان شده است. میزان خسارت به غشاهای سلولی را می‌توان از طریق اندازه‌گیری الکترو لیکج (Electro leakage) سلول‌ها (نشست سلولی) ارزیابی نمود (Fokar et al., 1998).

در این بررسی ۲۲ ژنوتیپ و رقم گندم دوروم تحت شرایط گلخانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود، کرمانشاه در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد مطالعه شامل ۵ رقم بومی غرب کشور (ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۳، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۴)، ۳ رقم سیمره، Marvoid و Garagilchik (ژنوتیپ‌های شماره ۱۱، ۱۲ و ۱۳)، دوازده لاین به‌نژادی و یک رقم محلی (زردک بعنوان شاهد) بودند.

ژنوتیپ‌های گندم دوروم در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. عامل اول شامل دو رژیم رطوبتی (بدون تنش رطوبتی و تنش رطوبتی در زمان گلدهی) و عامل دوم ژنوتیپ‌های گندم دوروم بودند. دمای شب و روز گلخانه به ترتیب ۱۸ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شد و نور تکمیلی به وسیله لامپ‌های فلورسنت و معمولی تا ۱۶ ساعت روشنایی در هر شبانه‌روز تأمین شد. کلیه گلدان‌ها روزانه تا

ارزیابی می‌نمایند. شاخص‌های ارزیابی تحمل به تنش متعددی پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Fernandez, 1992; Naderi et al., 1999). نقاط ضعف و قوت هر یک از این شاخص‌ها توسط محققین زیادی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند (Naderi et al., 1999; Gill, 1999). روش‌های غربال ژنوتیپ‌ها که اساس فیزیولوژیک داشته باشند را می‌توان برای گزینش مواد والدین یا غربال سریع جمعیت‌های در حال تفرق استفاده نمود (Winter et al., 1988) بدین منظور لازم است جنبه‌های فیزیولوژیک تحمل به خشکی که با پایداری عملکرد در شرایط تنش مرتبط هستند مطالعه نمود و صفات مناسب را برای گزینش استفاده نمود (Mohammadi et al., 2006).

مهم‌ترین شاخص مقاومت به خشکی مورد استفاده در برنامه‌های به‌نژادی گندم ارزیابی عملکرد دانه در شرایط آبیاری و تنش است، اما در صورت شناسایی مبانی فیزیولوژیک سازگاری به خشکی، به‌نژادگران می‌توانند از این شاخص‌ها نیز به عنوان گزینش در جمعیت‌ها استفاده کنند. خصوصیات بیوشیمیایی مانند محتوای اسید آمینه پرولین می‌تواند در تعیین ارقام مقاوم به خشکی مورد استفاده قرار گیرد (Martine et al., 1993; Teulate et al., 1997). افزایش غلظت این اسید آمینه که به تنظیم اسمزی کمک می‌کند. پرولین در تمام اندام‌های گیاه سالم در طی تنش

به ویژه وزن دانه در سنبله، وزن ریست توده، و وزن ۱۰۰ دانه ملاحظه می شود که تنش باعث کاهش قابل ملاحظه ای در کمیت صفات نسبت به شرایط بدون تنش شده است (جدول ۲).

تفاوت ژنوتیپ ها برای شاخص تحمل تنش (STI) قابل ملاحظه بود (جدول ۲). بر اساس این شاخص لاین های ۱۲، ۱۳ و ۲۱ که دارای STI بیشتر از بقیه بودند به عنوان لاین های متحمل و لاین های ۲، ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۶ با STI کمتر به عنوان لاین های حساس به خشکی و سایر لاین ها با درجه ای از تحمل به خشکی ارزیابی شدند. در صورتی که به سایر صفات و بویژه میزان پرولین و خسارت به غشاء سلولی توجه شود ملاحظه می گردد که بر این اساس نیز می توان تا حد زیادی به تحمل و حساسیت ژنوتیپ ها پی برد (جدول ۲). اختلال در انتقال کربوهیدرات ها به دانه ممکن است مهمترین دلیل کاهش وزن دانه در شرایط تنش باشد. بدلیل اینکه وزن دانه تا حدودی از طول دوره پر شدن دانه متاثر می شود. مقایسه وزن صد دانه در این ژنوتیپ ها در دو شرایط تنش و بدون تنش این موضوع را نمایان می سازد (جدول ۲).

بررسی نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از لحاظ میزان پرولین برگ در شرایط تنش و بدون تنش اختلاف زیادی داشتند. به طوری که میزان پرولین برگ در شرایط تنش بمراتب بیشتر از شرایط بدون تنش رطوبتی بود (جدول ۲).

تنظیم اسمزی نوعی ساز و کار اجتناب از تنش می باشد (Kao, 1981). تنولت و همکاران

رسیدن به ظرفیت زراعی آبیاری شدند. تنش خشکی در مرحله گلدهی اعمال گردید. صفات مورد نظر بر روی برگ پرچم بوته های موجود در گلدان های شاهد (بلا فاصله پس از آبیاری) و تنش (۱۰ روز پس از توقف آبیاری) اندازه گیری شدند.

شاخص تحمل به تنش (STI) (Fernandez, 1992)، درصد خسارت به غشاء سلولی و میزان پرولین با استفاده از نمونه های برگ در آزمایشگاه تعیین گردید (Bates et al., 1973). درصد خسارت به غشاء سلولی در مرحله گرده افشانی با تهیه دیسک هایی از برگ در هر گلدان اندازه گیری شد (Blum and Ebercon, 1981). تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS، MSTAT-C و EXCEL و بر اساس موازین طرح آماری مورد استفاده انجام شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ انجام گردید.

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین برای صفات مورد نظر به ترتیب در جداول ۱ و ۲ درج شده اند. اثر اصلی عامل ها (ژنوتیپ ها و تنش) بر روی تمام صفات بسیار معنی دار بودند که بیانگر تفاوت سطوح مختلف این دو عامل از لحاظ این سه صفت می باشد. معنی دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ × تنش بیانگر تفاوت واکنش ژنوتیپ های مختلف به سطوح متفاوت تنش می باشد (جدول ۱). با توجه به میانگین صفات

جدول ۱- تجزیه واریانس اثر تنش خشکی بر وزن دانه در سنبله (گرم)، وزن زیست توده در بوته (گرم)، وزن ۱۰۰ دانه و غلظت پرولین در گندم دوروم در شرایط گلخانه.

Table 1. Analysis of variance for grain weight/spike, plant biomass, 100 seed weight, and proline content in durum wheat as affected by drought stress under greenhouse conditions

S.O.V.	منابع تغییرات	df.	Mean Square میانگین مربعات			غلظت پرولین Proline content
			وزن دانه در سنبله Grain weight /spike	وزن زیست توده در بوته Biomass/plant	وزن ۱۰۰ دانه 100 grain weight	
Replication	تکرار	2	0.005 ^{ns}	13.071**	0.345 ^{ns}	0.319*
Genotype (G)	ژنوتیپ	21	0.735**	23.31**	65.382**	1.596**
Stress (S)	تنش	1	9.249**	334.759**	1.911**	136.284**
G × S		21	0.523**	5.205**	2.162**	2.34**
Error	اشتباه	86	0.36	2.516	0.423	0.099

* و **: به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: غیر معنی‌دار

* and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.
ns: Non-significant

سایر ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش خشکی وضعیت بهتری داشتند (جدول ۲).

بررسی پایداری غشاء سلولی در شرایط آزمایشگاهی به عنوان شیوه دیگری جهت ارزیابی میزان مقاومت ارقام به تنش خشکی معمولاً کاربرد دارد (Levitt, 1980; Gavutzi et al., 1997). نتایج این بررسی نشان داد بین ارقام و لاین‌ها از نظر درصد خسارت به غشاء سلول اختلاف زیادی وجود دارد (جدول ۲).

روابط بین صفات مورد مطالعه نیز بررسی شد و نتایج حاصله در جدول ۳ ارائه شده است. همانطوریکه ملاحظه می‌شود، رابطه منفی و معنی‌داری بین درصد خسارت به غشاء سلولی در شرایط تنش با وزن دانه در سنبله وجود

در آزمایشی که (Teulate et al., 1997) جهت مقایسه تنظیم اسمزی در ژنوتیپ‌های مختلف جو، گندم دوروم و اِمر وحشی (Wild emmer) مقاوم به خشکی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ارقامی که از ظرفیت تنظیم اسمزی بالایی برخوردار هستند پایداری عملکرد بهتری را در شرایط تنش‌های محیطی دارند. تنش خشکی باعث تجزیه و کاهش غلظت پروتئین‌ها در برگ‌های بالغ شده و در نتیجه اسیدهای آمینه آزاد از جمله پرولین افزایش می‌یابد (Kao, 1981). در این بررسی هم ارزیابی نتایج و مقایسه میزان پرولین ژنوتیپ‌ها با مطالعه بررسی شاخص تحمل تنش (STI) و میزان وزن دانه در سنبله مطابقت دارد به نحوی که ژنوتیپ‌های برتر (۱۲، ۱۳ و ۲۱) نسبت به

جدول ۲. میانگین وزن دانه در سنبله، وزن زیست توده در بوته، وزن ۱۰۰ دانه و مقدار پرولین در شرایط تنش و بدون تنش، درصد خسارت به غشاء سلولی و شاخص تحمل تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم دوروم مورد مطالعه در شرایط گلخانه

Table 2. Mean of grain weight/spike, plant biomass, 100 grain weight, proline content, cell membrane damage, and drought stress tolerance index in durum wheat genotypes under greenhouse conditions

ژنوتیپ Genotype	وزن دانه در سنبله (گرم) Grain weight /spike (g)		STI	وزن خشک بوته (گرم) Dry weight/plant (g)		وزن ۱۰۰ دانه (گرم) 100 grain weight(g)		خسارت به غشاء سلولی Cell Mem. Damage (%)	مقدار پرولین در برگ (میکروگرم برگرم) Proline content (µg/g)	
	بدون تنش Non-stress	تنش Stress		بدون تنش Non-stress	تنش Stress	بدون تنش Non-stress	تنش Stress	بدون تنش Non stress	تنش Stress	
	116-1-16	0.37bc	0.28a	0.20	8.54ce	7.65b	3.00	2.70	26.33	1.90a
G1	0.39bc	0.13a	0.10	5.97e	6.01be	2.90	1.63	31.33	0.49f	2.60hj
2019/01/23	0.60	0.13a	0.15	8.66be	4.40bf	3.47	0.00	58.00	1.09bf	1.85j
G2	0.32bc	0.24a	0.14	8.02ce	7.48bc	3.60	3.13	32.00	1.73ab	3.75cf
G3	0.33bc	0.26a	0.17	8.60be	7.04bd	2.53	2.50	36.00	1.22af	3.53dg
G4	0.18c	0.14a	0.05	9.32bd	5.57be	3.87	1.03	42.67	1.39ae	2.29ij
G5	0.45bc	0.27a	0.23	8.30ce	6.13be	3.00	2.53	26.00	1.64ac	3.73cf
27-10-2-1	0.84bc	0.23a	0.37	9.13bd	2.54ef	2.80	2.27	40.33	1.06bf	2.70hi
11-11-1-3	1.45b	0.15a	0.42	10.70bc	3.46cf	4.47	0.27	45.33	1.18af	2.32ij
31-19-2-2	1.07bc	0.21a	0.43	10.29bc	3.21df	2.97	1.13	34.00	1.79ab	3.31dh
GARAGILCHIK	0.26bc	0.16a	0.08	0.66f	1.18f	0.57	0.40	58.00	1.79ab	1.94j
MARVOID	1.00bc	0.58a	1.12	8.15ce	6.13be	2.67	2.37	21.00	0.66ef	4.32ac
SAYMAREH	1.07bc	0.48a	0.98	7.02de	6.09be	2.13	1.90	22.33	1.50ad	4.65ab
G6	0.34bc	0.17a	0.11	8.15ce	5.65be	2.83	1.40	42.00	1.17af	2.88gi
G7	0.62bc	0.21a	0.25	10.30bc	6.42be	3.70	1.33	37.67	1.54ac	3.30dh
G8	0.62bc	0.16a	0.19	10.60bc	6.02be	4.17	1.17	39.67	1.03bf	3.11fh
G9	0.56bc	0.17a	0.19	11.63b	5.97be	3.93	1.43	40.33	1.74ab	3.17eh
G10	0.53	0.39a	0.40	8.48ce	6.45be	3.17	2.20	26.00	0.99bf	3.79cf
G11	0.61bc	0.26a	0.31	9.01be	5.90be	2.27	1.80	31.34	1.24af	3.94be
G12	0.54bc	0.34a	0.35	8.01ce	7.56b	3.53	2.63	32.00	0.59f	2.36ij
G13	3.12a	0.75a	4.50	15.29a	12.80a	3.23	1.87	22.67	0.85cf	4.68a
ZARDAK	0.59bc	0.22a	0.25	8.79be	6.37be	3.20	1.33	28.67	0.74df	4.05ad
Mean	0.72	0.27	0.50	8.80	5.91	3.09	1.68	35.17	1.24	3.27

میانگین‌هایی، در هر ستون که دارای حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌داری ندارند.

Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 5% probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

جدول ۳- همبستگی ساده بین صفات مختلف و شاخص تحمل به تنش خشکی

Table 3. Simple correlation coefficients between different traits and drought stress tolerance index (STI) in durum wheat

Trait	صفت	وزن دانه /سنبله (گرم)		شاخص تحمل تنش STI (3)	وزن خشک /بوته (گرم)		خسارت دیواره سلولی Cell membrane damage (6)	مقدار پرولین	
		Grain weight /spike (gr)			Dry weight/plant (g)			Proline	
		بدون تنش Non-stress (1)	تنش Stress (2)		بدون تنش Non-stress (4)	تنش Stress (5)		(بدون تنش) Non-stress (7)	(تنش) Stress (8)
(1) GW/S-NS		1							
(2) GW/S-S		0.705**	1						
(3) STI		0.929**	0.835**	1					
(4) DW / PLANT- NS		0.633**	0.336 ^{ns}	0.548**	1				
(5) DW / PLANT- S		0.471*	0.652**	0.660**	0.571**	1			
(6) CD (%)		-0.308 ^{ns}	-0.695**	-0.412 ^{ns}	-0.302 ^{ns}	-0.640**	1		
(7) PROLIN-NS		-0.238 ^{ns}	-0.273 ^{ns}	-0.255 ^{ns}	-0.123 ^{ns}	-0.262 ^{ns}	0.211 ^{ns}	1	
(8) PROLIN-S		0.411 ^{ns}	0.730**	0.513*	0.356 ^{ns}	0.614**	-0.861**	0.003 ^{ns}	1

* و **: به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: غیر معنی‌دار

* and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.

ns: Non-significant

در وزن دانه در سنبله و غلظت پرولین نشان دادند (جداول ۲ و ۳). بنابراین این با توجه به شرایط آزمایش و سهولت اندازه گیری میتوان از صفات متعددی جهت مقایسه ژنوتیپ‌ها و ارزیابی تحمل آنها به تنش خشکی استفاده کرد. از جمله این شاخص‌ها میتوان به میزان پرولین برگ در شرایط تنش خشکی و نیز درصد خسارت به غشاء سلولی اشاره نمود که بعنوان شاخص‌های گزینش می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

داشت (جدول ۳). شیفراو و بیکر (Shiferaw and Baker, 1999) نیز این شاخص را در گندم برای گزینش برای مقاومت به خشکی مناسب گزارش کرده‌اند.

مزیت این شاخص آن است که امکان بررسی تعداد زیادی ژنوتیپ را در مدت زمان کم فراهم می‌سازد. سینگ و همکاران (Singh, Fokar, *et al.*, 1992) و فوکار و همکاران (*et al.*, 1998) نیز به این موضوع اشاره نموده‌اند. در این تحقیق نیز لاین‌هایی که به دیواره سلول آنها خسارت بیشتری رسیده بود کاهش بیشتری

References

- Bates, I. S., Waldern, R. P. and Teare, I. D. 1973.** Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant and Soil* 39: 205-207.
- Blum, A. and Ebercon, A. 1981.** Cell membrane stability as a measure of drought and heat tolerance in wheat. *Crop Science* 21: 43-47.
- Fernandez, G. C. J. 1992.** Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. *Proceeding of a Symposium, Taiwan*. 13-18 Aug. Pp. 257-270
- Fokar, M., Blum, A. and Nguyen, H. T. 1998.** Heat tolerance in spring wheat. II Grain filling. *Euphytica* 104: 9-15.
- Gavutzi, P., Rizza, F., Palumbo, M., Gampaline, R. G., Ricciardi, G. L. and Borghi, B. 1997.** Evaluation of field and laboratory predictors of drought and heat tolerance in winter cereals. *Canadian Journal of Plant Science* 77: 523-531.
- Gill, M. S. 1999.** Breeding for drought resistance . In: *Recent concepts in breeding for resistance to biotic and abiotic stresses in crop plants*. Nanda, G.S. Chahal G. S., Singh B. S., Allah Rang and M. S. Gill (eds.) 4-22 Oct., Pp. 73-85, PAU, Ludhiana, India.
- Kao, C. H. 1981.** Senescences of rice leaves. VI. Comparative study of the metabolic changes of senescing turgid and water stressed excised leaves. *Plant and Cell Physiology* 22: 683-685.
- Levitt, J. 1980.** Responses of plant to environmental stresses. Vol. 1, Academic Press

Inc.

Martine, M., F. Micell, J. A. Morgan, M. Scalet and G. Zerbi. 1993. Synthesis of osmotically active substances in winter wheat leaves as related to drought resistance of different genotypes. *Journal of Agronomy and Crop Science* 17: 176-184.

Mohammadi, R., Haghparast, R., Aghaee-Sarbarzeh, M., Abdollahi, A. 2006. Evaluation of drought tolerance of advanced durum wheat genotypes based on physiological criteria and related traits. *Journal of Agricultural Science of Iran*. 3 (1-37): 563-575.

Naderi, A., Majidi-Harvan, E., Hashemi-Dezfoli, A., Rezaei, A., Normohamadi, Gh. 1999. Analysis of efficiency of drought tolerance indices in crop plants and introduction of a new criteria. *Seed and Plant* 15 (4): 390-402.

Pessarkli, M. 1999. Hand book of plant and crop stress. Marcel Dekker Inc.

Shiferaw, B., and Baker, D. A. 1999. An evaluation of drought screening techniques. *Eragrostis tef*. In: *Proceedings of New Genetic Approaches to Crop Improvement II*. Naqvi, S. S. M. (ed.) Pp. 469-496.

Singh, M., Srivastava, J. P., and Kumar, A. 1992. Cell membrane stability in relation to drought tolerance in wheat genotypes. *Journal of Agronomy and Crop Science* 168: 186-190.

Teulate, B., Monneveux, P., J., Borrieres, C., Souyrus, I., Charri, A. and This, D. 1997. Relationships between relative water content and growth parameters and water stress in barley, a QTL study. *New Physiology* 137: 99-107.

Winter, S. R., Musik, J. T., and Porter, K. B. 1988. Evaluation of screening techniques for breeding drought resistant winter wheat. *Crop Science* 28: 512-516.