

اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم نان (*Triticum aestivum L.*) در گرگان

Effects of Sowing Date on Grain Yield and Its Components of Two Bread Wheat (*Triticum aestivum L.*) Cultivars in Gorgan in Iran

مهدى کلاته‌عربى^۱، فاطمه شيخ^۲، حبيب‌الله سوقى^۳ و جلال‌الدين هيوه‌چى^۴

۱، ۲ و ۳- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان
۴- پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۸/۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۸/۵

چکیده

کلاته‌عربى، م، شيخ، ف، سوقى، ح. و هيوه‌چى، ج. ۱۳۹۰. اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم نان در گرگان. مجله بهزیستی نهال و بذر ۲۷-۲ (۲۹۶-۲۸۵).

به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم نان آزمایش مزرعه‌ای به مدت دو سال زراعی (۱۳۸۴-۸۶) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان به اجرا در آمد. این آزمایش با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تاریخ‌های کاشت در کرت‌های اصلی در چهار سطح شامل: ۱۰ آذر، ۳۰ آذر، ۲۰ دی و ۱۰ بهمن و ارقام گندم در کرت‌های فرعی در دو سطح شامل مغان ۳ و آرتا کشت گردیدند. میانگین دمای روزانه خاک در تاریخ‌های کاشت مورد نظر به ترتیب ۱۱، ۱۴، ۱۶ و ۲۴ درجه سانتی گراد بود. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر سال بر عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در واحد سطح، روز تا سنبله‌دهی، روز تا رسیدن و مقدار درجه-روز رشد تا سنبله‌دهی معنی‌دار بود. کلیه صفات مورد بررسی (به جز تعداد دانه در سنبله) تحت اثر تاریخ کاشت قرار گرفتند. بیشترین عملکرد بیولوژیک ۱۴۴۱۵ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ۱۰ آذر (با درجه-روز رشد = ۲۲۴۷) بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه (۴۴۸۰ کیلوگرم در هکتار) نیز در تاریخ کاشت ۱۰ آذر بدست آمد. در تاریخ کاشت‌های دیگر هنگام به علت مواجه شدن گیاه با گرمای آخر فصل و دمای پائین خاک در زمان کاشت، عملکرد دانه کاهش یافت. ارقام گندم نیز از نظر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تقاضوت معنی‌دار داشتند. رقیم مغان ۳ با میانگین ۴۳۲۴ کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بالاتری تولید نمود و با رقم آرتا اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد داشت. در این بررسی مناسب‌ترین تاریخ کاشت ۱۰ آذر و میانگین دمای خاک ۱۴ درجه سانتی گراد با ۲۲۴۷ درجه روز رشد بود.

واژه‌های کلیدی: درجه-روز رشد، دمای خاک، عملکرد بیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه.

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول: jalal_hivehchie@yahoo.com

مقدمه

روطیت باعث افت عملکرد می‌گردد (Fathi *et al.*, 2001). کشت‌های دیر هنگام باعث کوتاه‌تر شدن دوره آغازش سنبلک‌ها و کوتاه شده دوره نمو سنبله تا تشکیل سنبلک انتهایی شده و بنابراین تعداد سنبلک در سنبله کاهش می‌یابد (Entz and Flower, 1991). Jain *et al.*, 1992 در بررسی اثر تاریخ کشت بر روی عملکرد دانه و اجزای وابسته به آن در گندم، تأخیر در تاریخ کشت را علت کاهش در اکثر صفات وابسته به عملکرد و در نهایت کاهش در عملکرد دانه معرفی کردند. علاوه بر آن چون گندم گیاهی روز بلند است، روزهای بلندتر باعث می‌شود تا طول دوره مراحل نموی کوتاه‌تر شوند و قبل از اینکه اندام‌های رویشی برای ایجاد منبع فیزیولوژیک به طور کامل توسعه یابند، بوته‌ها زودتر از آن وارد مرحله زایشی شده و در ادامه با کمبود منابع فتوستنتزی مواجه شوند (Entz and Flower, 1991). Alessi *et al.*, 1979) اظهار کردند که حداقل عملکرد دانه در گندم از تاریخ کاشت مناسب حاصل می‌شود. کاهش خواهد گشی، افزایش عملکرد دانه و وزن هکتولیتر از آثار دیگر کشت گندم در زمان مناسب می‌باشد (Chia, 1983). آزمایش انجام شده توسط توکلو و یاغ باسانلار (Toklu and Yagbasanlar, 1996) در ترکیه نشان داد که عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن هکتولیتر در گندم به طور معنی‌داری تحت

تاریخ کاشت به دلیل اثر بر طول دوره زندگی و به عبارتی میزان درجه-روز رشد دریافتی توسط گیاه تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد دانه گندم دارد و یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده موفقیت در تولید محصول می‌باشد (Hundal *et al.*, 1997). برخی مطالعات نشان می‌دهد که عملکرد دانه در کشت‌های زود هنگام کاهش می‌یابد (Radmehr *et al.*, 1997). با این وجود برخی از مطالعات نشان می‌دهد که کشت زود هنگام گندم موجب ایجاد پنجه و تراکم سنبله بیشتر و تعداد دانه کم در هر سنبله شده ولی وزن دانه‌ها سنگین‌تر (وزن هزار دانه بیشتر) و عملکرد دانه بیشتر خواهد شد (Knapp and Knapp, 1978). کاشت زودتر از موعد مقرر باعث می‌شود که گیاهان قبل از رسیدن سرما بیش از اندازه رشد نموده و با توجه به شروع رشد زایشی، احتمال همزمان شدن سرما با این مرحله حساس از نمو افزایش یابد (Hay, 1986). تأخیر در کاشت گندم نیز باعث کاهش دوره رشد رویشی، کاهش تعداد برگ و در نتیجه کل مواد فتوستنتزی تولیدی برای رشد رویشی و کاهش عملکرد مطلوب می‌شود (Blye *et al.*, 1990). در کشت‌های دیر هنگام به علت کوتاه شدن مراحل رشد بایستی میزان بذر بیشتری مصرف شود. از طرف دیگر وقوع دمای بالا در دوران رشد زایشی به ویژه در زمان گلدهی در آخر فصل همراه با بروز تنفس گرما و

گزارش کرد خسارت سرمای زمستانه در ارقام بهاره و بینایین موجب می‌شود که این ارقام در بهار به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایی مقداری از توان و نیروی خود را به ترمیم و بازسازی اندام‌های از دست رفته اختصاص دهنده، در حالی که در ارقام زمستانه بدون هیچ گونه تأخیری به رشد رویشی خود ادامه می‌دهند. تاریخ کاشت باید طوری تنظیم شود که بوته‌های گندم قبل از شروع سرماهی شدید زمستانه در مرحله ۳ تا ۴ برگی باشند.

بررسی‌های متعددی در مورد اثر تاریخ کشت بر صفات زراعی و عملکرد گندم در ایران انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی‌ها کاهش در وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله، افزایش میزان عقیمی گلچه‌ها، برخورد مراحل حساس رشد گیاه (مراحل تقسیم میوز، ظهرور سنبله و گردهافشانی و دوره پرشدن دانه) با گرمای آخر فصل و افزایش خسارات ناشی از آن، تسریع مراحل رشد و نمو و کاهش دوام آنها، کاهش عملکرد بیولوژیکی، وزن کاه و ساقه، ارتفاع بوته، طول سنبله و شاخص برداشت و در نهایت کاهش عملکرد دانه از آثار مهم تأخیر در تاریخ کشت گندم گزارش شده‌اند Akbari Moghaddam *et al.*, 1998; (Ehdaei *et al.*, 1994

واحد گرما یا درجه-روز رشد (Growing Degree Days=GDD) برای توضیح روابط بین دوره رشد و دما تعریف شده

تاثیر تاریخ کاشت قرار می‌گیرد. آنها گزارش کرده‌ند که تاریخ مناسب کشت برای ارقام مختلف، متفاوت می‌باشد. اصولاً عوامل محیطی مانند طول روز، نور، حرارت، آب و موادغذایی روی رشد رویشی و زایشی تاثیر می‌گذارد. اثر محیط رویش روی تغییرات کمی و کیفی بستگی به مرحله رشد گیاه و دوره تغییرات محیطی دارد (Gourley and Creech, 1980). معمولاً بین عملکرد و طول دوره رشد دانه همبستگی مثبتی وجود دارد، اما در برخی موارد این همبستگی منفی می‌شود (Brucker and Froherg, 1987) می‌رسد دلیل این امر مصادف شدن دوره دانه‌بندی با گرما یا تنش خشکی در آخر فصل (Waddington *et al.*, 1986) ناپ و ناپ (Knapp and Knapp, 1978) اعلام نمودند شش هفته تاخیر در کاشت، باعث شد که ظهرور سنبله یک هفتة به تعویق بیافتد و نهایتاً منجر به کاهش وزن هزار دانه گردید. بلو و همکاران (Blue *et al.*, 1990) نیز اعلام نمودند ظهرور بساک در یک دوره ۱۰ روزه انجام می‌شود و اگر پنجه‌ها پس از این مرحله وارد فاز گردهافشانی شوند بیشتر در معرض تنش‌های حرارتی و رطوبتی آخر فصل قرار می‌گیرند.

علاوه بر رعایت تاریخ کاشت مناسب، برای بدست آوردن محصول بیشتر و مطمئن باستی ارقامی با تیپ رشد مناسب در هر منطقه انتخاب و کشت شوند. روستایی (Roustaii, 1997)

اصلی در کرت‌های اصلی پیاده گردیدند و عامل فرعی شامل ارقام گندم مغان^۳ و آرتا در کرت‌های فرعی کشت گردیدند. میانگین روزانه دمای خاک در تاریخ کاشت‌های مورد آزمایش به ترتیب ۱۴، ۱۱، ۱۰ و ۶ درجه سانتی‌گراد بود. میزان بذر در کلیه کرت‌ها بر اساس ۳۵۰ دانه در مترمربع بر مبنای وزن هزار دانه محاسبه گردید و در کرت‌هایی به مساحت ۶ مترمربع شامل ۶ ردیف کاشت به طول ۶ متر و فاصله ۲۰ سانتیمتر کشت گردیدند. عملیات تهیه زمین شامل: شخم، دیسک و ماله بود. کود مصرفی نیز بر اساس نتایج تجزیه خاک، کود فسفات تریپل بر مبنای ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، کود اوره ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار (۵۰ کیلوگرم به عنوان پایه و ۱۰۰ کیلوگرم به عنوان سرک در دو مرحله پنجاه‌زنی و ساقه رفتن مصرف گردید)، گوگرد ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و سولفات روی ۳۰ کیلوگرم در هکتار با یکدیگر مخلوط و به خاک اضافه گردید. سایر مراقبت‌های زراعی در همه تیمارها به طور یکسان انجام گرفت. کترل شیمیایی علف‌های هرزیهن برگ و باریک برگ در مرحله پنجاه‌دهی و با استفاده از اختلاط علف‌کش‌های گرانستار به نسبت ۲۰ گرم در هکتار و تاپیک یک لیتر در هکتار به وسیله سمپاش پشتی موتوری انجام گردید. تاریخ ظهور سنبله، رسیدگی و نیز طول دوره پرشدن دانه، تعداد سنبله در متر مربع یاداشت برداری شدند. پس از برداشت نمونه‌ها، وزن هزار دانه، عملکرد

است. این شاخص وجود یک رابطه خطی و مستقیم بین رشد و دما را بیان می‌کند (Nuttonson, 1955) واحد گرما یا درجه روز رشد، میانگین دماهای بالاتر از دمای پایه می‌باشد. دمای پایه عبارت است از دمایی که در آن هیچ رشدی صورت نمی‌گیرد. واحد درجه روز رشد رابطه مثبت و معنی‌داری را با عملکرد نشان می‌دهد، زیرا درجه روز رشد بیشتر به معنای دوره رشد و پرشدن دانه طولانی تر و بنابراین عملکرد بیشتر می‌باشد (Hundal *et al.*, 1997). واحد درجه روز رشد شاخص مناسبی برای پیشگویی مراحل مختلف فنولوژیک در گندم در ایالت پنجاب گزارش شده است (Hundal *et al.*, 1997).

هدف از اجرای این تحقیق تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و مقدار درجه روز رشد موردنیاز برای دستیابی به حداقل عملکرد دانه دو رقم گندم نان در منطقه گرگان بود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان واقع در ۵ کیلومتری شمال گرگان با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (۱۳۸۴-۸۶) اجرا گردید. تاریخ‌های کاشت شامل ۱۰ آذر، ۳۰ آذر، ۲۰ دی و ۱۰ بهمن به عنوان عامل

(Momtazi and Emam, 2006) نیز با مطالعه بر روی رقم شیراز عملکرد بیولوژیک بالاتر در تاریخ کاشت‌های زود را گزارش کردند. این امر به دلیل کشت زودتر و برخورد با شرایط مساعدتر محیطی برای رشد رویشی بوته‌ها در این تاریخ کاشت بوده که منجر به افزایش تولید و تجمع ماده خشک گیاهی شد. ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت‌های زود هنگام توانستند مدت زمان بیشتری از منابع محیطی در دسترس استفاده نمایند و با تأخیر در کاشت عملکرد بیولوژیک کاهش یافت.

اثر سال بر تعداد سنبله در متر مربع در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار گردید و ارقام مورد بررسی در سال دوم تعداد سنبله بیشتری در واحد سطح داشتند (جدول ۲). اثر تاریخ کاشت نیز بر تعداد سنبله در مترمربع و در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۱). مقایسه میانگین تعداد سنبله در تاریخ کاشت‌های مختلف نشان داد که تاریخ کاشت اول و دوم مشابه بودند (جدول ۲). میانگین دمای خاک در این تاریخ‌ها به ترتیب ۱۴ و ۱۱ درجه سانتی‌گراد بود. مناسب بودن شرایط آب و هوایی در طول دوره رشد و نمو گیاه و میانگین دمای خاک مناسب در این دو تاریخ کاشت باعث گردید که تعداد پنجه‌های تولید شده به تعداد سنبله بارور بیشتری منجر شوند و از طرف دیگر گرمی و خشکی هوا و میانگین دمای خاک پائین‌تر در تاریخ کاشت‌های دیرتر باعث کاهش تعداد پنجه‌های بارور گردید (جدول ۲).

بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه یادداشت‌برداری شد. محاسبه درجه-روز رشد نیز با استفاده از آمارهای هواشناسی منطقه و تاریخ‌های متناظر محاسبه گردید.

برای محاسبه درجه روز رشد از رابطه $GDD = \sum(T_{\max} + T_{\min})/2 - T_{\text{base}}$ استفاده شد که دمای پایه برای گندم صفر در نظر گرفته شد (Russelle *et al.*, 1984). دماهای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد را نیز ۳۰ درجه سانتی‌گراد منظور گردید (Russelle *et al.*, 1984).

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS ver 8.2 (SAS Institute, 2002) تجزیه واریانس شد و میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ مقایسه شدند.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب داده‌ها نشان داد که اثر سال بر روی عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در مترمربع، روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدن و درجه روز رشد تا ظهور سنبله معنی‌دار بود (جدول ۱). بیشترین عملکرد بیولوژیک در سال دوم آزمایش به دست آمد. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک نیز در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود و بیشترین عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت ۱۰ آذر (میانگین درجه حرارت خاک ۱۴ درجه سانتی‌گراد و با درجه روز رشد = ۲۲۴۷) به دست آمد (جدول ۲). ممتازی و امام

جدول ۱- خلاصه تجزیه واریانس مرکب برای عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و صفات فنولوژیکی دو رقم گندم نان در تاریخ کاشت‌های مختلف در دو فصل زراعی (۱۳۸۶-۸۴)

Table 1. Summary of combined analysis of variance for grain yield, yield components and phonological traits of two bread wheat cultivars in different sowing dates in two cropping seasons (2005-07)

S.O.V	متابع تغیرات	میانگین مربیات (MS)											
		درجه آزادی df	عملکرد بیولوژیک Biological yield	تعداد سنبله در متر مربع Spike/m ²	تعداد دانه در سنبله Grain/spike	وزن هزاردانه 1000 Grain weight	عملکرد دانه Grain yield	دوره پر شدن دانه Days to Heading	تعداد روز تا ظهرور سنبله Days to Maturity	درجه روز رشد تا ظهرور سنبله GDD to heading	درجه روز رشد تا ظهرور سنبله GDD to maturity	درجه روز رشد در مرحله پر شدن دانه GDD in grain filling	
Year (Y)	سال	1	9706504.68**	51286.68*	25.52 ns	0.2002 ns	133066.55 ns	165.02*	285.188**	243**	22852.968**	19598.048**	112.394 ^{ns}
Error ₁	خطای ۱	4	244955.49	2466.29	6.20	3.050	28241.94	10.45	0.250	0.250	97.912	284.378	680.442
Sowing date (Sd)	تاریخ کاشت	3	29007063.13**	5678.74**	112.64**	13.370**	1441458.26**	255.88**	4733.688**	6189**	160559.424**	261389.207**	14683.928**
Y × Sd	سال × تاریخ کاشت	3	699396.35*	508.18 ns	1.52 ns	2.77**	357081.50**	11.29 ns	13.688 **	5 ns	6892.036**	8593.177**	10837.542**
Error ₂	خطای ۲	12	143184.09	1039.73	2.99	0.441	51701.79	3.84	1.583	2.250	497.726	1220.442	836.657
Cultivar (C)	رقم	1	4883229.68**	7624.02**	716.10**	22.550**	2187994.97**	4.68**	9.188**	12**	2883.770**	6721.328**	799.924 ^{ns}
Y × C	سال × رقم	1	58870.02 ns	7227.52**	98.04**	0.046 ns	193561.97*	0.021**	0.188 ^{ns}	0 ns	49.309 ^{ns}	2.708 ^{ns}	28.907 ^{ns}
Sd × C	تاریخ کاشت × رقم	3	701811.79 ns	2813.40*	10.40 ns	0.524 ns	16340.90 ns	2.07**	0.688 ^{ns}	0 ns	192.035 ^{ns}	7.014 ^{ns}	108.305 ^{ns}
Y × Sd × C	سال × تاریخ × رقم	3	246368.35 ns	1308.24 ns	36.00**	0.312 ns	43832.12 ns	0.521 ns	0.688 ^{ns}	0 ns	280.253 ^{ns}	8.934 ^{ns}	291.177 ^{ns}
Error ₃	خطای ۳	16	199727.70	823.37	5.54	0.287	35232.38	0.375	0.750	0.250	197.689	134.671	181.512

* and **: Significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively

ns: Not significant

* و **: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪

ns: غیر معنی دار

جدول ۲ - مقایسه میانگین اثر فصل زراعی، تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه گندم نان

Table 2- Mean comparison for effect of cropping season, sowing date and cultivar on grain yield and yield components of bread wheat

		عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)	تعداد سنبله در متر مربع	تعداد دانه در سنبله	وزن هزاردانه (گرم)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	دوره پر شدن دانه (روز)	تعداد روز تا ظهور سنبله	تعداد روز تا رسیدگی دهی	درجه روز رشد تا رسیدگی دهی	درجه روز رشد تا پرشدن دانه	درجه روز در مرحله رسیدگی
		Biological yield (Kg/ha)	Spike/m ²	Grain/spike	1000 Grain weight (g)	Grain yield (Kg/ha)	Grain filling duration (days)	Days to Heading	Days to Maturity	GDD to heading (°Cd)	GDD to maturity (°Cd)	GDD in grain filling period (°Cd)
فصل زراعی												
2005-2006	۱۳۸۴-۸۵	12123.83b	482.29b	39.41a	33.96a	4057.86b	47.2a	111.5b	153.75b	1241.535a	2081.017a	839.481 ^{ns}
2006-2007	۱۳۸۵-۸۶	13023.20a	547.66a	33.83a	33.83a	4163.16a	43.5a	116.375a	158.250a	1197.896b	2040.604b	842.542 ^{ns}
تاریخ کاشت												
01 December	۱۰ آذر	14415.2a	534.08a	44.4a	34.93a	4480.67a	50.58a	136.8a	182.05	1369a	2247a	845.1ab
21 December	۲۰ آذر	13140b	532a	40.06b	34.48a	4225.59b	47.33b	121.5b	165.5	1236b	2101b	864.6a
10 January	۲۰ دی	11935c	504.42ab	37.86c	33.64b	4082.80b	43.58c	107.3c	147.05	1179c	1990c	810.5b
30 January	۱۰ بهمن	10803.9d	489.42b	37.93c	32.53c	3652.98c	39.92d	90.25d	129.5	1094d	1905d	811.6b
رقم												
Moghan 3	۳ مغان	12875.7a	554.73a	44a	34.58a	4324.03a	45b	113.5b	155.5b	1211.965b	2048.977b	836.929 ^{ns}
Arta	۴ آرتا	12271b	475.12b	36.28b	33.21b	3897.01b	45.7a	114.375a	156.5a	1227.467a	2072.644a	845.094 ^{ns}

میانگین هایی، در هر ستون و برای هر عامل، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشند بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی داری ندارند.

Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

تدریج با تأخیر در کاشت و کاهش میانگین دمای خاک وزن هزار دانه نیز کاهش یافت (جدول ۲). اثر متقابل سال × تاریخ کاشت بر روی وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد (جدول ۱). ارقام گندم مورد بررسی نیز از لحاظ وزن هزار دانه با یکدیگر تفاوت داشتند و رقم میان ۳ از وزن هزار دانه بیشتری برخوردار بود (جدول ۲). کاهش وزن هزار دانه در تاریخ کاشت های دیرتر به علت گرم بودن و خشکی هوا در طول دوره پر شدن دانه ها بود. وزن هزار دانه تحت تأثیر عواملی که بعد از گرده افشاری اتفاق می افتد قرار می گیرد. وزن نهایی دانه تابعی از سرعت و طول دوره پر شدن دانه است. این دو عامل تحت تأثیر تأخیر در کاشت نقصان یافته و موجب کاهش وزن هزار دانه می گردد (Radmehr, 1997). مقایسه میانگین عملکرد دانه در چهار تاریخ کاشت مختلف نشان می دهد که تاریخ کاشت اول بالاترین عملکرد دانه را دارا بود. بین تاریخ کاشت اول (۱۰ آذر با میانگین دمای خاک ۱۴ درجه سانتی گراد) و آخر (۱۰ بهمن با میانگین دمای خاک ۴ درجه سانتی گراد) اختلاف عملکرد بسیار معنی دار بود (۸۲۷/۶۹ کیلو گرم در هکتار). این تفاوت ممکن است به علت مناسب بودن درجه حرارت هوا در دوره پر شدن دانه در تاریخ کاشت ۱۰ آذر باشد (جدول ۲). همزمان با تأخیر در کاشت به دلیل کوتاه شدن مراحل رشد، مصادف گردیدن زمان گلدهی با افزایش دما و کاهش رطوبت عملکرد دانه

هماهنگی تغییرات تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله با عملکرد دانه نشان داد که کاهش آنها به ویژه تعداد سنبله در مترمربع علت اصلی کاهش عملکرد دانه (جدول ۲) در مطالعه حاضر بود. تأخیر در کاشت غلات زمستانه و بهاره به دلیل کاهش استقرار بوته و کاهش تعداد پنجه های بارور موجب کاهش تراکم جمعیت سنبله و عملکرد دانه می شود (Blye *et al.*, 1990).

اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار گردید (جدول ۱). بیشترین تعداد دانه در سنبله از تاریخ کاشت ۱۰ آذر با دمای خاک ۱۴ درجه سانتی گراد در زمان کاشت بدست آمد (جدول ۲). فتحی و همکاران (Fathi *et al.*, 2001) نیز کاهش تعداد دانه در سنبله را با تأخیر در کاشت در گندم گزارش نمودند و آن را از علل اصلی کاهش عملکرد دانه بر شمردند. ارقام گندم نیز از لحاظ تعداد دانه در سنبله تفاوت معنی داری داشتند (جدول ۱). تعداد دانه در هر سنبله می تواند تحت تأثیر شرایط محیطی قرا گیرد و در طول آغاز شنبله تا مدتی بعد از گرده افشاری تغییر کند (Blye *et al.*, 1990). اثر متقابل سال × رقم بر تعداد دانه معنی دار گردید (جدول ۱).

اثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه معنی دار بود (جدول ۱). بیشترین وزن هزار دانه به تاریخ کاشت ۱۰ آذر (میانگین دمای خاک ۱۴ درجه سانتی گراد) با ۴۴/۴ گرم تعلق داشت و به

تا رسیدگی گندم در ۱۰ آذرماه (میانگین دمای خاک ۱۴ درجه سانتی گراد) به میزان ۲۲۴۷ درجه-روز رشد دریافت نمود که این درجه روز رشد توانست ۱۴۴۱۵ کیلو گرم ماده خشک با ۴۴۸۰ کیلو گرم در هکتار دانه تولید کند که در مقایسه با تاریخ کاشت ۳۰ آذرماه (میانگین دمای خاک ۱۱ درجه سانتی گراد) با ۲۱۰۱ درجه روز رشد (۱۳۱۴۰ کیلو گرم در هکتار ماده خشک با ۴۲۲۵ کیلو گرم در هکتار دانه) برتر بود. بدین معنی که تاریخ کاشت دوم مقدار ۱۴۶ درجه روز رشد کمتر دریافت کرد که باعث کاهش مقدار ماده خشک تولیدی به مقدار ۱۲۷۵ کیلو گرم در هکتار با ۲۰ روز تأخیر در کاشت شد و این کاهش به ازای هر روز ۶۳/۸ کیلو گرم در هکتار ماده خشک بود.

اختلاف بین تاریخ کاشت ۱۰ آذر تا ۱۰ بهمن ماه ۶۰ روز بود که این ۶۰ روز باعث کاهش تعداد روز تا ظهرور سنبله (۴۶/۶ روز)، روز تا رسیدن (۵۲/۶ روز)، دوره پر شدن دانه (۶ روز)، درجه روز رشد تا ظهرور سنبله (۲۷۵ درجه روز رشد)، درجه روز رشد تا رسیدن دانه (۳۴۲ درجه روز رشد)، درجه روز رشد برای مرحله پر شدن (۳۳/۵ درجه روز رشد)، ماده خشک کل (۳۶۱۱/۳ کیلو گرم در هکتار)، تعداد سنبله (۵۳/۷ دانه)، وزن هزار دانه در سنبله (۶/۵ دانه)، وزن هزار دانه (۲/۴ گرم) و عملکرد دانه (۸۲۷/۷ کیلو گرم در هکتار) شد. به عبارت دیگر ۶۰ روز تأخیر در کاشت معادل کاهش ۳۴۲ درجه روز رشد بود

کاهش یافت (جدول ۲). کاهش تعداد دانه در مترمربع به علت دمای بالاتر در زمان گردهافشانی ممکن است علت اصلی این کاهش می باشد (Fathi *et al.*, 2001). فتحی و همکاران کاهش عملکرد دانه گندم دوروم رقم دنا را با تأخیر در کاشت از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان گزارش کردند (Fathi *et al.*, 2001). ظاهراً شدت تأثیر شرایط نامناسب ناشی از تأخیر در کاشت به میزانی است که روابط جبرانی بین اجزای عملکرد دانه نمی تواند این اثر نامطلوب را جبران نماید (Momtazi and Emam, 2006). کاشت دیرهنگام گندم های زمستانه و یا بهاره به دلیل برخورد دوره رشد و نمو دانه با تنفس خشکی و گرمای هوا موجب کاهش عملکرد دانه می شود. در حالیکه کشت در تاریخ مناسب با میانگین دمای خاک مناسب موجب تولید گیاهان با نظام ریشه ای قوی تر و افزایش تحمل به سرمای زمستانی می گردد. به نظر می رسد دلیل بالاتر بودن عملکرد در تاریخ کاشت اول (۱۰ آذر با میانگین دمای خاک ۱۴ درجه سانتی گراد) نیز همین امر بود (Radmehr, 1997).

ارقام گندم نان نیز دارای عملکرد دانه متفاوتی بودند. مقایسه میانگین عملکرد دانه برای ارقام گندم نشان داد که رقم مغان ۳ با ۴۳۲۴ کیلو گرم در هکتار عملکرد دانه بالاتری نسبت به رقم آرتا با عملکرد ۳۸۹۷ کیلو گرم در هکتار داشت (جدول ۲). اثر متقابل سال × رقم نیز بر روی عملکرد دانه معنی دار گردید. کاشت

افزایش عملکرد دانه در مقایسه با تاریخ کاشت‌های دیرتر که از درجه روز رشد کمتر و رشد کمتری برخوردار بودند، شد (جدول ۲). اختلاف میانگین دمای خاک در زمان کاشت بین تاریخ کاشت اول و آخر ۱۱ درجه سانتی گراد بود. این میزان اختلاف دما باعث کاهش عملکرد به میزان ۸۲۷/۷ کیلوگرم در هکتار شد (جدول ۲). به عبارت دیگر به ازای هر درجه سانتی گراد کاهش میانگین دمای خاک، عملکرد دانه به مقدار ۷۵/۲ کیلوگرم در هکتار کاهش نشان داد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت مناسب یکی از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد دانه گندم در منطقه گرگان به شمار می‌رود. دمای بالا در هنگام گردده‌افشانی اثر منفی قابل توجهی بر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشت. بدین ترتیب می‌توان استنباط نمود که تاریخ کاشت بر روی درجه حرارت خاک در زمان کاشت و مقدار دریافت درجه روز رشد بوسیله گندم و در نهایت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم موثر می‌باشد.

که با کاهش ارتفاع بوته و تعداد برگ، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه موجب کاهش عملکرد بیولوژیک در مقایسه با تاریخ کاشت ۱۰ آذرماه به مقدار ۳۶۱۱/۳ کیلوگرم در هکتار شد. یعنی به ازای هر واحد کاهش درجه روز رشد، ۱۰/۶ کیلوگرم در هکتار ماده خشک کمتر تولید شد (جدول ۲). نوسانات مقدار درجه روز رشد در مرحله پر شدن دانه برای تاریخ کاشت‌های ۱۰ و ۳۰ آذر، ۲۰ دی ماه و ۱۰ بهمن ماه ناچیز بود. به طوریکه ۱۰ آذر و ۳۰ دی مشابه و ۲۰ دی و ۱۰ بهمن نیز در یک گروه دیگر قرار گرفتند. اما نکته اساسی در اختلاف مقدار درجه روز رشد از مرحله کاشت تا ظهور سنبله بود (جدول ۲). این مرحله هر چه طولانی‌تر بود (تاریخ کاشت ۱۰ آذر) گیاه از رشد رویشی بیشتری برخوردار بود، بنابراین تعداد برگ، تعداد پنجه، سطح برگ و سنبله بارور بیشتری داشت که این امر باعث افزایش ماده خشک تولیدی، تعداد دانه در سنبله بیشتر و به دلیل ذخیره مواد فتوسنتزی بیشتر در برگ‌ها و ساقه‌ها و انتقال مجدد آن‌ها به دانه، باعث وزن دانه بیشتر گردید که در نهایت باعث

References

- Akbari Moghaddam, H., Kambuzia, J., and Sangtarash, M. 1998. Study of variation in grain yield and yield components in two wheat cultivars Hirmand and Falat Cross in different planting dates. Pp. 321. In: The proceedings of the 5th Iranian Crop Science Congress. Karaj, Iran.
- Alessi, J. J., Power, J. F., and Sibbitt, L. D. 1979. Yield, quality and nitrogen

- fertilizer recovery of standard and semidwarf spring wheat as affected by sowing date and fertilizer rate. *The Journal of Agricultural Science* 93: 87-93.
- Blue, E. N., Mason, S. C., and Sander, D. H. 1990.** Influence of planting date, seeding rate and phosphorus on wheat yield. *Agronomy Journal* 82: 762-768.
- Blye, E. N., Mason, S. E., and Sander, D. H. 1990.** Influence of planting date, seeding rate on wheat yield. *Agronomy Journal* 82: 762- 768.
- Brucker, P. I., and Frohberg, R. C. 1987.** Rate and duration of grain filling in spring wheat. *Crop Science* 27: 451-455.
- Chia, A. J. 1983.** Seeding rate and seeding date effects on spring seeded small grain cultivars. *Agronomy Journal* 75: 795-799.
- Ehdaie, B., Nourmohammadi, V., Vala, A. 1994.** Environmental sensitivity and correlation analysis of grain yield and its components in tetraploid wheat cultivars (durum) of Khuzestan landrace in favorable and unfavorable conditions. *The Journal of Agriculture Science* 17: 15-31.
- Entz, M. I., and Fowler, D. B. 1991.** Agronomic performance of winter versus spring wheat. *Agronomy Journal* 83: 527-532.
- Fathi, G., Siadat, S. A., Rossbe, N., Abdali-Mashhadi, A. R., Ebrahimpoor, F. 2001.** Effect of planting date and seed density on yield components and grain yield of wheat cv. Dena in Yassoj conditions. *Journal of Agriculture Science and Natural Resources* 8 (3): 23-31.
- Gourley, L. M., and Creech, R. G. 1980.** Carbohydrates and lipids in food and feed grain crops. Pp. 113-138. In: *Crop quality storage and utilization*. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.
- Hay, R. K. M. 1986.** Sowing date and the relationships between plant and apex development in winter cereals. *Field Crops Research* 14: 321-327.
- Hundal, S. S., Singh, R., and Dhaliwal, L. K. 1997.** Agro-climatic indices for predicting phenology of wheat (*Triticum aestivum* L.) in Punjab. *Journal of Agriculture Science* 67: 265-68.
- Jain, M. P., Dixit, P. V., and Khan, R. A. 1992.** Effect of sowing date on wheat varieties under late sown irrigated conditions. *Indian Journal of Agricultural Science* 62: 669-671.
- Knapp, W. R., and Knapp, J. S. 1978.** Response of winter wheat to date of planting

- and fall fertilization. *Agronomy Journal* 70: 1048-1053.
- Momtazi, F., and Emam, Y. 2006.** Effect of sowing date and seeding rate on yield and yield components in bread wheat *c.v.* Shiraz. *Iranian Journal of Agriculture Science* 37:1-11.
- Nuttonson, M. Y. 1955.** Wheat climate relationships and use of phenology in ascertaining the thermal and photo-thermal requirements of wheat. *American Institute of Crop Ecology*, Washington DC. Pp. 54-55.
- Radmehr, M., Lotfali-Ayeneh, G. A., and Kajbaf, A. 1997.** Effect of sowing date on growth and yield of wheat cultivar Falat in southern regions of Khuzestan. II. Accumulation and redistribution pattern of macroelements in different plant parts. *Seed and Plant* 13: 34-46.
- Russelle, M. P., Wilhelm, W. W., Olson, R. A., Power, J. F., 1984.** Growth analysis based on degree days. *Crop Science* 24: 28-32.
- Roustaii, M. 1997.** Tolerance of winter wheat cultivars to cold stress and its relationship to morpho-physiological traits. M. Sc. Thesis. Tabriz University, Tabriz, Iran. 142 pp. (In Persian).
- SAS Institute. 2002.** SAS User Guide Statistics. Version 8.2 ed. SAS Institute Inc., Cary, N. C.
- Toklu, F., and Yagbasanlar, L. 1996.** A research on determination wheat cultivars under Cukrova climatic conditions. Pp. 287. In: The proceedings of the 5th International Wheat Conference. Ankara, Turkey.
- Waddington, S. R., Rowson, J. K., Osmanzai, M., and Sounders, D. A. 1986.** Improvement of wheat yield potential of bread wheat adapted to northwest Mexico. *Crop Science* 26: 698-703.