

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش ارزن دم روپاوهی
(*Setaria italica*)

Effect of Sowing Date on Grain Yield and Yield Components of Foxtail Millet (*Setaria italica*) Promising Lines

علی آذربایجانی نصرآباد^۱ و محمد رضا میرزاچی^۲

- ۱- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، بیرجند (نگارنده مسئول)
۲- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، بیرجند

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۸/۲

چکیده

آذربایجانی نصرآباد، ع. و میرزاچی، م. ر. ۱۳۹۱. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش ارزن دم روپاوهی (*Setaria italica*). مجله بهزیارتی نهال و بذر ۲-۲۸ (۱): ۹۵-۱۰۵.

به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و علوفه لاین‌های امیدبخش ارزن دم روپاوهی این تحقیق بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال (۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند انجام شد. تاریخ‌های کاشت شامل اول خرداد، ۱۵ خرداد، اول تیر و ۱۵ تیر به عنوان کرت‌های اصلی و پنج لاین امیدبخش ارزن دم روپاوهی KFM14، KFM15، KFM15، KFM5، KFM7، KFM20 و KFM20 در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. در طول فصل زراعی یادداشت برداری‌های لازم از قبیل تعداد پنجه در بوته، تعداد برگ در بوته، ارتفاع گیاه، طول پانیکول، قطر ساقه، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و علوفه انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه در تاریخ‌های کاشت دوم و سوم به ترتیب با میانگین ۴/۳ و ۴/۶ تن در هکتار نسبت به سایر تاریخ‌های کاشت بیشتر بود. عملکرد علوفه تر در تاریخ کاشت اول با میانگین ۲۵/۶ تن در هکتار نسبت به سایر تاریخ‌های کاشت بیشتر بود. عملکرد علوفه خشک نیز در تاریخ کاشت چهارم و اول بالاتر از تاریخ کاشت دوم و سوم بود. لاین KFM5 با میانگین عملکرد دانه ۴/۹ و عملکرد علوفه تر ۲۴/۷ تن در هکتار نسبت به سایر ارقام برتری داشت. بالاترین عملکرد علوفه خشک از لاین امیدبخش KFM15 در تاریخ کاشت اول بدست آمد.

کلمات کلیدی: ارزن دم روپاوهی، تاریخ کاشت، عملکرد علوفه و عملکرد دانه.

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول: azari.ali@gmail.com

مقدمه

می باشد و کشت و کشتن گیاه از دیرباز ریشه در فرهنگ کشاورزان این خطه دارد (Bina, 1993). با توجه به سازگاری این گیاه به شرایط نامساعد محیطی، فقر خاک و تنش های محیطی که از خصوصیات مناطق خشک و نیمه خشک از جمله خراسان جنوبی می باشد، ارزن می تواند از مهم ترین محصولات این مناطق برای تغذیه دام باشد. برداشت گندم و جو در استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط مناطق مختلف و کمبود ادوات برداشت، از اوایل خرداد تا اواسط تیر ماه بطول می انجامد. ارزن به عنوان کشت دوم در این مناطق مطرح است و برخی کشاورزان با هدف برداشت دانه و به منظور اجتناب از گرما و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان اقدام به کشت ارزن در اواخر تیر ماه می نمایند. هدف از اجرای این طرح تأکید بر علوفه سبز (قصیل) می باشد. بنابراین تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت در این بازه زمانی (اوایل خرداد تا اواسط تیر) جهت دستیابی به حداقل علوفه سبز به همراه عملکرد دانه مطلوب در این استان ضرورت دارد (Bina, 1993).

تعیین تاریخ کاشت مناسب برای گیاهان مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد و در حقیقت اولین قدم برای اجرای تحقیقات در رابطه با یک گیاه به شمار می رود و از عوامل مهمی است که خصوصیات فیزیولوژیکی و مر福利وژیکی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد (Khodabandeh, 1991).

نقش گیاهان علوفه ای در تغذیه دام و در نتیجه تأمین نیاز انسان به فرآورده های دامی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. در اکثر کشورهای جهان تحقیق و پیشرفت در امر تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای در مقایسه با تلاش و توجهی که به سایر محصولات معطوف می شود، مورد غفلت واقع شده است. از این رو توجه به کشت محصولات علوفه ای با شیوه علمی در کشور ما که با کمبود مراتع غنی روبرو است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (Khodabandeh, 1991).

با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند مناطق خشک و نیمه خشک، بهره برداری از گیاهان با درجه سازگاری بالا به اقلیم و شرایط خشک حاکم بر کشور راه حل مناسبی جهت افزایش تولیدات گونه هایی که بتوانند با مصرف آب کمتر، ماده خشک بیشتری تولید نمایند، اهمیت فراوانی دارد (Modir-Shanachi, 1992).

کشت ارزن در ایران از سابقه بسیار طولانی برخوردار است و با توجه به دوره رشد کوتاه قادر به تأمین علوفه در شرایطی است که منابع دیگر علوفه در دسترس نمی باشند. سطح زیر کشت این گیاه در ایران حدود ۱۰۰۰ هکتار است (Anon., 2006). با توجه به بررسی های اخیر امکان توسعه کشت این گیاه در همه مناطق کشور وجود دارد. مساحت زیر کشت این گیاه در استان خراسان جنوبی حدود ۱۰۰ هکتار

کاشت ارزن دم روباهی در دو نوبت در سال (اردیبهشت و مرداد) امکان پذیر بوده و انجام می شود (Bina, 1993).

با توجه به نیاز مملکت به علوفه سبزی که در کوتاه مدت بدست آید، در این پژوهش هدف اصلی تولید علوفه سبز ارقام است و دستیابی به عملکرد بذر و کاه در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین با توجه به مدت کوتاه دانه بستن تا رسیدن فیزیولوژیک بذر و صرفه جویی در وقت و کارگر از همین آزمایش برای تعیین عملکرد بذر و کاه نیز استفاده شد.

این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف ذیل اجرا گردید:

۱- تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت برای لاینهای امیدبخش ارزن دم روباهی جهت تولید بیشترین عملکرد علوفه سبز و خشک و دانه در منطقه بیرونی.

۲- یافتن لاینهای امیدبخش مناسب ارزن دم روباهی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرونی.

مواد و روش‌ها

این پژوهش به مدت دو سال (سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرونی بآ عرض جغرافیایی 53° و 32° و طول جغرافیایی 13° و 59° شرقی و ارتفاع ۱۴۸۰ متر از سطح دریا با میانگین بارندگی سالیانه ۱۴۰ میلی‌متر به اجرا در آمد. آزمایش بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا

مرحله رشدی، تاریخ کاشت و تراکم گیاه مهمترین فاکتورهای موثر بر ترکیب و ارزش غذیه‌ای علوفه می‌باشند (Howell, 1990; Fulkerson *et al.*, 2007). عوامل تعیین‌کننده تاریخ کاشت مناسب برای هر گیاه عبارت‌اند از بارندگی، دما، نور و طول روز (Berezenyi, 1990).

کاشت ارزن دم روباهی می‌تواند تا اواسط جولای (واخرتیر) برای تولید علوفه به تأخیر افتاد، در نتیجه این گیاه به عنوان یک محصول مناسب بصورت کشت دوم مطرح گردیده است (Koch, 2002).

ارزنهای برای جوانهزنی سریع به دمای خاک تا ۱۰ درجه سانتیگراد یا بالاتر نیاز دارند و عموماً تا اوایل جون (اواسط خرداد) کشت نمی‌شوند، این امر از نظر زمانی اجازه کنترل علف‌های هرز در مراحل اولیه کاشت را می‌دهد (Koch, 2002).

با کاهش دما عملکرد دانه کاهش می‌یابد اما دوره پرشدن دانه و رسیدگی فیزیولوژیکی افزایش می‌یابد، عواملی مانند تاخیر در برداشت محصول قبلی (به خصوص در مناطق سردسیر) و بارندگی‌های پائیزه که در برخی موارد اجازه کشت به موقع را به کشاورزان نمی‌دهد، باعث کاهش عملکرد می‌شود. کاهش عملکرد به علت تاخیر در تاریخ کاشت توسط برخی از محققین گزارش شده است (Maiti and Soto, 1990).

گزارشات نشان می‌دهد در شهرستان طبس

گیاه، طول پانیکول، قطر ساقه، رطوبت دانه، تعداد بذر در پانیکول، وزن هزار دانه، نسبت برگ به ساقه و واکنش به عوامل زنده و غیر زنده (خواهیدگی، خسارت پرندگان) انجام شد. از آنجا که برداشت گیاه در دو مرحله صورت گرفت، بنابراین با حذف یک خط از قسمت کناری هر کرت و حذف ۲۵ سانتیمتر از ابتداء و انتهای خط دوم و سوم کرت، برداشت گیاه بصورت علوفه سبز انجام شد. زمان دقیق برداشت علوفه سبز در مرحله ۵۰ درصد شیری برداشت بود. علوفه برداشت شده توزین گردید. دانه بود. علوفه برداشت شده توزین گردید. اندازه گیری عملکرد علوفه خشک و دانه زمانی انجام شد که برگهای پائینی در ارقام به زردی گرایید و پانیکولها به رنگ زرد درآمدند. برداشت علوفه خشک مجدداً از دو خط دیگر صورت گرفت. برای تعیین عملکرد علوفه خشک یک نمونه نیم کیلوگرمی از علوفه تر در آون خشک و توزین شد و سپس بر اساس عملکرد کل، عملکرد علوفه خشک (کاه) محاسبه گردید. نهایتاً با کوییدن نمونه خشک شده، جداسازی دانه صورت گرفت و با توزین بذر استحصالی و کسر کردن این بذر از توزین قبل از کوییدن، وزن خالص علوفه خشک بدست آمد. تعیین میزان رطوبت دانه نیز صورت گرفت و نهایتاً با در اختیار داشتن نتایج یادداشت برداری های و داده های خام تجزیه واریانس مرکب با استفاده از نرم افزار MSTAT-C انجام شد و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح

شد. تاریخ های کاشت شامل: اول خرداد، ۱۵ خرداد، اول تیر و ۱۵ تیر به عنوان کرت های اصلی و پنج لاین امیدبخش ارزن دمروبا هی KFM15، KFM5، KFM7، KFM13 و KFM20 در کرت های فرعی قرار گرفتند. برای اجرای این آزمایش قطعه زمینی به وسعت ۱۵۰۰ مترمربع، در نظر گرفته شد. در این قطعه آزمون خاک با تهیه یک نمونه کامل انجام گرفت تا بر اساس آن کود مصرف شود. لازم به ذکر است که در این آزمایش برای هر تیمار در هر تکرار ۶ خط ۴ متری به فاصله ۵۰ سانتیمتر کاشته شد. قبل از کاشت زمین مورد نظر با انجام شخم، دیسک، لولر آماده گردید و مقدار ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و ۷۰ کیلوگرم در هکتار اوره به خاک اضافه شد. عملیات کاشت بر اساس تاریخ کاشت مورد نظر و نقشه کاشت طرح، بر اساس مقدار ۱۰ کیلوگرم بذر در هکتار انجام شد. عمق کاشت ۲-۳ سانتیمتر در نظر گرفته شد و متعاقباً در دو نوبت و با فاصله زمانی کم آبیاری اولیه صورت گرفت. پس از سبز شدن بذر در صورت عدم وجود تراکمی حدود ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار بوته در هکتار با انجام واکاری یا تنک، تراکم موردنظر تامین گردید. تا زمان رسیدن دانه دوره آبیاری ۷ روز اعمال شد. و جین علف های هرز (بصورت مکانیکی) در مرحله ۶-۴ برگی انجام گردید. در طول دوره رشد گیاه، یادداشت برداری لازم از خصوصیات رویشی و زایشی آن شامل تعداد پنجه، تعداد برگ، ارتفاع

در تاریخ چهارم و اول بطور مشترک بیشتر بود احتمال ۵٪ انجام شد.

(جدول ۲). صفری (Safari, 2007) نیز به این

نتیجه رسید که با تأخیر در کاشت، عملکرد علوفه (تر و خشک) در واحد سطح کاهش می‌یابد. این امر به دلیل کاهش طول فصل رشد و ورود زودتر گیاه به مرحله زایشی نسبت به تاریخ کاشت زودهنگام می‌باشد.

اشراقی نژاد و همکاران

(Eshraghi-Nejad *et al.*, 2011) در تحقیق

خود نشان داد که افزایش طول دوره رشد رویشی در تاریخ‌های کاشت زودتر نسبت به تاریخ‌های کاشت دیرتر سبب شد تا در این تاریخ‌های کاشت در زمان وقوع حداکثر تابش منطقه، گیاهان فرصت کافی برای تولید برگ داشته باشند و در نهایت سطح برگ مطلوبی تویلید نمایند و با شرایط مناسب دما و طول روز تقارن یابند. در اولین تاریخ کاشت، گیاه زمان کافی برای استقرار داشت و از انرژی خورشیدی برای تولید محصول حداکثر بهره‌برداری را برد. امینی (Amini, 1998) در بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه ارزن نوتروفیید نشان داد که تاریخ کاشت زودهنگام (۱۵ اردیبهشت) در ارزن علوفه‌ای نوتروفیید بر روی تویلید علوفه خشک اثر مثبت داشت و با تأخیر در کاشت، عملکرد علوفه خشک کاهش یافت.

تاریخ‌های کاشت اول، دوم و سوم از نظر تعداد پنجه و تعداد برگ نیز وضعیت مناسبتری نسبت به تاریخ کاشت چهارم داشتند

نتایج و بحث

اثر سال بر تعداد پنجه، ارتفاع بوته، طول پانیکول و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر عملکرد علوفه تر و خشک و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار بود، ولی سایر صفات تحت تاثیر سال قرار نگرفتند (جدول ۱).

اثر تاریخ کاشت بر تعداد برگ، طول پانیکول و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد پنجه، ارتفاع، ضخامت ساقه و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار گردید (جدول ۱). عملکرد دانه در تاریخ‌های کشت دوم و سوم و وزن هزار دانه در تاریخ‌های سوم و چهارم میزان بالاتری را دارا بودند (جدول ۲) که این امر شاید به دلیل سپری شدن دوره وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان (نقش حرارت) و یا احتمالاً نقش طول روز باشد. در تحقیقی که بر روی ژنوتیپ‌های مختلف ارزن مرواریدی در تاریخ‌های مختلف کاشت انجام گرفت تفاوت معنی‌داری بین تاریخ‌های مختلف کاشت از نظر وزن هزار دانه مشاهده گردید (Maiti *et al.*, 1995).

هرچند تفاوت معنی‌داری از نظر عملکرد علوفه تر و خشک بین تاریخ‌های مختلف کاشت مشاهده نشد (جدول ۱) اما عملکرد علوفه تر در تاریخ کاشت اول و علوفه خشک

جدول ۱- تجزیه واریانس مرکب برای صفات مختلف ارزن دم رو باهی در تاریخ کاشت های مختلف
Table 1. Combined analysis of variance for different traits of Foxtail Millet in different sowing dates

S.O.V.	منابع تغیرات	درجه آزادی	d.f.	میانگین مربوط (MS)										تعداد پنجه	
				خشک											
				1000 grain weight	Grain yield	Dry forage yield	Fresh forage yield	Hay yield	Stem diameter	Panicle length	Plant height	Leaf number	Tiller number		
Year (Y)	سال	1	0.41**	14.8*	13.8*	99*	1.9 ^{ns}	0.16 ^{ns}	127.4**	1222.0**	0.56 ^{ns}	28.20**			
Replication/Y	تکرار/ سال	4	0.003	4.7	6.5	9.2	15.7	1.18	13.3	151.1	1.60	10.60			
Sowing date (S)	تاریخ کاشت	3	0.29**	8.2*	8.8ns	63.1ns	10.1 ^{ns}	1.30*	32.3**	537.8*	8.90**	4.01*			
S × Y	سال × تاریخ کاشت	3	0.05ns	2.3ns	18.3*	102.3*	1.8 ^{ns}	2.00**	11.1 ^{ns}	2763.0**	1.30 ^{ns}	4.07*			
Error 1	اشتباه ۱	12	0.014	2.6	3.7	30.1	5.5	0.29	4.6	123.6	1.40	1.50			
Line (L)	لاین	4	0.31**	5.8**	1.3ns	41.9**	4.6*	5.50**	303.7**	799.3**	6.20**	54.90**			
Y × L	سال × لاین	4	0.03**	1.5*	2.8*	28.3*	1.6 ^{ns}	0.46 ^{ns}	0.0*	57.8 ^{ns}	1.90**	1.10 ^{ns}			
S × L	لاین × تاریخ کاشت	12	0.006ns	0.87ns	3.13**	13.1ns	4.2*	0.68*	4.7 ^{ns}	56.1 ^{ns}	0.34 ^{ns}	2.70 ^{ns}			
S × L × Y	سال × لاین × تاریخ کاشت	12	0.009ns	0.94ns	1.2ns	8ns	2.5 ^{ns}	0.43 ^{ns}	2.4 ^{ns}	136.0 ^{ns}	0.70 ^{ns}	1.60 ^{ns}			
Error 2	اشتباه ۲	64	0.006	0.63	1.1	9.5	2.1	0.35	3.5	80.9	0.79	3.50			

* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪.

*and**: Significant at the 5%and 1%probability levels, respectively.

ns: Not-significant

غير معنی دار ns

جدول ۲- میانگین برخی صفات ارزن دم روباهی در تاریخ کاشت‌های مختلف
Table 2. Mean comparison for different traits of Foxtail Millet in different sowing dates

تاریخ کاشت Sowing date	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (تن در هکتار)	عملکرد علوفه خشک (تن در هکتار)	عملکرد علوفه تر (تن در هکتار)	طول پانیکول (سانتی متر)	ضخامت ساقه (میلی متر)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	تعداد برگ Leaf number	تعداد پنجه Tiller number
	1000 grain weight (g)	Grain yield (Ton ha ⁻¹)	Dry forage yield (Ton ha ⁻¹)	Fresh forage yield (Ton ha ⁻¹)	Panicle length (cm)	Stem diameter (mm)	Plant height (cm)		
22 May	3.1c	3.4b	9.1a	25.6a	20.3b	5.3ab	123.0b	10.5ab	2.50a
05 June	3.2b	4.3a	8.3b	24.6ab	22.6a	5.4a	132.8a	11.3ab	1.90ab
22 June	3.3a	4.6a	8.7ab	22.7b	22.1a	5.0b	129.8a	11.4a	2.03ab
06 July	3.3a	4.2ab	9.6a	22.7b	22.2a	4.9b	126.3ab	10.4b	1.60b

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level-using Duncan's Multiple Range Test.

جدول ۳- مقایسه میانگین برخی صفات لاین‌های امیدبخش ارزن دم رویاهی
Table 3. Mean comparison for different traits of Foxtail Millet promising lines

لاین امیدبخش	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (تن در هکتار)	عملکرد علوفه تر (تن در هکتار)	عملکرد کاه (تن در هکتار)	ضخامت ساقه (میلی متر)	طول پانیکول (سانتی متر)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	تعداد برگ	تعداد پنجه
Promising line	1000 grain Weight (g)	Grain yield (Ton ha ⁻¹)	Fresh forage yield (Ton ha ⁻¹)	Hay yield (Ton ha ⁻¹)	Stem diameter (mm)	Panicle length (cm)	Plant height (cm)	Leaf number	Tiller number
KFM15	2.99d	4.3b	23.1ab	12.3b	4.3b	19.5c	118.4b	10.2c	4.6a
KFM5	3.2bc	4.9a	24.7a	13.3a	5.4a	27.9a	130.4a	10.5bc	1.3b
KFM7	3.2ab	3.8b	24.9a	12.5b	5.4a	20.3bc	127.2a	11.1ab	1.8b
KFM13	3.3a	4.0b	21.9b	12.3b	5.4a	19.6c	130.6a	11.4a	1.0b
KFM20	3.2c	3.7b	24.9a	13.0b	5.4a	21.6b	133.3a	11.3a	1.4b

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level-using Duncan's Multiple Range Test.

(جدول ۲).

علوفه خشک کمترین حساسیت به کاشت دیرهنگام در مقایسه با سایر ارقام بود و بنابراین می‌توان آن را در صورت آماده نبودن زمین در تاریخ‌های کاشت دیرتر نیز کشت نمود (جدول ۴).

ترتیبی نژاد و همکاران (Torbatinejad *et al.*, 2009) اعلام کرد که علوفه تولید شده در تاریخ کاشت ۱۶ جولای (۲۵ تیر) بیشترین میزان پروتئین را دارا بود، بالاترین میزان خاکستر از تاریخ کاشت اول جولای (۱۰ تیر) بدست آمد و تاریخ کاشت اول جولای برای تولید ارزن دم رو باهی با ویژگی‌های مطلوب برای تغذیه دام در شرایط اقلیمی گرگان توصیه گردید. آرون و همکاران (Aaron *et al.*, 2005) نیز در تحقیقی بر روی تریتیکاله زمستانه گزارش کردند که تأخیر در کاشت و افزایش تراکم گیاهی باعث افزایش درصد پروتئین خام می‌گردد. دلیل این امر این است که تأخیر در کاشت باعث کاهش دوره رویش و کاهش سطح برگ گیاه می‌گردد و در نتیجه باعث کاهش محتوای فiber و افزایش سطح پروتئین در گیاه می‌گردد.

تأخر در تاریخ کاشت موجب کاهش ضخامت ساقه گردید (جدول ۲) که این امر می‌تواند بدلیل استفاده بهتر گیاه از امکانات محیطی در کشت به موقع باشد.

ارقام مورد مطالعه از نظر عملکرد کاه در سطح احتمال ۵ درصد و از نظر بقیه صفات در سطح احتمال یک درصد تفاوت آماری معنی‌دار نشان دادند (جدول ۱). از نظر عملکرد علوفه خشک تفاوتی بین ارقام مورد مطالعه مشاهده نگردید (جدول ۳).

اثر متقابل سال × لاین بر تعداد برگ و وزن هزاردانه در سطح احتمال یک درصد بر طول پانیکول، عملکرد علوفه تر و خشک و عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌دار داشت (جدول ۱). اثر متقابل لاین × تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه خشک در سطح احتمال یک درصد بر قطر ساقه و عملکرد کاه در سطح احتمال پنج درصد تفاوت آماری معنی‌دار بود (جدول ۱). مقایسه میانگین اثر متقابل لاین × تاریخ کاشت برای صفات مورد بررسی نشان میدهد که لاین امیدبخش KFM5 در تاریخ‌های مختلف کاشت از نظر عملکرد

جدول ۴- اثر متقابل لاین × تاریخ کاشت بر برخی صفات لاین‌های امیدبخش ارزن دم روباهی
Table 4. Sowing date × line interaction on some traits of Foxtail Millet promising lines

تاریخ کاشت	لاین	ضخامت ساقه (میلی متر)	عملکرد علوفه خشک (تن در هکتار)	عملکرد کاه (تن در هکتار)
Sowing date	Line	Stem diameter (mm)	Dry forage yield (Ton ha ⁻¹)	Hay yield (Ton ha ⁻¹)
D1	KFM15	4.2h	10.1a	12.5bc
	KFM5	5.6abc	9.2ab	13.3abc
	KFM7	4.9cdefgh	8.6ab	10.4d
	KFM13	5.8ab	7.7b	12.6abc
	KFM20	5.9a	9.5ab	12.2bcd
D2	KFM15	4.5efgh	7.9b	12.7abc
	KFM5	5.7abc	8.8ab	14.5a
	KFM7	5.4abcd	7.9b	13.8ab
	KFM13	5.9a	8.7ab	12.3bcd
	KFM20	5.6abc	7.9b	13.9ab
D3	KFM15	4.3gh	8.9ab	12.8abc
	KFM5	5.1abcdef	8.5ab	12.6abc
	KFM7	5.2abc	9.7ab	12.8abc
	KFM13	5.2abcde	7.7b	12.2bcd
	KFM20	5.1abcdef	8.9ab	13.9ab
D4	KFM15	4.4fgh	9.2ab	11.3cd
	KFM5	5.2abcde	9.3ab	12.8abc
	KFM7	5.5abc	9.1ab	13abc
	KFM13	4.7defgh	10.1a	12.3bcd
	KFM20	5.1bcdefg	10.2a	12.1bcd

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level-using Duncan's Multiple Range Test.

References

- Aaron, J ., Swart, L., Gibson, R., Douglas, L., Karlen, M. L., and Jean-Luc, J. 2005.**
Planting date effect on winter tritical dry matter and nitrogen accumulation. *Agronomy Journal* 97: 1333-1341.
- Amini, M. 1998.** Determination of forage millet to nitrogen in different sowing date. M. Sc. thesis. Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran. (In Persian).
- Anonymous. 2006.** Agricultural Statistics. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran. (In Persian).
- Berzenyi, D., 1990.** Change in growth and growth characteristics and affected by plant density in maize. *Novena Termles* 39 (6): 483-494.
- Bina, G. R. 1993.** Study of plant density effect on yield and its components of three

- species of millet. M. Sc. thesis. Ferdowsi University, Mashhad, Iran. (In Persian).
- Eshraghi-Nejad, M., Kamkar, B., and Soltani, A. 2011.** The effect of sowing date on yield of millet varieties by influencing duration of phonological phases. Electronic Journal of Crop Production 4(2): 169-188.
- Fulkerson, W. J., Neal, J. S., Clark, C. F., Haradagoda, A., Nandra, K. S., and Barchia, I. 2007.** Nutritive value of forage species grown in warm climate of Australia for dairy cows: Grasses and legumes. Livestock Science 107 (2): 253-264.
- Howell, T. A., 1990.** Grain dry matter yield relations for winter wheat and sorghum. Agronomy Journal 82: 912-918.
- Khodabandeh, N. 1991.** Cereals. Nashre- Sepehr Press. Tehran, Iran. 508 pp.
- Koch, D. W. 2002.** Foxtail Millet: Management for Supplemental and Emergency Forage. University of Wyoming Cooperative Extension Publication B-1122.3.
<http://ces.uwyo.edu/PUBS/B1122-3.pdf>.
- Maiti, R. K., Lopej, U. R., and Gamboa, L. A. F. 1995.** Effect of sowing date on the physiological maturity, grain filling and germination of 15 pearl millet cultivars. International Sorghum and Millets Newsletter 36: 57-58.
- Maiti, R. K., and Soto, G. L. 1990.** Effect of four sowing date environments on growth and development of 15 pearl millet cultivars during autumn-winter seasons in Marin, Nuvo Leon, Mexico. Journal of Experimental Botany 41: 1609-1618.
- Modir-Shanehchi, M. 1992.** Production and Management of Forage Crops. 2nd edition Astan-e-Ghods Press. 448 pp.
- Sen, D. K., and Hamidm, M. A. 1986.** Character association and path analysis in proso millet (*Panicum miliaceum*). Thai Journal of Agricultural Science 19(4): 307-312.
- Safari, F. 2007.** Effect of sowing date and plant density on Foxtail Millet yield. M. Sc. Thesis. University of Agricultural and Natural Resources Sciences of Gorgan, Gorgan, Iran. (In Persian).
- Torbatinejad, N., Galeshi, S., and Ghoorchi, T. 2009.** Evaluation by chemical and *in vitro* gas production techniques of Foxtail Millet grown in north of Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12): 2662-2667.