

ارزیابی کیفیت نانوایی ارقام و لاین‌های گندم نان با استفاده از آزمایش ارتفاع رسوب SDS و زیرواحدهای گلوتنین سنگین

Evaluation of Bread Making Quality of Bread Wheat Cultivars and Lines Using SDS- Sedimentation Volume and High Molecular Weight Glutenin Subunits

رضا نیکوسرشت^۱، گودرز نجفیان^۲، رضا قلی میرفخرائی^۳ و حمید دهقانی^۳

- ۱ مریبی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
- ۲ استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
- ۳ به ترتیب مریبی و دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۱۲/۱

چکیده

نیکوسرشت، ر.، نجفیان، گ.، میرفخرائی، ر.ق.، و دهقانی، ح. ۱۳۸۸. ارزیابی کیفیت نانوایی ارقام و لاین‌های گندم نان با استفاده از آزمایش ارتفاع رسوب SDS و زیرواحدهای گلوتنین سنگین. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱-۲۵: ۳۸۳-۳۷۳.

تعداد ۵۷ لاین پیشرفته گندم آبی مناطق معتدل کشور به منظور بررسی رابطه بین زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا و ارتفاع رسوب SDS، انتخاب شدند. جداسازی الکتروفورزی با روش SDS-PAGE انجام شد و برای تعیین کیفیت از ارتفاع رسوب SDS استفاده شد. در مکان ژنی Glu-A1 سه زیرواحد، در مکان ژنی Glu-B1 پنج زیرواحد و در مکان ژنی Glu-D1 دو زیرواحد شناسایی شدند. نتایج نشان داد که بین زیرواحدهای ۱ از مکان ژنی Glu-A1، ۱۷+۱۸ از مکان ژنی Glu-B1 و ۵+۱۰ از مکان ژنی Glu-D1 با ارتفاع رسوب SDS همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. در تجزیه رگرسیون گام به گام، دو آلل نول از جایگاه ژنی Glu-A1 و ۲+۱۲ از جایگاه ژنی Glu-D1 با تأثیر منفی بر ارتفاع بالای رسوب SDS و دو زیرواحدهای ۱۳+۱۶ و ۱۷+۱۸ از جایگاه ژنی Glu-B1 با تأثیر مثبت بر ارتفاع بالای رسوب SDS وارد مدل شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که زیر واحد ۱ از جایگاه ژنی Glu-A1، زیر واحد ۱۳+۱۶ از جایگاه ژنی Glu-B1 و زیر واحد ۵+۱۰ از جایگاه ژنی Glu-D1 دارای بالاترین میانگین ارتفاع رسوب SDS در جایگاه‌های ژنی سه گانه بودند.

واژه‌های کلیدی: گندم، الکتروفورز، زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا، ارتفاع رسوب SDS.

مقدمه

از: (Weegels *et al.*, 1996)

Weegels *et al.* (1996) در تحقیقی توسط مشخص شد که میزان زیرواحدهای سنگین گلوتنین که به وسیله روش‌های متفاوتی تعیین می‌شوند قادر به توجیه اختلافات ارقام در حجم قرص نان (۸۷-۲۰٪) و میزان پروتئین (۷۶-۱۰٪) هستند.

در آزمایشی که با ۱۷۴ رقم بومی اسپانیایی از گندم‌های نان (*Triticum aestivum*) برای بررسی ارتباط بین زیرواحدهای سنگین گلوتنین و استحکام گلوتن، از طریق اندازه‌گیری ضریب رسوب SDS، توسط Rodriguez and Carrillo (1994) انجام شد، ارتباط معنی‌داری بین حجم‌های بالای رسوب SDS و زیرواحدهای سنگین گلوتنین ۱ و ۲ از جایگاه ۱۳+۱۶، ۷+۸ و ۵+۱۰ از جایگاه ۷+۸، و زیرواحد Glu-B1 از جایگاه ۱۳+۱۶ و ۱۳+۱۶ از جایگاه Glu-D1 مشاهده شد. بین حجم‌های پایین رسوب SDS و آلل نول از جایگاه ۷+۸ و ۲۰ از جایگاه Glu-A1، زیرواحدهای ۶+۸ و ۲۰ از جایگاه Glu-B1، زیرواحدهای ۴+۱۲ و ۳+۱۳ و ۲+۱۲ از جایگاه ۷+۸ *Glu-D1* نیز ارتباط معنی‌داری وجود داشت.

Mirali و همکاران (Mirali *et al.*, 1999) در بررسی ارتباط بین زیرواحدهای سنگین گلوتنین و استحکام گلوتن مشاهده کردند که جایگاه ۷+۸ *Glu-D1* مهم‌ترین مکان ژنی است که در آن زیرواحد ۵+۱۰ دارای ارزش بالا در این ارتباط است و زیرواحدهای ۱۳+۱۶ و ۱۷+۱۸ از

گندم (*Triticum aestivum L.*) مهم‌ترین گیاه زراعی دنیا است و براساس نتایج آمارگیری وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی ۱۳۷۸-۷۹ ۱۳۷۸ هکتار بود گندم در ایران ۵/۱ میلیون هکتار بود (Anonymous, 2000). مصرف گندم در ایران مربوط به تولید نان است و هر ساله بیش از ۹۰ درصد آن در این جهت مصرف می‌شود.

مطلوبیت آرد برای تهیه نان بستگی به کیفیت و کمیت گلوتن آن دارد. گلوتن گندم شامل گلوتنین‌ها و گلیادین‌ها است که از مدت‌ها قبل به عنوان عامل تعیین کننده ارزش نانوایی در گندم شناخته شده‌اند. این دو گروه مجموعاً ۸۵ درصد از پروتئین ذخیره‌ای در گندم را تشکیل می‌دهند. گلوتنین‌ها خود از نظر وزن مولکولی به دو گروه با وزن مولکولی بالا (HMW-GS) و وزن مولکولی پایین (LMW-GS) تقسیم می‌شوند.

اولین مطالعه در مورد پروتئین‌های بذر گندم توسط Osborn در سال ۱۹۰۷ میلادی انجام شد. در این مطالعه پروتئین‌های بذر گندم براساس حلالت به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه آلبومین‌ها و گلوبولین‌های محلول در آب و محلول در حلالت نمکی بودند که دارای فعالیت‌های متابولیکی هستند. دو گروه دیگر گلوتلین‌ها و پرولامین‌ها یا گلیادین‌ها غیرفعال و نامحلول هستند (به نقل

آبی انتخاب شده از آزمایش‌های به نژادی گندم مناطق معتدل کشور بودند. ژنوتیپ‌ها در سال زراعی ۱۳۸۰-۸۱ در آزمایش مقایسه عملکرد لاین‌های پیشرفته گندم (ARWYT)، در استنگاه‌های مناطق معتدل کشور کاشته شدند. از ارقام امید (۲+۱۲، ۷+۸، نول)، مرودشت (۲+۱۲، ۷+۸، ۲*) و گلستان (۵+۱۰، ۱۷+۱۸، نول) به عنوان ارقام استاندارد جهت شناسایی زیرواحدهای گلوتنین سنگین استفاده شد. باندهای دیگر نیز با توجه به حرکت نسبی آن‌ها نسبت به باندهای فوق شناسایی شدند.

استخراج پروتئین‌ها و الکتروفورز با استفاده از روش SDS-PAGE پیشنهاد شده توسط دقت در تشخیص زیرواحدهای گلوتنین، Fullington *et al.*, (1983) برای الگوهای الکتروفورزی لاین‌ها چهار بار (چهار بذر از هر لاین) تکرار شد. در ژل تحتانی ۱۰٪ بعضی از زیرواحدها مانند زیر واحد های ۲ و ۲* که تحرک نسی متشابه دارند و به خوبی از هم جدا نمی‌شوند، برای اطمینان در تشخیص این زیرواحدها از ژل رقیق تر ۷/۵٪ استفاده شد. از آزمایش حجم رسوب SDS (Quick and Donnelly, 1980) برای تعیین کیفیت نانوایی در سه تکرار استفاده شد. تجزیه همبستگی و رگرسیون گام به گام بین زیرواحدهای سنگین گلوتنین و کیفیت نانوایی (آزمایش حجم رسوب SDS)، از روش Lapin (1990) انجام شد. حضور و عدم حضور هر آلل در زیرواحدهای گلوتنین به ترتیب با

در جایگاه ژنی Glu-B1 مهم‌ترین آلل‌ها در ارتباط با ارتفاع رسوب SDS هستند. آلل‌های موجود در جایگاه ژنی Glu-A1 تأثیری بر حجم رسوب SDS نداشتند.

آزمون رسوب SDS که معرف استحکام گلوتن است (Kavacs *et al.*, 1994) کیفیت پخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثر استحکام گلوتن بر کیفیت پخت بیش از اثر محتوای پروتئین گزارش شده است. میزان ارتفاع رسوب SDS نیز با شاخص پخت ارتباط دارد.

بحرائی (Bahraei, 2000) خواص کیفی و خلوص ژنتیکی تعدادی از ارقام و لاین‌های گندم دوروم را با استفاده از زیرواحدهای گلوتنین‌های سنگین مورد مطالعه قرارداد و نتیجه گرفت که با استفاده از نشانگرهای پروتئین ذخیره بذر می‌توان کیفیت آرد ژنوتیپ‌های مختلف را تعیین کرد.

در ایران هر چند که بررسی‌هایی در مورد کیفیت ارقام گندم نان انجام شده است (Haghparast *et al.*, 2009; Bahraei, 2003) ولی هنوز اطلاعات کافی در این زمینه ناچیز است.

هدف از این تحقیق، مطالعه زیرواحدهای سنگین گلوتنین لاین‌های پیشرفته گندم آبی مناطق معتدل کشور و به دست آوردن رابطه این زیرواحدها با کیفیت نانوایی گندم (ارتفاع رسوب SDS) بود.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی شامل ۵۷ لاین پیشرفته گندم

به ترتیب با فراوانی های ۰/۴۶۵، ۰/۴۸۳ و ۰/۷۰۷، بالاترین تعداد مشاهدات را در مکان های ژنی سه گانه داشتند.

همبستگی بین زیرواحدهای گلوتین با وزن مولکولی بالا و ارتفاع رسوب SDS در مکان ژنی *Glu-A1*، همبستگی مثبت و معنی داری بین زیرواحد (باند) ۱ و ارتفاع رسوب SDS بالا وجود داشت (جدول ۳). با حضور این زیرواحد در مکان ژنی فوق پروتئین های بذر، ارتفاع رسوب بالا رفته و این زیرواحد بر روی کیفیت نانوایی گندم اثر مثبت دارد. این نتیجه که در مکان ژنی *Glu-A1*، وجود زیرواحد ۱ باعث افزایش ارتفاع رسوب *Payne et al.* (1984) با نتایج SDS شده، *Rodriguez and Carrilo* (1994) و *Strohm et al.* (1996) مطابقت دارد.

در مکان ژنی *Glu-B1*، زیرواحدهای ۷+۹ همبستگی منفی و معنی داری با ارتفاع رسوب SDS به دست آمد، بنابراین وجود این زیرواحد باعث کاهش کیفیت نانوایی می شود. بین زیرواحد ۱۷+۱۸ و ارتفاع رسوب همبستگی مثبت و معنی داری به دست آمد که نشان می دهد وجود این زیرواحد، باعث بهبود کیفیت نانوایی در گندم می شود. *Gupta et al.* (1995) نتایج تحقیقات *Payne and Lawrence* (1983) و *Mirali et al.* (1999) نیز نشان داد که در مکان ژنی *Glu-B1*، زیرواحدهای ۱۳+۱۶ و ۱۷+۱۸ تأثیر مثبت بر روی ارتفاع رسوب SDS و.

اعداد یک و صفر در هر نمونه مشخص و تجزیه همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. برای بررسی اثر مکان های ژنی گلوتین با وزن مولکولی بالا بر روی صفات کیفیت نانوایی، تجزیه واریانس یک طرفه با تکرار نامساوی با استفاده از گزینه PROC GLM در نرم افزار SAS انجام شد.

نتایج و بحث

شماره و پدیگری لاین ها و ارقام آزمایشی در جدول ۱ نشان داده شده است.

وضعیت زیرواحدهای گلوتین با وزن مولکولی بالا

در پژوهش انجام شده نوع، تعداد و فراوانی زیرواحدهای گلوتین با وزن مولکولی بالا در ارقام و لاین های مورد مطالعه شناسایی شدند. در مکان ژنی *Glu-A1* مجموعاً سه آلل (۱، ۲* و نول) شناسایی شدند. آلل نول بیشترین فراوانی داشت و زیرواحد ۲* دارای کمترین فراوانی در بین لاین های مورد آزمایش بود. در مکان ژنی *Glu-B1*، پنج زیرواحد (۷، ۷+۸، ۷+۹، ۱۳+۱۶ و ۱۷+۱۸) مشاهده شد. زیرواحد ۷+۸ بیشترین فراوانی و زیرواحد ۷ کمترین فراوانی را داشتند. در مکان ژنی *Glu-D1* دو زیرواحد (۲+۱۲ و ۵+۱۰) شناسایی شد و فراوانی زیرواحد ۲+۱۲ بیشتر از زیرواحد ۵+۱۰ بود (جدول ۲ و شکل های ۱ و ۲).

در این پژوهش آلل های نول، ۷+۸ و ۷+۹


جدول ۱- پدیگری ارقام و لینهای گندم نان استفاده شده در آزمایش

Table 1. Pedigree of bread wheat cultivars and lines used in the experiment

| Line no. | Pedigree |
|----------|--|
| 1 | Marvdasht (Check) |
| 2 | Flt/Tjn |
| 3 | Flt//Maya"S"/Nac |
| 4 | 1-61-12/Tjn |
| 5 | Azd//Tob/Chb/3/MV 16 |
| 6 | Bow"S"/Nkt"s"/Mrn |
| 7 | F12.71/Coc//Seri/3/Arvand/Glennson |
| 8 | Opata*2/Wulp"S"/Zrn |
| 9 | T.Aest/5/Ti/4/La/3/Fr/Kad//Gb/6';F13471/Crow" |
| 10 | Ures 81//HD 2206/Hork"S"/3/Tbs/Flt |
| 11 | Ures 81//HD 2206/Hork"s"/3/1-67-78 |
| 12 | Ures 81//HD 2206/Hork"s"/3/1-67-78 |
| 13 | Fln/Acc//Ana/3/Pew"S"/4/F12.71;Coc//Cno 79 |
| 14 | M-70-4/5/Ures/3/Gov/Az//Mus/4/Sara |
| 15 | M-70-4/5/Ures/3/Gov/Az//Mus/4/Sara |
| 16 | Nik.N/5/Qt/Ravi66//Mxp65/3/Rsh/4/Za75 |
| 17 | Nik.N/3/Kjl/Maya"S"/Mon"S" |
| 18 | Mhdv/HD 2380 |
| 19 | M-70-13/Kauz"S" |
| 20 | 1-70-17/T.AestxTi(La(Fr-KadxGb))^2 |
| 21 | ID 1301/Mlt"S"/MV 16 |
| 22 | Alvd/MV 17 |
| 23 | Alvd/MV 17 |
| 24 | GK.Zombor/Attila |
| 25 | CHAM-6/4/Sissonais/Depres//Cal/Hu/3/Ald"S" |
| 26 | TOW"S"/PEW"S"/Shi#4414/Crow"S" |
| 27 | Cham-6//Seri*3/Buc |
| 28 | Flt/5/Rbs/Anza/3/Kvz/Hys//Ymh/Tob/4/Bow"S" |
| 29 | Rasul//Omid/Alamo |
| 30 | Hirmand/Attila |
| 31 | Hirmand/Attila |
| 32 | Hirmand/Attila |
| 33 | Hirmand/Mahdavi |
| 34 | Kavko/Ald"S"/Azd |
| 35 | Hahn"S"/Mjl/Lira//Rsh2 |
| 36 | Hahn"S"/Mjl/Lira//Rsh2 |
| 37 | Hahn"S"/Mjl/Lira//Rsh2 |
| 38 | Hahn"S"/Mjl/Lira//Rsh2 |
| 39 | Hahn"S"/Mjl/Lira//Rsh2 |
| 40 | Bb/Cll//Cj71/3/T.aest//Kall/Bb/4/Azd |
| 41 | Bez//Tob/8156/4/On/3/6*th../5/Azd |
| 42 | Hmd/6/Ti/Pch/5/Mt484 |
| 43 | Sonalika/Aurifen//Bow"S"/Atilla |
| 44 | Sonalika/Aurifen//Bow"S"/Atilla |
| 45 | F12-71/Coc//Seri/3/Ures81/Hd... |
| 46 | Ald"S"/Snb"S"/Bow"S"/Nkt |
| 47 | Ures 81//HD2206/Hork"S"/3/Lorin24/Coc75 |
| 48 | Azd//Vee#1/V-83035 |
| 49 | Azd//Vee#1/V-83035 |
| 50 | Azd/Vee#1//Id13-11Mlt |
| 51 | Azd//Hd2172/5/Ti/4/La/3/Fr//Kad.Gb |
| 52 | Azd//Hd2172/5/Ti/4/La/3/Fr//Kad.Gb |
| 53 | V-83035/1-67-72 |
| 54 | Ald"S"/Snb"S"/PK 15841 |
| 55 | IRENA/KAUZ |
| 56 | CHAM 4/SHUHA'S' |
| 57 | KAUZ/LUCO-M//PVN/STAR CMBW90M4977-OTOPY-87M... |
| 58 | CBRD/KAUZ CMBW90M2494-14M-010M-010Y-... |

ژنوتیپ‌هایی که پدیگری مشابهی دارند لینهای خواهر هستند.


Getotypes with similar pedigrees are sister lines.



شکل ۱- الکتروفورگرام بعضی از ارقام و لاین های گندم نان به روش SDS-PAGE روی ژل ۱۰٪.
اعداد بالای ژل شماره لاین ها را نشان می دهد (ارقام استاندارد: مرودشت، گلستان، امید؛ به جدول ۱ مراجعه شود).

Fig. 1. Electroforogram of bread wheat cultivars and lines with SDS-PAGE method on 10% gel

Numbers above the gel shows line no. (see Table 1; Standard cultivars: Marvdasht, Golestan, Omid).



شکل ۲- الکتروفورگرام بعضی از ارقام و لاین های گندم نان به روش SDS-PAGE بر روی ژل ۷/۵٪
برای تشخیص باندهای ۲ و ۲*

Fig. 2. Electroforogram of bread wheat cultivars and lines with SDS-PAGE method on 7.5% gel for identification of 2 and 2* bands

جدول ۲- نوع، تعداد و فراوانی نسبی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در ارقام و لاینهای گندم نان

Table 1. Type, number and frequency of high molecular weight glutenin subunits in bread wheat cultivars and lines

| جایگاه زنی Gene loci | شماره آلل Allele no. | آلل Allele | تعداد Number | فراوانی نسبی Frequency |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| <i>Glu-A1</i> | 1 | 1 | 8 | 0.139 |
| | 2 | 2* | 23 | 0.396 |
| | 3 | null | 27 | 0.465 |
| <i>Glu-B1</i> | 1 | 7 | 2 | 0.034 |
| | 2 | 7+8 | 28 | 0.483 |
| | 3 | 7+9 | 17 | 0.293 |
| | 4 | 13+16 | 2 | 0.034 |
| | 5 | 17+18 | 9 | 0.156 |
| <i>Glu-D1</i> | 1 | 2+12 | 41 | 0.707 |
| | 2 | 5+10 | 17 | 0.293 |

زیرواحد روی کیفیت نهایی آرد را گزارش کرده‌اند.

برای تعیین اثر زیرواحدهای سنگین گلوتنین (انفرادی یا گروهی) بر ارتفاع رسوب SDS از تجزیه رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شد. بر این اساس در چهار مرحله و در هر مرحله یک مدل تکامل یافته‌تر برای اثر زیرواحدها بر روی ارتفاع رسوب به دست آمد. در مدل چهارم اثر زیرواحدهای ۲+۱۲، نول، ۱۷+۱۸ و ۱۳+۱۶ مشخص شد. در این مدل b_1 برابر $13+16$ ، b_2 برابر $13/205$ ، b_3 برابر $10/997$ ، b_4 برابر $10/621$ و عرض از مبدأ برابر $46/552$ به دست آمد. همچنین R2 تصحیح شده در این مدل برابر 0.665 بود و بر اساس این مدل $5.66/5$ از تغییرات ارتفاع رسوب SDS توسط زیرواحدهای فوق توجیه شد. می‌توان نتیجه گرفت که $5.33/5$ ٪ از تغییرات می‌تواند توسط عوامل دیگری مانند زیرواحدهای L.M.W. گلیادین‌ها یا سایر عوامل توجیه شود،

صفات کیفیت دارند (جدول ۳) در مکان ژنی *Glu-D1* بین زیر واحد ۲+۱۲ و ارتفاع رسوب همبستگی منفی و معنی‌داری دیده شد. بنابراین وجود این زیر واحد باعث کاهش ارتفاع رسوب می‌شود، اما زیر واحد ۵+۱۰ تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روی ارتفاع رسوب SDS داشت و وجود ایzen زیر واحد باعث افزایش ارتفاع رسوب SDS شد. تحقیقات محققین مختلف از جمله Rodriguez and Carrillo (1994) و Mirali et al. (1999) نشان می‌دهد که زیر واحد ۵+۱۰ باعث افزایش ارتفاع رسوب SDS و زیر واحد ۲+۱۲ باعث کاهش آن می‌شود. Gupta et al. (1995) تأثیر مثبت زیر واحد ۵+۱۰ روی افزایش مقاومت خمیر، Rogers et al. (1991) تأثیر مثبت زیر واحد ۵+۱۰ روی خواص کیفی و نقش مثبت آن Jones and Cadle (1997)

جدول ۳- همبستگی بین زیرواحدهای گلوتنین سنگین و ارتفاع رسوب SDS

Table 3. Correlation between HMW glutenin subunits and SDS – Sedimentation

| زیرواحد | 1 | 2* | Null | 7 | 7+8 | 7+9 | 13+16 | 17+18 | 2+12 | 5+10 |
|-------------------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| ارتفاع رسوب | | | | | | | | | | |
| SDS-sedimentation | 0.31* | 0.01 | -0.22 | 0.06 | -0.18 | -0.26* | 0.24 | 0.42* | -0.42* | 0.46* |

* : Significant at 5% level.

: معنی دار در سطح احتمال ۵٪

جدول ۴- میانگین مربعات (MS) و R^2 مدل تجزیه واریانس برای ارتفاع رسوب SDS

Table 4. Mean squares and R^2 of variance analysis model for SDS - Sedimentation

| S.O.V. | df. | M.S. |
|----------------|-----|------------|
| Model | 15 | 229.486** |
| Glu-A1 | 2 | 237.557** |
| Glu-B1 | 4 | 341.982** |
| Glu-D1 | 1 | 1334.735** |
| Glu-A1*Glu-B1 | 5 | 49.232 ns |
| Glu-A1*Glu-D1 | 2 | 2.970 ns |
| Glu-B1*Glu-D1 | 1 | 2.970 ns |
| Error | 42 | 23.237 |
| C.V.% = 13.994 | | |
| $R^2 = 0.779$ | | |

.ns و **: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪.

ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively .

بیشترین تغییرات را توجیه می کند، به عنوان بهترین مدل در رابطه با آلل های مذکور معرفی می شود.

این یافته ها با نتایج بررسی محققین دیگر و همچنین نتایج همبستگی که در بالا اشاره شده مطابقت دارد و تأثیر مثبت زیرواحدهای ۱۷+۱۸ و ۱۳+۱۶ و تأثیر منفی زیرواحدهای ۲+۱۲ و آلل نول را بروی ارتفاع رسوب SDS نشان

بنابراین می توان رابطه زیر را برای این مدل در نظر گرفت:

$$\hat{Y} = 46/552 - 10/143 - 13/205 + 10/621 + 10/997 + 10/118 + 10/16 + 10/18$$

همان طوری که مشاهده می شود برای ارتفاع رسوب SDS، آلل های ۱۷+۱۸ و ۱۳+۱۶ با تأثیر مثبت و آلل های نول و ۲+۱۲ با تأثیر منفی در مدل قرار گرفتند. بنابراین چون این مدل

جدول ۵- مقایسه میانگین سه مکان ژنی برای ارتفاع رسوب SDS

Table 5. Mean comparison of three gene loci for SDS – Sedimentation

| مکان ژنی Loci genic | آلل Allele | میانگین Means | گروه Groups |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| <i>Glu-A1</i> | 1 | 41.25 | A |
| | 2* | 34.69 | B |
| | Null | 32.48 | B |
| | 13+16 | 45.50 | A |
| | 17+18 | 43.11 | AB |
| <i>Glu-B1</i> | 7 | 37.50 | BC |
| | 7+8 | 32.96 | C |
| | 7+9 | 31.06 | C |
| <i>Glu-D1</i> | 5+10 | 40.76 | A |
| | 2+12 | 32.00 | B |

انجام شد (جدول ۵).

در مکان ژنی *Glu-A1* زیرواحد ۱ بالاترین میانگین ارتفاع رسوب SDS را داشت و اختلاف معنی‌داری با زیرواحد ۲* و آلل نول نشان داد، بنابراین در این مکان ژنی اثر مثبت زیرواحد ۱ بر ارتفاع رسوب SDS از دو زیرواحد دیگر بیشتر بود.

در مکان ژنی *Glu-B1* زیرواحدهای ۱۳+۱۶ بالاترین میانگین ارتفاع رسوب را داشت ولی اختلاف معنی‌دار با زیرواحدهای ۱۷+۱۸ نداشت. زیرواحدهای ۷+۹ دارای پایین‌ترین ارتفاع رسوب SDS بودند و با زیرواحدهای ۷ و ۷+۸ تفاوت معنی‌دار نداشتند و در یک گروه قرار گرفتند. این امر نشان می‌دهد که زیرواحدهای ۱۳+۱۶ و ۱۷+۱۸ باعث افزایش ارتفاع رسوب SDS و زیرواحدهای ۷+۸، ۷+۹ و ۷ باعث کاهش ارتفاع رسوب می‌شوند. Gupta et al. (1995)

می‌دهد.

تعیین ارتفاع رسوب SDS در هر یک از ارقام گندم مورد مطالعه بر اساس زیرواحدهای موجود در مدل انجام می‌شود. به عنوان مثال اگر ژنتیکی دارای آلل نول در مکان ژنی *Glu-A1* آلل ۱۷+۱۸ و در مکان ژنی *Glu-B1* باشد برآورده ارتفاع رسوب آن برابر است با:

$$\hat{Y} = 46/552 - 10 \cdot 143 + 10 \cdot 997 = 47/406$$

برای تجزیه واریانس زیرواحدهای گلوتنین و ارتفاع رسوب SDS، مکان‌های ژنی به عنوان فاکتور اصلی و آلل‌های هر مکان به عنوان سطوح آن فاکتور در نظر گرفته شد. این آزمون برای اثر اصلی معنی‌دار بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در هر مکان ژنی، حداقل بین دو زیرواحد از نظر تأثیر بر ارتفاع رسوب SDS اختلاف معنی‌دار وجود دارد (جدول ۴).

برای درک بهتر اثر آلل‌ها، آزمون دانکن برای مقاله زیرواحدهای مختلف هر مکان ژنی

بالاتری هستند. ضریب همبستگی زیرواحدهای ۵+۱۰ با ارتفاع رسوب SDS نیز مثبت و معنی دار شده بود که مؤید مطلب فوق است.

با توجه به نتایج این تحقیق، داشتن آگاهی از وضعیت زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در والدین و انتخاب والدین واجد زیرواحدهای مورد نظر جهت برنامه های به نژادی گندم و نیز انتخاب نتاج در نسل های در حال تفکیک بر اساس زیرواحدهای فوق، به عنوان مارکرهای بیوشیمیایی که از نظر کیفیت نانوایی مطلوب باشند ما را جهت به دست آوردن نتاج با کیفیت نانوایی بالا یاری می کند و به دست آوردن نتاج با کیفیت نانوایی بالا و زیرکشت بردن آنها به جای ارقام موجود باعث کاهش ضایعات نان شده و از واردات بیشتر گندم جلو گیری می کند.

References

- Gupta, R. B., Khan, K., and Macritche, F. 1995.** Biochemical basis of flour properties in bread wheats. Cereal Chemistry 18: 23-41.
- Haghparast, R., Rajabi, R., Najafian, G., Rashmekarim, K., and Aghae Sarbarzeh, M. 2009.** Evaluation of indices related to grain quality in advanced bread wheat genotypes under rainfed conditions. Seed and Plant Improvement Journal 25-1: 315-328 (in Farsi).
- Jones, S., S. and Cadle, M. 1997.** Effect of variation at *Glu-D1* on club wheat end-use quality. Plant Breeding 116: 69-72.
- Kavacs, M. I. P., Dahlke, G., and Noll, S. 1994.** Gluten visco elasticity: its usefulness in the Canadian durum wheat breeding program. Cereal Science 19: 251-257.
- Lapin, L. L. 1990.** Probability and Statistic for Modern Engineering 2nd . PWK-Kent, Boston.
- Mirali, N., Arabi, M. I. E., and Safadi, B. 1999.** High molecular weight glutenin subunits composition of Syrian grown bread wheat and its relationships with gluten strength. Genetics and Breeding 53: 237-245.
- Payne, P. I., Holt, L. M., Jackson, E. A., and Low, C. N. 1984.** Wheat storage proteins: their genetics and their potential for manipulation by plant breeding. Philos. Trans. R. Soc. London, ser B, 304: 359-371.
- Payne, P. I., and Lawrece, J. 1983.** Catalogue of alleles for the complex gene loci *Glu-B1* and *Glu-D1* which code for high molecular weight subunits of glutenin in hexaploid wheat. Cereal Research Communications 11: 29-35.
- Quick, J. S., and Donnelly, B. J. 1980.** A rapid test for estimating durum wheat gluten quality. Crop Science 20: 816-818.
- Rodriguez, Q. M., and Carrillo, J. 1994.** Relationship between high molecular weight glutenin subunits and gluten strength in Spanish landraces of *Triticum aestivum*. Investigacion-Agraria, Production-Y-Proteccion-Vegetals 9: 327-339.
- Rogers, W. J., Payne, P. I., Seekings, J. A., and Sayers, E. J. 1991.** Effect on bread making quality of x-type and y-type high molecular weight subunits of glutenin. Cereal Science 14: 209-221.
- Strohm, T. S., Paynet, P. I., and Salovaara, H. 1996.** Effects of allelic variation of glutenin subunits and gliadins on baking quality in the progeny of two biotypes of bread wheat cv. Ulla. Creal Science 24: 115-124.
- Weegels, P. L., Hamer, R. J., and Schofield J. D. 1996.** Functional properties of wheat glutenin. Cereal Science 23: 1-17.