

بررسی مقاومت ارقام گندم نان به شته روسی در مراحل رشدی گیاهچه و طویل شدن ساقه

Evaluation of Resistance of Bread Wheat Cultivars to Russian Wheat Aphid at Seedling and Stem Elongation Growth Stages

پوریا همدانیان^۱، عبدالهادی حسینزاده^۲، توحید نجفی میرک^۳ و امیرحسین نوربخش^۴

۱، ۲ و ۴- به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشیار و کارشناس ارشد، پردیس کشاورزی و

منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

۳- استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۹/۲۶ تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۹/۱۰

چکیده

همدانیان، پ، حسینزاده، ع، نجفی میرک، ت، و نوربخش، ا.ح. ۱۳۸۹ بررسی مقاومت ارقام گندم نان به شته روسی در مراحل رشدی گیاهچه و طویل شدن ساقه. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱-۲۶: ۴۲-۴۷.

تعداد ۲۲۵ رقم گندم نان بهاره به همراه ۵۰ رقم شاهد شعله (حساس) و آزادی (مقاوم) در دو مرحله رشدی گیاهچه و طویل شدن ساقه برای مقاومت به شته روسی گندم در گلخانه ارزیابی شدند. از پنج شته بالغ بدون بال به ازاء هر گیاه در هر گلدان برای آلوده‌سازی استفاده شد. صفت درصد کلروز برگ در مراحل گیاهچه و طویل شدن ساقه و صفت درصد پیچیدگی برگ در مرحله گیاهچه اندازه‌گیری شدند. پس از برداشت گیاهان صفات مرفولوژیکی و زراعی ارقام نیز اندازه‌گیری شدند. ارقام رسول، مهدوی و ارونده بیشترین مقاومت و رقم کارون کمترین مقاومت در آلودگی مرحله گیاهچه‌ای را داشتند. درصد پیچیدگی برگ و کلروز برگ در مرحله آلودگی گیاهچه همبستگی معنی‌داری با هم نداشتند. ارقام آزادی، طبسی، بیات و کویر مقاوم‌ترین و ارقام شعله، کارون، رسول و بولانی حساس‌ترین ارقام در آلودگی مرحله طویل شدن ساقه بودند. در آلودگی مرحله طویل شدن ساقه، بین صفت درصد کلروز گیاه و صفات دیگر همبستگی معنی‌داری وجود نداشت. آلودگی با شته روسی در مرحله گیاهچه صفات تعداد دانه در سنبله و طول پدانکل را به طور معنی‌داری کاهش داد (به ترتیب ۲۱ و ۲۳ درصد) درحالی که آلودگی در مرحله طویل شدن ساقه کاهش معنی‌داری در صفات طول پدانکل و وزن خشک گیاه ایجاد کرد (به ترتیب ۲۰ و ۱۷ درصد). نتایج کلی نشان داد که ارقام گندم در مرحله گیاهچه نسبت به مرحله طویل شدن ساقه به آلودگی شته روسی حساس‌تر هستند.

واژه‌های کلیدی: گندم نان، ارقام، شته روسی، مقاومت، کلروز برگ، پیچیدگی برگ.

مقدمه

شته روسی گندم معمولاً از برگ‌های نزدیک به انتهای بالایی گیاه شروع به تغذیه می‌کند. بعد از توسعه کلونی، برگ‌ها حالت لوله‌ای به خود گرفته و یک ساختار حفاظتی برای شته‌ها ایجاد می‌کنند. این برگ‌های پیچیده شته‌ها را از شرایط نامساعد آب و هوایی، دشمنان طبیعی و حشره‌کش‌های شیمیایی حفظ می‌کند (نجفی میرک و همکاران، ۲۰۰۴b؛ Westhuizen *et al.*, 1995). این حشره علاوه بر تغذیه مستقیم از شیره گیاهی با تزریق توکسین در محل‌های تغذیه باعث تخریب کلروپلاست گیاهی شده و نوارهای طولی زرد و سفید و گاهی ارغوانی رنگ بر روی برگ‌های گیاه میزان ایجاد می‌کند، که یکی از علائم تغذیه شته روسی گندم، همین کلروزشدن برگ‌ها است (Du Toit *et al.*, 1989؛ Burd *et al.*, 1992).

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که به طور کلی هر سه مکانیزم مقاومت آنتیزنوز، آنتی‌بیوز و تحمل در مقاومت گندم به شته روسی دخالت دارند ولی سهم آنتی‌بیوز و تحمل در ایجاد مقاومت بیشتر از آنتیزنوز است مخصوصاً در مراحل آخر دوره رویشی گیاه آنتی‌بیوز مؤثرتر است، اما مکانیزم‌ها در ارقام مقاوم و در مراحل مختلف رشدی به صور مختلفی ظاهر می‌شوند (Miller *et al.*, 2003؛ Hawley *et al.*, 2003). یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل شته روسی تولید ارقام مقاوم است که از نظر اقتصادی حائز اهمیت زیادی

شته روسی گندم، *Diuraphis noxia*، یکی از گونه‌های (Homoptera:Aphididae) مهم شته‌ها است که برای اولین بار در سال ۱۹۰۰ در روسیه مشاهده و شاید به همین دلیل نام شته روسی به آن اطلاق می‌شود (به نقل از Najafi Mirak *et al.*, 2004b گزارش‌ها از وجود شته روسی در ایران توسط Davachi (Davachi) در سال ۱۳۷۷ و سپس Farahbakhsh (Farahbakhsh) در سال ۱۳۸۳ منتشر شد. آن‌ها از بروز شته ای به نام *Brodycolus noxia* روی گندم و جو در ورامین، اصفهان، سیرجان و اردکان خبر دادند که احتمالاً همین گونه *D. noxia* بوده است (به نقل از Shekarian *et al.*, 2001). خسارت گیاهی حاصل از تغذیه شته روسی ترکیب پیچیده‌ای از پاسخ‌های بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی است. برخی فاکتورها مثل زمان آلودگی (فصل و مرحله رشدی گیاه) مدت آلودگی، تنش‌های محیطی (به ویژه خشکی) و وضعیت تغذیه‌ای میزان، روی پاسخ گیاه در برابر خسارت شته روسی تأثیر می‌گذارند. خسارت این حشره در مناطق مختلف و در سال‌های مختلف با توجه به میزان، اقلیم، شرایط آب و هوایی، کنترل شیمیایی، وضعیت زراعی گیاه میزان و غیره متفاوت و حتی در بعضی مواقع به صد درصد هم می‌رسد (Najafi Mirak *et al.*, 2004b؛ Randolph *et al.*, 2005؛ Shekarian *et al.*, 2001).

آفت را بسیار کارآمد کرد. در همین راستا تحقیق حاضر با اهداف بررسی اثر خسارت شته روسی در مراحل مختلف رشد بر صفات مختلف، بررسی رابطه بین مراحل مختلف رشد گیاه از نظر مقاومت به شته روسی و شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت به شته روسی در بین ارقام گندم نان طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها

بر اساس مناطق آلوده به شته روسی در ایران، ۲۲ رقم گندم نان بهاره به همراه دو رقم شاهد مقاوم و حساس برای مقاومت به شته روسی مورد ارزیابی قرار گرفت. از رقم شعله که توسط شکاریان و همکاران (۲۰۰۱) و نجفی میرک و همکاران (۲۰۰۴b) حساس شناخته شده بود به عنوان شاهد حساس و از رقم آزادی که در منابع مذکور به عنوان مقاوم ارزیابی شده بود به عنوان شاهد مقاوم استفاده شد. ارقام مورد استفاده در آزمایش عبارت بودند از آزادی، ارونده، البرز، اترک، بولانی، بیات، پنجامو، چناب، داراب ۱، روشن، رسول، زاگرس، سرخ تخم، شعله، طبسی، فلات، قدس، کرج ۱، کاوه، کویر، کارون، مرودشت، مهدوی و نیکنژاد. آزمایش در قالب طرح دو بار خردشده بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که در آن مراحل آلودگی در کرت اصلی، شرایط آلودگی (کنترل و آلودگی) در کرت فرعی و ارقام در کرت فرعی جای گرفتند. دو مرحله آلودگی مورد آزمون عبارت

بوده و به راحتی قابل تلفیق با سایر روش‌های کنترل آفت خواهد بود و برخلاف روش‌های شیمیایی اثر تخریبی روی محیط زیست ندارد؛ Du Toit, 1989; Gray et al., 1990; Najafi Mirak et al., 2004c

یکی از مراحل تولید ارقام مقاوم به آفات ارزیابی منابع گیاهی و شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت است. در مواردی که آفت بومی منطقه باشد، همانند شته روسی که بومی جنوب روسیه، افغانستان و بخشی از ایران است، ارزیابی ارقام بومی جهت شناسایی ژن‌های مقاومت ضروری است (Najafi Mirak et al., 2004a). برخلاف بسیاری از آفات گندم که در مرحله یا مراحل خاصی از دوره رشد گیاه ظاهر می‌شوند، شته روسی در تمام مراحل رشد گیاه در مزارع حضور داشته و ایجاد خسارت می‌کند، در نتیجه واکنش بین حشره و گیاه در مراحل مختلف رشد ممکن است متفاوت باشد (Gray et al., 1990; Randolph et al., 2003; Girma et al., 1993; Arzani, 2007; Miller et al., 2003). تاکنون در ایران مقاومت و اثر متقابل بین گندم و شته روسی فقط در مرحله گیاهچه ارزیابی شده است و اطلاعاتی از واکنش گندم و شته روسی در مراحل دیگر رشدی در دست نیست، بنابراین با تعیین میزان و مکانیسم‌های مقاومت به این آفت در مراحل مختلف رشدی گیاه و شناسایی رابطه بین آن‌ها می‌توان اصلاح برای مقاومت به این

درجه‌بندی‌های استفاده شده قبلی مقاومت ارقام قابل تفکیک نبود بر همین اساس از درجه‌بندی جدیدی که در جدول ۱ آمده است استفاده شد. در روش کمی نسبت سطح پیچیده و سطح کلروزه به سطح کل برگ به صورت درصد محاسبه شد. بعد از ارزیابی صفات، برای از بین بردن شته‌ها گیاهچه‌ها به وسیله سم متاسیستوکس سمپاشی و سپس گیاهان تا مرحله رسیدن کامل بدون آلودگی نگهداری شدند. در مرحله طویل شدن ساقه نیز گیاهان با پنج عدد پوره شته با روش ذکر شده برای مرحله گیاهچه آلوده و پس از ۲۱ روز ارزیابی کلروز به روش کیفی و کمی انجام شد. با توجه به این که تا کنون درجه‌بندی کیفی برای مرحله طویل شدن ساقه گزارش نشده است، برای ارزیابی کیفی از مقیاس یک تا پنج که در آن یک معرف ژنوتیپ مقاوم و پنج معرف ژنوتیپ حساس بود استفاده شد. عدم استفاده از مقیاس کلروز مورد استفاده در مرحله گیاهچه برای مرحله طویل شدن ساقه به این دلیل بود که در مرحله طویل شدن ساقه با پدید آمدن برگ‌ها و پنجه‌ها نمی‌توان همانند مرحله گیاهچه کلروز را ارزیابی کرد. در روش کمی نسبت سطح کلروزه به سطح کل گیاه به شکل درصد انجام شد. بعد از انجام ارزیابی، شته‌ها با استفاده از سم متاسیستوکس حذف و گیاهان تا مرحله رسیدن بدون آلودگی حفظ شدند.

صفات وزن خشک، تعداد پنجه، درصد پنجه بارور، طول پدانکل، قطرپدانکل، طول

بودند از ۱- مرحله گیاهچه (۱۲-۱۳ زادکس) که در آن گیاهچه‌ها در مرحله دو تا سه برگی بودند و ۲- مرحله شروع طویل شدن ساقه (۳۲-۳۰ زادکس) که ارقام در مرحله یک تا دو گرهای قرار داشتند (Zadoks *et al.*, 1974). آزمایش در شرایط گلخانه در دمای 25°C -۲۲، رطوبت نسبی ۴۰-۵۰٪ درصد و ۱۴ ساعت نور و ۱۰ ساعت تاریکی انجام شد. شته مورد نیاز برای آلودگی از حاشیه مزارع شهرستان قزوین جمع آوری و به داخل انکوباتور با شرایط دمای $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ، رطوبت ۸۵٪ درصد و ۱۴ ساعت نور و ۱۰ ساعت تاریکی منتقل شد (Gray *et al.*, 1990). برای دست یافتن به تعداد مورد نیاز شته جهت آلودگی گیاهان در مراحل مختلف و ایجاد جمعیت خالص، یک شته روی رقم جو سرارود ۱ (رقم حساس) تکثیر شد. تعداد پنج گیاه از هر رقم در یک گلدان سفالی کاشته شد و هر گلدان به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد.

برای ایجاد آلودگی پنج عدد شته با استفاده از قلم موی نرم و مرطوب بر روی هر گیاه قرار داده شد. در مرحله گیاهچه، ۲۱ روز بعداز رهاسازی، ارزیابی گیاهان به دو روش کیفی و کمی بر اساس درصد پیچیدگی و کلروز برگ‌ها انجام شد (Najafi Mirak *et al.*, 2004b). در روش کیفی، کلروز برگ‌ها با استفاده از مقیاس نه درجه‌ای وبستر و همکاران (Webster *et al.*, 1987) اندازه گیری شد. در روش کیفی برای پیچیدگی برگ‌ها با استفاده از

جدول ۱- مقیاس استفاده شده برای ارزیابی مقاومت ارقام گندم به شته رویی در مرحله گیاهچه بر اساس کلروز و پیچیدگی برگ (Webster *et al.*, 1987)

Table 1. The used scales for evaluation of wheat cultivars resistance to Russian wheat aphid in seedling stage based on leaf chlorosis and leaf rolling (Webster *et al.*, 1987)

| Score | Leaf rolling | پیچیدگی برگ‌ها | Score | Leaf chlorosis | کلروز برگ‌ها |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|---|
| کمتر از ۱۰ درصد برگ‌ها پیچیده | | | | | |
| 1 | <10% of leaves rolled | ۱۰-۲۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 1 | Healthy plant | گیاه کاملاً سالم |
| 2 | 10-20% of leaves rolled | ۲۰-۳۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 2 | Prominent chlorosis spots | لکه‌های زرد مشخص و محدودی روی برگ‌ها |
| 3 | 20-30% of leaves rolled | ۳۰-۴۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 3 | < 15% chlorosis | زردی حداقل ۱۵٪ سطح برگ‌ها |
| 4 | 30-40% of leaves rolled | ۴۰-۵۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 4 | 15-25% chlorosis | زردی ۲۵-۴۰٪ سطح برگ‌ها و لکه‌های زرد و سفید |
| 5 | 40-50% of leaves rolled | ۵۰-۶۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 5 | 25-40% chlorosis | زردی ۴۰-۵۵٪ سطح برگ‌ها |
| 6 | 50-60% of leaves rolled | ۶۰-۷۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 6 | 40-55% chlorosis | زردی ۵۵-۷۰٪ سطح برگ‌ها |
| 7 | 60-70% of leaves rolled | ۷۰-۸۰ درصد برگ‌ها پیچیده | 7 | 55-70% chlorosis | زردی ۵۵-۸۵٪ سطح برگ‌ها |
| 8 | 70-80% of leaves rolled | بیش از ۸۰٪ برگ‌ها پیچیده | 8 | 70-85% chlorosis | گیاه مرده یا در حال مرگ |
| 9 | > 80% of leaves rolled | | 9 | Represents dead plants | ۱-۴: مقاوم؛ ۵: حد وسط؛ ۶-۹: حساس |

۱- مقاوم؛ ۲- نیمه مقاوم؛ ۳- نیمه حساس؛ ۴- حساس؛ ۵- ۶- ۷- ۸- ۹-

1-2: Resistant; 3-4: Moderately resistant;
5-7: Moderately susceptible; 8-9: Susceptible

1-4: Resistant; 5: Intermediate; 6-9: Susceptible

تصادفی با سه تکرار و مقایسه میانگین‌ها برای صفات اندازه‌گیری شده با استفاده از روش دانکن انجام شد. قبل از تجزیه واریانس فرضیات آن مورد آزمون قرار گرفت و صفات درصد پنجه بارور، تعداد سنبلچه در سنبله و وزن ۵۰ دانه در طرح دوبار خردشده و صفات طول پدانکل و تعداد دانه در سنبله در مرحله طویل شدن ساقه برای برقراری فرضیات با تبدیل جذری تغییر یافتدند. تجزیه خوش‌های و ضرایب همبستگی بین

سنبله، وزن سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن ۵۰ دانه در کدام از گیاهان (آلوده شده و کنترل) در هر گلدان اندازه گیری و سپس از میانگین گیاهان هر گلدان برای تجزیه استفاده شد.

تجزیه واریانس بر اساس طرح دوبار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و تجزیه واریانس‌های جداگانه مربوط به مراحل آلودگی بر اساس طرح بلوک‌های کامل

گرفت که جمعیت شته به کار رفته پیچیدگی بالایی را در ارقام ایجاد نکرد و با در نظر گرفتن درجه‌بندی کیفی، ارقام مورد آزمایش از نظر درصد پیچیدگی در گروه نیمه مقاوم تا مقاوم قرار گرفتند ولی تفاوت معنی داری با یک دیگر داشتند. ارقام از نظر میزان کلروز برگ نیز با هم تفاوت معنی داری داشتند (جدول ۲).

مقایسه میانگین‌ها (جدول ۳) نشان داد که رقم آزادی (شاهد مقاوم) دارای کمترین مقدار کلروز برگ بود و با ارقام کاوه، اترک، ارونده، مهدوی و رسول تفاوت معنی داری نداشت. شکاریان و همکاران (۲۰۰۱) و نجفی‌میرک و همکاران (۲۰۰۴a,b) نیز مقاومت رقم آزادی به شته روسی را گزارش داده بودند.

ارقام بولانی و نیک نژاد بیشترین مقدار کلروز برگ را از خود نشان دادند و با رقم شاهد حساس تفاوت معنی داری نداشتند. بر اساس درجه‌بندی وبستر و همکاران (Webster *et al.*, 1987) در جدول ۱، بیشتر ارقام در گروه نیمه مقاوم تا نیمه حساس جای گرفتند و ارقام خیلی حساس و خیلی مقاوم در بین ارقام دیده نشد. ارقام مرودشت، روشن و زاگرس بر اساس این درجه‌بندی در گروه نیمه مقاوم قرار داشتند.

گروه‌بندی ژنتیپ‌ها براساس صفات درصد پیچیدگی و درصد کلروز برگ با استفاده از تجزیه خوش‌های در شکل ۱ نشان داده شده است. با خط برش در فاصله پنج، ارقام در چهار گروه،

صفات اندازه‌گیری شده در مراحل مختلف آلودگی و شرایط کنترل و آزمون t-student برای مقایسه مراحل آلودگی و شرایط کنترل انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که ارقام از نظر صفات درصد کلروز و درصد پیچیدگی تفاوت معنی داری باهم دارند (جدول ۲).

جدول مقایسه میانگین (جدول ۳) نشان داد که ارقام البرز، اترک، داراب ۱ و فلات به طور معنی داری درصد پیچیدگی کمتری نسبت به شاهد مقاوم (آزادی) داشتند. این ارقام بر اساس درجه‌بندی جدول ۱ دارای نمره کیفی کمتر از ۲ بودند که نتیجه روش کمی را مورد تأیید قرار می‌دهد.

ارقام کارون و زاگرس دارای پیچیدگی برگ بیشتر نسبت به شاهد حساس بودند. این ارقام به عنوان ژنوتیپ‌های حساس به شته روسی در مرحله گیاهی‌چه ارزیابی شدند. ارقام شعله (شاهد حساس)، طبسی، زاگرس و کارون بر اساس درجه‌بندی کیفی (جدول ۱) دارای میانگین ۳/۳۳-۴/۶۷ بودند که در گروه نیمه مقاوم جای گرفتند. ارقام زاگرس و شعله در نتایج نجفی‌میرک و همکاران (۲۰۰۴a) در گروه حساس جای گرفته بودند. با توجه به میانگین درصد پیچیدگی ارقام (۱۹/۹۷) می‌توان نتیجه

جدول ۲- تجزیه واریانس برای صفات درصد کلروز برگ، درصد پیچیدگی برگ و درصد کلروز گیاه ارقام گندم در آلودگی با شته روسی در مراحل گیاهچه و طویل شدن ساقه

Table 2. Analysis of variance for leaf and plant chlorosis and leaf rolling percentage on wheat cultivars under infestation with Russian wheat aphid at seedling and stem elongation stages

| S. O. V. | منبع تغییرات | درجه آزادی df. | میانگین مربعات MS | | |
|-------------|--------------|----------------|---|---|---|
| | | | درصد کلروز برگ ⁺ Percent of leaf chlorosis ⁺ | درصد پیچیدگی برگ ⁺ Percent of leaf rolling ⁺ | درصد کلروز گیاه ⁺⁺ Percent of plant chlorosis ⁺⁺ |
| Replication | تکرار | 2 | 27.540 ^{ns} | 5.520 ^{ns} | 28.08 ^{ns} |
| Cultivar | ارقام | 23 | 113.178 ^{**} | 225.197 ^{**} | 819.75 ^{**} |
| Error | اشتباه | 46 | 21.91 | 7.176 | 27.29 |

+Infestation at seedling stage


++ Infestation at stem elongation stage

Ns and ** : Not-significant and significant at the 1% level, respectively.

+آلودگی در مرحله گیاهچه

++آلودگی در مرحله طویل شدن ساقه

ns و **: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۰/۱٪



شکل ۱- گروه بندی ارقام گندم با استفاده از تجزیه خوش ای بر اساس صفات درصد پیچیدگی و درصد کلروز برگ در آلودگی با شته روسی در مرحله گیاهچه

Fig. 1. Classification of wheat cultivars using cluster analysis based on leaf chlorosis percentage and leaf rolling percentage under infestation with Russian wheat aphid at seedling stage

جدول ۳- مقایسه میانگین ارقام گندم برای صفات درصد کلروز و درصد پیچیدگی در آسودگی با شته رویی در مرحله گیاهچه و صفت کلروز گیاه در آسودگی مرحله طویل شدن ساقه

Table 3. Mean comparison of leaf and plant chlorosis and leaf rolling percentage in wheat cultivars under infestation with Russian wheat aphid at seedling and stem elongation stages

| ارقام Cultivars | آسودگی مرحله طویل شدن ساقه Stem elongation stage | | | آسودگی مرحله گیاهچه Seedling stage | | |
|--------------------|---|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| | کلروز گیاه | | Plant chlorosis | کلروز برگ | | Leaf rolling |
| | درصد Percent | نمره Score | درصد Percent | نمره Score | درصد Percent | نمره Score |
| Azadi | 0.68 | 12.50i | 2.00 | 12.47lm | 3.40 | 17.97h |
| Arvand | 2.75 | 46.67bc | 2.33 | 18.47ijk | 3.75 | 24.55efgh |
| Alborz | 1.38 | 28.50efg | 1.00 | 5.61n | 4.85 | 36.83ab |
| Atrak | 3.08 | 50.94bc | 1.33 | 7.31n | 4.10 | 20.92fgh |
| Bolani | 3.42 | 56.03b | 2.67 | 23.31efghi | 5.19 | 41.89a |
| Bayat | 0.82 | 13.28i | 2.33 | 19.42hij | 4.55 | 28.92bcd |
| Panjamoo | 1.36 | 27.22efgh | 3.00 | 23.13efghi | 4.73 | 31.40bcde |
| Chenab | 1.36 | 20.22ghi | 2.00 | 14.25kl | 4.77 | 30.50bcde |
| Darab1 | 3.00 | 52.07bc | 1.67 | 9.33mn | 4.90 | 35.11abcd |
| Roshan | 2.28 | 27.41efgh | 2.67 | 22.56fghi | 4.87 | 30.33bcde |
| Rasool | 3.50 | 56.33b | 2.00 | 17.38jk | 4.23 | 25.10efgh |
| Zagros | 2.25 | 44.17cd | 3.67 | 31.64b | 4.65 | 29.78bcde |
| Sorkhtokhm | 1.85 | 33.79ef | 3.00 | 25.67cdef | 4.83 | 34.53abcd |
| Sholeh | 4.42 | 65.17a | 3.33 | 29.94bc | 4.68 | 34.56abcd |
| Tabasi | 1.12 | 12.75i | 3.33 | 28.39bcd | 4.81 | 30.92bcde |
| Falat | 1.78 | 25.54fgh | 1.33 | 7.43n | 4.92 | 31.72bcde |
| Ghods | 2.69 | 35.83de | 2.00 | 16.00jkl | 4.52 | 31.56bcde |
| Karaj1 | 0.89 | 20.81ghi | 2.33 | 19.67ghij | 5.11 | 35.97abc |
| Kaveh | 0.95 | 18.50hi | 3.00 | 21.33defgh | 3.47 | 19.42gh |
| Kavir | 0.73 | 16.00i | 2.00 | 13.50klm | 3.69 | 26.78defg |
| Karoon | 3.42 | 56.33b | 4.67 | 41.31a | 4.23 | 27.22cdefg |
| Marvdasht | 2.75 | 46.85bc | 3.00 | 25.58defg | 4.93 | 30.83bcd |
| Mahdavi | 2.15 | 26.72efgh | 2.33 | 17.45jk | 3.98 | 25.00efgh |
| Niknejad | 3.25 | 52.45bc | 3.00 | 28.03bcde | 4.93 | 41.42a |

مشاهدات این پژوهش نشان داد که علاوه بر پیچیدگی و کلروز برگ‌ها مشابه یکدیگر اتفاق نمی‌افتد، یعنی ژنتیکی که دارای کلروز بالا است ممکن است پیچیدگی کمی داشته باشد و بالعکس. این امر باعث می‌شود استفاده از درجه‌بندی‌هایی که هر دوی این صفات همزمان در نظر گرفته می‌شوند مثل درجه‌بندی دوتویت (Du Toit, 1989a)، درجه‌بندی که در آن میزان پیچیدگی برگ‌ها و میزان کلروز برگ‌ها به طور یک جا با یک درجه مشخص می‌شود، برای ارزیابی مقاومت ارقام از دقت کافی برخوردار نباشد، بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب در ارزیابی‌ها بهتر است از هر دو صفت استفاده شود و رقمی به عنوان مقاوم معرفی شود که هم میزان پیچیدگی برگ کمتر و هم کلروز برگ کمتری داشته باشد.

آبودگی در مولده طویل شدن ساقه

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که ارقام از نظر صفت درصد کلروز برگ در مرحله طویل شدن ساقه تفاوت معنی‌داری با هم دارند (جدول ۲). مقایسه میانگین (جدول ۳) نشان داد که رقم شعله دارای بیشترین مقدار کلروز است و ارقام آزادی، طبیعی، بیات و کویر دارای کمترین مقدار کلروز بودند.

بعد از رقم شعله، ارقام کارون، رسول و بولانی نیز دارای درصد کلروز بالایی بودند. با توجه به گروه‌بندی ارقام بر اساس درصد کلروز و پیچیدگی برگ در مرحله گیاهچه ارقام شعله، کارون و بولانی همانند مرحله گیاهچه در گروه

مقاوم شامل ارقام رسول، مهدوی، ارونده، چناب، قدس، کویر، کاوه، آزادی و اترک، نیمه مقاوم شامل ارقام داراب ۱، فلاط و البرز، نیمه حساس شامل ارقام بولانی، نیک نژاد، زاگرس، طبسی، سرخ تخم، شعله، پنجامو، روشن، مرودشت، بیات و کرج ۱ و حساس شامل رقم کارون قرار گرفتند. ارقام مهدوی، کویر، آزادی در گروه مقاوم و رقم زاگرس در گروه نیمه حساس و ارقام شعله و مرودشت در گروه نیمه حساس قرار گرفتند. عدم تطابق کامل نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی ممکن است به دلیل تفاوت بیوتیپ در دو جمعیت شته مورد استفاده باشد هر چند که تاکنون بیوتیپ‌های مشخص برای شته روسی در ایران شناسایی نشده است. در سال ۲۰۰۴ بیوتیپ جدید شته روسی در کلرادو آمریکا شناسایی شد (Haley *et al.*, 2004).

در این مرحله ضریب همبستگی منفی معنی‌دار بین درصد کلروز برگ با صفات تعداد سنبلچه در سنبله ($r=-0.48$) و قطر پدانکل ($r=-0.48$) نشان‌دهنده تأثیر معکوس کلروز برگ ناشی از تغذیه شته روسی بر روی صفات تعداد سنبلچه در سنبله و قطر پدانکل بود. ضریب همبستگی معنی‌داری بین درصد پیچیدگی و صفات دیگر به دست نیامد (جدول ۴). عدم وجود ضریب همبستگی معنی‌داری بین دو جزء مقاومت یعنی میزان پیچیدگی برگ و میزان کلروز برگ بیانگر این نکته است که غربال برای هر کدام از این صفات به تنهایی نمی‌تواند منجر به شناسایی ارقام مقاوم شود.

جدول ۴- ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه گندم در آلودگی مرحله گیاهچه با شته روسي (n=22)

Table 4. Correlation coefficients of studied traits in wheat under infestation with Russian wheat aphid at seedling stage(n=22)

| Traits | صفات | Dry weight | Tiller number | Fertile tiller | Peduncle length | Peduncle diameter | Spike length | Spike weight | Spikelet number per spike | Grain number per spike | Grain weight | Leaf chlorosis |
|----------------|-------------|------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Leaf chlorosis | کلروز برگ | -0.01 ns | 0.08 ns | -0.06 ns | 0.01 ns | -0.48 * | -0.21 ns | -0.03 ns | -0.48 * | -0.34 ns | -0.22 ns | |
| Leaf rolling | پیچیدگی برگ | 0.25 ns | 0.04 ns | -0.20 ns | -0.08 ns | 0.01 ns | 0.05 ns | -0.28 ns | -0.12 ns | -0.23 ns | 0.13 ns | 0.15 ns |

جدول ۵- تجزیه واریانس برای صفات مختلف ارقام گندم در طرح دوبار خردشده با فاکتورهای مرحله آلودگی (گیاهچه و طول شدن ساقه)، شرایط آلودگی (آلودگی و عدم آلودگی) و ارقام

Table 5. Analysis of variance for different traits in wheat cultivars in split split plot design with infestation stage (seedling and stem elongation), infestation circumstances (infestation and non-infestation) and cultivar factors

| S.O.V. | منابع تغییرات | درجه آزادی df. | میانگین مربعات (MS) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|
| | | | وزن ۵۰ دانه | دانه در سنبله | تعداد سنبلچه در سنبله | وزن سنبله | طول سنبله | قطر پدانکل | طول پدانکل | درصد پنجه بارور | تعداد پنجه | وزن خشک |
| Rep. | تکرار | 2 | 0.036 ns | 22.142 ns | 3.087 ns | 0.043 ns | 148.12 ns | 0.060 ns | 59.096 ns | 123.68 ns | 0.405 ns | 0.160 ns |
| Infestation Stage (S) | مرحله آلودگی | 1 | 0.001 ns | 130.371 * | 6.450 * | 0.019 ns | 251.33 ns | 0.020 ns | 36.822 ns | 959.77 ** | 2.446 * | 1.520 ns |
| Error a | خطا | 2 | 0.002 | 2.434 | 0.171 | 0.005 | 150.08 | 0.022 | 46.507 | 6.86 | 0.029 | 0.109 |
| Infestation,control(IC) | شرایط آلودگی | 1 | 0.429 ** | 164.968 ** | 11.818 ** | 0.192 ** | 115.70 ns | 0.154 ns | 13160.900 ** | 3071.26 * | 0.215 ns | 0.899 * |
| S × IC | شرایط آلودگی × مرحله آلودگی | 1 | 0.001 ns | 130.371 ** | 6.450 ** | 0.017 ns | 251.33 ns | 0.020 ns | 36.822 ns | 959.76 ns | 2.446 ns | 1.520 ** |
| Error b | خطا | 4 | 0.007 | 3.950 | 0.221 | 0.006 | 101.16 | 0.032 | 95.571 | 304.03 | 0.427 | 0.070 |
| Cultivar(C) | ارقام | 23 | 0.801 ** | 180.642 ** | 25.174 ** | 0.156 ** | 446.89 ** | 0.0192 ** | 2486.980 ** | 3067.92 ** | 1.127 ** | 0.650 ** |
| C × S | ارقام × مرحله آلودگی | 23 | 0.095 ** | 30.811 ** | 7.874 ** | 0.031 ** | 172.77 ** | 0.074 ** | 418.034 ** | 268.64 ** | 0.148 * | 0.143 ** |
| C × IC | ارقام × شرایط آلودگی | 23 | 0.157 ** | 98.567 ** | 10.077 ** | 0.091 ** | 150.30 * | 0.102 ** | 1534.480 ** | 973.34 ** | 0.296 ** | 0.440 ** |
| C × IC × S | ارقام × آلودگی × مرحله آلودگی | 23 | 0.095 ** | 30.811 ** | 7.874 ** | 0.031 ** | 172.77 ** | 0.074 ** | 418.034 ** | 268.64 ** | 0.148 * | 0.143 ** |
| Error c | خطا | 184 | 0.018 | 6.081 | 2.433 | 0.005 | 87.92 | 0.028 | 59.545 | 108.22 | 0.081 | 0.033 |

ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

و **: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪.

وجود نداشت، در حالی که میلر و همکاران (Miller *et al.*, 2003) گزارش دادند که وزن تازه در آلدگی مراحل مختلف رشدی کاهش می‌یابد و بیشترین کاهش در آلدگی مرحله گیاهچه دیده می‌شود، نتایج گیری و همکاران (Gray *et al.*, 1990) نشان داد که در آلدگی مرحله غلاف‌دهی، وزن ریشه افزایش می‌یابد. همان‌طور که در جدول ۶ مشاهده می‌شود بین میانگین صفت تعداد پنجه در مراحل مختلف آلدگی اختلاف معنی‌داری وجود داشت.

آلدگی در مرحله گیاهچه منجر به کاهش بیشتر درصد پنجه بارور شد، این درحالی است که گیری و همکاران (Gray *et al.*, 1990) گزارش دادند تعداد پنجه در مراحل گیاهچه، پنجه‌دهی و غلاف‌دهی تحت تأثیر آلدگی شته روسی قرار نمی‌گیرد ولی نتایج تحقیقات میلر و همکاران (Miller *et al.*, 2003) نشان داده است که تولید پنجه در گیاهان آلدود شده در مرحله گیاهچه کاهش و در مراحل پنجه‌دهی و طویل شدن ساقه افزایش می‌یابد و این با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

در صفات طول پدانکل، قطر پدانکل و طول سنبله تفاوت معنی‌دار بین دو مرحله آلدگی مشاهده نشد. میلر و همکاران (Miller *et al.*, 2003) گزارش دادند طول سنبله در آلدگی با شته روسی در مراحل مختلف رشدی گیاه کاهش می‌یابد و این کاهش در مراحل گیاهچه و پنجه‌دهی بیشتر از سایر مراحل است. دو مرحله آلدگی تفاوت معنی‌داری برای

حساس و نیمه حساس قرار گرفتند. اگر به میانگین نمره کیفی ارقام برای صفت درصد کلروز گیاه در جدول ۳ توجه شود مشاهده می‌شود که ارقام آزادی، کویر، بیات، کاوه و کرج ۱ در گروه مقاوم، ارقام طبی، چناب، فلات، پنجامو، البرز و سرخ‌تخم در گروه نسبتاً مقاوم، ارقام مهدوی، روشن، قدس، زاگرس، ارونده و مرودشت در گروه نسبتاً حساس و ارقام اترک، نیک‌نژاد، داراب ۱، بولانی، رسول، کارون و شعله در گروه حساس قرار گرفتند.

همبستگی معنی‌داری بین درصد کلروز با صفات دیگر دیده نشد. عدم همبستگی معنی‌دار بین درصد کلروز و صفات مورد بررسی ممکن است به علت مدت کوتاه آلدگی باشد که در این مدت صفات تحت تأثیر تغذیه شته قرار نگرفته‌اند.

تجزیه واریانس طرح دوبار خرد شده (جدول ۵) نشان داد که اثر کلیه منابع تغییر در صفات تعداد سنبلاچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله معنی‌دار بودند. در صفات وزن خشک، تعداد سنبلاچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله اثر متقابل شرایط آلدگی × مرحله آلدگی معنی‌دار بودند. اثر متقابل ارقام × مرحله آلدگی در کلیه صفات معنی‌دار بود. صفات تعداد پنجه، طول و قطر پدانکل در شرایط آلدگی و عدم آلدگی تفاوت معنی‌داری نداشتند.

در مقایسات میانگین مراحل آلدگی برای صفات مختلف (جدول ۶)، تفاوت معنی‌داری بین مراحل آلدگی برای صفت وزن خشک

صفت وزن خشک و طول پدانکل با یک دیگر تفاوت معنی دار داشتند (جدول ۷). هردو صفت نسبت به شرایط کنترل کاهش یافته بودند. نتایج گزارش شده توسط میلر و همکاران (Miller *et al.*, 2003) نیز نشان داده است که صفات وزن تازه و طول سنبله بر اثر آلوودگی مرحله طویل شدن ساقه کاهش و صفات تعداد پنجه و تعداد سنبله در سنبله افزایش می یابد.

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که واکنش ارقام مختلف گندم بهاره به آلوودگی در مراحل گیاهچه و طویل شدن ساقه متفاوت است. دلیل این امر احتمالاً ظاهر متفاوت مکانیسم های مقاومت در مراحل مختلف رشدی در گیاهان حساس و مقاوم است (Gray *et al.*, 1990؛ Miller *et al.*, 2003). صفات مورد بررسی در آلوودگی مراحل مختلف به اشکال متفاوتی تحت تاثیر قرار می گیرند. آلوودگی در مراحل ابتدایی رشد نمی تواند روی صفات تولید مثلی تأثیرگذار باشد و تأثیر آن روی وضعیت رشدی گیاه خواهد بود، اما اگر خسارت شته روسی در مراحل ابتدایی رشد با تنفس های محیطی همراه شود باعث خسارت زیادی به گیاه و عملکرد می شود.

نتایج همچنین نشان داد که ارقام رسول، مهدوی و ارونند دارای بیشترین مقاومت و رقم کارون دارای بیشترین حساسیت در آلوودگی مرحله گیاهچه، و ارقام آزادی، طبسی، بیات و کویر مقاوم ترین و ارقام شعله، کارون، رسول و بولانی حساس ترین ارقام در آلوودگی مرحله

صفت وزن سنبله نداشتند، ولی میانگین صفت تعداد سنبله در سنبله در آلوودگی مرحله طویل شدن ساقه بیشتر از مرحله گیاهچه بود. این نتایج مشابه گزارش میلر و همکاران (۲۰۰۳) بود، آن ها گزارش دادند که تعداد سنبله در سنبله در آلوودگی مراحل گیاهچه و پنجه دهی کاهش و در مرحله طویل شدن ساقه و غلاف دهی کمی افزایش می یابد. در تعداد دانه در سنبله در گیاهان آلووده به شته در مرحله طویل شدن ساقه بیشتر از مرحله گیاهچه بود و این نشان می دهد که تعداد دانه در سنبله همانند تعداد سنبله در سنبله بیشتر تحت تأثیر آلوودگی در مرحله گیاهچه قرار می گیرند.

مقایسه میانگین بین شرایط کنترل (بدون آلوودگی) و مراحل آلوودگی به شته روسی برای صفات مختلف گندم به وسیله t-student (جدول ۷) نشان داد در شرایط آلوودگی مرحله گیاهچه فقط میانگین صفات تعداد پنجه، طول پدانکل و تعداد دانه در سنبله با شرایط کنترل تفاوت معنی داری دارند. صفات طول پدانکل و تعداد دانه در سنبله در شرایط آلوودگی در مرحله گیاهچه نسبت به شرایط کنترل کاهش یافتد، ولی صفت تعداد پنجه در مرحله آلوودگی گیاهچه نسبت به شرایط کنترل افزایش یافت که ممکن است تغذیه شته از برگ های اولیه باعث تحریک تولید پنجه های ثانویه شده که منجر به افزایش تعداد پنجه ها شده باشد. مقایسه بین شرایط عدم آلوودگی و آلوودگی مرحله طویل شدن ساقه نشان داد که نمونه ها در دو

جدول ۶- مقایسه میانگین صفات مختلف در آلدگی با شته روسی در مراحل گیاهچه و طویل شدن ساقه گندم

Table 6. Mean comparison of studied traits in wheat under infestation with Russian wheat aphid at seedling and stem elongation stage

| Infestation stage | مرحله آلدگی | وزن ۵۰ دانه | وزن سنبله | تعداد سنبله در سنبله | وزن سنبله | طول سنبله | قطر پدانکل | طول پدانکل | درصد پنجه بارور | تعداد پنجه | وزن خشک | وزن خشک |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|---------|
| | 50 Grain weight(g) | Grain number per spike | Spikelet number per spike | Spike weight(g) | Spike length(mm) | Peduncle diameter(mm) | Peduncle length(mm) | Fertile tiller (%) | Tiller number | Dry weight(g) | | |
| Seedling | گیاهچه | 1.03a | 12.57b | 0.46a | 65.72a | 1.44a | 54.83a | 63.66b | 1.77a | 1.53a | | |
| Stem elongation | طویل شدن ساقه | 1.03a | 12.87a | 0.48a | 63.85a | 1.45a | 55.55a | 67.31a | 1.59b | 1.38a | | |

جدول ۷- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی گندم در مراحل مختلف آلدگی با شته روسی (گیاهچه و طویل شدن ساقه) و شرایط کنترل به وسیله آزمون t-student

Table 7. Mean comparison of studied traits in wheat under infestation with Russian wheat aphid and non-infestation (control) at different growth stages (seedling and stem elongation) using t-student test

| Traits | صفات | Mean infestation | | | Mean infestation | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|------------------|--|----------------------|
| | | کنترل Control | مرحله طویل شدن ساقه Stem elongation | میانگین آلدگی 1 | کنترل Control | مرحله طویل شدن ساقه Stem elongation | میانگین آلدگی 1 |
| Dry weight (g) | وزن خشک | 1.510 | 1.543 | -0.302 ^{ns} | 1.510 | 1.252 | 3.089* |
| Tiller number | تعداد پنجه | 1.655 | 1.895 | -2.026* | 1.655 | 1.526 | 1.300 ^{ns} |
| Fertile tiller (%) | درصد پنجه بارور | 68.748 | 58.566 | 1.668 ^{ns} | 68.748 | 65.867 | 0.552 ^{ns} |
| Peduncle length (mm) | طول پدانکل | 61.960 | 47.713 | 2.839* | 61.960 | 49.142 | 1.971* |
| Peduncle diameter (mm) | قطر پدانکل | 1.423 | 1.453 | -0.530 ^{ns} | 1.423 | 1.487 | -1.183 ^{ns} |
| Spike length (mm) | طول سنبله | 65.422 | 64.355 | 0.376 ^{ns} | 65.422 | 62.909 | 0.977 ^{ns} |
| Spike weight (g) | وزن سنبله | 0.495 | 0.470 | 0.405 ^{ns} | 0.495 | 0.465 | 0.617 ^{ns} |
| Spikelet number per spike | تعداد سنبله در سنبله | 12.621 | 12.625 | -0.007 ^{ns} | 12.621 | 13.113 | -0.840 ^{ns} |
| Grain number per spike | تعداد دانه در سنبله | 13.661 | 10.794 | 2.009* | 13.661 | 13.496 | 0.101 ^{ns} |
| 50 Grain weight (g) | وزن ۵۰ دانه | 1.067 | 0.985 | 0.935 ^{ns} | 1.067 | 0.994 | 0.791 ^{ns} |

ns and * : Not significant and significant at the 5% probability level, respectively.

* و ns : به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵٪

کند و باعث تغییر در صفاتی مثل وزن و تعداد دانه، طول و وزن سنبه و قطر و طول پدانکل و در ارقام حساس این صفات را کاهش و درنتیجه عملکرد را کاهش دهد. در این تحقیق صفت طول پدانکل بر اثر تغذیه شته روسی در آلودگی مراحل گیاهچه و طویل شدن ساقه کاهش یافت که و در آزمایش های بعدی می توان از آن برای شناسایی ارقام مقاوم استفاده کرد.

طویل شدن ساقه بودند. آلودگی با شته روسی در مرحله گیاهچه، صفات تعداد دانه در سنبه و طول پدانکل را به طور معنی داری کاهش داد در حالی که آلودگی در مرحله طویل شدن ساقه کاهش معنی داری در صفات طول پدانکل و وزن خشک گیاه ایجاد نشد. انتظار می رود آلودگی در مراحل انتهایی رشد مثل مراحل طویل شدن ساقه بر انتقال شیره پرورده و کربوهیدرات های ذخیره در برگ ها و ساقه به سنبه اختلال ایجاد

References

- Arzani, A. 2007.** Efficency of market-assisted selection for a Russian wheat aphid resistance gene in Wheat. *Seed and Plant* 23:101-112 (in Farsi).
- Burd, J. D., and Burton, R. L. 1992.** Characterization of plant damage by Russian wheat aphid. *Journal of Economic Entomology* 85:2017-2022.
- Du Toit, F. 1989a.** Components of resistance in three bread wheat lines to Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) in South Africa. *Journal of Economic Entomology* 82:1779-1781.
- Du Toit, F. 1989b.** Inheritance of resistance in two *Triticum aestivum* lines to Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology* 82:1251-1253.
- Girma, M., Wilde, G. E., and Harvey, T. L. 1993.** Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) affects yield and quality of wheat. *Journal of Economic Entomology* 86:594-601.
- Gray, M. E., Hein, G. L., Walgenbach, D. D., and Elliott, N. C. 1990.** Effects of Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) on winter and spring wheat infested during different plant growth stages under greenhouse conditions. *Journal of Economic Entomology* 83: 2434-2442.
- Haley, S. D., Peairs, F. B., Walker, C. B., Rudolph, J. B., and Randolph, T. L. 2004.** Occurrence of a new Russian wheat aphid biotype in Colorado. *Crop Science* 44: 1589-1592

- Hawley, C. J., Peairs, F. B., and Randolph, T. L. 2003.** Categories of resistance at different growth stage in Halt, a winter wheat resistant to Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology* 96: 214-219.
- Miller, H. R., Randolph, T. L., and Peairs, F. B. 2003.** Categories of resistance at four growth stages in three wheats resistant to the Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology* 96: 673-679.
- Najafi Mirak, T., Hosseinzadeh, A., Zali, A., Zeinali, H., Saidi, A., and Rassoulian, G. R. 2004a.** Inheritance of resistance to Russian wheat aphid, *Diuraphis noxia*(Mordvilko), based on leaf rolling in wheat. *Seed and Plant* 20: 245-257 (in Farsi).
- Najafi Mirak, T., Zali, A., Hosseinzadeh, A., Rassoulian, G. R., and Saidi, A. 2004b.** Evaluation of resistance to Russian wheat aphid, *Diuraphis noxia* (Mordvilko) in durum and bread wheats. *Journal of Agriculture and Natural Resource* 7(4):115-127 (in Farsi).
- Najafi Mirak, T., Zali, A., Hosseinzadeh, A., Saidi, A., and Rassoulian, G. R. 2004c.** Inheritance and allelism of resistance to Russian wheat aphid, *Diuraphis noxia*(Mordvilko) in Iranian wheat cultivars. *International Journal of Agriculture and Biology* 6: 525-528.
- Randolph, T. L., Peairs, F. B., Kroenning, M. K., Armstrong, J. S., Hammon, R. W., Walker C. B., and Quick, J. K. 2003.** Plant damage and yield response to the Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) on susceptible and resistant winter wheats in Colorado. *Journal of Economic Entomology* 96: 352-360.
- Randolph, T. L., Peairs, F. B., Kock, M., Walker,C. B., Stabs, J. R., Quick, J. S., and Haley, S. D. 2005.** Yield response and categories of resistance to Russian wheat aphid in four *Dn4* hard red winter wheat cultivars. *Journal of Economic Entomology* 98: 588-594.
- Shekarian, B., Rassoulian, G. R., and Azemayesh Fard, P. 2001.** Screening of different varities of wheat to find resistance sources to Russian wheat aphid, *Diuraphis noxia*(Mordvilko). *Iranian Journal of Agricultural Sciences* 32: 253-237 (in Farsi).
- Webster, J. A., Starks, K. J., and Burton, R. L. 1987.** Plant resistance studies with the *Diuraphis noxia* (Homoptera: Aphididae), a new United States wheat pest. *Journal of*

Economic Entomology 80: 944-949

- Westhuizen, A. J. 1995.** Biochemical and physiological response of Resistant and susceptible wheat to Russian wheat aphid infestation. Cereal Research Communications 23: 312-315.
- Zadoks, J. C., Chang, T. T., and Konzak, C. F. 1974.** A decimal code for the growth stage of cereals. Weed Research 14:415-421.

Archive of SID