

معرفی رقم

Cultivar Release

ساجی، رقم جدید گندم دورروم مناسب برای مناطق پرباران اقلیم‌های معتدل سرد و معتدل گرم دیم و شرایط آبیاری تکمیلی

Saji, A New Durum Wheat Cultivar Adapted to Rainfed and Supplementary Irrigation Conditions of Moderate Cold and Moderate Warm Areas of Iran

پدیدآورندگان: رضا محیی‌الدین، مصطفی آقایی سربرزه، رضا حق‌پرست، محمد آرمیون، داود صادق‌زاده اهری، مظفر رostایی، نوذر بهرامی، امیر دریابنی، فرهاد فری، سید کریم حسینی، محتشم محمدی، طهماسب حسین‌پور، جعفر آلت‌جعفری‌بای، حسن خانزاده، محمد فرزاد افشاری، مقصود حسنپور حسنی، حسن قوجیق، وفا مردوخی، محمدعلی دهقان و سامان بهرامی، دانگ

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۷/۸

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۷/۸

به تنش‌های زنده و غیرزنده داشتند. برای آن بنش لاین‌های پرمحصول و سازگار به رایج، محیطی مناطق معتدل سرد و معتدل گرم نیز بررسی شدی انجام و منجر به انتخاب یک لاین جدید شد.

Syrian-4:Mrb11//Snipe/Magh./Rufom-7
ICD91-1251-0AP-11AP-0AP-1AP-0AP
به عنوان لاین گندم دورروم دارای زراعی ۸۰-۱۳۷۹ در آزمایش‌های بین‌المللی مقایسه عملکرد (IDYT-MCA) دریافتی از ایکاردا در استگاه سرارود به صورت مقدماتی ارزیابی و با تولید ۲۱۶۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد آزمایش (رقم زرد ک)، حدود ۲۳۰ کیلوگرم در هکتار محصول بیشتری تولید کرد. این لاین به دلیل داشتن ویژگی‌های مناسب زراعی

تقریباً ۹۰ درصد گندم دورروم تولید شد در دنیا از حوزه دریای مدیترانه حاصل می‌شود. ایران یکی از کشورهای با شرایط آب و هوایی مدیترانه‌ای است، اما علیرغم شرایط مساعد اقلیمی برای تولید گندم دورروم جایگاه واقعی را در بین کشورهای این حوزه از نظر تولید گندم دوروم و تبدیل آن به سمولینا ندارد. تنش‌های حاصل از خشکی، گرما، سرما، بیماری‌ها و آفات از مهم‌ترین عوامل محدود کننده کشت و توسعه گندم دوروم هستند.

ارقام گندم دورروم سیمه‌ه و دهدشت به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۷ برای مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر ایران توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم معرفی شدند که عملکرد دانه بالا، کیفیت خوب سمولینا و تحمل

تلفن: ۰۸۳۱۲۳۳۳۴۱۰

نویسنده مسئول: rmohammadi1973@yahoo.com

آلودگی مصنوعی در مناطق مختلف کشور و همچنین در گلخانه نشان داد که لاین جدید همانند رقم شاهد سمیره نسبت به زنگ زرد نیمه مقاوم تا مقاوم، نسبت به زنگ قهوه‌ای نیمه حساس تا نیمه مقاوم، نسبت به سیاهک پنهان معمولی حساس تا نیمه حساس و نسبت به سیاهک پنهان پاکوتاه نیمه حساس است.

لاین جدید از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۴ در یازده منطقه استان کرمانشاه و در مزارع کشاورزان در قالب آزمایش تحقیقی- تطبیقی با ارقام سرداری و زردک مورد مقایسه قرار گرفت. در تمام این آزمایش‌ها اختلاف عملکرد دانه لاین جدید با ارقام شاهد چشمگیر بود (جدول ۱). در ایستگاه‌های تحقیقاتی گچساران، گند، مغان و آردلشت نیز میانگین عملکرد دانه این لاین بنت ب- ارقام شاهد بیشتر بود.

لاین جدید از نظر ویژگی‌های کیفی (۱۳٪ پروتئین، ۵۱٪ سه با، ۴۰٪ گلوتن مرطوب و ۱۴٪ گلوتن خاک) نسبت به رقم شاهد نیز برتر بود. این لاین دارای پرشد بینایین متمایل به بهاره، زودرس، متوس - ارتفاع بوته آن در شرایط دیم ۸۹ سانتی‌متر و روابط خواهدگی کاملاً مقاوم است. لاین جدید ب- دلیل پتانسیل تولید بیشتر، کیفیت خوب، تحمل به تنش خشکی، مقاوم به ورس و مقاومت قابل قبول در برابر بیماری‌ها برای معرفی و کاشت در شرایط آبیاری تکمیلی و مناطق پرباران اقلیم‌های مناطق معتدل سرد و معتدل گرم دیم کشور انتخاب شد. گزارش معرفی لاین جدید پس از تایید در

انتخاب و وارد آزمایش‌های پیشرفته مقایسه عملکرد شد. در سال زراعی ۱۳۸۰-۸۱ این لاین در آزمایش مقایسه عملکرد DWYT-A با تولید ۲۵۶۳ کیلوگرم در هکتار به طور معنی داری نسبت به رقم زردک (۲۱۷۸ کیلوگرم در هکتار) عملکرد بیشتری داشت. در سال ۸۲-۱۳۸۱ لاین جدید در آزمایش مقایسه عملکرد DWYT-B و دارید ۲۴۸۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم زردک (۴۲۰ کیلوگرم در هکتار) عملکرد بیشتری داشت. در سال‌های ۱۳۸۲-۸۵ این لاین با چهارده لاین دیگر در قالب طرح سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ایستگاه‌های تحقیقاتی سراورود کرمانشاه و شیروان چرداول ایلام در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با ارقام شاهد زردک و سرداری مقایسه شد. میانگین عملکرد دانه لاین جدید و رقم زردک در شرایط دیم به ترتیب ۳۲۸۲ و ۲۱۳۰ کیلوگرم در هکتار بود که اختلاف عملکرد دانه آن‌ها حدود ۱۱۵۲ کیلوگرم در هکتار بود. در شرایط دو بار آبیاری تکمیلی (مراحل ساقه و پرشدن دانه) در ایستگاه سراورود، میانگین عملکرد دانه لاین جدید و ارقام زردک و سرداری به ترتیب ۲۹۴۰، ۲۲۶۹ و ۲۱۲۳ کیلوگرم در هکتار بود. در جدول ۱ میانگین عملکرد لاین جدید با ارقام شاهد زردک، سرداری و سمیره در مناطق مختلف مقایسه شده است.

نتایج ارزیابی واکنش لاین جدید به بیماری‌های مهم در خزانه‌های بیماری با

جدول ۱- میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) لاین جدید گندم دوروم (رقم ساجی) و ارقام شاهد در آزمایش‌های دیم، آبیاری تکمیلی و تحقیقی- تطبیقی در مناطق و سال‌های مختلف

Table 1. Mean grain yield (kg ha^{-1}) of the new durum wheat line (Saji cv.) and check cultivars in rainfed, supplementary irrigation and on-farm experiments in different locations and years

| مناطق Locations | سال Year | شرایط آزمایش Experimental conditions | لاین جدید New line | ارقام شاهد Check cultivar | | |
|--------------------|-------------|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | Zardak Durum wheat for moderate cold climate | Seimareh Durum wheat for warm climate | Sardari Bread wheat for cold and moderate |
| Sararood | 2000-08 | Rainfed | 2706 | 2169 | - | 2393 |
| | | Suppl. Irrigation | 2940 | 2269 | - | 2123 |
| Shirvan-Chardavel | 2003-08 | Rainfed | 2405 | 2168 | 2365 | 2159 |
| | | Suppl. Irrigation | 3081 | 2877 | 2692 | 2717 |
| Gachsaran | 2000-04 | Rainfed | 3257 | - | 3293 | - |
| Gonbad | 2000-04 | Rainfed | 3041 | - | 2542 | - |
| Moghan | 2000-04 | Rainfed | 2614 | - | 3397 | - |
| Koohdasht | 2004-04 | Rainfed | 3691 | - | 3097 | - |
| Kermanshah | 2005-08 | On-farm | 2214 | 1389 | - | 1940 |

کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گرفت و بر
اساس نامه شماره ۸۹۶۴۱/۲۲۲ مورخ
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ آن سازمان به نام ساجی نامگذاری
شد.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و موسسه
تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در جلسه
مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ کمیته انتخاب و نامگذاری
ارقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

آدرس: معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، صندوق پستی ۱۱۶۴-۶۷۱۴۵، کرمانشاه

Archive of SID