

خصوصیات ارقام سفید انگور استان فارس

Characteristics of White Grape Cultivars of Fars Province, Iran

محمد جواد کرمی

مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۴/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

چکیده

کرمی، م. ج. ۱۳۹۱. خصوصیات ارقام سفید انگور استان فارس. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱-۲۸: ۳۵۳-۳۸۱.

در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ با استفاده از توصیف‌گر جهانی انگور (IBPGR) در مراحل مختلف رشد، شناسایی بیش از صد صفت ارقام انگور استان فارس انجام شد. از ۸۱ رقم انگور موجود در باغ کلکسیون زرقان، ۵۵ رقم سفید و ۲۶ رقم رنگی بودند. دنдрوگرام تشابه ارقام نشان داد که ارقام قلاتی دودج و سیاه ارسنجان با ۸۴/۵۳ درصد تشابه بیشترین شباهت را داشتند و کمترین شباهت با ۴۲/۳۸ درصد تشابه در ارقام رجبی عقیقی زرقان با یاقوتی زرقان دیده شد. همه این ارقام از گونه *Vitis vinifera* L. بودند. ارقام گیهای زرقان و یاقوتی زرقان بیدانه و مابقی دار بودند. همه ارقام گل‌های دوجنسه داشتند. فقط ارقام مهرسیاه مزایجان، اشکنک مزایجان بوانات، ایته سیاه زرقان و پیکمی دودج دارای گل‌های ماده بودند. ارقام ایته ریز زرقان، ایته بی‌نام زرقان، مهر سیاه مزایجان و بش‌مزایجان دیر شکوفاترین ارقام بودند. ارقام قلاتی دودج و سزدگ قلات به دلیل اندازه حبه، خوش و آبدار بودن حبه‌ها مناسب‌ترین ارقام برای تهیه آب میوه و آب غوره شناسائی شدند. ارقام عسکری پیکمی زرقان و نجف‌آبادی زرقان متتحمل به سرمای زودرس پاییزه بودند. با توجه به خصوصیات میوه، ارقام به انگورهای تازه خوری، کشمکشی و آب میوه‌ای گروه‌بندی شدند. ارقام ایته سیاه رزقان، رطبی سفید زرقان، نجف‌آبادی زرقان، عسکری نجف‌آباد آباده، متفاوتی نجف‌آباد آباده، بش بوانات، کشمکشی سبز بوانات، رطبی زرقان، قلاتی دودج، سیاه سمرقندی دودج، کله‌ای محمدآباد، تخم کیکی مزایجان و بش مزایجان بوانات عملکرد بالائی داشتند. بارده بودن این ارقام می‌تواند ناشی از سازگار بودن آن‌ها با هرس کوتاه در سیستم توریت پاچراغی اعمال شده در کلکسیون باشد.

واژه‌های کلیدی: انگور (Vitis vinifera L.), ارقام محلی، موکاری، تاک نگاری.

مقدمه

با ارزش از قبیل مقاومت به آفات و بیماری‌ها، و تنش‌های محیطی مانند سرما، شوری، خشکی، و یا عملکرد بالا و نظایر آن‌ها باشند، به همین دلیل و به منظور جلوگیری از فرسایش ژنتیکی ارقام انگور در استان فارس، مطالعه و بررسی خصوصیات آن‌ها ضرورت دارد.

اکثر کشورهای تولیدکننده انگور به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات محصول انگور، اقدام به شناسایی و جمع‌آوری ارقام و در نهایت تشکیل کلکسیون‌های باگی از این ارقام کرده و این کلکسیون‌ها را با روش‌های مختلفی از قبیل روش‌های شیمیایی، بیوشیمیایی، ایزوآنزیم‌ها و الکتروفورز مورد مطالعه قرار داده‌اند (Bist and Sharma, 1990; Avarmov *et al.*, 1989; Volpe, 1990; Martens and Fretz, 1980; Bachman, 1989).

مهمنترین صفات مورد بررسی در مطالعات تاکنگاری و شناسایی گونه‌ها و ارقام مو، صفات مرغولوژیکی هستند که در اکثر کشورها از آن‌ها استفاده می‌شود (Wolpert, *et al.*, 1995; Mannini *et al.*, 1992) ایران نیز با استفاده از این روش ارقام انگور استان‌های کردستان (Karami, 1996, 2006, 2009) (Haji Amiri and Sanei Shariatpanahi, 1996) خرم‌آباد لرستان (Zahedi and Sanei Shariatpanahi, 1996) منطقه مرکزی (Madani, 1994)، قزوین و

استان فارس با دارا بودن شخصیت هزار تاکستان رتبه اول سطح زیر کشت انگور کشور را در اختیار دارد (Anonymous, 2008). به همین دلیل تاکداری نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند. تنوع ارقام انگور در این استان قابل توجه است و ارقام زیادی با خصوصیات متفاوت در تاکستان‌های استان وجود دارد. وسعت زیاد استان، شرایط آب و هوایی متنوع و قدمت تاکداری در این منطقه می‌تواند در این موضوع نقش داشته باشد، بنابراین شناسایی و جمع‌آوری این ارقام ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از آن‌ها برای احداث باغ کلکسیون و مطالعه خصوصیات آن‌ها در شرایط یکسان استفاده کرد. ارقام این کلکسیون‌ها می‌توانند در برنامه‌های بهنژادی و تبادل مواد ژنتیکی با مراکز تحقیقاتی مهم دنیا مورد استفاده قرار گیرند. در بین ارقام محلی ارقام با میوه‌های مطلوب وجود دارد که به علت برخورداری از کیفیت بالا جهت مصارف تازه‌خواری، تهیه کشمش و سبزه مورد توجه باقداران بوده و در سطح تجاری تولید می‌شوند، از طرف دیگر ارقامی نیز وجود دارند که به دلایل مختلف به خصوص فرهنگ و ذائقه مردم منطقه و یا پایین بودن خصوصیات ظاهری و بازارپسندی آن‌ها، توانایی رقابت با گروه اولی را نداشته و به مرور زمان موجبات حذف آن‌ها از چرخه تولید و با زوال ژنتیکی آن‌ها فراهم می‌شود. این ارقام ممکن است که دارای ژن‌های

(۲ صفت)، گل آذین (۵ صفت)، برگ بالغ (۲۹ صفت)، میان گره (۲ صفت)، خوشه (۶ صفت)، جبه (۱۶ صفت)، دانه (۵ صفت)، مراحل مختلف زمانی (۴ صفت)، در مرحله برداشت میوه (۲ صفت).

برای گروه‌بندی ارقام و تعیین درصد شباهت آن‌ها از روش آماری تجزیه خوشه‌ای (تجزیه کلاستر) استفاده شد. برای این منظور ابتدا بر اساس رنگ جبه ارقام به دو گروه رنگی و سفید تقسیم و برای هر گروه بر اساس صفات مورد نظر تجزیه خوشه‌ای و دندروگرام تشابه ارقام آن‌ها رسم شد. برای این منظور با استفاده از تجزیه کلاستر بر اساس کدهای مربوط به صفات اندازه‌گیری شده و بر اساس فرمول تعیین فواصل اقلیدسی^۲ $d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^n (X_{ij} - X_{ik})^2}$ با

ترکیب ۲۹ صفت گروه‌های مشابه بین ارقام مشخص شد. صفات مورد نظر عبارت بودند از ۱- تراکم کرک‌های خوابیده روی سطح پائینی برگ، ۲- تراکم کرک‌های ایستاده بین رگبرگ‌های سطح پائینی برگ، ۳- تراکم کرک‌های ایستاده روی رگبرگ‌های اصلی سطح پائینی برگ، ۴، ۵، ۶ و ۷- به ترتیب طول رگبرگ اصلی، اولین، دومین و سومین رگبرگ جانبی برگ، ۸- فاصله محل اتصال دمبرگ به محل اتصال سومین رگبرگ جانبی برگ، ۹ و ۱۰- به ترتیب فاصله محل اتصال دمبرگ به برگ تا سینوس‌های بالایی و پائینی برگ، ۱۱ و ۱۲- به ترتیب طول و عرض دندانه اولین رگبرگ جانبی برگ، ۱۳ و ۱۴- به ترتیب طول

تاکستان (Zeinanloo, 1993؛ Nejatian, 2006)، آذربایجان غربی (Alizadeh, 2004؛ Dadgar, 1988) شناسایی شده‌اند. در همین راستا در سال ۱۳۷۲ ارقام محلی انگور استان فارس از سراسر استان فارس جمع آوری و یک کلکسیون از این ارقام در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان فارس احداث شد. ارقام این کلکسیون در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد سه تاک در هر واحد آزمایشی (کرت) کاشته شده‌اند. بنابراین در این کلکسیون از هر رقم تعداد نه تاک وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ارقام سفید انگور موجود در کلکسیون زرقان فارس و تشریح خصوصیات آن‌ها برای استفاده در برنامه‌های به نژادی انگور و توسعه تاکداری بود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در کلکسیون انگور زرقان فارس انجام شد. زرقان دارای متوسط بارندگی سالانه حدود ۸۰۰ میلی‌متر است و زمستان‌های معتدل نسبت به سایر مناطق استان دارد. بر این مبنای استفاده از توصیف‌گر جهانی انگور کارهای مطالعاتی مربوط به ثبت ۱۰۲ صفت کمی و کیفی (Anonymous, 1983) شامل موارد ذیل انجام شد:

شاخه چوبی (۶ صفت)، پایه یا بوته مو (۳ صفت)، شاخه جوان (۵ صفت)، برگ جوان (۶ صفت)، شاخه سبز (۱۱ صفت)، پیچک

در صد قند متوسط (۵/۱۸٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۲ میلی‌گرم) با متوسط تعداد ۲/۳ دانه به طول ۵/۸۵ و عرض ۵/۳۵ میلی‌متر. رقمی است متواسطرس دارای ۱۲۱ روز دوره رشد (از زمان شکفتن جوانه تا رسیدن میوه) که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم ایته درشت زرقان

رقمی است زود شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۹ سانتی‌متر، جبهه‌ها تخم‌مرغی شکل، اندازه آن‌ها متوسط (۸/۲ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه متوسط (۱۶ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۶ میلی‌متر)، جبهه‌ها سبک تا متوسط (۴/۲ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، در صد قند بالا (۰/۲٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۵ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۷ دانه به طول ۴/۸۸ میلی‌متر و عرض ۲/۴۴ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۳ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم ایته ریز زرقان

رقمی است دیر شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متواسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه بلند به طول ۲۷ و

و عرض سومین رگبرگ جانبی برگ، ۱۵- اندازه سینوس دمبرگی، ۱۶- نسبت طول دومین رگبرگ جانبی به طول رگبرگ اصلی، ۱۷- نسبت طول سومین رگبرگ جانبی به طول رگبرگ اصلی، ۱۸- نسبت فاصله محل اتصال دمبرگ به برگ تا سینوس‌های پایینی برگ به طول اولین رگبرگ جانبی برگ، ۱۹- نسبت فاصله محل اتصال دمبرگ به برگ تا سینوس‌های بالایی برگ به طول دومین رگبرگ جانبی برگ، ۲۰ و ۲۱- به ترتیب نسبت طول به عرض دندانه اولین و سومین رگبرگ جانبی برگ. علاوه بر رنگ میوه از چهار صفت دیگر میوه و سه صفت دانه از قبیل، طول جبهه، عرض جبهه، وزن جبهه، طول، عرض و وزن دانه نیز استفاده شدند.

نتایج و بحث

مشخصات ۵۱ رقم مطالعه شده به شرح ذیل بود:

رقم رجی عقیقی زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا با قدرت رشد ضعیف و قدرت کم تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۷ سانتی‌متر و عرض ۹ سانتی‌متر، جبهه به شکل ییضی طویل، اندازه جبهه متوسط (۹/۲ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه متوسط (۲۱ میلی‌متر)، عرض جبهه متوسط (۱۶ میلی‌متر)، جبهه‌ها سبک تا متوسط (۵/۲ گرم)، دم جبهه خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط،

تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم ایته سیاه زرقان

این رقم علی‌رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی سفید رنگ است. رقمی است زود شکوفا، با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد در تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشة متوسط به طول ۱۹ و عرض ۸ سانتی‌متر، جبه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها بزرگ (۳/۸۰ سانتی‌مترمربع)، طول جبه متوسط (۲۱ میلی‌متر)، عرض جبه متوسط (۱۸ میلی‌متر)، وزن جبه‌ها متوسط (۳/۱ گرم)، دم جبه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (۱۹٪)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۴۰ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۹ دانه به طول ۴/۷۲ میلی‌متر و عرض ۲/۳۷ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۵۸ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم رطبی سفید زرقان

رقمی است زود شکوفا با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، طول خوشة متوسط به طول ۱۹ و عرض ۱۲ سانتی‌متر، جبه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها بزرگ (۳/۸۰ سانتی‌مترمربع)، طول جبه بلند (۲۳ میلی‌متر)، عرض جبه کم (۱۵ میلی‌متر)، وزن جبه‌ها سبک تا متوسط

عرض ۱۰ سانتی‌متر، جبه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۶۶ سانتی‌مترمربع)، طول جبه متوسط (۱۹ میلی‌متر)، عرض جبه کم (۱۴ میلی‌متر)، وزن جبه‌ها سبک (۲/۲ گرم)، دم جبه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (۱۸/۵٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۳ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۴ دانه به طول ۴/۸۵ میلی‌متر و عرض ۲/۶۸ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۰ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم اتابکی زرقان

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد در تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشه بلند به طول ۲۳ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبه‌ها واژتخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۴۰ سانتی‌مترمربع)، طول جبه متوسط (۱۶ میلی‌متر)، عرض جبه کم (۱۵ میلی‌متر)، وزن جبه‌ها سبک تا متوسط (۲/۷ گرم)، دم جبه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (۱۹٪)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۴۰ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۹ دانه به طول ۴/۶۷ میلی‌متر و عرض ۲/۵۲ میلی‌متر. رقمی است متوضطرس دارای ۱۲۶ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد. به دلیل رنگ طلایی میوه ظاهر جذابی داشته و برای مصرف

رقم پیکمی سفید دودج

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت کم تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبهه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آنها متوسط (۲/۲۰ سانتی‌مترمربع)، جبهه کوتاه (۱۷ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳ میلی‌متر)، جبهه‌ها سبک (۱/۹ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (۱۷/۵٪)، آبدار فاقد مزه مخصوص، پوست نازک و دارای سفتی متوسط، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک (۱۵ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۶ دانه به طول ۴/۳۵ میلی‌متر و عرض ۱/۷۹ میلی‌متر. رقمی است زودرس دارای ۱۱۶ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد به دلیل ریز بودن دانه‌ها، پوست نازک، رنگ‌گیری یکنواخت و طلایی جبهه‌ها رقم بازارپسند و مناسب برای تازه‌خوری و تهیه کشمش می‌باشد.

رقم یاقوتی زرقان

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، طول خوشه متوسط به طول ۱۷ و عرض ۹ سانتی‌متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آنها متوسط (۲/۲۰ سانتی‌مترمربع)، جبهه کوتاه (۱۷/۲ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳ میلی‌متر)، جبهه‌ها خیلی سبک تا سبک (۱/۱ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی

(۲/۸ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (۱/۱۸٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک (۲۴ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۴ دانه به طول ۴/۴۵ میلی‌متر و عرض ۲/۲۵ میلی‌متر. رقمی است متوسط رس دارای ۱۲۷ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد. این رقم به دلیل عملکرد بالا، عطر و طعم خوب میوه، شکل و رنگ طلایی خوشه به عنوان یک رقم مناسب برای تازه‌خوری و توسعه تاکستان‌ها قابل توصیه است.

رقم نجف‌آبادی زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد قوی و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۶ و عرض ۶ سانتی‌متر، جبهه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آنها متوسط (۲/۴۰ سانتی‌مترمربع)، جبهه کوتاه (۱۷ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۴ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۱ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (۰/۲۱٪)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط تاسنگین (۴۷ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۶ دانه به طول ۵/۴۵ میلی‌متر و عرض ۲/۳۲ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۱ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد. برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۸ سانتی متر، جبهه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها متوسط (۳/۸۰ سانتی مترمربع)، طول جبهه متوسط (۲۱ میلی متر)، عرض جبهه متوسط (۱۸ میلی متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۵ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (٪۱۸)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (وزن هر دانه ۴۱ میلی گرم)، متوسط تعداد ۲/۲ دانه در هر جبهه به طول ۵/۲۸ میلی متر و عرض ۲/۶۳ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۱ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم سزدنگ قلات

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه‌ها بلند به طول ۲۳ و عرض ۱۲ سانتی متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آن‌ها کوچک (۱/۸۰ سانتی مترمربع)، طول جبهه‌ها کوتاه (۱۳/۵ میلی متر)، عرض جبهه‌ها کم (۱۳ میلی متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۵ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (٪۱۸)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۴۰ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۳ دانه به طول ۵/۲۵ میلی متر و عرض ۲/۷۵ میلی متر. رقمی است دیررس دارای

کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (٪۱۸/۵)، دارای دانه سبک (وزن هر دانه ۲۱ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۲ دانه به طول ۵/۴۹ میلی متر و عرض ۲/۶۵ میلی متر. رقمی است متوسطرس دارای ۱۲۰ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقم پیکمی دودج

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت کم تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، طول خوشه متوسط به طول ۱۸ و عرض ۷ سانتی متر، جبهه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۴۰ سانتی مترمربع)، جبهه کوتاه (۱۷/۲ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۳/۲ میلی متر)، جبهه‌ها سبک (۱/۹ گرم)، با سفتی متوسط و پوست نازک، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه مشکل، درصد قند پایین (٪۱۶/۵)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۲۳ میلی گرم)، متوسط تعداد ۲/۰ دانه در هر جبهه به طول ۳/۴۹ میلی متر و عرض ۱/۵۷ میلی متر. رقمی است متوسطرس دارای ۱۲۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد. رقمی است بسیار جالب که برای تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم ریش بابا سفید قصردشت

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت

جدا شدن حبه از خوشه مشکل، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۱۸ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۱ دانه به طول ۴/۵۶ میلی‌متر و عرض ۱/۷۴ میلی‌متر در هر حبه. رقمی است دیررس دارای ۱۳۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم ریش بابا سفید نجف‌آباد

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط، تراکم خوشه متوسط، طول خوشه متوسط به طول ۲۰ و عرض ۸ سانتی‌متر، حبه‌ها به شکل بیضی کوتاه، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۵۰ سانتی‌مترمربع)، طول حبه متوسط (۱۸ میلی‌متر)، عرض حبه کم (۱۴ میلی‌متر)، وزن حبه‌ها سبک تا متوسط (۲/۹ گرم)، دم حبه‌ها کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (۱۸/۰٪)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۲۵ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۸ دانه به طول ۴/۵۰ میلی‌متر و عرض ۲/۳۵ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقم عسکری نجف‌آباد آباده

رقمی است متوسط شکوفا با عملکرد بالا دارای قدرت رشد ضعیف، تراکم خوشه زیاد، طول خوشه متوسط به طول ۱۷ و عرض ۷ سانتی‌متر، حبه‌ها به شکل تخم مرغی باز،

۱۵۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم گیهای قلات

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۶ و عرض ۹ سانتی‌متر، حبه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۲۰ سانتی‌مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۷ میلی‌متر)، عرض حبه کم (۱۳ میلی‌متر)، وزن حبه‌ها متوسط (۱/۷ گرم)، دم حبه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه مشکل، درصد قند متوسط (۱۸/۰٪)، دارای دانه‌هایی سنگین وزن (۵۲ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۱ دانه به طول ۵/۹۵ میلی‌متر و عرض ۲/۹۲ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۶ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد. برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم ۱۰۸ زرقان

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه کم، خوشه کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۹ سانتی‌متر، حبه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۴۰ سانتی‌مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۷/۲ میلی‌متر)، عرض حبه کم (۱۴ میلی‌متر)، وزن حبه‌ها سبک (۱/۹ گرم)، دم حبه‌ها کوتاه،

رقم نباتی بهاره نجف آباد آباده

رقمی است متوسط تا دیر شکوفا، دارای قدرت رشد ضعیف و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۷ سانتی متر، حبه ها گرد، اندازه آنها کوچک (۱/۷۰ سانتی مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۳/۵ میلی متر)، عرض حبه خیلی کم (۱۲/۳ میلی متر)، وزن حبه ها سبک (۱/۷ گرم)، دم حبه ها خیلی کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۱)، دارای دانه هایی با وزن متوسط (۲۵ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۵ دانه به طول ۴/۵۰ میلی متر و عرض ۲/۳۵ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می رسد و برای مصارف تازه خوری و تهیه کشمش و توسعه تاکستان های استان مناسب است.

رقم بُری سیاه نجف آباد آباده

این رقم علی رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی است با میوه های سفید رنگ، متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه های فرعی، تراکم خوشه خیلی زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۶ و عرض ۶ سانتی متر، حبه ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آنها متوسط (۲/۷۰ سانتی مترمربع)، طول حبه متوسط (۱۸ میلی متر)، عرض حبه کم (۱۵ میلی متر)، وزن حبه ها سبک (۱/۹ گرم)، دم حبه ها خیلی

اندازه آنها متوسط (۲/۴۰ سانتی مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۶/۳ میلی متر)، عرض حبه کم (۱۴-۷ میلی متر)، وزن حبه ها سبک (۲/۲ گرم)، دم حبه ها خیلی کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۱)، دارای دانه هایی با وزن متوسط (۲۵ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۵ دانه به طول ۴/۵۰ میلی متر و عرض ۲/۳۵ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می رسد و برای مصارف تازه خوری و تهیه کشمش و توسعه تاکستان های استان مناسب است.

رقم متقالي نجف آباد آباده

رقمی است متوسط شکوفا، با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد متوسط، تراکم خوشه متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۱۰ سانتی متر، حبه ها گرد، اندازه آنها متوسط (۲/۵۰ سانتی مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۶ میلی متر)، عرض حبه کم (۱۵/۱ میلی متر)، وزن حبه ها سبک (۲/۱ گرم)، دم حبه ها خیلی کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (٪۱۸)، دارای دانه هایی با وزن زیاد (۵۳ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۴ دانه به طول ۵/۵۶ میلی متر و عرض ۲/۸۳ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می رسد و برای مصارف تازه خوری، و توسعه تاک داری مناسب است.

آنها متوسط ($2/50$ سانتی‌مترمربع)، طول جبه کوتاه ($16/2$ میلی‌متر)، عرض جبه کم ($15/6$ میلی‌متر)، وزن جبه‌ها سبک ($2/1$ گرم)، دم جبه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبه از خوشید آسان، درصد فند متوسط ($17/5$ ٪)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط تا سنگین (45 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $1/3$ دانه به طول $5/43$ میلی‌متر و عرض $2/46$ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای 131 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقمی ریش بابا سفید نجف‌آباد آباده

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشید متوسط، طول خوشید متوسط به طول 19 و عرض 10 سانتی‌متر، جبه‌ها استوانه‌ای شکل، اندازه آنها درشت ($3/40$ سانتی‌مترمربع)، طول جبه متوسط (21 میلی‌متر)، عرض جبه کم (14 میلی‌متر)، وزن جبه‌ها متوسط ($3/0$ گرم)، دم جبه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشید متوسط، درصد فند متوسط ($17/5$ ٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک (40 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $2/6$ دانه به طول $4/85$ میلی‌متر و عرض $2/75$ میلی‌متر. رقمی است متوسطرس دارای 122 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

کوتاه، جدا شدن جبه از خوشید متوسط، درصد فند متوسط ($17/5$ ٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (31 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $2/1$ دانه به طول $4/42$ میلی‌متر و عرض $2/24$ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای 129 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقمی مادر بچه نجف‌آباد آباده

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشید خیلی متوسط، خوشید کوتاه به طول 17 و عرض 7 سانتی‌متر، جبه‌ها گرد، اندازه آنها متوسط ($2/50$ سانتی‌مترمربع)، طول جبه کوتاه (15 میلی‌متر)، عرض جبه کم (14 میلی‌متر)، وزن جبه‌ها سبک ($2/0$ گرم)، دم جبه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشید سخت، درصد فند متوسط (18 ٪)، دارای دانه‌هایی سبک (35 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $1/7$ دانه به طول $4/35$ میلی‌متر و عرض $2/01$ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای 142 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقمی نباتی پاییزه نجف‌آباد آباده

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشید زیاد، خوشید کوتاه به طول 15 و عرض 6 سانتی‌متر، جبه‌ها گرد، اندازه

۲/۷۰ میلی متر. رقمی است متوسط رس دارای ۱۲۳ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می رسد و برای مصرف تازه خوری و توسعه تاکستان های استان قابل توصیه است.

رقم سفید بوانات

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه های فرعی، تراکم خوش متوسط، طول خوش متوسط به طول ۲۲ و عرض ۹/۵ سانتی متر، جبهات خوش متوسط شکل، اندازه آنها متوسط ۲/۹ سانتی مترمربع)، طول جبه متوسط (۲۰ میلی متر)، عرض جبه متوسط (۱۵ میلی متر)، وزن جبهات خوش متوسط (۲/۳ گرم)، دم جبهات کوتاه، جدا شدن جبه از خوش متوسط، درصد قند بالا (٪ ۲۱/۰)، دارای دانه هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۱ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۸ دانه به طول ۴/۵۲ میلی متر و عرض ۳/۳۴ میلی متر. رقمی است زود رس دارای ۱۱۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می رسد و برای مصرف تازه خوری مناسب است.

رقم سیاه جشنیون بوانات

این رقم علی رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی است با میوه های سفید رنگ، متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه های فرعی، تراکم خوش متوسط، طول خوش متوسط به طول ۲۲ و عرض ۱۰ سانتی متر،

رقم بُری سفید نجف آباد آباده

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه های فرعی، تراکم خوش زیاد، جبهات به شکل تخم مرغی باز، اندازه آنها کوچک (۲۰ سانتی مترمربع)، طول جبه کوتاه (۱۴ میلی متر)، عرض جبه کم (۱۴ میلی متر)، جبهات سبک (۲/۰ گرم)، دم جبهات خیلی کوتاه، جدا شدن جبه از خوش متوسط، درصد قند متوسط (۱۸/۵٪)، دارای دانه های سبک وزن ۲۳ (میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۱ دانه به طول ۴/۳۶ میلی متر و عرض ۲/۳۱ میلی متر. رقمی است زودرس دارای ۱۱۳ روز دوره رشد که در شرایط زرقان در دهه دوم مرداد ماه می رسد و برای مصرف تازه خوری و کشمش مناسب است.

رقم بیدانه جشنیون بوانات

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه های فرعی، تراکم خوش متوسط، طول خوش کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۱۰ سانتی متر، جبهات به شکل تخم مرغی، اندازه آنها خیلی متوسط (۲/۴۰ سانتی مترمربع)، طول جبه بلند (۲۳ میلی متر)، عرض جبه متوسط (۲۰ میلی متر)، وزن جبهات متوسط تا زیاد (۳/۶ گرم)، دم جبهات خیلی کوتاه، جدا شدن جبه از خوش متوسط، درصد قند متوسط (۱۹٪)، دارای دانه هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۴ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۹ دانه به طول ۴/۹۸ میلی متر و عرض

جبه‌ها و عملکرد بالا یکی از ارقام مناسب برای مصرف تازه‌خوری، تهیه کشمش و توسعه تاک‌داری است.

رقم کشمی سبز بوانات

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، با عملکرد بالا، تراکم خوشة متوسط، طول خوشه زیاد به طول ۲۴ و عرض ۸ سانتی‌متر، جبه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها کوچک ($1/9$ سانتی‌مترمربع)، طول جبه کوتاه ($15/1$ میلی‌متر)، عرض جبه خیلی کم ($12/4$ میلی‌متر)، وزن جبه‌ها خیلی کم ($1/2$ گرم)، دم جبه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه آسان، درصد قند بالا ($21/0$ ٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (31 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $1/8$ دانه به طول $4/52$ میلی‌متر و عرض $2/34$ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای 131 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای مصارف تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم بش بوانات

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، طول

جبه‌ها ییضی شکل، اندازه آن‌ها متوسط ($3/0$ سانتی‌مترمربع)، طول جبه متوسط (20 میلی‌متر)، عرض جبه کم (15 میلی‌متر)، جبه‌ها سبک وزن ($2/3$ گرم)، دم جبه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه آسان، درصد قند بالا ($21/0$ ٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (31 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $1/8$ دانه به طول $4/52$ میلی‌متر و عرض $2/34$ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای 131 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای مصارف تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم یک ریز با وزن خیلی سبک

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، با عملکرد بالا، تراکم خوشه زیاد، طول خوشه متوسط به طول 20 و عرض 8 سانتی‌متر، جبه‌ها گرد، اندازه آن‌ها درشت ($3/20$ سانتی‌مترمربع)، طول جبه متوسط (18 میلی‌متر)، عرض جبه متوسط (18 میلی‌متر)، وزن جبه‌ها متوسط ($3/1$ گرم)، دم جبه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (22 ٪)، دارای دانه‌های سبک وزن (25 میلی‌گرم)، با متوسط تعداد $2/3$ دانه به طول $4/55$ میلی‌متر و عرض $2/35$ میلی‌متر. رقمی است متوسط رس دارای 124 روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد. به دلیل رنگ طلایی میوه در زمان رسیدن، شکل خوشه و جبه، گوشته بودن

رقم سیاه گردن بوانات

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، طول

رقم گیهای زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوش کم، طول خوش بلنده طول ۲۷ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها درشت (۳/۲ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه متوسط (۲۱ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۵ میلی‌متر)، جبهه‌ها خیلی سبک (۱/۰ گرم)، آبدار، با سفتی متوسط، پوست نازک، معطر، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش متوسط، درصد قند بالا (٪۲۰). رقمی است بیدانه، دیررس، دارای ۱۳۱ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصارف تازه‌خوری مناسب تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

تخم تهرانی زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوش زیاد، طول خوش کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۳ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه کوتاه (۱۵/۳ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۵ میلی‌متر)، جبهه‌ها سبک (۲/۳ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش آسان، درصد قند متوسط بالا (٪۱۹)، دارای دانه‌های خیلی سبک تا سبک (۱۳ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۳ دانه به طول ۳/۸۰ میلی‌متر و عرض ۱/۴۳ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای

خوش متوسط به طول ۱۹ و عرض ۱۰ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها درشت (۳/۱ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه متوسط (۲۴ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها سبک (۲/۲ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش متوسط، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۴۱ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۷ دانه به طول ۴/۱۹ میلی‌متر و عرض ۲/۳۸ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۲۷ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصارف تازه‌خوری مناسب است.

رقم ایته بی‌نام زرقان

رقمی است دیر شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوش متوسط، طول خوش متوسط به طول ۱۹ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آن‌ها درشت (۳/۴ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه متوسط (۱۹ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۰ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش متوسط، درصد قند خیلی بالا (٪۲۴)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک (۲/۷ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۲ دانه به طول ۴/۵۶ میلی‌متر و عرض ۲/۳۷ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۵۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

بالا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل واژ تخم مرغی، اندازه آن‌ها درشت (۳/۶ سانتی‌متر مربع)، طول جبهه بلند (۲۳/۱ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۵/۴ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۳ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۱)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۶ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۰ دانه به طول ۴/۵۶ میلی‌متر و عرض ۲/۴۴ میلی‌متر. رقمی است متواسطرس دارای ۱۲۳ روز دوره رشد در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقمی ریش بابا سفید زرقان

رقمی است متواسط شکوفا، دارای قدرت رشد ضعیف و قدرت متواسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه به طول ۱۷ و عرض ۹ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل بیضی طویل، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۰ سانتی‌متر مربع)، طول جبهه بلند (۲۷ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳ میلی‌متر)، جبهه‌ها سبک (۱/۹ گرم)، دم جبهه‌ها متوسط، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (٪۱۸)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۱ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۲ دانه به طول ۴/۱۰ میلی‌متر و عرض ۲/۲ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۱ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس

۱۵۸ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم شهریور ماه می‌رسد برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقمی رطبی زرقان

رقمی است زود شکوفا، با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها درشت (۳/۷ سانتی‌متر مربع)، طول جبهه بلند (۲۳ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۶ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۳ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (٪۱۸)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۱ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۷ دانه به طول ۴/۶۵ میلی‌متر و عرض ۲/۴۱ میلی‌متر. رقمی است متواسطرس دارای ۱۲۶ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد. به طور متوسط هر بوته آن حدود ۲۵ کیلوگرم میوه تولید می‌کند و در صورت وجود ۲۰۰۰ تاک در هر هکتار در سیستم تربیت پاچراغی به طور متوسط ۵۰ تن در هکتار عملکرد خواهد داشت. بنابراین به دلیل عملکرد بالا، عطر و طعم خوب، رنگ و شکل ظاهری خوب میوه آن، یکی از ارقام پر طرفدار استان فارس است و برای مصارف تازه‌خوری و توسعه تاکستان‌ها یک رقم بسیار مناسب است.

رقمی رجبی سفید زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، با عملکرد

دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۱۷ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۰ دانه به طول ۴/۷۲ میلی متر و عرض ۱/۴۵ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۳ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم قلاتی دودج

رقمی است زودتا متوسط شکوفا، با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه طویل به طول ۲۸ و عرض ۹ سانتی متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۳ سانتی مترمربع)، طول جبهه بلند (۱۹/۰ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۴/۰ میلی متر)، جبهه‌ها سبک (۱/۹ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه مشکل، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۱۹ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۱ دانه به طول ۳/۳۷ میلی متر و عرض ۱/۶۴ میلی متر. رقمی است متosterس دارای ۱۲۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد به دلیل دانه‌های بسیار ریز و رنگ جالب، نازکی پوست یکی از ارقام پر طرفدار در استان فارس است که برای مصرف تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم سیاه سمرقندی دودج

این رقم علی‌رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی است با میوه‌های سفید رنگ، متوسط شکوفا، با

در در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقم عسکری زرقان

رقمی است زود شکوفا، دارای قدرت رشد ضعیف و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه کوتاه به طول ۱۷ و عرض ۷ سانتی متر، جبهه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها درشت (۳/۲ سانتی مترمربع)، طول جبهه متوسط (۲۱/۰ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۵/۰ میلی متر)، جبهه‌ها سبک (۱/۹ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه مشکل، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۱۹ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۱ دانه به طول ۳/۳۷ میلی متر و عرض ۱/۶۴ میلی متر. رقمی است متosterس دارای ۱۲۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد به دلیل دانه‌های بسیار ریز و رنگ جالب، نازکی پوست یکی از ارقام پر طرفدار در استان فارس است که برای مصرف تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم کله‌ای سفید دودج

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۶ و عرض ۷ سانتی متر، جبهه‌ها به شکل تخم مرغی باز، اندازه آن‌ها درشت (۳/۹ سانتی مترمربع)، طول جبهه بلند (۲۵/۰ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۵/۵ میلی متر)، جبهه‌ها سبک (۲/۵ گرم)،

دارای دانه‌هایی با وزن متوسط تا سنگین (۴۸ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۸ دانه به طول ۵/۲۱ میلی متر و عرض ۲/۸۰ میلی متر. رقمی است خیلی دیررس دارای ۱۷۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول مهر ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم انگور به ارسنجان

رقمی است زودتا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۶ سانتی متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۶ سانتی مترمربع)، جبهه‌ها کوتاه (۱۶/۰ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۶/۰ میلی متر)، وزن جبهه‌ها سبک تا متوسط (۲/۴ گرم)، دم جبهه‌ها خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۱)، دارای دانه‌های سنگین (۵۴ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۲ دانه به طول ۵/۷۳ میلی متر و عرض ۲/۷۲ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۶ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای نهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم انگور آب ارسنجان

رقمی است متوسط تا دیرشکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، طول خوشه کوتاه به طول ۱۴ و عرض ۸ سانتی متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۶ سانتی مترمربع)،

عملکرد بالا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه زیاد، خوشه‌ها متوسط تا بزرگ به طول ۱۹ و عرض ۱۰ سانتی متر، جبهه‌ها تخم مرغی باز، اندازه آنها درشت (۳/۵ سانتی مترمربع)، طول جبهه بلند (۲۳/۰ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۷/۰ میلی متر)، جبهه‌ها متوسط (۳/۷ گرم)، آبدار، ضخامت پوست متوسط، فاقد مزه مخصوص، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (٪۱۸)، دارای دانه‌هایی سبک وزن (۲۹ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۰ دانه به طول ۴/۶۵ میلی متر و عرض ۲/۳۵ میلی متر. رقمی است متوسط رس دارای ۱۱۷ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد برای تازه‌خوری بسیار مناسب است.

رقم سیاه ارسنجان

این رقم علی‌رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی است با میوه‌های سفید رنگ، متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، طول خوشه متوسط به طول ۱۸ و عرض ۶ سانتی متر، جبهه‌ها به شکل واژ تخم مرغی، اندازه آن‌ها کوچک (۱/۹ سانتی مترمربع)، جبهه‌ها کوتاه (۱۴/۲ میلی متر)، عرض جبهه کم (۱۳/۲ میلی متر)، وزن جبهه‌ها سبک تا متوسط (۲/۸ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند خیلی بالا (٪۲۳)،

رقم کله‌ای سیاه زرقان

این رقم علی‌رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی است با میوه‌های سفید رنگ، متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوش کم، طول خوش بلنده طول ۲۴ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبههای تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها کوچک (۲۰ سانتی‌متر مربع)، جبههای کوتاه (۱۵ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳ میلی‌متر)، جبههای سبک تا خیلی سبک (۱/۶ گرم)، دم جبههای خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش بقدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید خیلی بالا (٪۲۳)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۳۷ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۳/۷ دانه به طول ۵/۴۰ میلی‌متر و عرض ۲/۵۲ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۵۱ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم عسکری سفید زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوش کم، طول خوش‌ها کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۷ سانتی‌متر، جبههای گرد، اندازه آن‌ها کوچک (۱/۶ سانتی‌متر مربع)، طول جبهه کوتاه (۱۳/۰ میلی‌متر)، عرض جبهه خیلی کم (۱۲/۰ میلی‌متر)، جبههای سبک تا سبک (۱/۳ گرم)، دم جبههای کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش بخت، درصد قند متوسط (٪۱۹/۵)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط

جبههای کوتاه (۱۶/۰ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۶/۰ میلی‌متر)، وزن جبههای سبک (۲/۲ گرم)، دم جبههای خیلی کوتاه، جدا شدن جبهه از خوش بخت، درصد قند خیلی بالا (٪۲۴)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط تا سنگین (۴۶ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۵ دانه به طول ۵/۳۵ میلی‌متر و عرض ۲/۵۱ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۱ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم ریش بابا ارسنجان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوش کم، طول خوش بخت به طول ۱۸ و عرض ۸ سانتی‌متر، جبههای (۳/۵ سانتی‌متر مربع)، جبههای طویل (۲۳ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۵ میلی‌متر)، وزن جبههای متوسط (۳/۱ گرم)، دم جبههای متوسط، جدا شدن جبهه از خوش بخت، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۳۷ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۳/۷ دانه به طول ۵/۴۰ میلی‌متر و عرض ۲/۵۲ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۸ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریور ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خواری و توسعه تاکستان‌های استان مناسب است.

دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشه‌ها متوسط به طول ۱۸ و عرض ۸ سانتی‌متر، جبهه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها کوچک (۲۰ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه کوتاه (۱۵/۰ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳/۰ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها خیلی سبک تا سبک (۱/۳ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (۱۸/۵٪)، دارای دانه‌هایی سبک وزن (۱۰ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۱ دانه به طول ۴/۹۵ میلی‌متر و عرض ۳/۲۵ میلی‌متر. رقمی است متوسط رس دارای ۱۲۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد. رقمی است بازار پستاند با میوه‌های طلایی رنگ در زمان رسیدن، هم‌چنین به دلیل سخت جدا شدن جبهه‌ها از خوشه، یکی از ارقام مناسب برای تازه‌خوری و تهیه کشمش است.

رقم منقای شیراز

رقمی است زود شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه کم، خوشه‌ها متوسط به طول ۲۰ و عرض ۸ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل بیضی طویل، اندازه آن‌ها درشت (۳/۸ سانتی‌مترمربع)، جبهه طویل (۲۷/۰ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۴/۰ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها سبک تا متوسط (۲/۸ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه تا متوسط، جدا شدن جبهه از خوشه خیلی سخت، درصد قند خیلی بالا (۲۳/۰٪)، دارای دانه‌هایی با وزن متوسط (۳۸ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۵ دانه به طول ۵/۶۷ میلی‌متر و عرض ۲/۶۱ میلی‌متر.

۳۶ (میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۳ دانه به طول ۲/۸۱ میلی‌متر و عرض ۰/۶۸ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای ۱۳۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد. رقمی است بازار پستاند با میوه‌های طلایی رنگ در زمان رسیدن، هم‌چنین به دلیل سخت جدا شدن جبهه‌ها از خوشه، یکی از ارقام مناسب برای تازه‌خوری و تهیه کشمش است.

رقم آش سفید زرقان

رقمی است زود تا متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، به طول ۲۱ و عرض ۱۳ سانتی‌متر، جبهه‌ها به شکل واژ تخم مرغی، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۲۱ سانتی‌مترمربع)، طول جبهه کوتاه (۱۷/۰ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۳/۰ میلی‌متر)، جبهه‌ها سبک (۲/۱ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (۱۸,۵٪)، دارای دانه‌هایی سبک وزن (۴۳ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۷ دانه به طول ۵/۸۷ میلی‌متر و عرض ۲/۲۴ میلی‌متر. رقمی است متوسط رس دارای ۱۲۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصارف تازه‌خوری و تهیه کشمش مناسب است.

رقم عسکری پیکمی سیاه زرقان

این رقم علی‌رغم نام آن که در کلکسیون به عنوان رقمی رنگی ثبت شده است رقمی است با میوه‌های سفید رنگ، زود تا متوسط شکوفا،

متوسط، درصد قند بالا (٪۲۰)، دارای دانه‌های سنگین (۵۳ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۱/۲ دانه به طول ۵/۴۹ میلی متر و عرض ۳/۰۶ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۹ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم شهریورماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقمی کله‌ای محمدآباد

رقمی است متوسط شکوفا، با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد کم و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة زیاد، خوشه‌ها متوسط تا بزرگ به طول ۱۸ و عرض ۸ سانتی متر، جبهه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها درشت (۳/۴ سانتی مترمربع)، طول جبه متوسط (۲۰/۰ میلی متر)، عرض جبه کم (۱۷/۰ میلی متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۷ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه سخت، درصد قند متوسط (۱۶/۵٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۰ میلی گرم)، با متوسط تعداد ۲/۳ دانه به طول ۵/۲۱ میلی متر و عرض ۲/۵۱ میلی متر. رقمی است دیررس دارای ۱۴۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه اول شهریورماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره بسیار مناسب است.

رقمی تخم کبکی مزایجان

رقمی است متوسط شکوفا با عملکرد بالا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه‌ها طویل به طول ۲۵ و عرض ۱۰ سانتی متر، جبهه‌ها

رقمی است متوسطرس دارای ۱۲۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و به دلیل شکل ظاهری و طعم خوب آن به عنوان یک رقم مناسب برای مصارف تازه‌خوری، تهیه کشمش و توسعه تاکستان‌های استان قابل توصیه است.

رقمی یاقوتی سفید دودج

رقمی است زودرس، بیدانه، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه‌ها کوتاه به طول ۱۵ و عرض ۹ سانتی متر، جبهه‌ها گرد، اندازه آن‌ها متوسط (۱/۸ سانتی مترمربع)، طول جبه کوتاه (۱۳/۳ میلی متر)، عرض جبه کم (۱۳/۳ میلی متر)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (۱۷/۵٪)، رقمی است بیدانه، آبدار، حساس به خسارت پرندگان به خصوص گنجشک، متوسطرس دارای ۱۲۲ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم تیرماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خوری مناسب است.

رقمی اشکنک مزایجان بووات

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، جبهه‌ها به شکل واژ تخم مرغی، اندازه آن‌ها درشت (۳/۷ سانتی مترمربع)، طول جبه کوتاه (۲۰/۰ میلی متر)، عرض جبه کم (۱۷/۰ میلی متر)، وزن جبهه‌ها متوسط (۳/۱ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبه از خوشه

۱۴۳ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم شهریور ماه می‌رسد و برای تهیه آب میوه و آب غوره مناسب است.

رقم بش مزایجان بوانات

رقمی است دیرشکوفا، با عملکرد زیاد، دارای قدرت رشد متوسط و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشة متوسط، خوشه‌ها طویل به طول ۲۵ و عرض ۱۲ سانتی‌متر، حبه‌ها به شکل واژ تخم مرغی، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۴ سانتی‌مترمربع)، طول حبه کم (۱۶/۰ میلی‌متر)، وزن حبه‌ها خیلی سبک تا سبک (۱/۶ گرم)، دم حبه‌ها کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۰/۰)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۱۶ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۹ دانه به طول ۳/۹۹ میلی‌متر و عرض ۲/۰۹ میلی‌متر. رقمی است زودرس دارای ۱۱۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و به دلیل داشتن دانه‌های بسیار ریز، رنگ و شکل ظاهری جذاب خوشه و حبه، نازک بودن پوست حبه‌ها، یکی از ارقام مناسب برای تازه خوری، تهیه کشمش و توسعه تاکداری است.

رقم صابونی خورجان بوانات

رقمی است متوسط شکوفا، دارای قدرت رشد زیاد و قدرت خیلی زیاد تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط، خوشه‌ها متوسط تا بزرگ به طول ۱۸ و عرض ۸ سانتی‌متر، حبه‌ها تخم مرغی شکل، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۸ سانتی‌مترمربع)، طول حبه متوسط

به شکل واژتخم مرغی، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۳ سانتی‌مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۶/۴ میلی‌متر)، عرض حبه کم (۱۴/۰ میلی‌متر)، وزن حبه‌ها خیلی سبک تا سبک (۱/۶ گرم)، دم حبه‌ها کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند بالا (٪۲۰/۰)، دارای دانه‌هایی با وزن خیلی سبک تا سبک (۱۶ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۹ دانه به طول ۳/۹۹ میلی‌متر و عرض ۲/۰۹ میلی‌متر. رقمی است زودرس دارای ۱۱۴ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه دوم مرداد ماه می‌رسد و به دلیل داشتن دانه‌های بسیار ریز، رنگ و شکل ظاهری جذاب خوشه و حبه، نازک بودن پوست حبه‌ها، یکی از ارقام مناسب برای تازه خوری، تهیه کشمش و توسعه تاکداری است.


رقم مهرسیاه مزایجان

رقمی است دیرشکوفا، دارای قدرت رشد ریاد و قدرت متوسط تولید شاخه‌های فرعی، تراکم خوشه متوسط تا زیاد، خوشه‌ها طویل به طول ۲۴ و عرض ۷ سانتی‌متر، حبه‌ها گرد، اندازه آن‌ها متوسط (۲/۷ سانتی‌مترمربع)، طول حبه کوتاه (۱۷/۰ میلی‌متر)، عرض حبه کم (۱۶/۰ میلی‌متر)، وزن حبه‌ها سبک تا متوسط (۲/۵ گرم)، دم حبه‌ها کوتاه، جدا شدن حبه از خوشه متوسط، درصد قند متوسط (٪۱۹/۰)، دارای دانه‌های سنگین (۵۲ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۲/۰ دانه به طول ۵/۶۸ میلی‌متر و عرض ۳/۰۴ میلی‌متر. رقمی است دیررس دارای

شده است.

با بررسی ارقام انگور سفید کلکسیون مشخص شد که با توجه به حجم کار و تعداد ارقام در زمان جمع‌آوری و کاشت قلمه‌ها در هنگام احداث این کلکسیون یک سری اشتباهات صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها مخلوط شدن یا جایه‌جا شدن اتیکت تعدادی از قلمه‌ها و در نهایت ارقام کلکسیون است که این اشتباهات در اسامی تعدادی از ارقام کلکسیون به صورت تناقض در رنگ میوه با اسامی آن‌ها نمایان شده است. به طوری که نام بعضی از ارقام سفید از قبیل سیاه ارسنجان، بری سیاه نجف آباد آباده، سیاه سمرقندی دودج، سیاه جشنیون بوانات، سیاه گردن بوانات، مهرسیاه مزایجان بوانات، کله‌ای سیاه زرقان و عسکری پیکمی سیاه زرقان اشاره به رنگی بودن میوه (سیاه یا قرمز) آن‌ها دارد در حالی که رنگ واقعی جبهه‌ها سفید است. با توجه به وجود این مسئله در کلکسیون انگور زرقان لازم است که تمامی محققین و دانشجویانی که به نحوی از ارقام این کلکسیون در برنامه‌های تحقیقاتی استفاده و به خصوص دست‌اندرکاران کلکسیون ملی انگور در تاکستان قزوین که از ارقام این کلکسیون در ایجاد کلکسیون ملی انگور در تاکستان استفاده نموده‌اند به این موضوع توجه نمایند تا صحت نتایج تحقیقات آن‌ها تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرد. با توجه به این موضوع لازم است که با استفاده از مطالعات متکی بر مارکرهای ملکولی نسبت به تعیین تشابه دقیق تر

(۲۰/۰ میلی‌متر)، عرض جبهه کم (۱۷/۰ میلی‌متر)، وزن جبهه‌ها سبک تا متوسط (۲/۶ گرم)، دم جبهه‌ها کوتاه، جدا شدن جبهه از خوشة متوسط، درصد قند متوسط (۱۸/۵٪)، دارای دانه‌هایی با وزن سبک تا متوسط (۳۰ میلی‌گرم)، با متوسط تعداد ۱/۹ دانه به طول ۴/۵۸ میلی‌متر و عرض ۲/۴۹ میلی‌متر. متوسطرس دارای ۱۲۳ روز دوره رشد که در شرایط زرقان فارس در دهه سوم مرداد ماه می‌رسد و برای مصرف تازه‌خواری مناسب است دندروگرام تشابه ارقام سفید (شکل ۱) نشان داد که رقم قلاتی دودج با سیاه ارسنجان با ۸۴/۵۳ درصد تشابه بیشترین شباهت را داشتند. و کمترین آن با ۴۲/۳۸ درصد تشابه در ارقام رجبی عقیقی زرقان با یاقوتی زرقان دیده شد. سایر ارقام دارای حداقل ۸۰ درصد شباهت به ترتیب عبارت بودند از رقم ایته درشت زرقان با ایته سیاه زرقان (۸۳/۸۸٪ تشابه)، عسکری زرقان با سیاه سمرقندی دودج (۸۳/۸۶ درصد تشابه)، گیه‌ای زرقان با ریش بابا ارسنجان (۸۲/۷۹ درصد تشابه)، بیدانه جشنیون بوانات با کله‌ای محمدآباد بوانات (۸۲/۷۳ درصد تشابه)، ایته بی‌نام زرقان با عسکری سفید زرقان (۸۱/۹۳ درصد تشابه)، ریش بابا سفید قصردشت با رجبی سفید زرقان (۸۱/۰۳ درصد تشابه)، اتابکی زرقان با بیدانه سفید بوانات (۸۰/۷۵ درصد تشابه)، کله‌ای سیاه زرقان با تخم کبکی مزایجان (۸۰/۷۵ درصد تشابه). وضعیت کلی شباهت ارقام سفید در شکل ۱ نشان داده



شکل ۱ - دنروگرام تشابه ارقام انگور سفید (غیرنگی) استان فارس
Fig.1. Dendrogram of similarity of Fars white grape cultivars

دارای خوشه‌های کوچک تا متوسط، با اندازه و رنگ‌گیری یکنواخت با تراکم متوسط، درصد قند آن‌ها متوسط (معمولًاً بین ۱۸ تا ۲۰ درصد)، جبه‌ها گوشتی و پوست جبه نازک تا متوسط، اندازه جبه‌ها متوسط باشد و جدا شدن آن‌ها از خوشه در حد متوسط باشد به گونه‌ای که با تکان دادن خوشه‌ها جبه‌های آن ریزش نکند از طرف دیگر با جدا کردن جبه از خوشه قسمت انتهای جبه شکافه نشود (Winkler *et al.*, 1974). ارقام انگور مناسب تازه‌خوری در استان فارس عبارتند از رجی عقیقی، اتابکی زرقان، ایته سیاه زرقان، رطبی سفید زرقان، پیکمی سفید دودج، یاقوتی زرقان، پیکمی دودج، ۱۰۸ زرقان، ریش بابا سفید نجف آباد، عسکری نجف آباد آباده، متقالی نجف آباد آباده، ریش بابا سفید نجف آباد آباده، بری سفید نجف آباد آباده، بیدانه جشنیون بوانات، سفید بوانات، سیاه جشنیون بوانات، بش بوانات، کشممشی سبز بوانات، سیاه گردن بوانات، گیهای زرقان، تخم تهرانی زرقان، رطبی سفید زرقان، رجی سفید زرقان، ریش بابا سفید زرقان، عسکری زرقان، سیاه سمرقندی دودج، ریش بابا ارسنجان، کله‌ای سیاه زرقان، عسکری سفید زرقان، آش سفید زرقان، عسکری پیکمی سیاه زرقان، منقای شیراز، یاقوتی سفید دودج، اشکنک مزایجان بوانات، تخم کبکی مزایجان، بش مزایجان بوانات و صابونی خورجان بوانات. علی‌غم مناسب بودن همه این ارقام برای تازه خوری، ارقام رطبی سفید، متقالی نجف آبادی،

ارقام کلکسیون و تمایز آن‌ها از هم دیگر اقدام شود.

هم‌چنین در بین ارقام مورد مطالعه ارقام مهرسیاه مزایجان، اشکنک مزایجان بوانات، ایته سیاه زرقان، پیکمی دودج با داشتن پرچم‌های کوتاه‌تر از مادگی (پرچم‌های واژگون) شناسایی شدند که با توجه به مشکلاتی که در اخته کردن گل‌های انگور وجود دارد به راحتی می‌توان در برنامه‌های بهثادی از آن‌ها استفاده کرد.

در این تحقیق مشخص شد که ارقام شناسایی شده به دلیل داشتن اختصاصات عمومی از قبیل نداشتن برآمدگی‌های عرضی روی پهلوهای بذر، غیر متوالی بودن پیچک‌ها، جوانه انتهایی قابل روئیت یا شکوفا بودن جوانه انتهایی، علفی نبودن شاخه‌ها، پنتامر بودن اعضای گل همه این ارقام مطالعه شده به گونه *Vitis vinifera* تعلق دارند. با توجه به خصوصیات میوه از جمله درصد قند و میزان اسید موجود در میوه و سایر خصوصیات ویژه‌ای که هر یک از ارقام داشتند (ضخامت پوست، بافت گوشت، رنگ جبه‌ها و غیره) می‌توان از نظر تجاری و موارد مصرف در جامعه با معیار استاندارد ارقام را به گروه‌های زیر طبقه‌بندی کرد.

الف- ارقام انگور برای تازه‌خوری: ارقام تازه‌خوری دارای ظاهر جذاب و کیفیت خوراکی خوب با خاصیت حمل و نقل خوب و قدرت نگهداری کیفیت میوه به مدت طولانی هستند. این ارقام ترجیحاً بیدانه و می‌بایست

ubar tend az rjgi ueqiqi, atabki zrquan, aithe siyah zrquan, piykmgi sfeid doudj, piykmgi doudj, 108 zrquan, usskri njf Abad Abade, bry sfeid njf Abad Abade, siyah jshnion boanat, bry boanat, kshmshi szb boanat, gihai zrquan, usskri zrquan, usskri sfeid zrquan, As sfeid zrquan و usskri piykmgi siyah zrquan. Ulirغم qabilit astfadeh az ayn arqam bray tehie kshmsh, arqam usskri njf Abad Abade, usskri piykmgi siyah zrquan و bkhosch sfeid boanat ke jzo arqam qabil towchihie bry ayjad bagat angkorri tazeh xorri niz hstnd bry dlyl dashtn sfeft mnchsr bry frd, mnashterin arqam kshmshi qabil towchihie bry towshh naek dary b mntzor tolid kshmsh dr stan faras hstnd.

ج- ارقام انگور برای تهیه آب میوه: از این ارقام برای تهیه آب میوه هایی با طعم مناسب استفاده می شوند. آب میوه تولیدی باید به گونه ای باشد که در طول دوره فرایند تولید و نگهداری، طعم طبیعی انگور تازه حفظ شود (Shanmugavelu, 2003). معمولاً از ارقام آبدار، با درصد فند متوسط تا زیاد با عملکرد بالا برای این منظور استفاده می شود. ارقام انگور استان فارس، مناسب برای تهیه آب میوه عبارتند از ایته درشت zrquan، aithe riz zrquan، njf Abad zrquan، Rish baba sfeid qsrdsht، szdngk qlat، gihai qlat، nbati bharh njf Abad Abade، bry siyah njf Abad Abade،

usskrri njf Abad Abade، bidanhe jshnion boanat، bsh boanat، kshmshi szb boanat، Rjbi zrquan، rjgi sfeid zrquan، siyah smrcndi doudj، Rish baba arsnjan، bsh mzayigan boanat و usskri piykmgi siyah arqam galb و mnchsr bry frd hstnd wobe dlyl dara boudn umlkrd bala، utr، tsum mnasbt， andazhe mnasbt jbe ha و xwshh baazar pisenndi ziyad， bry brnamahai tosue taek dary dr bsiyari az manatc estan faras b xhosch boanat، Abade， zrquan، spidn， kwar و hromeh shiraz towchihie mi shond و piyshnhd mi shod ke bry brrsi amkan astfadeh az ayn arqam dr sair manatc taek dary kshor، ba njam azmash hahay mqaish arqam， sazgari آnha ba arqam tghari hr mncte mord brrsi qrr ghrnd و dr chort aibat btrri آnha، bry tosue taek dary dr ayn manatc mord astfadeh qrr ghrnd.

ب- ارقام انگور برای تهیه کشمش: ارقامی hstnd ke bry tehie angkor xshk shde (kshmsh) astfadeh mi shond. Ayn arqam baiysti dary bafet nrm， bidanhe و ba mcdar qnd mnasbt و xosh tsum ba jbe hahay drshet ya xhili kochk ba xaschit km cspndg آnha dr shriydt abar bashd (Shanmugavelu, 2003). hr chnd dr iran az bspci arqam ke dary daneh hahay riz و bhe tuddad km dr hr jbe hstnd niz bry tehie kshmsh astfadeh mi shod. Be taur klli arqam angkor estan faras، mnasbt bry tehie kshmsh

ارقام می‌تواند ناشی از سازگار بودن آن‌ها با هرس کوتاه در سیستم تربیت پاچراغی اعمال شده در کلکسیون باشد که در هنگام هرس حداکثر تعداد سه جوانه در هر شاخه نگهداری می‌شود. و کم بارده بودن سایر ارقام نیز می‌تواند ناشی از عدم سازگاری آن‌ها با هرس کوتاه و امکان سازگار بودن آن‌ها با روش هرس بلند باشد. به عنوان مثال برای دستیابی به بیشترین عملکرد در رقم هیمروود (Himrod) در منطقه کشمیر هندوستان، نگهداری تعداد پنج شاخه دوازده جوانه‌ای بر روی هر تاک توصیه شده است (Feza Ahmad, 2008). در ارقام قرمزو و سفید بیدانه بیشترین تعداد جوانه‌های بارده بین جوانه‌های چهارم تا دوازدهم قرار می‌گیرند (Jalili-Marandi, 1996). و در رقم سلطانی نیز با نگهداری تعداد هشت تا دوازده جوانه نسبت به نگهداری تعداد چهار جوانه در هر شاخه عملکرد افزایش یافت (Moeinrad, 2007). بنابراین در صورتی که هر یک از این ارقام که با هرس بلند سازگار هستند به روش کوتاه هرس شوند عملکرد کاهش می‌یابد در نتیجه قضاوت در مورد پتانسیل باردهی آن‌ها با خطا همراه خواهد بود. در صورت تربیت ارقامی که در کلکسیون باردهی کم داشته باشند با یک روش تربیت سازگار با هرس بلند ممکن است عملکرد بالایی تولید نمایند و در گروه ارقام پرعملکرد قرار بگیرند که این موضوع نیاز به بررسی دارد. سرمای بهاره یکی از معضلاتی است که هر ساله خسارت هنگفتی بر تاکستان‌های کشور

مادر بچه نجف‌آباد آباده، نباتی پاییزه نجف‌آباد آباده، ایته بی‌نام زرقان، کله‌ای سفید دودج، سیاه ارسنجان، انگور به ارسنجان، آنگور آب ارسنجان، کله‌ای محمد‌آباد و مهر سیاه مزایجان. بخشی از تولید انگور در استان فارس برای تهیه آب غوره و شیره انگور (دوشاب) است. هرچند بیشتر ارقام آب میوه‌ای انگور برای تهیه آب غوره و شیره انگور (دوشاب) مناسب هستند اما در میان آن‌ها، ارقام قلاتی دودج و سزدنگ قلات به دلیل اندازه جبه و خوشة و آبدار بودن جبه‌ها و سایر صفات مناسب ترین ارقام تهیه آب میوه و آب غوره برای استان فارس هستند. گزارش ارقامی از قبیل ایته سیاه رزقان، رطبی سفید زرقان، نجف‌آبادی زرقان، عسکری نجف‌آباد آباده، متقالي نجف‌آباد آباده، بش بوانات، کشممشی سبز بوانات، رطبی زرقان، قلاتی دودج، سیاه سمرقندی دودج، کله‌ای محمد‌آباد، تخم کبکی مزایجان و بش مزایجان بوانات به عنوان ارقام پرعملکرد به معنی کم بارده بودن سایر ارقام نیست به این دلیل که در ارقام انگور محل جوانه‌های بارده متفاوت است و عملکرد آن‌ها تحت تأثیر سیستم هرس قرار می‌گیرد. به همین دلیل بعضی از ارقام با روش هرس کوتاه (Spur pruning) و بعضی ارقام که جوانه‌های بارده آن‌ها در قسمت‌های بالای شاخه قرار دارند به صورت بلند (Cane pruning) هرس می‌شوند (Ahmedullah and Himelrick, 1989) (Mullins et al., 1992). بنابراین بارده بودن این

سایر مناطق مستعد این پدیده طبیعی، استفاده از این ارقام پس از طی آزمایش‌های سازگاری برای هر منطقه امکان‌پذیر است.

مشاهدات حاکی از وجود بعضی خصوصیات و احتمالاً ژن‌های مطلوب در بعضی از ارقام بود. مثلاً دیر شکوفا بودن ارقام ارقام ایته ریز زرقان، ایته بی‌نام زرقان، مهر سیاه مزایجان و بش مزایجان و امکان گریز آن‌ها از سرمای زودرس بهاره، وجود عملکرد بالا در ارقام رطیبی زرقان، کشمشی سبز بوانات، عسکری نجف‌آباد آباده و قلاتی دودج و هم‌چنین متحمل بودن ارقام عسکری پیکمی زرقان و نجف‌آبادی زرقان نسبت به سرمای زودرس پاییز (مشاهدات عینی در سرمای زودرس پاییز ۱۳۹۰). با توجه به این که در کشورمان تاکنون به دلیل عدم دسترسی به ژن‌های مطلوب و مورد نیاز، برنامه‌های بهنژادی در خور توجهی انجام نشده است، لذا می‌توان با انجام مطالعات مشابهی در مورد خصوصیات ارقام، صفات و ژن‌های مفید و مورد نیاز بهنژادگران را مشخص و معرفی کرد (Einset and Dratt, 1975).

تحمیل می‌کند لذا دسترسی به روش‌هایی که به نحوی امکان مقابله با این پدیده یا کاهش خسارات آن را میسر سازد بسیار مهم است. بنابراین در صورتی که بتوان طول دوره رکود (خواب) در تاک‌ها را افزایش داد می‌توان با گریز تاک‌ها از سرمای بهاره، مشکل سرمای بهاره را در تاکستان‌ها برطرف کرد. به تأخیر انداختن زمان شکفتن جوانه‌های مو یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به این موضوع و کاهش خسارت سرمای بهاره است. گزینش ارقام دیر شکوفا می‌تواند تا حدودی تأمین کننده این موضوع باشد (Friend *et al.*, 2001). در میان ارقام مطالعه شده ارقام ایته ریز زرقان، ایته بی‌نام زرقان، مهر سیاه مزایجان و بش مزایجان بوانات دیر شکوفاترین ارقام بودند که به دلیل دیر شکفته شدن جوانه‌های آن‌ها و امکان گریز از سرمای بهاره، احتمال خسارت سرما در این ارقام نسبت به سایر ارقام مطالعه شده کمتر خواهد بود به همین دلیل برای مقابله با سرمای بهاره و کاهش خسارت این پدیده طبیعی در مناطق بوانات و مزایجان (محل جمع‌آوری این ارقام) می‌توان از این ارقام استفاده کرد و هم‌چنین برای مقابله با خسارت سرمای بهاره در

References

- Ahmedullah, M., and Himmelrich, D. C. 1989. Grape. In: Galletta, G. J., and Himmelrich, D. C. (eds.) Small Fruit Crop Management. Prentice Hall Englewood Clif, New Jersy, USA.

- Alizadeh, A. 2004.** Collection and preliminary identification of grape cultivars in West Azarbajian. *Seed and Plant* 20: 1-23 (in Persian).
- Anonymous, 1983.** Descriptors for Grape. International Board for Plant Genetic Resources. Executive Secretariat, via dell Terme, Dicaraculia, Rome, Italy.
- Anonymous, 2008.** Results of Statistical Sampling Studies: Horticultural Crops Office of Statistical and Information Technology, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran (in Persian).
- Avarmov, L., Males, P., and Zuniv, D. 1989.** Ampelographic application methods in Yugoslavia. *Rivista di Viticoltura edi Enologia*, Conegliano 42(1): 77-79.
- Bachman, O. 1989.** Isoenzyme as a tool for grape cultivar identification. *Riv. Vitic. Enol. N. l.* 42(1): 27-31.
- Bist, H. S., and Sharma, S. D. 1990.** Vegetative characters of some local cultivars of grape (*Vitis* species) grown in Kinnaur. *Indian Journal of Agricultural Sciences* 60(9): 636-637.
- Dadgar, A. 1988.** Identification of Uromieh grape cultivars. MSc. Thesis, College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran. 152 pp. (in Persian).
- Feza Ahmad, M. 2008.** Influence of pruning severity on yield and quality of Himrod grape under Kashmir conditions. *Indian Journal of Horticulture* 65(1): 16-19.
- Friend, A. 2001.** Manipulating bud break date in grapevines. ASEV 52nd Annual Meeting, San Diego, California, USA.
- Einset, J., and Dratt, C. 1975.** Grape. pp. 130-153. In: Janick, J., and Moore, J. N. (eds.), *Advances in Fruit Breeding*. Purdu University Press, West Lafayette, Ind., USA.
- Jalili-Marandi, R. 1996.** Effects of pruning intensity on growth rate and yield of grape cv. White seedless. Proceedings of the First Iranian Horticultural Sciences Congress, 14-17 Septamber, Mashhad, Iran. Page 180 (in Persian).
- Haji Amiri, A., and Sanei Shariatpanahi, M. 1996.** Identification of local grape cultivars of Kermanshah (Sahneh). *Seed and Plant* 12 : 24-40 (in Persian).
- Karami, M. J. 1996.** Identification of Kurdistan grape cultivars. MSc. Thesis, College of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 224 pp. (in Persian).

- Karami, M. J. 2006.** Introduction and description of major characteristics of non-irrigated grape cultivars grown in Kurdistan. *Seed and Plant* 21: 577-600 (in Persian).
- Karami, M. J. 2009.** Evaluation of major characteristics of irrigated grape cultivars of Kurdistan province. *Seed and Plant Improvement Journal* 25-1: 1-32 (in Persian).
- Madani, J. 1994.** Identification of Markazi (Hazareh and Shara) grape cultivars. MSc. Thesis, College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran. 150 pp. (in Persian).
- Mannini, F., Schneider, A., Gerbi, V., Avetrahi, L., and Rigazio, L. 1992.** Clonal selection of major grapevine cultivars grown in the Aosta Valley: Ampelographic, agronomic and enological aspects. *VigneVini, Bologna* 19 (6): 43-52.
- Martenz, J., and Fretz, T. A. 1980.** Identification of eight crabapples by pollen surface sculpture. *Journal of American Society of Horticultural Science* 105 (2): 257-263.
- Mullins, M. G., Bouquet, A., and Williams, L. E. 1992.** Biology of the Grapevine. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 239 pp.
- Moeinrad, H. 2007.** Buds fruitfulness position on canes of Soltanni, Askari and Shahroodi (*Vitis vinifera* L.) grape cultivars. Proceedings of the 5th Iranian Horticultural Sciences Congress, 3-6 September, Shiraz, Iran (in Persian).
- Nejatian, M. A. 2006.** Collection and preliminary evaluation of grapevine cultivars of Qazvin province. *Seed and Plant* 22: 319-338 (in Persian).
- Shanmugavelu, K. G. 2003.** Grape Cultivation and Processing. Agrobios Publication, India. 283 pp.
- Winkler, A., Cook, J., Kliewer, W. M., and Lider, L. A. 1974.** General Viticulture. University of California Press, Berkeley, USA. 633 pp.
- Volpe, B. 1990.** Ampelographic and taxonomic studies for varietal identification. *VigneVini, Bologna* 17 (1/2): 27-32.
- Wolpert, J. A., Kasimatis, A. N., and Verdegal, P. S. 1995.** Viticultural performance of seven Cabernet sauvignon clones in the Northern San Joaquin valley California. *American Journal of Enology and Viticulture* 46(4): 437-441.
- Zahedi, B., and Sanei Shariatpanahi, M. 1996.** Identification of grapevine cultivars in Khorram Abad (Lorestan). Proceedings of the First Horticultural Sciences Congress of Iran, Karaj, Iran. Page 46 (in Persian).

خصوصیات ارقام سفید انگور...

Zeinanloo, A. 1993. Identification of local grape cultivars in Qazvin and Takestan regions. MSc. Thesis, College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran. 310 pp. (in Persian).