

## ترکیب‌پذیری برخی اینبرد لاین‌های جدید آفتابگردان

### Combining Ability of some Sunflower New Inbred Lines

اسداله زارعی سیاه‌بیدی<sup>۱</sup> و عباس رضائی‌زاد<sup>۲</sup>

۱ و ۲- به ترتیب محقق و استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۸/۱۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۳/۲۳

#### چکیده

زارعی سیاه‌بیدی، ا. و رضائی‌زاد، ع. ۱۳۹۲. ترکیب‌پذیری برخی اینبرد لاین‌های جدید آفتابگردان. مجله به‌نژادی نهال و بذر ۲۹-۲۹۳: ۲۷۷-۱

به منظور تهیه هیبریدهای جدید و ارزیابی ترکیب‌پذیری برخی از اینبرد لاین‌های آفتابگردان، تعداد ۶۰ دورگ آفتابگردان حاصل از تلاقی ۳۰ اینبرد لاین با ۲ لاین نر عقیم به عنوان تستر به همراه هیبریدهای آذرگل، SHF81-85، SHF81-90 و CMS1052/1\*14 به عنوان شاهد در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی اسلام‌آباد غرب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تیمارهای مورد بررسی برای کلیه صفات به استثنای پایان گلدهی و درصد روغن دانه دارای اختلاف معنی‌دار بودند. هیبریدهای B86-353.1AF81-196، B86-284.1AF81-196 و B86-345.1AF81-196 به ترتیب با ۵۵۸۳، ۵۳۳۱ و ۵۲۳۵ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. تجزیه واریانس ترکیب‌پذیری به روش طرح تلاقی II کامستاک و راینسون نشان داد که ترکیب‌پذیری عمومی اینبرد لاین‌ها و تسترها برای عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. اینبرد لاین‌های B86-353، B86-284 و B86-345 از نظر عملکرد دانه دارای بیشترین ترکیب‌پذیری عمومی مثبت و اینبرد لاین‌های B86-373.2 و B86-382.2 برای صفت تعداد روز تا رسیدگی دارای بیشترین ترکیب‌پذیری منفی بودند. ترکیب‌پذیری خصوصی نیز برای برخی صفات مهم زراعی مثل عملکرد دانه، قطر طبق، ارتفاع بوته و تعداد روز تا رسیدگی معنی‌دار بود. بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی برای عملکرد دانه متعلق به دورگ‌های B86-300.2AF81-112 و B86-346.2AF81-112 و بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی منفی برای تعداد روز تا رسیدگی متعلق به دورگ B86-287.1AF81-196 بود.

واژه‌های کلیدی: آفتابگردان، ترکیب‌پذیری عمومی، ترکیب‌پذیری خصوصی.

## مقدمه

آفتابگردان گیاهی دگرگشن است و هتروزیس بالایی برای صفات زراعی و به ویژه عملکرد دانه نشان می‌دهد. معمولاً گیاهان آفتابگردان با تظاهر فنوتیپی برتر هتروزیگوت هستند. آخرین ارقام آزادگرده‌افشان (O. P.) آفتابگردان ارقامی خود عقیم بودند. خود عقیمی ارقام آزادگرده‌افشان سبب به وجود آمدن جمعیت‌هایی متشکل از تعداد زیادی دورگ طبیعی با تظاهر فنوتیپی مناسب می‌شد. چون ارقام آزادگرده‌افشان آفتابگردان به دلیل دگرگشی به تدریج ساختار ژنتیکی خود را از دست می‌دهند و از طرفی در چنین جمعیت‌های هتروژنی برای صفات مهمی مانند ارتفاع بوته و زمان رسیدگی یکنواختی وجود ندارد، توجه محققان به تولید ارقام دورگ آفتابگردان معطوف شده است (Hu et al., 2010).

کشف سیستم نرعقیمی توسط لکلرک (Leclercq, 1969) که از تلاقی گونه‌های *H. annuus* و *H. petiolaris* به دست آمد و سیستم رجعت‌دهنده باروری توسط کینمن (Kinman, 1970) نقطه عطفی در تولید هیبرید آفتابگردان بود. اولین دورگ‌های آفتابگردان با نام‌های Fransol و Relax در فرانسه در سال ۱۹۷۴ ثبت شدند، با این حال تولید گسترده دورگ‌های آفتابگردان مبتنی بر سیستم نرعقیمی از سال ۱۹۷۸ شروع شد (Hu et al., 2010). اولین دورگ‌های ایرانی با نام‌های مهر و شفق در سال ۱۳۶۶ معرفی شدند (Arshi and Jafari, 1990) و در سال ۱۳۷۳

سه دورگ جدید CMS31×R28، CMS19×R43 و CMS31×R43 با نام‌های گلشید، آذرگل و گل‌دیس معرفی شدند (Arshi et al., 1994). تولید و معرفی نسل جدید دورگ‌های ایرانی با معرفی دورگ SHF-81-85 با نام فرخ با عملکرد بالا و زودرسی قابل توجه در سال ۱۳۸۸ شروع شد (Farrokhi et al., 2010).

اصلاح و تولید اینبردلاین‌هایی که دارای ترکیب پذیری بالایی باشند یکی از پیش‌نیازهای تولید دورگ آفتابگردان است، بنابراین داشتن اطلاعاتی در مورد واریانس ژنتیکی و ترکیب‌پذیری اینبردلاین‌ها ضروری است. هالور و میراندا (Halluer and Miranda, 1988) ترکیب‌پذیری عمومی را به عنوان عملکرد ژن‌هایی که دارای اثر افزایشی بوده و قابلیت ترکیب خصوصی را نشان دهنده اثر غیر افزایشی عنوان کردند. لورتی و گاتو (Laureti and Gutto, 2001) ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ۲۴۵ تست کراس را ارزیابی و گزارش دادند که برآوردهای ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌های بازگردان باروری اغلب بیشتر از لاین‌های سیتوپلاسم نرعقیم (Cytoplasm Male Sterile: CMS) بوده و این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب بر اساس لاین‌های بازگردان باروری نسبت به CMSها می‌تواند بیشتر موثر باشد، از طرفی میزان ترکیب‌پذیری عمومی همیشه کمتر از ترکیب‌پذیری خصوصی بود. اسکوریچ و

دیسک و ماله برای تسطیح زمین انجام و کود شیمیایی مورد نیاز بر اساس آزمون خاک مصرف شد. کاشت به صورت جوی و پشته و هر کرت مشتمل بر چهار خط به طول ۵/۵ متر و با فواصل خطوط ۶۰ سانتی‌متر و فاصله بوته ۲۵ سانتی‌متر روی خطوط بود. در طول آزمایش عملیات معمول زراعی شامل تنک کردن، وجین و سله شکنی و مبارزه با آفات انجام شد. در این آزمایش از خصوصیات مهم زراعی شامل تعداد روز تا گل‌دهی، طول مدت گل‌دهی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته و قطر طبق بر اساس دستورالعمل شناختی و میلر (Schneider and Miller, 1981) یادداشت‌برداری به عمل آمد. برداشت از دو خط وسط هر کرت با حذف یک بوته از ابتدا و انتهای هر کرت انجام شد. پس از برداشت، میزان عملکرد دانه و وزن هزار دانه اندازه‌گیری شد. با توجه به برداشت ۴۰ طبق از هر کرت آزمایشی و تراکم بوته (۶۷ هزار بوته در هکتار)، عملکرد دانه هر کرت آزمایشی به کیلوگرم در هکتار تعمیم داده شد.

درصد روغن دانه بر اساس روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای (Nuclear Magnetic Resonance) در آزمایشگاه بخش تحقیقات دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اندازه‌گیری شد.

برای مطالعه ترکیب‌پذیری عمومی دورگ‌های حاصل از تلاقی تسترها و اینبردلاین‌ها، داده‌ها به صورت طرح تلاقی

موهنار (Skorvic and Mohnar, 2000) برای عملکرد دانه ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی معنی‌داری را مشاهده و نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی را کمتر از یک برآورد کردند. رضایی‌زاد و فرخی (Rezaeizad and Farrokhi, 2009) نیز گزارش دادند که برای اکثر صفات نقش والد رجعت‌دهنده باروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در تحقیق حاضر سعی شده است ضمن بررسی اینبردلاین‌ها و لاین‌های بازگردان باروری جدید، ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی این مواد آزمایشی برای صفات زراعی مهم در آفتابگردان برآورد و با غربال اینبرد لاین‌های مناسب، از آن‌ها در برنامه‌های به‌نژادی و تولید دورگ آفتابگردان استفاده شود.

### مواد و روش‌ها

از تلاقی تعداد ۳۰ اینبردلاین و ۲ لاین نر عقیم سیتوپلاسمی با نام‌های (CMS) AF81-196 و AF81-112 به عنوان تستر تعداد ۶۰ هیبرید F1 در سال ۱۳۸۷ به دست آمد. شصت هیبرید F1 مذکور به همراه هیبریدهای آذرگل، SHF81-85، SHF81-90 و CMS1052/1\*14 به عنوان شاهد در قالب طرح لاتیس ساده ۸×۸ با دو تکرار در سال ۱۳۸۸ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برای اجرای آزمایش، قطعه زمینی یکنواخت انتخاب شد و عملیات زراعی شامل شخم،

در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس ۶۴ تیمار نشان داد که تیمارهای مورد بررسی برای کلیه صفات به استثنای پایان گلدهی و درصد روغن دانه دارای اختلاف معنی‌دار بودند (جدول ۱). از نظر عملکرد دانه هیبرید امیدبخش SHF-81-90 و هیبرید آذرگل به ترتیب با ۶۷۵۱ و ۶۶۷۷ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند (جدول ۲). میانگین مربعات ترکیب‌پذیری به دست آمده به روش طرح تلاقی II کامستاک و رابینسون (جدول ۳) نشان داد که اینبرد لاین‌ها و لاین‌های بازگردان باروری و همچنین اثر متقابل این دو برای صفت عملکرد دانه اختلاف معنی‌دار داشتند. نتایج نشان داد که اثر دوگانه افزایشی و غیر افزایشی ژنی بر عملکرد دانه موثر بودند. در تحقیقات مختلف گاهی اثر افزایشی ژن (Skoric and Mohnar, 2000) و گاهی اثر ژنی غیر افزایشی (Bajaj *et al.*, 1997) موثر بر عملکرد دانه گزارش شده است. برخی محققان از جمله پوت (Putt, 1966)، می‌حالشویچ (Mihaljevic, 1988)، تی‌اگی (Tyagi, 1988) و کستلوت و همکاران (Kestlout *et al.*, 1985) اثر دوگانه افزایشی و غیر افزایشی را برای عملکرد دانه گزارش داده‌اند. نتایج نشان داد که تسترها بیشترین سهم را در واریانس عملکرد دانه داشته و پس از آن اینبرد لاین‌ها و اثر متقابل اینبرد لاین‌ها و تسترها قرار داشتند، بنابراین سهم اثر افزایشی موثر بر عملکرد دانه بیش از سهم اثر غیر افزایشی بود.

فاکتوریل یا طرح II کامستاک و رابینسون (Comstock and Robinson, 1952) تجزیه شد و مجموع مربعات دورگ‌ها به اجزای اثر اینبرد لاین‌ها، تسترها و اثر متقابل اینبرد لاین‌ها و تسترها تقسیم شد. اثر اینبرد لاین‌ها و تسترها معادل ترکیب‌پذیری عمومی و اثر متقابل این دو معادل ترکیب‌پذیری خصوصی است.

برآورد اثر ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌های تسترها، اینبرد لاین‌ها، ترکیب‌پذیری عمومی نسبی و ترکیب‌پذیری خصوصی به ترتیب با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه شد (Singh and Chaudhary, 1977):

$$GCA_i = X_{i0} - \bar{X}_{00}$$

اینبرد لاین‌ها

$$GCA_j = X_{0j} - \bar{X}_{00}$$

تسترها

$$G\hat{CA} = \frac{GCA}{\bar{X}_{00}} \times 100$$

عمومی نسبی

$$SCA_{ij} = X_{ij} - GCA_{i0} - GCA_{0j} - \bar{X}_{00}$$

ترکیب‌پذیری خصوصی

در روابط فوق  $X_{ij}$ ،  $X_{0j}$ ،  $\bar{X}_{00}$ ،  $X_{i0}$ ،

$GCA_{0j}$  و  $GCA_{i0}$  به ترتیب معادل میانگین اینبرد لاین، میانگین کل، میانگین تستر، میانگین دورگ، ترکیب‌پذیری عمومی اینبرد لاین و ترکیب‌پذیری عمومی تستر است.

## نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس ساده طرح لاتیس نشان داد که بلوک‌ها داخل تکرار برای هیچ کدام از صفات معنی‌دار نبود و در نتیجه آزمایش مذکور

جدول ۱ - تجزیه واریانس صفات مختلف دورگ‌های آفتابگردان و شاهد‌ها  
 Table 1. Analysis of variance for different traits of sunflower hybrids and checks

S.O.V.	منابع تغییرات	df.	میانگین مربعات MS									
			درجه آزادی	تعداد روز تا غنچه دهی	تعداد روز تا شروع گلدهی	تعداد روز تا گلدهی کامل	تعداد روز تا پایان گلدهی	تعداد روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته	قطر طبق	وزن هزار دانه	عملکرد دانه
			Days to budding	Days to initial flowering	Days to complete flowering	Days to end of flowering	Days to maturity	Plant height	Head diameter	1000 Seed weight	Seed yield	Seed oil %
Replication	تکرار	1	0.19 <sup>ns</sup>	2.60*	11.90**	36.1 <sup>ns</sup>	3.8 <sup>ns</sup>	6425.0**	15.8**	26.7 <sup>ns</sup>	360931*	6.3 <sup>ns</sup>
Treatment	تیمار	63	4.20**	5.20**	2.90**	49.7 <sup>ns</sup>	17.1**	389.0**	3.4**	403.0**	1684698**	12.7 <sup>ns</sup>
Error	اشتباه	63	2.20	0.99	0.44	36.1	1.6	126.0	1.1	195.0	81232	15.3
CV. (%)	ضریب تغییرات		2.70	1.60	0.97	8.3	1.2	7.4	5.0	15.6	6.1	9.5

ns, \* و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح ۵٪ و ۱٪.

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

جدول ۲- میانگین صفات زراعی مهم دورگ‌های آفتابگردان و شاهد‌ها  
Table 2. Means of important agronomic traits of sunflower hybrids and checks

شماره	دورگ	عملکرد دانه	تعداد روز تا غنچه دهی	تعداد روز تا شروع گلدهی	تعداد روز تا گلدهی کامل	تعداد روز تا پایان گلدهی	تعداد روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته	قطر طبق	وزن هزار دانه	درصد روغن دانه
No.	Hybrid	Seed yield (Kgha <sup>-1</sup> )	Days to budding	Days to initial flowering	Days to complete flowering	Days to end of flowering	Days to maturity	Plant height (cm)	Head diameter (cm)	1000 Seed weight (g)	Seed oil (%)
1	B86-279.2AF81-196	3687.0	53.0	60.0	67.0	70.0	105.0	127.0	17.5	104.5	37.2
2	B86-281.1AF81-196	3559.5	55.5	62.0	67.5	72.0	105.0	145.5	20.0	105.5	37.2
3	B86-282.2AF81-196	4683.0	53.5	60.0	67.0	70.0	106.0	137.0	19.0	84.0	38.0
4	B86-284.1AF81-196	4972.5	54.0	61.0	67.5	72.0	107.0	154.5	21.0	94.5	36.8
5	B86-287.1AF81-196	4369.0	56.5	60.5	66.5	70.0	102.5	165.5	22.5	88.0	39.1
6	B86-289.2AF81-196	4351.0	54.5	61.5	68.0	72.0	106.0	152.0	21.0	99.0	37.7
7	B86-296.2AF81-196	4105.0	55.0	62.0	68.0	70.0	107.0	154.0	21.5	86.0	43.5
8	B86-298.1AF81-196	4645.5	55.0	64.0	69.0	73.0	106.0	150.0	21.0	80.5	39.4
9	B86-300.2AF81-196	3703.0	55.5	62.5	69.0	73.0	108.0	128.0	19.0	107.0	43.4
10	B86-302.2AF81-196	4347.0	56.5	63.0	69.0	74.0	109.0	148.5	21.0	92.5	43.0
11	B86-309.1AF81-196	4316.5	53.0	62.0	68.5	72.0	104.5	139.0	20.0	89.0	39.6
12	B86-310.1AF81-196	3750.0	53.0	60.5	67.0	69.0	108.0	133.5	19.5	100.0	38.4
13	B86-313.1AF81-196	2859.5	52.0	61.0	67.5	70.0	107.0	156.0	22.5	108.5	40.4
14	B86-330.1AF81-196	3250.0	53.0	59.5	65.5	69.0	109.0	139.5	20.5	86.5	40.2
15	B86-333.1AF81-196	4747.0	53.0	61.0	67.0	70.0	107.0	156.0	22.5	89.0	40.1
16	B86-336.2AF81-196	4708.0	54.0	60.5	67.0	69.0	105.0	153.5	22.0	98.5	38.6
17	B86-339.1AF81-196	4814.0	55.0	61.0	67.0	72.0	108.0	133.5	20.5	92.5	41.2
18	B86-345.1AF81-196	4768.5	53.5	62.0	68.5	73.0	107.0	140.0	21.0	101.0	41.9
19	B86-346.2AF81-196	3588.0	53.5	60.5	67.5	72.0	104.5	138.0	21.0	80.5	38.1
20	B86-347.2AF81-196	4413.0	54.5	61.5	68.5	39.0	108.0	149.0	22.0	100.0	40.1
21	B86-348.2AF81-196	3972.0	52.5	60.5	67.5	70.0	102.5	148.5	22.5	60.0	39.0
22	B86-351.2AF81-196	3486.0	55.0	59.5	66.0	69.0	103.0	135.0	21.0	89.0	41.1
23	B86-353.1AF81-196	5428.5	52.5	61.5	67.0	70.0	101.0	141.0	22.0	88.5	42.0
24	B86-364.2AF81-196	5126.5	54.0	61.5	68.5	72.0	101.0	152.0	23.0	84.0	40.6
25	B86-368.2AF81-196	2600.5	52.0	59.0	65.5	70.0	105.0	137.5	21.5	110.0	39.8
26	B86-370.1AF81-196	2966.0	54.0	59.0	65.5	69.0	105.0	121.0	19.5	60.0	42.2

Table 2. Continued

ادامه جدول ۲

شماره	دورگ	عملکرد دانه	تعداد روز تا نتیجه دهی	تعداد روز تا شروع گلدهی	تعداد روز تا گلدهی کامل	تعداد روز تا پایان گلدهی	تعداد روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته	قطر طبق	وزن هزار دانه	درصد روغن دانه
No.	Hybrid	Seed yield (Kgha <sup>-1</sup> )	Days to budding	Days to initial flowering	Days to complete flowering	Days to end of flowering	Days to maturity	Plant height (cm)	Head diameter (cm)	1000 Seed weight (g)	Seed oil (%)
27	B86-373.2AF81-196	3986.5	53.0	59.5	66.5	71.0	100.0	143.5	22.5	88.5	41.4
28	B86-374.2AF81-196	4466.0	53.5	60.5	67.0	73.0	109.0	148.0	23.0	101.5	39.6
29	B86-379.1AF81-196	5429.5	53.0	61.0	67.0	71.0	101.5	143.0	23.0	106.5	38.5
30	B86-382.2AF81-196	4399.5	55.5	61.0	67.0	70.0	101.0	136.5	22.0	74.5	40.2
31	B86-279.2AF81-112	5783.5	55.0	63.0	69.0	77.0	105.0	151.0	23.0	88.5	39.4
32	B86-281.1AF81-112	5421.5	57.0	63.5	69.5	77.0	108.0	160.0	21.5	86.0	41.1
33	B86-282.2AF81-112	3071.5	56.0	64.0	70.5	76.0	107.0	158.0	18.5	100.5	43.5
34	B86-284.1AF81-112	5690.0	57.0	64.5	70.0	77.0	111.0	177.5	22.5	97.0	43.7
35	B86-287.1AF81-112	4543.0	55.0	63.5	69.0	74.0	111.0	149.0	20.5	91.0	39.3
36	B86-290.2AF81-112	5376.0	56.0	64.0	69.0	78.0	107.0	162.0	21.5	71.0	40.4
37	B86-296.2AF81-112	4648.5	56.5	64.5	70.0	78.0	107.0	175.0	22.5	72.0	42.5
38	B86-298.1AF81-112	5560.5	55.5	64.5	70.0	78.0	111.0	167.0	21.5	90.0	42.8
39	B86-300.2AF81-112	6232.5	56.0	63.0	69.0	78.0	107.0	172.5	23.0	83.0	42.2
40	B86-302.2AF81-112	4717.5	56.0	64.0	69.0	76.0	109.0	164.0	21.5	72.5	40.3
41	B86-309.1AF81-112	4007.5	55.5	62.5	69.0	74.0	109.0	136.5	20.5	108.5	41.4
42	B86-310.1AF81-112	3458.5	56.5	64.0	69.0	74.0	109.0	148.0	21.5	101.0	42.7
43	B86-313.1AF81-112	4322.0	56.5	64.0	69.0	74.0	108.0	150.5	21.0	109.5	38.1
44	B86-330.1AF81-112	5474.5	56.5	64.5	69.0	74.0	111.0	155.0	21.0	113.5	43.1
45	B86-333.1AF81-112	5195.5	56.5	62.5	68.5	74.0	106.0	183.5	21.5	75.0	40.7
46	B86-336.2AF81-112	5161.5	56.0	63.5	68.0	73.0	108.0	174.5	21.5	96.5	38.3
47	B86-339.1AF81-112	5243.5	54.0	62.5	68.0	75.0	106.0	156.5	21.5	95.0	41.4
48	B86-345.1AF81-112	5701.0	54.0	63.5	69.0	74.0	106.0	177.0	22.5	93.5	39.9
49	B86-346.2AF81-112	6096.0	54.5	62.5	68.0	74.0	105.0	133.5	22.5	104.0	43.5
50	B86-347.2AF81-112	5478.0	55.5	62.5	68.5	75.0	107.0	154.0	22.5	101.0	42.0
51	B86-348.2AF81-112	4172.0	56.5	63.5	69.0	74.0	105.0	151.5	19.5	74.0	45.3
52	B86-351.2AF81-112	5422.5	57.0	64.0	69.5	75.0	107.0	167.5	22.0	81.5	44.3

Table 2. Continued

ادامه جدول ۲

شماره	دورگ	عملکرد دانه	تعداد روز تا غنچه دهی	تعداد روز تا شروع گلدهی	تعداد روز تا گلدهی کامل	تعداد روز تا پایان گلدهی	تعداد روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته	قطر طبق	وزن هزار دانه	درصد روغن دانه
No.	Hybrid	Seed yield (Kgha <sup>-1</sup> )	Days to budding	Days to initial flowering	Days to complete flowering	Days to end of flowering	Days to maturity	Plant height (cm)	Head diameter (cm)	1000 Seed weight (g)	Seed oil (%)
53	B86-353.1AF81-112	5736.5	55.5	63.5	69.0	74.0	107.0	174.0	22.5	81.0	42.4
54	B86-364.2AF81-112	5100.0	54.0	63.0	68.0	73.0	107.0	168.5	21.5	79.5	45.5
55	B86-368.2AF81-112	3740.5	54.0	62.0	68.0	71.0	106.0	141.0	18.0	106.5	47.4
56	B86-370.1AF81-112	5212.5	54.0	61.5	67.5	72.0	104.0	156.5	20.0	80.5	44.5
57	B86-373.2AF81-112	3853.0	55.0	62.0	68.5	72.0	102.0	145.0	18.5	84.0	48.9
58	B86-374.2AF81-112	5496.0	56.0	63.5	68.5	72.0	103.0	157.0	22.0	83.5	44.9
59	B86-379.1AF81-112	4986.0	56.0	63.5	69.0	74.0	103.0	156.0	20.5	97.5	42.9
60	B86-382.2AF81-112	5343.5	54.5	62.0	68.0	72.0	101.0	149.0	21.5	89.5	40.4
61	SHF81-85	5442.0	53.0	62.0	68.5	72.0	102.5	165.0	21.5	60.0	43.2
62	SHF81-90	6751.0	57.0	65.0	70.0	77.0	111.0	168.5	22.5	71.0	43.7
63	Cms1052/1 *14	4985.5	55.0	62.0	69.0	75.0	101.0	164.5	22.0	64.0	44.8
64	Azargol	6677.0	58.0	66.0	71.0	78.0	114.0	172.5	22.5	89.0	42.4
LSD (P≤0.05)		569.5	2.9	1.9	1.3	12.0	2.5	22.5	2.1	27.9	7.8
LSD (P≤0.01)		757.0	3.9	2.6	1.7	15.9	3.4	29.9	2.8	37.2	10.3



جدول ۳ - تجزیه واریانس ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفات مختلف لاین های اینبرد و تسترهای آفتابگردان

Table 3. Analysis of variance of general and specific combining ability for different traits of sunflower inbred lines and testers

S.O.V.	منابع تغییرات	df.	میانگین مربعات MS									
			تعداد روز تا Days to budding	تعداد روز تا Days to initial flowering	تعداد روز تا Days to complete flowering	تعداد روز تا Days to end of flowering	تعداد روز تا Days to maturity	ارتفاع بوته Plant height	قطر طبق Head diameter	وزن هزار دانه 1000 Seed weight	عملکرد دانه Seed yield	درصد روغن دانه % Seed oil
Replication	تکرار	1	0.67 <sup>ns</sup>	4.03 <sup>*</sup>	12.03 <sup>**</sup>	38.50 <sup>ns</sup>	4.40 <sup>ns</sup>	6424.0 <sup>**</sup>	14.70 <sup>**</sup>	31.1 <sup>ns</sup>	402058 <sup>*</sup>	177.60 <sup>**</sup>
CMS	اینبرد لاین	29	2.54 <sup>ns</sup>	2.72 <sup>**</sup>	1.90 <sup>**</sup>	41.40 <sup>ns</sup>	19.45 <sup>**</sup>	331.0 <sup>**</sup>	3.04 <sup>**</sup>	429.4 <sup>**</sup>	1348520 <sup>**</sup>	14.60 <sup>ns</sup>
Tester	تستر	1	81.70 <sup>**</sup>	163.30 <sup>**</sup>	70.53 <sup>**</sup>	681.60 <sup>**</sup>	66.00 <sup>**</sup>	7207.5 <sup>**</sup>	0.30 <sup>ns</sup>	15.9 <sup>ns</sup>	20413600 <sup>**</sup>	45.60 <sup>ns</sup>
CMS × R	اثر متقابل	29	2.45 <sup>ns</sup>	1.36 <sup>ns</sup>	1.10 <sup>**</sup>	38.94 <sup>ns</sup>	8.28 <sup>**</sup>	193.3 <sup>**</sup>	4.09 <sup>**</sup>	309.3 <sup>ns</sup>	960719 <sup>**</sup>	0.99 <sup>ns</sup>
Error	اشتباه	59	2.16	0.94	0.46	38.53	1.73	130.8	1.15	207.8	81270	15.02
CV. (%)	ضریب تغییرات		2.69	1.57	0.99	8.59	1.24	7.56	5.07	15.9	6.2	9.4

ns, \* و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح ۵٪ و ۱٪.

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

(Hity, 1992) هر دو اثر افزایشی و غیر افزایشی را در کنترل میزان روغن دانه موثر دانسته‌اند. هلاذنی و همکاران (Hladni *et al.*, 2005) اثر غیرافزایشی ژنی را به عنوان عامل اصلی کنترل‌کننده درصد روغن دانه بیان کردند. برای صفت ارتفاع بوته اثر ترکیب‌پذیری عمومی اینبرد لاین‌ها، تسترها و اثر ترکیب‌پذیری خصوصی معنی‌دار بود. با این حال سهم واریانس تسترها به مراتب بیشتر از اینبرد لاین‌ها و اثر متقابل بود. اینبرد لاین‌های B86-345.1 و B86-309.1 به ترتیب با ۱۳۶ و ۱۳۸ سانتی‌متر دارای بیشترین ترکیب‌پذیری منفی برای ارتفاع بوته بودند در حالی که اینبرد لاین‌های B86-333.1 و B86-284.1 به ترتیب با ارتفاع ۱۶۹/۷۵ و ۱۶۶ سانتی‌متر دارای بیشترین ترکیب‌پذیری مثبت بودند. از طرفی تستر AF81-196 با ارتفاع ۱۴۳/۵ سانتی‌متر از پاکوتاه‌های قابل توجهی در مقایسه با تستر AF81-112 با ۱۵۹ سانتی‌متر برخوردار بود. امروزه معرفی دورگ‌های آفتابگردان با ارتفاع کم برای کشت در سیستم‌های متراکم و همچنین کشت دوم، یکی از اهداف به‌نژادی آفتابگردان محسوب می‌شود. نتایج فرخی (۲۰۰۳) و زائوچنگ و همکاران (Zaocheng *et al.*, 1988) نشان دهنده اثر معنی‌دار لاین‌های بازگردان باروری بر روی صفت ارتفاع بوته استبود اورتیس و همکاران (Ortis *et al.*, 2005) اثر افزایشی را به عنوان اثر اصلی کنترل‌کننده ارتفاع بوته گزارش دادند. در مطالعه رضایی‌زاد و فرخی

در مطالعه حاضر اینبرد لاین‌های B86-353.1، B86-284.1 و B86-345.1 دارای بیشترین ترکیب‌پذیری عمومی مثبت برای عملکرد دانه بودند. در بین تسترها AF81-112 با ۵۰۰۸ کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد بیشتری نسبت به AF81-196 با ۴۱۸۳ کیلوگرم در هکتار بود و دارای ترکیب‌پذیری عمومی بالاتری در جهت مثبت بود (جدول ۴). در بین ترکیبات موجود از نظر عملکرد دانه هیبریدهای B86-353.1AF81-196، B86-284.1AF81-196 و B86-345.1AF81-196 به ترتیب با ۵۵۸۳، ۵۳۳۱ و ۵۲۳۵ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه و به عبارتی دارای بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت بودند. در ترکیبات فوق‌علی‌رغم این که تستر ضعیف AF81-196 وجود داشت، ولی با توجه به ترکیب‌پذیری بالای اینبردلاین‌های B86-353.1، B86-284.1 و B86-345.1، ترکیبات فوق‌عملکرد بالایی داشتند (جدول ۵). از نظر درصد روغن دانه علی‌رغم غیرمعنی‌دار شدن اثر اینبرد لاین‌ها و تسترها، اینبردلاین‌های B86-364.2، B86-313.1 و B86-339.1 دارای بیشترین ترکیب‌پذیری عمومی مثبت بودند. از طرفی تستر AF81-112 درصد روغن ۴۱/۸۱ دارای ترکیب‌پذیری بیشتری نسبت به AF81-196 با درصد روغن ۴۰/۵۸ بود. فرخی (Farrokhi, 2003) اثر افزایشی را برای درصد روغن دانه گزارش داد در حالی که پوت (Putt, 1966)، اورتگون و همکاران (Ortegon *et al.*, 1992) و هیتی

جدول ۴- ترکیب پذیری عمومی و ترکیب پذیری عمومی نسبی لاین های اینبرد و تسترهای آفتابگردان

Table 4. General combining ability and partial general combining ability of sunflower inbred lines and testers

شماره No.	لاین اینبرد Inbred line	عملکرد دانه		تعداد روز تا رسیدگی		ارتفاع بوته		قطر طبق		درصد روغن دانه		وزن هزار دانه	
		Seed yield		Days to maturity		Plant height		Head diameter		% Seed oil		1000 Seed weight	
		GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA
1	B86-279.2	139.5	3.04	-1.03	-0.97	-12.28	-8.12	-0.97	-4.56	-1.34	-3.26	6.0	6.61
2	B86-281.1	-105.2	-2.29	0.48	0.45	1.47	0.97	-0.47	-2.20	-4.32	-10.49	5.2	5.73
3	B86-282.2	-718.4	-15.63	0.48	0.45	-3.78	-2.50	-2.47	-11.63	-0.33	-0.81	1.5	1.70
4	B86-284.1	735.4	16.00	2.98	2.81	14.72	9.73	0.53	2.51	-1.58	-3.84	5.1	5.62
5	B86-287.1	-139.8	-3.04	0.73	0.68	5.97	3.94	0.28	1.34	-2.35	-5.70	-0.9	-0.95
6	B86-289.2	267.5	5.82	0.48	0.45	5.72	3.78	0.03	0.16	1.65	4.01	-5.4	-5.91
7	B86-296.2	-219.3	-4.77	0.98	0.92	13.22	8.74	0.78	3.69	-1.22	-2.95	-11.5	-12.70
8	B86-298.1	507.4	11.04	2.48	2.33	7.22	4.77	0.03	0.16	-0.08	-0.19	-5.4	-5.97
9	B86-300.2	372.0	8.09	1.48	1.39	-1.03	-0.68	-0.22	-1.02	-0.95	-2.32	4.4	4.85
10	B86-302.2	-63.2	-1.38	2.98	2.81	4.97	3.28	0.03	0.16	-1.09	-2.65	-8.2	-9.06
11	B86-309.1	-433.6	-9.43	0.73	0.68	-13.53	-8.95	-0.97	-4.56	2.10	5.10	8.1	8.99
12	B86-310.1	-991.4	-21.57	2.48	2.33	-10.53	-6.96	-0.72	-3.38	-3.30	-8.00	9.9	10.92
13	B86-313.1	-1005.2	-21.87	1.48	1.39	1.97	1.30	0.53	2.51	3.71	9.00	18.3	20.25
14	B86-330.1	-233.5	-5.08	3.98	3.75	-4.03	-2.67	-0.47	-2.20	-0.39	-0.96	9.5	10.48
15	B86-333.1	375.6	8.17	0.48	0.45	18.47	12.21	0.78	3.69	1.30	3.15	-8.5	-9.33
16	B86-336.2	339.2	7.38	0.48	0.45	12.72	8.41	0.53	2.51	-0.38	-0.91	6.8	7.55
17	B86-339.1	433.0	9.42	0.98	0.92	-6.28	-4.15	-0.22	-1.02	2.62	6.36	3.2	3.58
18	B86-345.1	639.2	13.91	0.48	0.45	7.22	4.77	0.53	2.51	0.89	2.16	6.8	7.55
19	B86-346.2	246.3	5.36	-1.28	-1.20	-15.53	-10.27	0.53	2.51	1.34	3.26	1.6	1.81
20	B86-347.2	349.9	7.61	1.48	1.39	0.22	0.14	1.03	4.87	1.54	3.73	9.5	10.48
21	B86-348.2	-523.7	-11.39	-2.28	-2.15	-1.28	-0.85	-0.22	-1.02	-0.48	-1.18	-23.5	-25.89

GCA: ترکیب پذیری عمومی؛ RGCA: ترکیب پذیری عمومی نسبی؛ S.E.<sub>gi</sub>: خطای استاندارد ترکیب پذیری عمومی.

GCA: General Combining Ability; RGCA: Ratio General Combining Ability; S.E.<sub>gi</sub>= Standard Error of general combining ability.

Table 4. Continued

شماره No.	لاین اینبرد Inbred line	عملکرد دانه		تعداد روز تا رسیدگی		ارتفاع بوته		قطر طبق		درصد روغن دانه		وزن هزار دانه	
		Seed yield		Days to maturity		Plant height		Head diameter		% Seed oil		1000 Seed weight	
		GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA	GCA	RGGA
22	B86-351.2	-141.4	-3.08	-1.03	-0.97	-0.03	-0.02	0.28	1.34	1.91	4.65	-5.3	-5.86
23	B86-353.1	986.6	21.47	-2.03	-1.91	6.22	4.11	1.03	4.87	-0.73	-1.76	-5.7	-6.30
24	B86-364.2	517.6	11.26	-2.03	-1.91	8.97	5.93	1.03	4.87	4.04	9.81	-31.8	-35.05
25	B86-368.2	-1425.4	-31.02	-0.53	-0.50	-12.03	-7.95	-1.47	-6.91	0.02	0.04	4.7	5.24
26	B86-370.1	-506.4	-11.02	-1.53	-1.44	-12.53	-8.28	-1.47	-6.91	-0.87	-2.10	4.7	5.24
27	B86-373.2	-675.8	-14.71	-5.03	-4.74	-7.03	-4.65	-0.72	-3.38	-1.71	-4.15	-4.5	-4.92
28	B86-374.2	385.2	8.38	-0.03	-0.02	1.22	0.80	1.28	6.05	1.69	4.10	2.0	2.20
29	B86-379.1	611.8	13.31	-3.78	-3.56	-1.78	-1.18	0.53	2.51	-0.27	-0.67	11.3	12.46
30	B86-382.2	276.0	6.00	-5.03	-4.74	-8.53	-5.64	0.53	2.51	-1.42	-3.44	-8.5	-9.33
	<b>S.E.<sub>gi</sub></b>	142.54		0.66		5.72		0.54		1.94		7.20	
شماره No.	تستر Tester												
1	AF81-196	-412.5	-8.98	-0.74	-0.7	-7.75	-5.12	-0.05	-0.24	-0.67	-1.63	0.37	0.4
2	AF81-112	412.5	8.98	0.74	0.7	7.75	5.12	0.05	0.24	0.67	1.63	-0.37	-0.4
	<b>S.E.<sub>gi</sub></b>	38.87		0.17		1.48		0.14		0.50		1.86	

GCA: ترکیب پذیری عمومی؛ RGCA: ترکیب پذیری عمومی نسبی؛ S.E.<sub>gi</sub>: خطای استاندارد ترکیب پذیری عمومی.

GCA: General Combining Ability; RGCA: Ratio General Combining Ability; S.E.<sub>gi</sub>= Standard Error of general combining ability.

جدول ۵- ترکیب پذیری خصوصی لاین های بازگردان باروری و اینبردها  
Table 5. Specific combining ability of restorer lines and inbreds

شماره	تلاقی	عملکرد دانه	تعداد روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته	قطر طبق	وزن هزار دانه	درصد روغن دانه
No.	Cross (Inbred × Tester)	Seed yield	Days to maturity	Plant height	Head diameter	100 <sup>0</sup> Seed weight	% Seed oil
1	B86-279.2AF81-196	-635.76	0.74	-4.25	-2.70	7.33	0.92
2	B86-281.1AF81-196	-518.32	-0.76	0.50	-0.70	9.63	0.30
3	B86-282.2AF81-196	1218.00	0.24	-2.75	0.30	-8.52	0.57
4	B86-284.1AF81-196	53.70	-1.26	-3.75	-0.70	-1.87	-1.37
5	B86-287.1AF81-196	325.33	-3.51	16.00	1.05	-1.82	0.75
6	B86-289.2AF81-196	-100.02	0.24	2.75	-0.20	13.68	0.49
7	B86-296.2AF81-196	140.82	0.74	-2.75	-0.45	6.73	-0.10
8	B86-298.1AF81-196	-44.98	-1.76	-0.75	-0.20	-5.17	0.92
9	B86-300.2AF81-196	-852.35	1.24	-14.50	-1.95	11.53	-1.61
10	B86-302.2AF81-196	227.29	0.74	0.00	-0.20	9.73	1.10
11	B86-309.1AF81-196	567.00	-1.51	9.00	-0.20	-10.22	0.17
12	B86-310.1AF81-196	558.00	0.24	0.50	-0.95	-1.17	-1.97
13	B86-313.1AF81-196	-318.84	0.24	10.50	0.80	-0.82	1.05
14	B86-330.1AF81-196	-699.50	-0.26	0.00	-0.20	-14.07	0.61
15	B86-333.1AF81-196	188.07	1.24	-6.00	0.55	6.88	-0.06
16	B86-336.2AF81-196	185.86	-0.76	-2.75	0.30	0.68	0.30
17	B86-339.1AF81-196	197.58	1.74	-3.75	-0.45	-1.62	-0.61
18	B86-345.1AF81-196	-53.69	1.24	-10.75	-0.70	3.58	1.74
19	B86-346.2AF81-196	-841.64	0.49	10.00	-0.70	-12.12	0.24
20	B86-347.2AF81-196	-120.26	1.24	5.25	-0.20	-0.87	-0.84
21	B86-348.2AF81-196	312.38	-0.51	6.25	1.55	-7.22	-0.61
22	B86-351.2AF81-196	-555.69	-1.26	-8.50	-0.45	3.53	-0.92
23	B86-353.1AF81-196	258.29	-2.26	-8.75	-0.20	3.53	-2.43
24	B86-364.2AF81-196	425.92	-2.26	-0.50	0.80	-21.02	-0.85
25	B86-368.2AF81-196	-157.54	0.24	6.00	1.80	-11.52	0.00
26	B86-370.1AF81-196	-710.82	1.24	-10.00	-0.20	14.38	-1.60
27	B86-373.2AF81-196	479.23	-0.26	7.00	2.05	1.88	0.82
28	B86-374.2AF81-196	-102.65	3.74	3.25	0.55	8.53	1.53
29	B86-379.1AF81-196	634.14	-0.01	1.25	1.30	4.23	0.75
30	B86-382.2AF81-196	-59.55	0.74	1.50	0.30	-7.92	0.75
31	B86-279.2AF81-112	635.76	-0.74	4.25	2.70	-7.33	-0.92
32	B86-281.1AF81-112	518.32	0.76	-0.50	0.70	-9.63	-0.3
33	B86-282.2AF81-112	-1218.0	-0.24	2.75	-0.30	8.52	-0.57
34	B86-284.1AF81-112	-53.70	1.26	3.75	0.70	1.87	1.37
35	B86-287.1AF81-112	-325.33	3.51	-16.00	-1.05	1.82	-0.75
36	B86-290.2AF81-112	100.02	-0.24	-2.75	0.20	-13.68	-0.49
37	B86-296.2AF81-112	-140.82	-0.74	2.75	0.45	-6.73	0.10
38	B86-298.1AF81-112	44.98	1.76	0.75	0.20	5.17	-0.92
39	B86-300.2AF81-112	852.35	-1.24	14.5	1.95	-11.53	1.61
40	B86-302.2AF81-112	-227.29	-0.74	0.00	0.20	-9.73	-1.10
41	B86-309.1AF81-112	-567.00	1.51	-9.00	0.20	10.22	-0.17
42	B86-310.1AF81-112	-558.00	-0.24	-0.50	0.95	1.17	1.97
43	B86-313.1AF81-112	318.84	-0.24	-10.5	-0.80	0.82	-1.05
44	B86-330.1AF81-112	699.50	0.26	0.00	0.20	14.07	-0.61
45	B86-333.1AF81-112	-188.07	-1.24	6.00	-0.55	-6.88	0.06
46	B86-336.2AF81-112	-185.86	0.76	2.75	-0.30	-0.68	-0.30
47	B86-339.1AF81-112	-197.58	-1.74	3.75	0.45	1.62	0.61
48	B86-345.1AF81-112	53.69	-1.24	10.75	0.70	-3.58	-1.74
49	B86-346.2AF81-112	841.64	-0.49	-10.00	0.70	12.12	-0.24
50	B86-347.2AF81-112	120.26	-1.24	-5.25	0.20	0.87	0.84
51	B86-348.2AF81-112	-312.38	0.51	-6.25	-1.55	7.22	0.61
52	B86-351.2AF81-112	555.69	1.26	8.50	0.45	-3.53	0.92

Table 5. Continued

ادامه جدول ۵

شماره	تلافی	عملکرد دانه	تعداد روز تا رسیدگی	ارتفاع بوته	قطر طبق	وزن هزار دانه	درصد روغن دانه
No.	Cross (Inbred × Tester)	Seed yield	Days to maturity	Plant height	Head diameter	100 <sup>n</sup> Seed weight	% Seed oil
53	B86-353.1AF81-112	-258.29	2.26	8.75	0.20	-3.53	2.43
54	B86-364.2AF81-112	-425.92	2.26	0.50	-0.80	21.02	0.85
55	B86-368.2AF81-112	157.54	-0.24	-6.00	-1.80	11.52	0.00
56	B86-370.1AF81-112	710.82	-1.24	10.00	0.20	-14.38	1.60
57	B86-373.2AF81-112	-479.23	0.26	-7.00	-2.05	-1.88	-0.82
58	B86-374.2AF81-112	102.65	-3.74	-3.25	-0.55	-8.53	-1.53
59	B86-379.1AF81-112	-634.14	0.01	-1.25	-1.30	-4.23	-0.75
60	B86-382.2AF81-112	59.55	-0.74	-1.50	-0.30	7.92	-0.75
<b>S.E.<sub>gi</sub></b>		201.60	0.93	8.10	0.76	201.60	2.74

S.E.<sub>gi</sub>: خطای استاندارد ترکیب پذیری عمومی.

S.E.<sub>gi</sub> = Standard Error of general combining ability.

مد نظر است. سانچز و همکاران (Sanchez *et al.*, 1999) اثر غیرافزایشی را در کنترل طول دوره رشد مهم تر از اثر افزایشی بیان داشتند. برای وزن هزار دانه تنها ترکیب پذیری عمومی اینبرد لاین‌ها معنی دار شد. سهم واریانس تسترها برای وزن هزار دانه به مراتب کمتر از اینبرد لاین‌ها بود. اینبرد لاین‌های B86-310.1، B86-379.1، B86-313.1، B86-330.1 و B86-347.2 به ترتیب با ۱۰۸/۵، ۱۰۱/۹، ۱۰۰/۵، ۱۰۰/۱ و ۱۰۰/۱ گرم دارای بیشترین ترکیب پذیری عمومی بودند. تستر AF81-196 با وزن هزار دانه ۹۰/۹۷ گرم دارای وزن بیشتری نسبت به AF81-112 با ۹۰/۲ گرم بود. اورتیس و همکاران (Ortis *et al.*, 2005) اثر افزایشی را به عنوان اثر اصلی کنترل کننده وزن هزار دانه گزارش دادند. خان (Khan, 2001) برای وزن صد دانه برآوردهای وراثت پذیری بالایی گزارش داد. در مجموع با توجه به عملکرد دانه نسبتاً خوب

(Rezaeizad and Farokhi, 2009) نیز برای صفت ارتفاع بوته تنها اثر ترکیب پذیری عمومی لاین‌های بازگردان باروری معنی دار شده بود. برای صفت تعداد روز تا رسیدگی نیز همانند ارتفاع بوته تمامی اثر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی معنی دار شده است. برای صفت تعداد روز تا رسیدگی سهم واریانس تسترها به مراتب بیشتر از سهم واریانس اینبرد لاین‌ها و سهم واریانس ترکیب پذیری خصوصی بود. اینبرد لاین‌های B86-373.2 و B86-382.2 با طول دوره رشد ۱۰۱ روز دارای بیشترین ترکیب پذیری عمومی منفی بود. تفاوت طول دوره رشد تسترها قابل توجه نبود به طوری که طول دوره رشد AF81-196 و AF81-112 به ترتیب ۱۰۵ و ۱۰۷ روز بود. زودرسی در آفتابگردان یکی از اهداف به‌نژادی مهم محسوب می‌شود چرا که در بخش مهمی از اراضی کشور توسعه آفتابگردان زودرس به عنوان کشت دوم

اینبرد لاین‌های B86-284.1، B86-353.1، B86-345.1، B86-364.2، B86-379.1 و B86-298.1 می‌توان از این لاین‌ها در برنامه‌های به‌نژادی تولید دورگ آفتابگردان پر عملکرد استفاده کرد. از طرفی اینبردلاین‌های B86-345.1، B86-309.1، B86-370.1 و B86-279.2 و B86-368.2 با دارا بودن صفت پاکوتاهی می‌توانند در برنامه‌های تولید دورگ آفتابگردان پاکوتاه و زودرس قرار گیرند. در بین تسترهای مورد ارزیابی نیز در مجموع تستر AF81-112 مناسب است هرچند ارتفاع بوته این تستر اندکی بیش از AF81-196 است.

## References

- Arshi, Y., Arab, G. H., Soltani, A., Khiavi, M., Taie, A., Rad Davaji, A. M., Faghih, M. J., Alisharifi, M. A., and Fallahtooosi, A. 1994.** Introduction of new hybrids of sunflower. Proceedings of the 3rd Iranian Congress of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz University, Tabriz, Iran. Page 204 (in Persian).
- Arshi, Y., and Jafari, H. 1990.** Study of Sunflower. A Publication of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. 37pp. (in Persian).
- Bajaj, R.K., Aujla, K. K., and Chahal, G.S. 1997.** Combining ability studies in sunflower. (*Helianthus annuus* L.) Crop Improvement 34: 141-146.
- Comstock, R. E., and Robinson, H. F. 1952.** Estimation of Average Dominance of Genes in Heterosis. Iowa State College Press, Ames, Iowa, USA.
- Farrokhi, E. 2003.** General combining ability and gene effects of sunflower new restorer lines. Seed and Plant 18: 470-486 (in Persian).
- Farrokhi, E., Khodabandeh, A., Daneshian, J., Rahmanpour, S., Ghafari, M., Taei, A., Khiavi, M., Rezaeizad, A., Zareei, A., Shahsavari, M., Davaji, E., Andarkhor, A., and Shariati, F. 2010.** Hybrid Farrokh, leader of new generation of Iranian sunflower hybrids. Proceedings of the 3rd International Seminar of Oilseeds and Edible Oils. Tehran, Iran (in Persian).
- Hallauer, A. R., and Miranda, J.B. 1988.** Quantitative Genetic in Maize Breeding. Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA.
- Hity, A. H. E. 1992.** Genetical analysis of agronomic characters in sunflower. Proceedings of the 13th International Sunflower Conference Pisa, Italy. pp. 1118-1128.

- Hlandi, N., Skoric, D., Balalic, M. K., and Jovic, S. 2004.** Line  $\times$  tester analysis for plant height and head diameter in sunflower. Proceedings of the 16th International Sunflower Conference, Fargo, USA. pp. 497-502.
- Hu, J., Seiler, G., and Kole, C. 2010.** Genetics, Genomics and Breeding of Sunflower. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.
- Kestlout, J. A., Heursel, A. J., and Oawales, F. M. 1985.** Estimation of heritability and genetic variation in sunflower. *Helia* 8: 17-20.
- Khan, A. 2001.** Yield performance, heritability and interrelationship in some quantitative traits in sunflower. *Helia* 24: 35-50.
- Kinman, M.L. 1970.** New development in USDA and state experiment station sunflower breeding programs. Proceedings of the Fourth International Sunflower Conference, Memphis. pp. 181-183.
- Laureti, D., and Gatto, A. D. 2001.** General and specific combining ability in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Helia* 24 (34): 1-16.
- Leclercq, P. 1969.** The sterile male cytoplasmic chezle tournesoil. *Annales de l'Amelioration des Plantes* 19: 99-106.
- Mihaljevic, M. 1988.** Combining ability and heterosis in *Helianthus annuus* (Wild). Proceedings of the 12th International Sunflower Conference Noisad, Yugoslavia. pp. 963-968.
- Ortegon, M., Escabedo, A. A., and Villareal, L.Q. 1992.** Combining ability of sunflower lines and comparison among parent lines and hybrids. Proceedings of 13th International Sunflower Conference, Pizza, Italy. pp. 1178-1193.
- Ortis, L., Nestares, G., Frutos, E., and Machado, N. 2005.** Combining ability analysis for agronomic traits in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Helia* 28 (43): 125-134.
- Putt, E. D. 1966.** Heterosis, combining ability, and predicted synthetics from a diallel cross in sunflower. *Canadian Journal of Plant Science* 46: 50-67.
- Rezaeizad, A., and Farrokhi, E. 2009.** General and specific combining ability of some sunflower inbred lines and restorers. *Seed and Plant* 24: 83-98 (in Persian).
- Sanchez, D. G., Baldini, M., Charles, D. A., and Vannozzi, G. P. 1999.** Genetic variances and heritability of sunflower traits associated with drought tolerance. *Helia* 22 (31): 23-34.



- Schneiter, A. A., and Miller, J. F. 1981.** Description of sunflower growth stage. *Crop Science* 21: 901-903.
- Singh, R. K., and Chaudhary, B. D. 1977.** *Biometrical Methods in Quantitative Genetics Analysis*. Kalyani Publisher, New Delhi, Ludhiana, India.
- Skoric, D. S., and Mohnar, I. 2000.** General (GCA) and specific (SCA) combining abilities in sunflower. *Proceedings of the 15th Sunflower Conference, Toulouse, France*. pp. 23-27.
- Tyagi, A.P. 1988.** Combining ability of yield components and maturity traits in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Proceedings of the 12th International Sunflower Conference, Noisad, Yugoslavia*. pp. 489-493.
- Zhaocheng, X. L., Guizhi, D. W., and Ji, Q. 1988.** Applied the theory of relative heritability to calculate the heterosis of sunflower. *Proceedings of the 12th International Sunflower Conference, Noisad, Yugoslavia*. pp. 484-488.

Archive of SID