

راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

فرخنده حیاتی: کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمود محمودی: استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: تعیین راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران طی سال ۱۳۸۶ بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که بر روی ۱۷۵ نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، صورت گرفت. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه و ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌های حاوی مشخصات فردی و آزمون شیوه‌های مقابله با استرس بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که در بعد شیوه‌های مقابله با استرس مشکل مدار، ۵۷/۱ درصد از نمونه‌ها در حد متوسط، ۴۱/۷ درصد خوب و ۱/۱ درصد به شکلی ضعیف از شیوه‌های مقابله‌ای مشکل مدار استفاده کرده‌اند. در بعد شیوه‌های مقابله‌ای هیجان مدار، ۸۹/۷ درصد از نمونه‌ها متوسط، ۶/۹ درصد خوب و مابقی آنها (۳/۴ درصد) به شکل ضعیف از شیوه‌های مقابله هیجان مدار استفاده کرده‌اند.

بیشترین کاربردها در بعد شیوه‌های مقابله با استرس مشکل مدار به ترتیب مربوط به سؤال «وضعیت را آنطور که هست می‌پذیرم» و سؤال «سعی می‌کنم موقعیت پیش آمده را درک کنم» ۵۶/۶ درصد بود و ۵۵/۴ درصد جواب «همیشه» را داده بودند. کمترین کاربردها مربوط به سؤال «برای اینکه کاری کرده باشم به هر عملی دست می‌زنم» و سؤال «می‌خواهم شخص دیگری مشکلم را حل کند» بود و بطور مساوی ۱/۷ درصد، جواب «همیشه» را داده بودند. در رابطه با شیوه‌های مقابله با استرس هیجان مدار، بیشترین کاربردها به ترتیب مربوط به سؤال «دعا می‌کنم و به خدا متولّ می‌شوم» و سؤال «امید دارم اوضاع بهتر خواهد شد» ۸۸ درصد بود و ۷۱/۴ درصد جواب «همیشه» را داده بودند. کمترین کاربردها مربوط به سؤال «ناضایتی و فشار ناشی از مشکل را به دیگران انتقال می‌دهم» و سؤال «دیگران را مقصّر می‌دانم و آنها را سرزنش می‌کنم» بطور مساوی بود و ۳/۴ درصد جواب «همیشه» را داده بودند.

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که اکثر بیماران مبتلا به سرطان پستان از راهبردهایی چون راهبرد مذهبی، تگریش مثبت و امیدواری و خوشبینی، پذیرش حقیقت بیماری، تلاش در جهت درمان بیماری، کنترل درونی، بازنگری مثبت، نگرانی، درخواست حمایت اجتماعی و فراموشی عمدى استفاده می‌کردند. اکثر شیوه‌های مقابله کاربردی توسط زنان ایرانی مثبت بود و اعتقاد مذهبی به عنوان یک منبع مهم فردی برای تطابق با بیماری در این زنان استفاده می‌شد.

واژه‌های کلیدی: مقابله با استرس، سرطان پستان

مقدمه

این زنان جهت سازگاری با بیماری خود بکار می برند، شامل راهبرد مذهبی (پذیرش بیماری به عنوان مشیت خداوند: جنگ معنوی)، تفکر در مورد بیماری (تفکر مثبت، نظر مثبت، امید، فراموشی عمدى، تفکر منفی، نامیمی، ترس، اختلال در تصویر ذهنی)، پذیرش حقیقت بیماری و عوامل اجتماعی و فرهنگی و در آخر حمایت اجتماعی بود. اکثر استراتژی‌های کاربردی توسط زنان ایرانی مثبت بودند. اعتقاد مذهبی یک نقش مهم را در این زنان ایفا می کرد [۲].

مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است، لذا با توجه به اینکه جامعه بیماران مبتلا به سرطان پستان، اکثراً زنان هستند و این افراد نقش حساس و مهم در خانواده و اجتماع را بر عهده دارند، مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به سرطان پستان طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی

این تحقیق از نوع توصیفی بوده و در بهار سال ۱۳۸۶ در شهر تهران انجام شد. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان و در محدوده سنی ۳۰ سال به بالا با تشخیص قطعی سرطان اولیه پستان، بدون پیشینه روانپردازی و بیماری مزمن یا سیستمیک دیگر و مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، در صورت علاقمندی برای شرکت در این پژوهش بود.

۱۷۵ نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. و از افرادی که در روز نمونه‌گیری به بخش‌های جراحی زنان و انکولوژی و کلینیک‌های انکولوژی مراجعه می کردند نمونه‌گیری انجام شد. روش گرداوری داده‌ها مصاحبه و ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه شیوه‌های مقابله با استرس بود.

پرسشنامه شیوه‌های مقابله با استرس دارای ۳۹ سؤال مربوط به شیوه‌های مقابله با استرس (مسئله مدار و هیجان‌مدار) با استفاده از عین عبارات جدول هشت حیطه‌ای مقابله‌ای ۵ جالوویس است و جهت تعیین میزان استفاده برای هر عبارت ۵ قسمت هرگز (۰، خیلی کم (۱)، گاهی اوقات (۲)، اغلب اوقات (۳)، همیشه (۴) در نظر گرفته می شود. براساس امتیاز کسب شده، نوع شیوه مقابله بکارگرفته شده (مشکل مدار، هیجان مدار و توأم‌مان) توسط واحدهای مورد پژوهش در گروه‌های ضعیف، متوسط و خوب جای می گیرند. لازم به ذکر است که جدول مقابله‌ای جالوویس ۴۰ عبارتی بود، لیکن عبارت ۳۹ مربوط به شیوه هیجان‌مدار مبنی بر استفاده از الکل، با توجه به معیارهای فرهنگ جامعه اسلامی ایران و بر طبق نظر استادید راهنمای و مشاور دیگر پژوهش‌های انجام شده مشابه، حذف

سرطان پستان در عصر حاضر، یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی زنان جهان است و شایعترین سرطان زنان در اکثر کشورهای دنیاست. سرطان پستان به تکثیر غیرطبیعی و بدحیم سلول‌های بافت پستان گفته می شود که بطور کلی به دو گروه اصلی کارسینوم درجا (غیرتهاجمی) و سرطان مهاجم تقسیم می‌گردد. طبق آمارهای انجمن سرطان آمریکا، در هر سال بیش از ۱۹۳۰۰۰ مورد سرطان پستان تشخیص داده می‌شود. میزان مرگ و میر آن نیز حدود ۴۰۰۰ مورد در سال تخمین زده می شود [۱].

در کشور ما، به دلیل فراگیر نبودن مراکز ثبت وقایع حیاتی به خصوص سرطان، نمی توان در مورد میزان بروز و شیوع این بیماری و مرگ و میر حاصل از آن اظهار نظر قطعی کرد، ولی بر اساس برآوردهای کارشناسان بهداشتی و درمانی، ایران از نظر شیوع سرطان پستان حداقل جزء مناطق کم شیوع نیست و شیوع متوسط دارد [۲].

تشخیص و درمان سرطان پستان، تجربه‌ای همراه با استرس و اضطراب است. زنانی که این بیماری در آنها زود تشخیص داده می‌شود با درمان دارویی و عمل جراحی به همراه تأثیرات جانبی منفی بالقوه‌ای مثل ریزش مو، حالت تهوع، ادم لنفاوی و مشکلات جنسی مواجه می شوند. درمان طولانی، توانایی زنان را در برقراری نقش اجتماعی به عنوان زن خانه دار یا شاغل، وضعیت آینده و امکان بازگشت به کار، دچار شک و تردید می‌سازد. سطح بالای استرس، تأثیر منفی طولانی مدت بر خودبازی زنان داشته که تأثیر بسیار بد و مهمی در عملکرد خانواده، زناشویی و پائین آمدن سطح کیفی زندگی می‌گذارد. حدود ۱۰-۳۰٪ از بیماران در زمان تشخیص دچار نشانه‌های بالینی PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) می‌گردد [۳].

مفهوم «مقابله» بکارگیری انواع مختلفی از روش‌ها است. این روش‌ها شامل روش‌های سازگارانه (سودمند) یا ناسازگارانه (غیر مؤثر) توسط فرد، در جهت سازگار شدن با یک تهدید برای ایجاد تعادل روانی در او است [۴]. طبق نظر لازروس و فالکمن (۱۹۸۴) دو شیوه اصلی مقابله شامل مقابله، مسئله مدار و هیجان مدار است که البته غالب مردم در مقابله با تنش‌ها هر دو شیوه را بکار می برند [۵]. کنترل درونی، عقاید مثبت، شوخ طبعی، داشتن سیستم حمایتی و مذهب، از منابع فردی کنار آمدن با استرس هستند [۶].

در مطالعه‌ای که طالقانی بر روی چگونگی تطابق با بیماری در ۲۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان انجام داد، دریافت که تطابق با سرطان پستان در زنان، دارای روند تکاملی مثبت بوده و در جهت تطابق هر چه بیشتر با بیماری است. راهبردهایی که

مابقی آنها (۳/۴ درصد) به شکل ضعیف از شیوه‌های مقابله هیجان‌مدار استفاده کرده‌اند (جدول شماره ۱۲).

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیازات کسب شده از میزان کاربرد شیوه‌های مقابله با استرس مشکل مدار زنان مبتلا به سرطان پستان

درصد	تعداد	شیوه‌های مقابله مشکل مدار
۴۱/۷	۷۳	خوب (۴۰-۶۰)
۵۷/۱	۱۰۰	متوسط (۲۱-۴۰)
۱/۱	۲	ضعیف (۰-۲۰)
۱۰۰	۱۷۵	جمع

جدول ۲- توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیازات کسب شده از میزان کاربرد شیوه‌های مقابله با استرس هیجان‌مدار زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعت کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، سال ۱۳۸۶

درصد	تعداد	شیوه‌های مقابله هیجان مدار
۶/۹	۱۲	خوب (۶۵-۹۶)
۸۹/۷	۱۵۷	متوسط (۳۳-۶۴)
۳/۴	۶	ضعیف (۰-۳۲)
۱۰۰	۱۷۵	جمع

در پاسخگویی به سوالات شیوه‌های مقابله با استرس (مشکل مدار و هیجان مدار) بیشترین کاربردها در بعد شیوه‌های مقابله با استرس مشکل مدار به ترتیب مربوط به سؤال «وضعیت را آنطور که هست می‌پذیرم» و سؤال «سعی می‌کنم موقعیت پیش آمده را درک کنم» ۵۶/۶ درصد بود و ۵۵/۴ درصد جواب «همیشه» را داده بودند. کمترین کاربردها مربوط به سؤال «برای اینکه کاری کرده باشم به هر عملی دست می‌زنم» و سؤال «می‌خواهم شخص دیگری مشکلم را حل کند» بطور مساوی ۱/۷ درصد جواب «همیشه» را داده بودند. در رابطه با شیوه‌های مقابله با استرس هیجان مدار، بیشترین کاربردها به ترتیب مربوط به سؤال «دعا می‌کنم و به خدا متولّ می‌شوم» و سؤال «امید دارم اوضاع بهتر خواهد شد» ۸۸ درصد بود و ۷۱/۴ درصد جواب «همیشه» را داده بودند. کمترین کاربردها مربوط به سؤال «ناضایتی و فشار ناشی از مشکل را به دیگران انتقال می‌دهم» و سؤال «دیگران را مقصّر می‌دانم و آنها را سرزنش می‌کنم» بطور مساوی ۳/۴ درصد جواب «همیشه» را داده بودند (جدول شماره ۳).

گردید. درجه اعتماد علمی روش‌های مقابله با استرس جالوویس با آلفای کرونباخ برگرفته از ۲۴ مقاله مختلف از ۰/۴۸ تا ۰/۸۱ برآورد گردید.

در ایران نیز این پرسشنامه اولین بار توسط خانم زهری (۱۳۷۳) جهت تعیین روش‌های مقابله‌ای بیماران تحت همودیالیز شهر تهران قبل و بعد از آموزش مراقبت از خود به کار گرفته شد و سپس در سال ۱۳۷۵ جهت تعیین روش‌های مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت که درجه اعتماد هر دو تحقیق با

[۰/۰۰۰۵ < P] مورد تأیید واقع شد [۷/۰].

امتیازات کسب شده در شیوه‌های مقابله با استرس نوع مشکل مدار در سه سطح ضعیف (۰-۲۰)، متوسط (۲۱-۴۰) و خوب (۴۱-۶۰) و امتیازات کسب شده در شیوه‌های مقابله با استرس نوع هیجان مدار در سه سطح ضعیف (۰-۳۲)، متوسط (۳۳-۶۴) و خوب (۶۵-۹۶) بوده است.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نرم افزار spss استفاده شد.

یافته‌ها

(الف) تحلیل اطلاعات دموگرافیک: یافته‌ها نشان داد که اکثر نمونه‌ها (۷/۳ درصد) در ۴۱-۵۰ سال، همسردار (۴/۷۹ درصد)، دارای تحصیلات زیردیپلم (۹/۵۰) درصد، خانه دار (۸۸ درصد)، دارای همسر با تحصیلات در سطح زیردیپلم (۱/۵۶ درصد) بودند. سایر مشخصات دموگرافیک به قرار زیر بود: شغل همسر آزاد (۴/۳۷ درصد)، وضعیت اقتصادی متوسط و ضعیف بطور مساوی (۶۰/۶ درصد)، درمان‌های جراحی، شیمی درمانی و اشعه درمانی قرار گرفته (۴/۴ درصد)، مدت زمان تشخیص بیماری بیشتر از ۲۴ ماه (۷/۲۹ درصد)، دارای سه فرزند (۳/۲۲ درصد)، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی (۶/۴۴ درصد)، یائسه شده (۶/۶ درصد)، دارای سن یائسگی (۹/۶۷ درصد)، عدم تشخیص بیماری قبل از یائسگی (۱/۵۸ درصد)، عدم هورمون درمانی پس از یائسگی (۳/۸۹ درصد)، ۳ ماه و ۸۴ ماه هورمون درمانی پس از یائسگی (۵/۲۵ درصد)، عدم مصرف داروهای آرامبخش پس از یائسگی (۶/۸۶ درصد).

(ب) تحلیل سوالات شیوه‌های مقابله با استرس: در بعد شیوه‌های مقابله با استرس مشکل مدار، ۱/۵۷ درصد از نمونه‌ها در حد متوسط، ۷/۴۱ درصد خوب و ۱/۱۱ ضعیف از این شیوه‌ها استفاده کرده‌اند. در بعد شیوه‌های مقابله‌ای هیجان‌مدار، ۷/۸۹ درصد از نمونه‌ها متوسط، ۹/۶۴ درصد خوب و

جدول ۳- توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیازات کسب شده از پاسخگویی به سؤالات شیوه های مقابله با استرس (مشکل مدار و هیجان مدار) در زنان مبتلا به سرطان پستان

درصد	جمع	همیشه (۴)		اغلب اوقات (۳)		گاهی اوقات (۲)		خیلی کم (۱)		هرگز (۰)		وضعیت	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	سوالات شیوه های مقابله با استرس	
۱۰۰	۱۷۵	۷۱/۴	۱۲۵	۸/۶	۱۵	۱۴/۳	۲۵	۳/۴	۶	۲/۳	۴	امید دارم اوضاع بهتر خواهد شد.	۱
۱۰۰	۱۷۵	۴۶/۳	۸۱	۲۵/۱	۴۴	۲۵/۱	۴۴	۲/۹	۵	۰/۶	۱	سعی می کنم تا حدودی بر اوضاع و احوال خودم کنترل داشته باشم.	۲
۱۰۰	۱۷۵	۴۳/۴	۷۶	۲۴/۶	۴۳	۲۳/۴	۴۱	۸	۱۴	۰/۶	۱	اطلاعات بیشتری کسب می کنم تا بتوانم مشکلم را حل کنم.	۳
۱۰۰	۱۷۵	۳۲/۶	۵۷	۲۶/۹	۴۷	۳۴/۹	۶۱	۵/۱	۹	۰/۶	۱	به راه حل های مختلفی فکر می کنم که بتوانم وضعیت خود را بهتر کنم.	۴
۱۰۰	۱۷۵	۵۰/۹	۸۹	۱۹/۴	۳۴	۲۴	۴۲	۵/۱	۹	۰/۶	۱	با مشکل بطور منطقی واقعی برخورد می کنم.	۵
۱۰۰	۱۷۵	۵۲/۶	۹۲	۱۵/۴	۲۷	۲۶/۳	۴۶	۵/۱	۹	۰/۶	۱	طبق روال عادی به خوردن و آشامیدن و ... ادامه می دهم.	۶
۱۰۰	۱۷۵	۱۷/۱	۳۰	۱۸/۹	۳۳	۴۷/۴	۸۳	۱۶/۶	۲۹	۰	۰	جهت یافتن راه حل مناسب برای مشکل خود راه حل های مختلفی را امتحان می کنم.	۷
۱۰۰	۱۷۵	۲۹/۱	۵۱	۲۰	۳۵	۴۴	۷۷	۵/۷	۱۰	۱/۱	۲	برای حل مشکل از تجارت قبلی خود کمک می گیرم.	۸
۱۰۰	۱۷۵	۵۵/۴	۹۷	۲۱/۱	۳۷	۲۰	۳۵	۲/۹	۵	۰/۶	۱	سعی می کنم موقعیت پیش آمده را در کنم.	۹
۱۰۰	۱۷۵	۸۸	۱۵۴	۸/۶	۱۵	۱/۱	۲	۱/۷	۳	۰/۶	۱	دعا می کنم و به خدا متول می شوم.	۱۰
۱۰۰	۱۷۵	۱۴/۳	۲۵	۱۷/۷	۳۱	۳۶/۶	۶۴	۲۶/۳	۴۶	۵/۱	۹	عصبي می شوم.	۱۱
۱۰۰	۱۷۵	۲۸	۴۹	۲۵/۱	۴۴	۲۹/۷	۵۲	۱۲/۶	۲۲	۴/۶	۸	نگران می شوم.	۱۲
۱۰۰	۱۷۵	۱۹/۴	۳۴	۱۹/۴	۳۴	۳۶/۶	۶۴	۲۲/۳	۳۹	۲/۳	۴	با موشکافی جزء به جزء مشکلم را در نظر می گیرم.	۱۳
۱۰۰	۱۷۵	۲۳/۴	۴۱	۱۴/۳	۲۵	۲۹/۷	۵۲	۲۱/۱	۳۷	۱۱/۴	۲۰	برای کسب آرامش از خانواده، اقوام و دوستان کمک می گیرم.	۱۴
۱۰۰	۱۷۵	۱۴/۹	۲۶	۲۴	۴۲	۴۸/۶	۸۵	۱۲	۲۱	۰/۶	۱	جهت حل مشکل ابتدا اهداف خاصی را در نظر می گیرم و سپس اقدام می کنم.	۱۵
۱۰۰	۱۷۵	۵۶/۶	۹۹	۱۸/۳	۳۲	۲۰	۳۵	۳/۴	۶	۱/۷	۳	وضعیت را آنطور که هست می پذیرم.	۱۶
۱۰۰	۱۷۵	۶/۹	۱۲	۱۰/۳	۱۸	۱۸/۹	۳۳	۱۴/۹	۲۶	۴۹/۱	۸۶	ترجیح می دهم که تنها باشم.	۱۷
۱۰۰	۱۷۵	۳۶	۶۳	۱۴/۹	۲۶	۲۲/۳	۳۹	۷/۴	۱۳	۱۹/۴	۳۴	مشکل خود را کوچک می دانم چون معتقدم که از آن بدتر هم ممکن است پیش آید.	۱۸
۱۰۰	۱۷۵	۲۸	۴۹	۳۷/۷	۶۶	۲۱/۱	۳۷	۷/۴	۱۳	۵/۷	۱۰	سعی می کنم آن مشکل را از ذهنم بیرون کنم.	۱۹
۱۰۰	۱۷۵	۱۰/۹	۱۹	۱۴/۳	۲۵	۲۲/۳	۳۹	۱۸/۹	۳۳	۳۳/۷	۵۹	به رویا فرو می روم و خیالبافی می کنم.	۲۰
۱۰۰	۱۷۵	۲۰	۳۵	۱۱/۴	۲۰	۲۸/۶	۵۰	۹/۱	۱۶	۳۰/۹	۵۴	خود را برای پذیرش وضعیت بدتر آماده می کنم.	۲۱
۱۰۰	۱۷۵	۲۰/۶	۳۶	۲۷/۴	۴۸	۳۴/۹	۶۱	۹/۷	۱۷	۷/۴	۱۳	درباره مشکل خود با افرادی که وضعیت مشابه دارند صحبت می کنم.	۲۲
۱۰۰	۱۷۵	۵۵/۴	۹۷	۲۱/۱	۳۷	۱۹/۴	۳۴	۲/۹	۵	۱/۱	۲	با جدیت سعی می کنم وضعیت را تغییر دهم و بهتر کنم.	۲۳
۱۰۰	۱۷۵	۵/۷	۱۰	۱۰/۳	۱۸	۳۲/۶	۵۷	۲۱/۱	۳۷	۳۰/۳	۵۳	عصبانی می شوم پرخاشگری می کنم و گاهی هم ناسزا می گویم.	۲۴
۱۰۰	۱۷۵	۹/۱	۱۶	۱۸/۳	۳۲	۴۵/۷	۸۰	۱۴/۳	۲۵	۱۲/۶	۲۲	گریه می کنم و افسرده می شوم.	۲۵

ادامه جدول ۳- توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیازات کسب شده از پاسخگویی به سوالات شیوه‌های مقابله با استرس (مشکل مدار و هیجان مدار) در زنان مبتلا به سرطان پستان

درصد	درصد	جمع		همیشه (۴)		غالب اوقات (۳)		گاهی اوقات (۲)		خیلی کم (۱)		هرگز (۰)		وضعیت	
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۱۰۰	۱۷۵	۱۵/۴	۲۷	۲۸/۶	۵۰	۲۵/۷	۴۵	۱۲/۶	۲۲	۱۷/۷	۳۱	۱۷/۷	۳۱	سعی می کنم بخوابیم با این امید که وقتی	
															بیدار شوم اوضاع روپراه تر خواهد شد.
۱۰۰	۱۷۵	۳۳/۷	۵۹	۱۶	۲۸	۲۹/۷	۵۲	۱۷/۱	۳۰	۳/۴	۶				نگران نمی شوم و فکر می کنم بالاخره هر
															مشکلی حل خواهد شد.
۱۰۰	۱۷۵	۲۶/۹	۴۷	۲۴	۴۲	۲۸	۴۹	۱۰/۳	۱۸	۱۰/۹	۱۹				وضعیت پیش آمده را ندیده می گیرم و به
															روی خود نمی آورم.
۱۰۰	۱۷۵	۳۷/۷	۶۶	۲۸	۴۹	۲۲/۹	۴۰	۸/۶	۱۵	۲/۹	۵				با فعالیت جسمی فشار ناشی از مشکلم را
															کم می کنم.
۱۰۰	۱۷۵	۵۳/۷	۹۴	۱۷/۷	۳۱	۲۲/۹	۴۰	۴/۶	۸	۱/۱	۲				به انتظار وضعیت بهتر می نشینم.
۱۰۰	۱۷۵	۳/۴	۶	۶/۳	۱۱	۲۳/۴	۴۱	۱۷/۱	۳۰	۴۹/۷	۸۷				نارضایتی و فشار ناشی از مشکل را به دیگران انتقال می دهم.
۱۰۰	۱۷۵	۵/۱	۹	۴	۷	۲۷/۴	۴۸	۱۴/۹	۲۶	۴۸/۶	۸۵				از یافتن راه حل برای مشکلم نامیدم می شوم.
۱۰۰	۱۷۵	۱۶/۶	۲۹	۷/۴	۱۳	۲۲/۳	۳۹	۱۵/۴	۲۷	۳۸/۳	۶۷				دست به هیچ عملی نمی زنم چون فکر می کنم مشکل خود بخود حل می شود.
۱۰۰	۱۷۵	۴۰/۶	۷۱	۱۴/۹	۲۶	۲۶/۹	۴۷	۵/۷	۱۰	۱۲	۲۱				خود را تسلیم سرنوشت می کنم.
۱۰۰	۱۷۵	۱/۷	۳	۵/۱	۹	۱۴/۳	۲۵	۱۷/۷	۳۱	۶۱/۱	۱۰۷				برای اینکه کاری کرده باشم به هر عملی دست می زنم.
۱۰۰	۱۷۵	۳/۴	۶	۵/۱	۹	۱۷/۷	۳۱	۶/۹	۱۲	۶۶/۹	۱۱۷				دیگران را مقصراً می بینم و آنها را سرزنش می کنم.
۱۰۰	۱۷۵	۱۰/۹	۱۹	۱۰/۹	۱۹	۳۰/۳	۵۳	۱۳/۷	۲۴	۳۴/۳	۶۰				از وسایل آرام سازی روح مانند موسیقی و یا تمرینات جسمی مانند ورزش استفاده می کنم.
۱۰۰	۱۷۵	۱/۷	۳	۲/۹	۵	۲۲/۹	۴۰	۲۴	۴۲	۴۸/۶	۸۵				می خواهم شخص دیگری مشکلم را حل کنم.
۱۰۰	۱۷۵	۵/۱	۹	۲/۹	۵	۱۵/۴	۲۷	۱۸/۹	۳۳	۵۷/۷	۱۰۱				به مصرف داروهای مسکن و آرامبخش روی می آورم.

سوالات شماره‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ سوالات شیوه‌های مقابله‌ای مشکل مدار هستند.

ولون و همکاران دریافتند [۲۰۰۶] که امید به عنوان یک عنصر اصلی در بین بیماران سلطانی جهت مقابله، کنترل بیماری و تطابق روانشناختی با بیماری محسوب می شود [۹]. همچنین شواهد نشان می دهند که صفات شخصیتی مثل خوشبینی بر روی پاسخهای مقابله‌ای و در نتیجه سازگاری روانشناختی با بیماری تأثیر دارند. افراد خوشبین با کاربرد روش مقابله‌ای مشکل گشایی، بازنگری مثبت و پذیرش واقعیت با بیماری مقابله می کنند [۵].

هیلگارد (۱۳۸۴) می نویسد: نیندیشیدن موقتی به مسئله یا فراموشی عمدی، از روش‌های مقابله‌ای هیجان مدار است. همچنین کسانی که شیوه نشخوارگری و نگرانی فکری را پیشه می کنند کمتر در پی تدابیر فعل حل مسئله می روند [۵]. بیماران مبتلا به سرطان پستان که به طور موفقیت‌آمیزی با مسائل ناشی از بیماری مقابله کرده‌اند، کسانی بودند که

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش، اکثر زنان جهت سازگاری با سرطان پستان از راهبردهایی چون راهبرد مذهبی، نگرش مثبت (امیدواری و خوش بینی)، پذیرش حقیقت بیماری، تلاش در جهت درمان بیماری، کنترل درونی، بازنگری مثبت، نگرانی، درخواست حمایت اجتماعی، فراموشی عمدی استفاده می کردند. بیشتر شیوه‌های مقابله‌ای کاربردی توسط زنان ایرانی مثبت بود و اعتقاد مذهبی به عنوان یک منبع مهم فردی برای تطابق با بیماری در این زنان استفاده می شد. ایمان و اعتماد به نفس، قدرت انسان را در صبر و تحمل سختی‌های زندگی افزایش می دهد و احساس امنیت و آرامش را در او ایجاد می کند. منابع فردی چون کنترل درونی، عقاید مثبت، شوخ طبعی، داشتن سیستم حمایتی و مذهب از منابع شخصی کنار آمدن با استرس است [۶].

مقایسه‌ای دیسترس روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان و همسرانشان پیشنهاد می‌گردد

تشکر و قدردانی

از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پژوهشی تهران و همچنین از مسئولین محترم بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران و کارکنان کتابخانه‌های دانشکده‌های پرستاری- مامایی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، ایران و شهید بهشتی و استیتو روپزشکی تهران که جهت اجرای این تحقیق همکاری لازم را با اینجانب داشتند کمال تشکر و سپاس را دارم.

ارتباطات فamilی نزدیک داشته و از منبع حمایتی چندگانه برخوردار بوده‌اند و از نظر مشکلات عاطفی نیز در معرض خطر کمتری قرار داشته‌اند [۲].

با توجه به گستره بودن راهبردهای مقابله با استرس پیشنهاد می‌گردد به منظور بررسی دقیق تر: ۱) مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی حمایت خانواده در بیماران مبتلا به سرطان پستان» صورت گیرد. ۲) از آنجا که میزان آگاهی و دانش بیماران از جمله عوامل مؤثر و مهم تأثیرگذار برآنحوه کاربرد روش‌های مقابله‌ای در بیماران است، پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سرطان پستان در ارتباط با شیوه‌های مقابله با بیماری» صورت گیرد. ۳) بررسی روابط بین شخصیت و شیوه‌های مقابله با استرس در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گذیرد. بررسی

منابع

۱. سامی پ، پرستاری داخلی جراحی زنان پستان و تناولی ادراری مردان، بروز، سودارت، جلد دوازدهم، ۱، انتشارات بشری: ۱۳۸۳: ۱۵۱.
۲. طالقانی ف، بررسی فرآیند تطابق در زنان مبتلا به سرطان پستان، پایان نامه درجه دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۸۴: ۲ و ۱۹۳.
3. Luecken Linda J, Compass Bruce E. Stress, coping and immune function in breast cancer. Society of Behavioral Medicine 2002; 4(4): 336-4.
4. Fortinash Katherine M, Holiday Worrel Patricia A. Psychiatric mental health nursing. 6th edition, Philadelphia, Lippincott, 2004.
5. براهانی مرن و دیگران، زمینه روانشناسی هیلگارد انکینسون، ریتال ال «و دیگران». ۱، انتشارات رشد: تهران. ۱۳۸۴: ۵۰۷.
6. کوشان م، واقعی س، بهداشت روان ۱، ۱، اندیشه رفیع: تهران. ۱۳۸۳: ۸۳ و ۸۹.
7. زهری س، بررسی تأثیر آموزش اصول مراقبت از خود، بر روش‌های مقابله‌ای بکار گرفته شده توسط بیماران تحت همودیالیز، در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران، ۱۳۷۳: ۷۳.
8. زهری س، بررسی روش‌های مقابله در والدین کودکان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران، طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۶: ۱۶ و ۲۲.
9. Vellone Ercole, et al. Hope and Related Variables in Italian Cancer Patients, Cancer Nursing 2006; 29(5): 356- 66.