



بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتبیپ‌های یولاف وحشی (*Avena ludoviciana* Durieu) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوانزیم-آ-کربوکسیلاز

اسکندر زند^{۱*}- محمد علی باغستانی^۲- فاطمه بناء کاشانی^۳- فاطمه دستاران^۴

تاریخ دریافت: ۱۷/۴/۸۷

تاریخ پذیرش: ۱۰/۹/۸۹

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی باریک برگ کش‌های ثبت شده در ایران در کنترل بیوتبیپ‌های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف‌کش، سه آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای، در بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در قالب طرح بلوهکهای کامل تصادفی اجرا شد. در آزمایش‌های اول، دوم و سوم به ترتیب توده حساس (DR₇)، توده مقاوم با مکانیزم متabolیسم (SOR₁) و توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل عمل (NR₁₄) توسط ۱۷ تیمار علف‌کشی مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش‌های اول و دوم با ۱۲ تکرار و آزمایش سوم نیز با ۹ تکرار انجام شد. تیمارهای علف‌کشی در مرحله ۴ برگی علف‌های هرز اعمال شد. اندازه‌گیریهای انجام شده شامل ارزیابی چشمی بر اساس روش EWRC در ۳۰ روز پس از سمپاشی، درصد تعداد یولاف وحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی و درصد وزن خشک یولاف وحشی توده حساس نسبت به شاهد بود. در مجموع بر اساس نتایج بدست آمده بهترین علف‌کش در این آزمایش برای توده حساس، علف‌کش‌های کلودینافوب پروپریل (۸/۰ لیتر در هکتار)، پینوکسادن (۴۵۰ میلی لیتر در هکتار)، سولفوسولفوروں (۴۶۰ گرم در هکتار)، سولفوسولفوروں + متیسلوفوروں (۴۵ گرم در هکتار)، یدوسولفوروں + مزوسولفوروں (۳۵۰ گرم در هکتار)، پروسولفوکارب (۳-۴ لیتر در هکتار) و فنوکسایپوب پی اتیل (۱ لیتر در هکتار) و ایزوپروتون + دیفلوفینیکان (۲-۲/۵ لیتر در هکتار) بود. البته ترالکوکسیدین (۱/۲ لیتر در هکتار) نیز به طور نسبی این توده را کنترل نمودند. بهترین علف‌کش برای کنترل توده مقاوم با مکانیزم افزایش متabolیسم علف‌کش‌های سولفوسولفوروں + متیسلوفوروں و ایزوپروتون + دیفلوفینیکان بود و علف‌کش‌های یدوسولفوروں + مزوسولفوروں (۴۰۰ گرم در هکتار) و پروسولفوکارب نیز به طور نسبی این توده را کنترل نمودند. برای کنترل توده مقاوم با مکانیزم عمل تغییر محل هدف نیز بهترین علف‌کش ها شامل پینوکسادن، سولفوسولفوروں، سولفوسولفوروں + متیسلوفوروں، یدوسولفوروں + مزوسولفوروں با ذر و ایزوپروتون + دیفلوفینیکان بود. در مجموع نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برای کنترل شیمیایی علف‌هرز یولاف مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوانزیم-آ-کربوکسیلاز (ACCase)، باید مکانیزم مقاومت این علف‌هرز نیز مد نظر قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: مقاوت به علف‌کش، یولاف وحشی، مقاومت مبتنی بر متabolیسم و مقاومت مبتنی بر تغییر محل عمل

مقدمه

علف‌های هرز مهم مزارع غلات آبی و دیم و همچنین جبویات و سایر محصولات زراعی می‌باشد (۲۰). یولاف وحشی بهاره (Avena fatua L.) و زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) از مهم‌ترین علف‌های هرز خانواده گندمیان محسوب می‌شود (۳). در ایران نیز یولاف وحشی زمستانه گونه غالب است (۳). یولاف وحشی زمستانه در مناطق سردسیر، معتدل مرکزی و معتدل شمالی ایران دارای اهمیت زیادی است، در حالی که یولاف وحشی بهاره در مناطق گرمسیری حائز اهمیت است (۹). در تحقیق ۵ ساله‌ای که در خصوص تهییه نقشه جغرافیایی علف‌های هرز مزارع گندم ایران در بخش تحقیقات

از بین زیان آورترین علف‌های هرز جهان (که شامل ۱۸ گونه می‌باشد)، ۱۰ گونه مربوط به خانواده گندمیان می‌باشد و از این بین نیز یولاف وحشی جزء مهم‌ترین علف‌های هرز در بیش از ۲۰ گونه مهم زراعی و در ۵۵ کشور جهان است. این گیاه از جمله

۱ و ۲- دانشیاران بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

(Email: eszand@yahoo.com) - نویسنده مسئول:

۳ و ۴- محققان بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

و فنیل پیرازولین یا دنها قرار می‌گیرند. فوپ‌ها و دیم‌ها در بازدارندگی فعالیت آنزیم استیل کوانزیم آکربوکسیلاز (ACCase)، یکی از آنزیم‌های اوئلیه در ساخت اسیدهای چرب، نقش دارند (۵). با مطالعات ACCase صورت گرفته بر روی موجودات مختلف دو نوع آنزیم موجود در علف‌های هرز چمنی شناسایی شده است. آنزیم ACCase موجود در علف‌های هرز چمنی از نوع هوموریک و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase است، در صورتی که در سایر علف‌های هرز آنزیم ACCase موجود در کلروپلاست هترومور و غیر حساس به علف‌کش‌های بازدارند ACCase بوده و همین امر مبنای انتخابی عمل کردن علف‌کش‌های بازدارند ACCase است (۶). مکانیزم‌های مقاومت علف‌های هرز بازیک برگ به علف‌کش‌های بازدارند ACCase عمدتاً مبتنی بر تغییر محل هدف و متabolیسم است (۵ و ۱۶)، مطالعات انجام شده نقش مقاومت مبتنی بر تغییر محل هدف را در بروز علف‌های هرز مقاوم به بازدارندۀ‌های ACCase بیشتر می‌دانند (۷). مقاومت مبتنی بر تغییر محل هدف عمدتاً به دلیل تغییر در پنج اسید آمینه در آنزیم ACCase است (۱۵ و ۱۶). بطور مثال، چنانچه ایزوولوسین در جایگاه ۱۷۸۱ بجای لوسین قرار گیرد، مقاومت به علف‌کش ستوكسیدیم که از خانواده سیکلوهگراندیون است ایجاد می‌شود (۱۶). یکی از راههای مبارزه با علف‌های هرز بازیک برگ مقاوم به بازدارندۀ‌های ACCase استفاده از دیگر گروههای علف‌کشی (مانند بازدارندۀ‌های استولاكتات سیستاز (ALS)، بازدارندۀ‌های سنتر کارتونید و ...) و یا استفاده علف‌کش‌های سایر خانواده‌های بازدارندۀ ACCase است (۱۳). برخی از علف‌کش‌های بازدارند ALS بخوبی قادرند بازیک برگ‌های مقاوم به علف‌کش‌های بازدارند ACCase را کنترل کنند. هدف این مطالعه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های یولاف و حشی مقاومت مبتنی بر تغییر محل عمل (با مکانیزم مقاومت مبتنی بر متabolیسم و مکانیزم مقاومت مبتنی بر تغییر محل عمل) و حساس به علف‌کش‌های بازدارندۀ استیل کوانزیم-آکربوکسیلاز بود.

مواد و روش‌ها

مواد آزمایش شامل سه توده یولاف و حشی توده حساس (DR₇)، توده مقاوم با مکانیزم متabolیسم SOR و توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل عمل (NR₁₄) بود که در سال ۱۳۸۴ از استان خوزستان جمع آوری شده بود (۲۸). مکانیزم مقاومت این توده‌ها قبل از توده راستگو (۴) و زند و نظری (۱۲) از طریق روش dCABS مشخص شده بود. تیمارهای علف‌کشی نیز شامل ۱۸ تیمار بود که مشخصات علف‌کش‌ها در جدول ۱ ذکر شده است.

در مجموع ۳ آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای، در بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در قالب طرح بلوهای کامل تصادفی اجرا شد. در هر سه آزمایش تیمارهای

علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ایران انجام شده، یولاف و حشی به عنوان مهم‌ترین علف‌هرز بازیک برگ مزارع گندم کشور با متوسط تراکم متوسط ۲۰ بوته در متر مربع شناخته شده است (۱۰). در ایران عمده ترین روش کنترل این علف‌هرز در مزارع گندم، کنترل شیمیایی است. این علف هرز را می‌توان در پایان مرحله سه برگی تا اواسط پنجه زنی گندم و با استفاده از برخی از علف‌کش‌های ثبت شده در ایران دیفن زوکوات (آونچ)، ترالکوکسیدیم (گراسپ)، دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان)، فلم پروب ام ایزوپروپیل (سافیکس بی‌دبیلو)، کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک)، فنوکسایپروپ‌پی‌ایتل (پوماسوپر)، سولفوسولفورون (آپیروس) و مزوسلوفورون متیل + دیوسولفورون متیل (شواليه) بخوبی کنترل نمود (۹ و ۱۱). در طی ده سال گذشته علف‌کش‌های مانند دیکلوفوپ متیل، کلودینافوپ پروپارژیل و فنوکسایپروپ‌پی‌ایتل از جمله پر مصرف‌ترین بازیک برگ‌کش‌های رایج در اکثر مناطق گندم خیز کشور بوده‌اند (۲) و از آنجا که این علف‌کش‌ها عمدتاً از علف‌کش‌های بازدارندۀ استیل کوانزیم-آکربوکسیلاز (ACCase) هستند و بیش از ۵ سال به طور متوالی در برخی از استانهای کشور مصرف شده‌اند (۵)، مصرف متوالی آنها باعث بروز پدیده مقاومت می‌شود (۷ و ۱۴ و ۱۸). استفاده متوالی از علف‌کش‌های بازدارندۀ استیل کوانزیم-آکربوکسیلاز باعث شده است تا مقاومت یولاف و حشی به علف‌کش‌ها بازدارندۀ ACCase برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۳ پس از ۲۴ سال از ثبت علف‌کش دیکلوفوپ متیل، ۱۲ سال از ثبت علف‌کش فنوکسایپروپ‌پی‌ایتل و ۱۰ سال از ثبت علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل از استان خوزستان گزارش شود (۱ و ۶)، زند و همکاران (۲۷) گسترش بیوتیپ‌های علف‌هرز یولاف و حشی مقاوم به علف‌کش کلودینافوپ-پروپارژیل در استان خوزستان را مورد مطالعه قرار دادند و وجود یولاف و حشی مقاوم به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل را در شهرهای دزفول، آندیمشک، دشت آزادگان و رامهرمز گزارش کردند.

در سراسر جهان تا اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۵ بیوتیپ از علف‌های هرز مختلف نسبت به این گروه از علف‌کش‌ها مقاوم شده اند. اولین گزارش مربوط به مقاومت یولاف و حشی به علف‌کش‌های بازدارندۀ ACCase در جهان، در سال ۱۹۸۵ در استرالیا منتشر شد و از آن تاریخ به بعد، مقاومت یولاف و حشی به این گروه از علف‌کش‌ها در بیش از ۱۱ کشور گزارش شده است (۲۰). امروزه با بروز حدود ۳۱۹ بیوتیپ علف‌هرز مقاوم به علف‌کش‌های مختلف (۲۰)، کنترل علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش‌ها به یکی از معضلات اصلی در مباحث مدیریت علف‌های هرز تبدیل شده است و در طی سالهای اخیر توجه محققان بسیاری به کنترل علف‌های مقاوم جلب شده است (۱۹).

علف‌کش‌های بازدارندۀ ACCase در سه خانواده آریلوکسی‌فنوکسی-پروپیونات‌ها یا فوپ‌ها، سیکلوهگراندیونها یا دیم‌ها

شد و به صورت درصد گیاهان باقیمانده در ۳۰ روز پس از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی محاسبه شد. در ۳۰ روز پس از سمپاشی بعد از ثبت تعداد گیاهان زنده داخل هر گلدان، بوته ها از سطح خاک برداشت شد و سپس به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲۰°C خشک و سپس توزین شد. بر اساس تعداد بوته های داخل هر گلدان و وزن خشک کل اندام هوایی بوته های داخل هر گلدان، وزن خشک تک بوته تک بوته برای هر توده بدست آمد. سپس درصد وزن خشک تک بوته هر توده تیمار شده با علفکش نسبت به شاهد خودش (علفکش نخورده از همان توده) بدست آمد. ضمناً ۳۰ روز پس از سمپاشی ارزیابی چشمی نیز بر اساس روش EWRC (۲۲) صورت گرفت.

علفکشی مشابه بود (جدول ۱)، ولی توده علفه رز یولافوحشی برای آزمایش اول، دوم و سوم به ترتیب شامل توده حساس (DR₇، مقاوم با مکانیزم متابولیسم (SOR) و توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل عمل (NR₁₄) بود. آزمایش اول و دوم با ۱۲ تکرار و آزمایش سوم بدلیل کمبود بذر با ۹ تکرار انجام شد. پس از شکستن توده تعداد بذر جوانه دار شده و در گلدان هایی به قطر ۹ سانتی متر کشت شد. در هر گلدان ۱۰ گیاه کشت گردید.

سم پاشی گلدان ها در مرحله ۲-۳ برگی یولافوحشی (حدوداً ۳-۴ هفته بعد از کاشت) با دستگاه سم پاش ثابت نازل متحرک و توسط نازل بادیزی یکنواخت صورت گرفت. قبل از سمپاشی و ۳۰ روز پس از سمپاشی تعداد گیاهان زنده باقی مانده در هر گلدان یاداشت

جدول ۱- تیمارهای علفکشی مورد استفاده در آزمایش

تیمار	نام عمومی	نام تجاری	نحوه تاثیر	فرمولاسیون	مقدار مصرف	زمان مصرف
۱	کلودینافوب پروپارازیل	تاپیک	بازدارنده ACCase	%۸ EC	۰/۸ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ برگی
۲	کلودینافوب پروپارازیل	تاپیک	بازدارنده ACCase	%۸ EC	۰/۸ لیتر در هکتار + سیتوگیت ۲ در هزار	۲ تا ۴ برگی
۳	فنوكسابروب پی اتیل	پوماسوپر	بازدارنده ACCase	%۷/۵ EC	۱ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ برگی
۴	فنوكسابروب پی اتیل	پوماسوپر	بازدارنده ACCase	%۷/۵ EC	۱ لیتر در هکتار + سیتوگیت ۲ در هزار	۲ تا ۴ برگی
۵	دیکلوفوب متیل	ایلوکسان	بازدارنده ACCase	%۳۶ EC	۲/۵ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ برگی
۶	دیکلوفوب متیل	ایلوکسان	بازدارنده ACCase	%۳۶ EC	۲ لیتر در هکتار + سیتوگیت ۲ در هزار	۲ تا ۴ برگی
۷	یدوسولفورون + مزوسلوفورون	شوالیه	بازدارنده ALS	%۳+% ۳ WG	۳۵۰ گرم در هکتار + سیتوگیت ۲ در هزار	۲ تا ۴ برگی
۸	یدوسولفورون + مزوسلوفورون	شوالیه	بازدارنده ALS	%۶ WG	۴۰۰ گرم در هکتار	۲ تا ۴ برگی
۹	پینوکسادن	آکسیال	بازدارنده ACCase	%۱۰۰ EC	۴۵۰ میلی لیتر در هکتار + روغن مخصوص	۲ تا ۴ برگی
۱۰	پینوکسادن	آکسیال	بازدارنده ACCase	%۱۰۰ EC	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار + روغن مخصوص	۲ تا ۴ برگی
۱۱	سولفوسولفورون	آپیروس	بازدارنده ALS	%۷۵ WG	۲۶/۶ گرم در هکتار	۲ تا ۴ برگی
۱۲	ایزوپروتون + دیفلوفیکان	پتر	بازدارنده فتوستتر	%۵۰ SC	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	پیش رویشی
۱۳	کلروسولفورون	مگاتن	بازدارنده ALS	%۷۵ WG	۲۰ گرم در هکتار	پس رویشی
۱۴	کلروسولفورون	مگاتن	بازدارنده ALS	%۷۵ WG	۲۰ گرم در هکتار	پیش رویشی
۱۵	سولفوسولفورون + متسلولفورون	توتال	بازدارنده ALS	%۷۵+% ۵ WG	۴۵ گرم در هکتار	۲ تا ۴ برگی
۱۶	پروسولفوکارب	باکسر چربیها	بازدارنده ستز	%۸۰ EC	۴-۳ لیتر در هکتار	پیش رویشی
۱۷	ترالکوکسیدیم	گراسپ	بازدارنده ACCase	%۲۵ SC	۱/۲ لیتر در هکتار + روغن ولک ۵ در هزار	۲ تا ۴ برگی

باشد (۹)، لذا با توجه به اینکه قبل از کارایی برخی از باریک برگ‌کش‌های تولید داخل (از جمله فنوکسابرپ پی اتیل) مورد تردید قرار گرفته بود (۸)، کاهش کارایی این علفکش بر روی توده‌های حساس توجیهی جز پایین بودن کیفیت این علفکش ندارد. و قطعاً چنانچه کیفیت فرمولا سیون علفکش مشکل نداشته باشد، باید توده حساس یولافوحشی توسط آن به خوبی کنترل شود. در خصوص عدم تاثیر این علفکش بر روی توده‌های مقاوم یولافوحشی، با توجه به اینکه مقاومت این توده‌ها به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل قبل از اثبات رسیده است (۲۶)، عدم تاثیر علفکش دیکلوفوپ متیل احتمالاً به دلیل بروز مقاومت عرضی است (۲۵).

علفکش کلودینافوپ پروپارژیل: این علفکش به خوبی توده حساس یولافوحشی را کنترل کرده است. به طوریکه معمولاً درصد خسارت این علفکش بر روی توده حساس بر اساس EWRC تیمار بدون روغن ۹۸ و برای تیمار با روغن ۸۷ درصد، درصد تعداد تیمار بدون روغن ۹۸ و برای تیمار با روغن ۱۵ و برای تیمار با روغن ۲۵ درصد سمپاشی برای تیمار بدون روغن و درصد تعداد تیمار با روغن ۲۵ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی توده حساس نسبت به شاهد نیز برای تیمار بدون روغن ۱۴ و برای تیمار با روغن ۲۴ درصد است. همانطور که ملاحظه می‌شود معمولاً تیمار علفکش کلودینافوپ پروپارژیل با و بدون روغن تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند (جدول ۲). علفکش کلودینافوپ پروپارژیل بر هر دو توده مقاوم (اعم از مقاومت میتی بر متاپولیسم و مبتنی بر محل عمل) نیز بی تاثیر بود. به طوریکه معمولاً درصد خسارت این علفکش به توده‌های مقاوم بر اساس EWRC بین صفر تا سه درصد، درصد تعداد یولافوحشی مقاوم باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی بین ۷۷ تا ۹۹ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد نیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بود (جدول ۲) که حاکی از بی تاثیری این علفکش بر توده‌های مقاوم می‌باشد (جدول ۳ و ۴). زند و همکاران (۲۶) قبلاً عدم کنترل این توده‌ها توسط علفکش کلودینافوپ پروپارژیل را گزارش کرده بودند.

علفکش فنوکسابرپ پی اتیل: مصرف این علفکش به همراه روغن، توده حساس یولافوحشی را در حد کمی مطلوب و بدون روغن نیز همان توده‌ها را در در حد ضعیف کنترل نمود. به طوریکه درصد خسارت این علفکش بر روی توده حساس بر اساس EWRC برای تیمار بدون روغن ۴۳ و برای تیمار با روغن ۷۳ درصد، درصد تعداد یولافوحشی توده حساس باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی برای تیمار بدون روغن ۶۱ و برای تیمار با روغن ۳۶ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی توده حساس نسبت به شاهد نیز برای تیمار بدون روغن ۵۸ و برای تیمار با روغن ۴۴ درصد است. همانطور که ملاحظه می‌شود هنگامی که این علفکش با روغن افروزنی بکار رفته است، کارایی آن بهبود یافته است (جدول ۲).

در این تحقیق تیمارها با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند و برای مقایسه بهتر تیمارها، علی‌رغم انجام مقایسه میانگین، برای سهولت نتیجه گیری ازدادهای یاد داشت شده شامل ارزیابی چشمی بر اساس روش EWRC در ۳۰ روز پس از سمپاشی، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی و درصد وزن خشک یولافوحشی توده حساس نسبت به شاهد، از روش توصیفی مشابه روش استاندارد EWRC (۲۲) و روش موس و همکاران (۲۳) استفاده شد. در این روش برای کنترل با بیش از ۸۰ درصد از واژه "کنترل بسیار خوب تا مطلوب"، کنترل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از واژه "کنترل کمی مطلوب"، کنترل ۵۰ تا ۷۰ درصد از واژه "کنترل ضعیف"، کنترل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از واژه "کنترل بسیار ضعیف" و کنترل کمتر از ۳۰ درصد از واژه "بدون تاثیر" استفاده شد.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس درصد خسارت بر اساس EWRC، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد نشان داد که اثر تیمار بر روی هر سه صفت مذکور و برای هر سه توده مورد مطالعه معنی دار بود (داده‌ها ارائه نشده است). مقایسه میانگین‌های اثر تیمارهای مختلف از نظر درصد خسارت بر اساس EWRC، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی و درصد وزن خشک نیز حاکی از تفاوت بودن اثر تیمارهای مختلف است (جدول ۲). در ادامه ابتدا تیمارهای مربوط به هر یک از گروههای علفکشی به تفکیک مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت کارایی علفکشی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

کارایی علفکش‌های بازدارنده ACCase در کنترل توده‌های یولافوحشی حساس و مقاوم

علفکش‌های خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (فوپ‌ها)

علفکش دیکلوفوپ متیل: همانطور که ملاحظه می‌شود (جدول ۲) بر اساس هر سه معیار EWRC، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد، علفکش دیکلوفوپ متیل توده حساس یولافوحشی را در حد ضعیف (۵۰ درصد) و دو توده مقاوم دیگر را نیز بسیار ضعیف کنترل نمود (جدول ۳ و ۴). ضمناً بین تیمار با و بدون روغن علفکش کلودینافوپ پروپارژیل نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد (جدول ۲). با توجه به اینکه علفکش دیکلوفوپ متیل باید کارایی خوبی در کنترل توده‌های یولافوحشی حساس داشته

نسبت به شاهد نیز بین ۱۲ تا ۳۹ درصد است. ضمناً علف‌کش فوق هیچ تاثیری بر توده مقاوم مبتنی بر افزایش متاپولیسیم نداشته است (جدول ۲). در این تحقیق مقادیر مختلف علف‌کش پینوکساندن نیز اختلاف چندانی با هم نشان نداده‌اند.

در مجموع به نظر می‌رسد که توده‌هایی از یولافوحشی که مقاومت آنها نسبت به علف‌کش کلودینافوب پروپارژیل از نوع مقاومت مبتنی بر متاپولیسیم تشخیص داده شده، نسبت به هر سه خانواده آریلوواکسی‌فنوکسی-پروپیونات‌ها (فوپ‌ها)، سیکلوهگزاندیونها (دیم‌ها) و فنیل پیرازولین (دن‌ها) مقاومت عرضی نشان داده‌اند (جدول ۲). این در حالی است که توده‌هایی که مقاومت آنها نسبت به علف‌کش کلودینافوب پروپارژیل از نوع مقاومت مبتنی بر محل عمل ترشیخیس داده شده، فقط نسبت به خانواده آریلوواکسی‌فنوکسی-پروپیونات‌ها (فوپ‌ها) مقاومت نشان دادند. قابل ذکر است که علف‌کش گراسپ (از خانواده سیکلوهگزاندیونها، دیم‌ها) توده‌هایی که مقاومت مبتنی بر محل عمل داشتند را در حد ضعیف و علف‌کش پینوکساندن نیز آنها را کاملاً کنترل کرد. دلیه و میچل (۱۶) و همچنین دلیه (۱۵) معتقدند که مقاومت مبتنی بر تغییر محل هدف عمدتاً به دلیل تغییر در پنجه اسید آمینه در محل کربوکسیل ترنسفراز (آنزیم ACCase) است. آنها اظهار داشتند چنانچه ایزولوسین در جایگاه ۱۷۸۱ بجای لوسین قرار گیرد، مقاومت به علف‌کش ستوكسیدیم که از خانواده سیکلوهگزاندیون است ایجاد می‌شود. اگر تریپتوфан در منطقه ۲۰۲۷ بجای سیستئین، ایزولوسین در منطقه ۲۰۴۱ بجای آسپارژین و گلایسین در منطقه ۲۰۹۶ بجای آلانین قرار گیرد، علف‌هرز نسبت به علف‌کش‌های خانواده آریلوواکسی‌فنوکسی‌پروپیونات مقاوم می‌شود و جابجای اسید آسپاریک با گلایسین در جایگاه ۲۰۷۸ نیز باعث بروز مقاومت نسبت به هر دو خانواده از علف‌کش‌های آریلوکسی فنوکسی‌پروپیونات و سیکلوهگزاندیون می‌گردد (۱۵). در خصوص چگونگی تغییرات بوجود آمده در اسیدهای آمینه آنزیم ACCase در توده‌هایی این آزمایش باید در آینده مطالعات بیشتری صورت گیرد.

کارایی علف‌کش‌های بازدارنده ALS در کنترل توده‌های یولافوحشی حساس و مقاوم

در این آزمایش کارایی پنج علف‌کش از علف‌کش‌های گروه بازدارنده‌های ALS شامل سولفوسولفورون (آپیروس)، سولفوسولفورون+متسلوفورون (توتال)، یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه) و کلروسولفورون (مگاتن)، بر روی توده‌های حساس و مقاوم مورد مطالعه قرار گرفت که در خصوص هر کدام به طور جداگانه بحث خواهد شد.

سولفوسولفورون (آپیروس): این علف‌کش توانست توده حساس و

هال و همکاران (۱۸) معتقدند که کارایی علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در اثر کاربرد مواد افزودنی افزایش می‌یابد. علف‌کش فنوکسایر و پی اتیل بر هر دو توده مقاوم (اعم از مقاومت مبتنی بر متاپولیسیم و مبتنی بر محل عمل) نیز بی تاثیر بود. به طوریکه معمولاً درصد خسارت این علف‌کش به توده‌های مقاوم بر اساس EWRC بین صفر تا یک درصد، درصد تعداد یولافوحشی مقاوم باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی بین ۹۱ تا ۹۹ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد نیز بین ۷۵ تا ۹۹ درصد بود (جدول ۲) که حاکی از بی تاثیری این علف‌کش بر توده‌های مقاوم می‌باشد (جدول ۳ و ۴). با توجه به اینکه مقاومت این توده‌ها قبل از علف‌کش کلودینافوب پروپارژیل گزارش شده بود (۲۸)، عدم تاثیر این علف‌کش بر توده‌های مقاوم احتمالاً به دلیل بروز مقاومت عرضی نسبت به این علف‌کش است (۲۵).

علف‌کش‌های خانواده سیکلوهگزاندیون (دیم‌ها)

ترالکوکسیدیم (گراسپ): همانطور که ملاحظه می‌شود (جدول ۲) علف‌کش گراسپ در کنترل هیچ یک از سه توده یولافوحشی خوب عمل نکرده است. به طوریکه درصد خسارت این علف‌کش به توده حساس بر اساس EWRC برابر ۵۳ درصد، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی ۵۴ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد نیز ۴۰ درصد است (جدول ۲). بنابراین به نظر می‌رسد که علف‌کش گراسپ توده حساس یولافوحشی را در حد کمی مطلوب کنترل نموده است (جدول ۶ و ۷) و تاثیر این علف‌کش بر توده‌های مقاوم ضعیفتر از تاثیر آن بر توده حساس است. موس و همکاران (۲۲) علف‌کش‌هایی شاخصی که قادر به از بین بردن بیوتیپ‌های که مقاومت آنها به خانواده فوپ‌ها و دیمها بر اساس تغییر محل هدف است، معرفی کرده‌اند. البته در این آزمایش علف‌کش ترالکوکسیدم توانست هیچ یک از توده‌های مقاوم را کنترل کند.

علف‌کش‌های خانواده فنیل پیرازولین (دن‌ها)

پینوکساندن (اکسیال): همانطور که ملاحظه می‌شود (جدول ۲) علف‌کش پینوکساندن در کنترل توده یولافوحشی حساس و مقاوم با مکانیزم مبتنی بر تغییر محل هدف یسیار خوب عمل کرده است. به طوریکه درصد خسارت این علف‌کش به توده حساس و مقاوم مبتنی بر محل هدف بر اساس EWRC بین ۹۱ تا ۱۰۰ درصد، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده از توده حساس و مقاوم مبتنی بر محل هدف بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی بین ۴ تا ۱۲ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی توده حساس و مقاوم مبتنی بر محل هدف

درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز بین ۲۵ تا ۵۹ درصد بود (جداوی ۲). تاثیر علفکش شوالیه بر توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل هدف در حد بسیار خوب بود. بخصوص که دز ۴۰۰ گرم آن بهتر از دز ۳۵۰ این توده را کنترل نمود. مجموع درصد خسارت این علفکش به توده مذکور در دز ۴۰۰ گرم در هکتار بر اساس EWRC ۹۲ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی به قبیل از سمپاشی ۸ درصد و درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز ۸۰ درصد بود (جداوی ۲).

کلروسولفورون (مگانن): این علفکش به صورت تیمارهای پیش‌رویشی و پس‌رویشی، هیچ یک از توده‌های یولافوحشی مورد مطالعه را کنترل نکرد. درصد خسارت این علفکش به توده‌های مذکور بر اساس EWRC بین صفر تا ۱۵ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده‌ها در بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و درصد وزن خشک آنها نسبت به شاهد آن نیز ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بود (جداوی ۲، ۳ و ۴).

در مجموع تیمارهای علفکش توتال و شوالیه ۳۵۰ گرم در هکتار به همراه روغن توانستند توده‌های حساس یولافوحشی را در حد بسیار خوب کنترل نمایند (جداوی ۲، ۳ و ۴). همچنین بهترین علفکش برای کنترل توده مقاوم با مکانیزم افزایش متابولیسم نیز ابتداء علفکش سولفوسولفورون+متسلوفورون (توتال) و پس از آن با قدرت کنترلی کمتر علفکش یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه) با دز ۴۰۰ گرم در هکتار بود. ضمناً برای کنترل توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل هدف نیز بهترین علفکش سولفوسولفورون+متسلوفورون (توتال) و یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه) با دز ۴۰۰ گرم در هکتار بود. به طور کلی برای هنگامی که مقاومت محرز است، ولی مکانیزم آن مشخص نیست بهترین علفکش بازدارنده ALS، علفکش سولفوسولفورون+متسلوفورون (توتال) است (جداوی ۲، ۳ و ۴).

کارایی علفکش‌های بازدارنده سنتز چربی در کنترل توده‌های یولافوحشی حساس و مقاوم

پروسولفوکارب: این علفکش تنها علفکشی بود که از گروه بازدارنده‌های سنتز چربی در این آزمایش برای کنترل توده‌های یولافوحشی حساس و مقاوم مورد استفاده قرار گرفت. علفکش مذکور در کنترل توده حساس بسیار خوب عمل نمود، به طوریکه درصد خسارت این علفکش به توده مذکور بر اساس EWRC ۱۰۰ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی ۴ درصد و درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز ۳ درصد بود (جداوی ۲، ۳ و ۴) بود، ولی اثر کنترلی آن بر دو توده مقاوم قابل قبول نبود و در مجموع درصد خسارت این علفکش به توده‌های مذکور بر اساس EWRC ۴ تا ۶۹ درصد، درصد تعداد

توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل هدف را در حد کمی مطلوب کنترل کند. به طوری که درصد خسارت این علفکش به توده حساس و توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل هدف بر اساس EWRC به ترتیب ۷۷ و ۸۰ درصد، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده این دو توده بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی به ترتیب ۳۶ و ۳۱ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد نیز برای آنها به ترتیب برابر ۲۰ و ۴۷ درصد بود. البته آپیروس توده‌های مقاوم با مکانیزم متabolیسم را نتوانست خوب کنترل کند (جدول ۲). در این توده‌ها درصد خسارت علفکش فوق بر اساس ۱۴ EWRC درصد، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده در بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی ۸۷ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد نیز ۵۷ درصد بود (جدول ۲). زند (۱۳۷۸). (زند ۲، اطلاعات منتشر شده) در در یک تحقیق گلخانه‌ای کارایی ۱۰ علفکش را بر روی دو توده حساس یولافوحشی مورد بررسی قرارداد و مشاهده نمود که آپیروس قادر است تا حدود ۸۰ درصد توده‌های یولافوحشی حساس را کنترل نماید.

سولفوسولفورون+متسلوفورون (توتال): این علفکش توانست هر سه توده را در حد بسیار خوب کنترل نماید. درصد خسارت این علفکش به توده حساس بر اساس EWRC ۹۸ درصد، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده از توده حساس در بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی ۵ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی توده حساس نسبت به شاهد آن نیز ۳ درصد بود. برای دو توده مقاوم درصد خسارت این علفکش به بر اساس EWRC بین ۹۹ تا ۹۰ درصد، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده در بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی بین ۲ تا ۲۶ درصد و درصد وزن خشک یولافوحشی نسبت به شاهد آن نیز بین ۴ تا ۷۰ درصد بود. بر اساس گزارش زند و همکاران (۲۵) نیز، علفکش توتال قادر است توده‌های حساس علفه‌ز یولافوحشی را بیش از ۸۰ درصد کنترل نماید.

یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه): این علفکش در هر دو دز ۳۵۰ و ۴۰۰ گرم در هکتار توده حساس را کنترل نمود، ولی کارایی دز ۳۵۰ گرم در هکتار به همراه روغن از دز ۴۰۰ گرم در هکتار بدون روغن بهتر بود. درصد خسارت این علفکش به توده حساس در دو دز ۳۵۰ و ۴۰۰ گرم در هکتار بر اساس EWRC بین ۸۵ تا ۲۲ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی بین ۲۳ تا ۶۳ درصد و درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز بین ۲۴ تا ۲۱ درصد بود (جدول ۲). تاثیر این علفکش بر توده با مکانیزم مقاومت مبتنی بر متabolیسم نسبتاً ضعیف بود. هرچند که دز ۴۰۰ گرم آن نسبتاً کمی بهتر عمل کرد، ولی در مجموع درصد خسارت این علفکش به توده مذکور در هر دو دز مذکور در هکتار بر اساس EWRC بین ۳۰ تا ۵۹ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی نسبت به قبیل از سمپاشی بین ۳۴ تا ۲۱ درصد و

نسبت به شاهد آن نیز ۱۹ درصد بود (جداول ۲، ۳ و ۴) بود. در واقع مشکل این علف‌کش در کنترل توده حساس این بود که وزن خشک این توده‌ها را خوب کاهش داد، ولی نتوانست تعداد را بخوبی کاهش دهد و توده‌های حساس پس از سمپاشی به صورت ضعیف حیات خود را ادامه دادند. البته آنچه مسلم است گیاهانی با این جهه ضعیف در مزرعه قدرت رقابت گیاه زراعی اصلی را ندارند.

تأثیر علف‌کش فوق بر توده مقاوم با مکانیزم افزایش متابولیسم نیز نسبتاً خوب بود، به طوریکه درصد خسارت این علف‌کش به توده‌های مذکور بر اساس EWRC ۸۰ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی ۴ درصد و درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز ۳ درصد بود (جداول ۲، ۳ و ۴) بود.

باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی بین ۴۱ تا ۶۶ درصد و درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز بین ۵۰ تا ۷۶ درصد بود (جداول ۲، ۳ و ۴).

کارایی علف‌کش‌های بازدارنده فتوسنتز در کنترل توده‌های یولافوحشی حساس و مقاوم

ایزوپروتون+دیفلوفینیکان (پتر): این علف‌کش تنها علف‌کشی بود که از گروه بازدارنده‌های فتوسنتز در فتوسیستم II در این آزمایش برای کنترل توده‌های یولافوحشی حساس و مقاوم مورد استفاده قرار گرفت. اثر این علف‌کش بر توده حساس در حدکمی مطلوب بود، به طوریکه درصد خسارت این علف‌کش به توده‌های مذکور بر اساس EWRC ۷۶ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی ۶۷ درصد و درصد وزن خشک آن

جدول ۲ - مقایسه میانگین‌های اثر تیمارهای مختلف از نظر درصد خسارت بر اساس EWRC، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی و درصد وزن خشک یولافوحشی تیمار شاهد

		توده SOR _{1,4} (مقاؤمت مبتنی بر NR _{1,4})				توده حساس					
		توده حساس		تیمار علف‌کشی		تیمار علف‌کشی		تیمار علف‌کشی		نحوه عمل	
درصد وزن خشک	نسبت به شاهد	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	درصد تعداد یولاف	خانواده شیمیایی	نحوه عمل
		درازی	درازی	درازی	درازی	درازی	درازی	درازی	درازی	درازی	درازی
۷۶ab	۹۷a	e	Mab	۹۹a	g	۹۹cd	۵۴cd	۵۰c	دیکلوفوب متل		
۹۸a	۸۲a	e	۹۲a	۹۸a	g	۴۶cd	۵۱cd	۵۳c	دیکلوفوب متل + روغن	ACCase	
۷۷ab	۹۸a	e	۹۱a	۹۹a	g	۱۴ef	۱۵ef	۹۸a	کلودینافوب پروپارازیل	ACCase	
۱۰۰a	۹۲a	e	۹۰a	۹۵ab	g	۳۴e	۲۵e	۸۷ab	کلودینافوب پروپارازیل + روغن	ACCase	
۷۵ab	۹۱a	e	۹۳a	۹۹a	g	۵۸bed	۶۱c	۴۳c	فوکسایپوب بی‌اتیل	ACCase	
۸۷a	۹۷a	e	A4abc	۹۵ab	fg	۴4d	۳۶d	۷۳b	فوکسایپوب بی‌اتیل + روغن	ACCase	
۹۱a	۴۹b	۴۸c	۶۳bcde	۶۶c	abc	۴0d	۵4cd	۵۳c	ترالکوکسیدیم	ديم	ACCase
۳۹bc	۱۲de	۹۶a	۷۰abcd	۷۷abc	de	۱۲ef	۱۰f	۹۱ab	پینوکسادن	۴۵۰	ACCase
۲۲c	۴e	۱۰a	۷۹abcd	۸۶abc	ef	۱۱ef	۲۲e	۹۸a	پینوکسادن	۶۰۰	دن
۴۷cd	۲۱dc	Ma	۵۷de	۸۷abc	ef	۱۴ef	۲۰e	۷۷b	سولفونولفرون		
۷۰ab	۲۶dc	a	۴g	۲g	g	۹۹a	۳f	۹۸a	سولفونولفرون + متیوسولفرون		
۳۰c	۴۲bc	۶4b	۵۹cde	۷۱bc	cd	۳4e	۲۳e	۸۵ab	بدوسولفورون + متیوسولفرون	ALS	
۸-ab	۸e	۹۲a	۲۵f	۳4e	gb	۲۱e	۶۳bc	۷۲b	یدوسولفورون + مزوسولفورون	ALS	
۹۸a	۹۵a	e	۹۲a	۸۴abc	g	۹۴a	۹۹a	۰f	یدوسولفورون + مزوسولفورون	ALS	
۱۰۰a	۷۸a	۱۴d	۸ab	۹7ab	g	۷bcd	۵0cd	۱۵d	کلروسولفورون پس رویشی		
۶۶ab	۴۱bc	۶9b	۵0e	۴4d	fg	۳f	۴f	۱۰0a	کلروسولفورون پیش رویشی	Fatty acid	
۱۲c	۳e	۱۰a	۲1f	۱8f	g	۱۹e	۶7bc	۷6b	پروسولفونکرب	PsII	
a100	e			ab92	de18		a100	f	ایزوپروتون+دیفلوفینیکان		
									شامد	Control	

حروف مشابه در ستون‌ها نشان دهنده آن است که آن تیمارها در آزمون دانکن با یکدیگر تفاوت معنی‌دار ندارند

جدول ۳ - میزان کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل توده‌های مختلف یولافوحشی از نظر درصد خسارت بر اساس EWRC، درصد تعداد یولافوحشی باقیمانده

نحوه عمل شیمیایی خانواده	تیمار علفکشی	توده حساس										توده NR ₁₄ (مقاومت مبتنی بر تغییر متابولیسم)	توده هدف (محل هدف)	تعداد (وزن خشک نسبت به قبل از سماپاشی)	نمره چشمی (%)		
		توده ₁				توده ₂				توده ₃							
		تعداد	وزن خشک	نسبت به قبل از سماپاشی	نمره چشمی (%)	تعداد	وزن خشک	نسبت به قبل از سماپاشی	نمره چشمی (%)	تعداد	وزن خشک	نسبت به قبل از سماپاشی	نمره چشمی (%)				
-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	++	دیکلوفوب میل			
-	-	-	-	-	-	-	++	++-	++-	+++	+++	+++	+++	دیکلوفوب میل + روغن			
+	-	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	++++	++++	++++	++++	کلودینافوب پروپارازیل	ACCase		
-	-	-	-	-	-	-	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	کلودینافوب پروپارازیل + روغن	ACCase		
+	-	-	-	-	-	-	+	++	++	+	+	+	+	فنوكسابروب پی اتیل	ACCase		
-	-	-	-	-	-	-	++	++	++	+++	+++	+++	+++	فنوكسابروب پی اتیل + روغن	ACCase		
-	++	+	+	+	+	+	++	+	++	++	++	++	++	ترالکوکسید ایم دیم			
++	++++	++++	+	+	+	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	پینوکسادن ۴۵۰			
+++	++++	++++	+	-	+	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	پینوکسادن ۶۰۰ دن			
++	+++	++++	+	-	-	-	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	سولفوسولفوروون			
+	+++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	سولفوسولفوروون + متسلوفوروون			
++	++	++	+	+	+	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	مزوسولفوروون + ۳۵۰ روغن	ALS		
?	++++	++++	+++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	یدوسولفوروون + ۴۰۰ اوره	Sulfonil ALS		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کلروسولفوروون پس رویشی			
-	-	-	-	-	-	-	+	++	++	-	-	-	-	کلروسولفوروون پیش رویشی			
+	++	++	++	++	++	++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	پروسولفونکارب Fatty acid			
++++	++++	++++	+++	++++	++++	++++	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	ایزوپرپتون + دیفلوفنیکان PsII			

بعد از سماپاشی نسبت به قبل از سماپاشی و درصد وزن خشک نسبت به شاهد

+	٣٠ تا ٥٠ درصد کنترل	++++	بیش از ۸۰ درصد کنترل
-	کمتر از ٣٠ درصد کنترل	+++	٨٠ تا ٨٠ درصد کنترل
-		++	٧٠ تا ٧٠ درصد کنترل

به طور کلی به نظر می‌رسد که علفکش ایزوپرپتون + دیفلوفنیکان (پنتر) در کنترل توده‌های یولافوحشی اعم از مقاوم و غیر مقاوم خوب عمل نموده و می‌توان از این علفکش بخصوص برای کنترل توده‌های مقاوم به علفکش‌های بازدارنده ACCCase استفاده کرد.

علفکش مذکور همچنین بخوبی توانست توده مقاوم با مکانیزم تغییر محل هدف را کنترل کند، به طوریکه درصد خسارت این علفکش به توده‌های مذکور بر اساس EWRC ۱۰۰ درصد، درصد تعداد باقیمانده این توده در بعد از سماپاشی نسبت به قبل از سماپاشی ۳ درصد و درصد وزن خشک آن نسبت به شاهد آن نیز ۱۲ درصد بود (جداول ۲، ۳ و ۴) بود.

جدول ۴ - میزان کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل توده‌های مختلف یولاف وحشی از نظر میزان کنترل یولاف وحشی

میزان کنترل یولاف وحشی

نحوه عمل	خانواده شیمیایی	نام عمومی علف‌کش	توده حساس	توده	توده SOR_{14} (مقاومت مبتنی بر تغییر محل هدف)	توده NR_{14} (مقاومت مبتنی بر متabolیسم)
ACCase		دیکلوفوب متیل	++	-	-	-
ACCase		دیکلوفوب متیل + روغن	-	-	-	-
ACCase		کلودینافوب پروپارژیل	++++	-	-	-
فوبها		کلودینافوب پروپارژیل + روغن	++++	-	-	-
ACCase		فنوكسابروب پی اتیل	++	-	-	-
ACCase		فنوكسابروب پی اتیل + روغن	+++	-	-	-
ACCase		ترالکوسیدین	++	+	+	+
دیم‌ها		پینوکسادن ۴۵۰	++++	+	+	+
دنهای		پینوکسادن ۶۰۰	++++	+	+	+
ALS		سولفوسولفوروں	+++	-	-	-
ALS		سولفوسولفوروں + متسلولفوروں	++++	++++	++++	++++
ALS	سولفونیل اوردها	یدوسولفوروں + مزوسلولفوروں ۳۵۰ + روغن	++++	+	+	+
ALS		یدوسولفوروں + مزوسلولفوروں ۴۰۰	+++	+++	+++	+++
ALS		کلروسلولفوروں پس رویشی	-	-	-	-
ALS		کلروسلولفوروں پیش رویشی	+	-	-	-
Fatty acid		پروسولفوکارب	++++	++	++	++
PsII		ایزوپروتون + دیفلوفنیکان	+++	++++	+++	+++
بیش از ۸۰ درصد کنترل				۳۰ تا ۵۰ درصد کنترل	+	+
۷۰ تا ۸۰ درصد کنترل				کمتر از ۳۰ درصد کنترل	-	-
۵۰ تا ۷۰ درصد کنترل						++

افزایش متabolیسم علف‌کش‌های سولفوسولفوروں + متسلولفوروں و ایزوپروتون + دیفلوفنیکان بود و علف‌کش‌های یدوسولفوروں + مزوسلولفوروں و پروسولفوکارب نیز به طور نسبی این توده را کنترل نمودند. برای کنترل توده مقاوم با مکانیزم عمل تغییر محل هدف نیز بهترین علف‌کش‌ها شامل پینوکسادن، سولفوسولفوروں، سولفوسولفوروں + متسلولفوروں، یدوسولفوروں + مزوسلولفوروں با ذر ۴۰۰ گرم در هکتار و ایزوپروتون + دیفلوفنیکان بود.

نتیجه گیری

به طور کلی بهترین علف‌کش در این آزمایش برای توده حساس، علف‌کش‌های کلودینافوب پروپارژیل، پینوکسادن، سولفوسولفوروں، سولفوسولفوروں + متسلولفوروں، یدوسولفوروں + مزوسلولفوروں با ذر ۳۵۰ گرم در هکتار، پروسولفوکارب، و ایزوپروتون + دیفلوفنیکان بود. بالته گراسپ و فنوكسابروب پی اتیل نیز به طور نسبی این توده را کنترل نمودند. بهترین علف‌کش برای کنترل توده مقاوم با مکانیزم

منابع

- ۱- بنا کاشانی ف، زند ا، و علیزاده ح.م. ۱۳۸۵. مقاومت بیوتیپ‌های یولاف وحشی (*Avena ludoviciana*) به علف‌کش کلودینافوب پروپارژیل. آفات و بیماریهای گیاهی. ۷۴: ۷۴ - ۱۲۷.
- ۲- دیهیم فرد. ر. و زند ا. ۱۳۸۳. استفاده از مدل EIQ در ارزیابی اثرات زیست محیطی علف‌کش‌ها در اکوسیستم‌های زراعی گندم درکشور. مجله علوم محیطی. شماره ۶: ۹-۱.
- ۳- دزفولی م. ۱۳۷۶. گیاهان هرز کشیده برگ گندمیان ایران. نشر دانشگاهی. ۴۸۰ صفحه.

- راستگو م. ۱۳۸۶. پی جوبی مقاومت یولافوحشی (*Avena ludoviciana*) به علفکش‌های بازدارنده ACCase در مزارع گندم استان خوزستان. پایان نامه دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
- زند ا. باختنی م.ع، بی طرفان م. و شیمی پ. ۱۳۸۶. راهنمای کاربرد علفکش‌های ثبت شده در ایران. جهاد دانشگاهی مشهد.
- زند ا. ۱۳۸۳. مقاومت به علفکش‌های خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در علف‌هرز یولافوحشی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی شماره ۸۳/۱۶۷۲ مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. ۲۸ صفحه.
- زند ا و باختنی م.ع. ۱۳۸۱. مقاومت به علف کشها در علف‌های هرز. جهاد دانشگاهی مشهد. ۱۷۶ صفحه.
- زند ا. ۱۳۸۳. بررسی کارایی فرمولاسینون‌های مختلف علفکش‌های تربیت‌بندان متیل و فنوکسابرپ پی اتیل در مزارع گندم کشور. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. شماره ثبت ۸۵/۳۰۳.
- منتظری م.، زند ا. و باختنی م.ع. ۱۳۸۴. علف‌های هرز و کنترل آنها در کشتزارهای گندم ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. ۸۵ صفحه.
- ۱- مین باشی م و همکاران. ۱۳۸۶. رهیافتی تحلیلی بر مدیریت علف‌های هرز مزارع گندم آبی ایران (سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴). مجموعه مقالات کلیدی دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران. صفحات ۷-۲۶.
- ۱۱- نجفی ح.، زند ا. و باختنی م.ع. . بیولوژی علف‌های هرز ایران. مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ایران. (زیر چاپ).
- ۱۲- نظری ف. و زند ا. . استفاده از روش ملکولی برای تشخیص علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوانزیم آکربوکسیلاز(ACCase). دهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران . صفحه ۲۶۰.
- 13- Beckie H. 2006. Herbicide resistant weeds: Management actions and practices. *Weed Technol.* 20: 793-814.
- 14- Beckie H.J., Hall L.M., Merris S., Laslo J.J., and Stevenson F.C. 2004. Management practices influencing herbicide resistance in wild oat. *Weed Technol.* 18: 853-859.
- 15- Delye C. 2005. Weed resistance to acetyl coenzyme A carboxylase inhibitors: an update. *Weed Sci.* 53: - 728-746.
- 16- Delye C., and Michel S. 2005. Universal primers for PCR-sequencing of grass chloroplastic acetyl-CoA carboxylase domain involved in resistance to herbicide. *Weed Res.* 45: 323-330.
- 17- Devine M.D., and Shukla A. 2000. Altered target sites as a mechanism of herbicide resistance. *Crop Protec.* 19: 881-889.
- 18- Hall L.M., Beckie H.J., and Wolf T.M. 1999. How herbicides work? Biology to application. Alberta Agriculture food and Rural development.
- 19- Harminder P.S., Batish D.R., Kohli R.K. 2006. Handbook of Sustainable Weed Management. Food and Product Press .
- 20- Heap I. 2007. International survey of herbicide resistance weeds. Online Internet. 20 April 2001. <http://www.Weed science.com>.
- 21- Medd R.W. 1996. Ecology of Wild Oats. *Plant Protection Quarterly* 11: (sup 1) 185-187.
- 22- Moss S.R., Perryman S.A.M., and Tatnell L.V. 2007. Managing herbicide-resistance black grass (*Alopecurus myosuroides*) theory and practice. *Weed. Technol.* 21: 300-309.
- 23- Sandral G.H., Dear B.S., Pratley J.E., and Cullis B.R. 1997. Herbicide dose response rate response curve in subterranean clover determined by a bioassay. *Aust Jour of Exper Agri.* 37: 67-74.
- 24- Tomlin C.D.S . 2005. A World Compendium ,the-Pesticide Manual. Brithis Crop Protect Concil.
- 25- Thill D.C., and Lemerle D. 2001. World wheat and herbicide resistance. In *Herbicide Resistance and World Grains*. Powells, S.B and D.L. Shanner. CRC Press. pp 165-194.
- 26- Zand E., Baghestani M.A., Soufizadeh S., Skandari E., PourAzar R., Veysi M., Mousavi K., and Barjasteh A. 2007. Evaluation of some newly registered herbicide for weed control in wheat (*Triticum aestivum L.*) in Iran. *Crop Protect.* 26: 1349-1358
- 27- Zand E., Bena Kashani F., Baghestani M.A., Maknali A., Minbashi M., and Soufizadeh S. 2007. Investigating the distribution of resistant wild oat (*Avena ludoviciana*) populations to clodinafop-propargil herbicide in south western Iran. *Environ.* 3: 85-92.
- 28- Zand E., Bena Kashani F., Porbage M., and Baghestani M.A. 2009. Resistiance of wild oat (*Avena spp.*), canary grass (*Phalaris spp.*) and ryegrass (*Lolium multiflorum*) to clodinafop-propargil herbicide in some provice of Iran. *Environmental Science.* 7: In Press.